UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
CAMPUS BOTUCATU-SP

**EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DA DESLORELINA POR
70 DIAS NA FORMA DE IMPLANTE NA DINÂMICA
FOLICULAR, PERFIL ENDÓCRINO E EXPRESSÃO DE
RECEPTORES ENDOMETRIAIS DE ESTRÓGENO,
PROGESTERONA E OCITOCINA DE VACAS NELORE
(*Bos taurus indicus*)**

WOLFF CAMARGO MARQUES FILHO

AGOSTO, 2011

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
CAMPUS BOTUCATU-SP

**EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE DESLORELINA POR
70 DIAS NA FORMA DE IMPLANTE NA DINÂMICA
FOLICULAR, PERFIL ENDÓCRINO E EXPRESSÃO DE
RECEPTORES ENDOMETRIAIS DE ESTRÓGENO,
PROGESTERONA E OCITOCINA DE VACAS NELORE
(*Bos taurus indicus*)**

WOLFF CAMARGO MARQUES FILHO

Tese apresentada à Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da
UNESP – Botucatu para obtenção do título
de Doutor em Medicina Veterinária, Área
de Reprodução Animal.

Orientador: Prof. Dr. Adj. João Carlos Pinheiro Ferreira

Agosto, 2011

COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

Autor: Wolff Camargo Marques Filho

Titulo: Efeito da administração de Deslorelina por 70 dias na forma de implante na dinâmica folicular, perfil endócrino e expressão de receptores endometriais de estrógeno, progesterona e ocitocina de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*)

Data: 22/08/2011

Nome	Assinatura
Prof. Dr. João Carlos Pinheiro Ferreira	_____
Prof. Dr. Nereu Carlos Prestes	_____
Prof. Dr. Sony Dimas Bicudo	_____
Prof^a. Dr^a. Ines Cristina Giometti	_____
Prof^a. Dr^a. Jeanne Broch Siqueira	_____

DEDICATÓRIA

Em especial, aos meus pais, Wolff e Olinda, por todo suporte emocional e educacional, por todo apoio, dedicação, confiança, incentivo, cuidado e paciência.

As minhas irmãs, Rafaella e Marcella e, seus namorados David e Rodrigo pela amizade, carinho, torcida e preocupação.

À minha companheira e namorada, Letícia Ferrari Crocomo, pelo amor, apoio, cumplicidade, paciência e confiança, e aos seus familiares, que considero como meus, por todo apoio, carinho e cuidado.

A todos meus familiares.

E a todos meus professores pelos ensinamentos, paciência e incentivo.

AGRADECIMENTOS

À minha querida família, que amo tanto e, minha eterna companheira de todos os momentos, Letícia e seus familiares, Wilson, Antonieta, Leandro e Luciana que foram, são e sempre serão essenciais e especiais em minha vida.

A todos os meus professores, pelos ensinamentos e convívio diário. Em especial ao meu amigo e orientador Professor Doutor João Carlos Pinheiro Ferreira, pela oportunidade, ensinamentos e apoio.

Aos professores colaboradores deste projeto: Alexandre Secorun Borges, Cezinande de Meira, Eunice Oba, Giovana Wingeter Di Santis, Guilherme de Paula Nogueira, Miriam Harumi Tsunemi, Renée Laufer Amorim e Roberto Sartori Filho.

À equipe de pesquisa coordenada pelo Professor João, aos demais pós-graduandos colaboradores, José Paes de Oliveira Filho e Ian Martin e, em especial à Caroline Junko Fujihara.

Aos meus amigos, colegas de trabalho, funcionários e amigos da Biblioteca, FMVZ e UNESP e, estagiários, pela amizade, apoio, paciência e auxílio durante toda Pós-graduação e contribuição para execução desta pesquisa.

À FUNDUNESP, pelo auxílio pesquisa concedido, que permitiu a confecção do trabalho.

À FAPESP, pela bolsa e auxílio pesquisa concedidos, que possibilitaram a realização do doutorado.

À Peptech Animal Health pela concessão dos implantes subcutâneos da Deslorelina (Suprelorin®).

À Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia/UNESP-Botucatu, pela formação pessoal e profissional.

Ao Curso de Pós-graduação, pelo aprimoramento científico.

A todos que direta ou indiretamente contribuíram para meu crescimento e formação pessoal, intelectual e profissional e que, por falha de minha memória, não tenham sido mencionados.

LISTA DE TABELAS

	Pág
Capítulo 2	44
Tabela 1. Sequências nucleotídicas dos <i>primers</i> utilizados nas reações de PCR em tempo real.....	57
Tabela 2. Concentração plasmática de P ₄ (média ± desvio padrão) (ng/mL) de vacas Nelore (<i>Bos taurus indicus</i>) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina -Suprelorin [®]) por 70 dias. Valores com letras diferentes são significativamente diferentes.....	65

LISTA DE FIGURAS

		Pág
Capítulo 2		44
Figura 1.	Protocolo de sincronização da ovulação de vacas Nelore (<i>Bos taurus indicus</i>). BE (Estrogin [®] , Farmavet Ltda, Brasil); P ₄ (DIB [®] , Intervet Schering-Plough, Brasil); PGF _{2α} (Dinoprost trometamina, Lutalyse [®] , Pfizer Saúde Animal, Brasil); D-1 e D0: exame ultra-sonográfico transretal a cada 12 horas para determinação da ovulação.....	50
Figura 2.	Número médio de folículos classe I (< 0,4 cm), II (0,4-0,6 cm) e III (>0,6 cm) em vacas Nelore (<i>Bos taurus indicus</i>) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin [®]) por 70 dias. Barras com letras diferem significativamente.....	61
Figura 3.	Dinâmica folicular da vaca A durante os primeiros 35 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin [®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e folículos subordinados (FS).....	62
Figura 4.	Dinâmica folicular da vaca I durante os primeiros 35 dias durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin [®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e folículos subordinados (FS).....	63
Figura 5.	Dinâmica folicular da vaca A durante os últimos 20 dias durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin [®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e folículos subordinados (FS).....	64
Figura 6.	Média e desvio padrão da concentração plasmática de LH (ng/mL) em vacas Nelore (n=7) nos D4, 20, 27, 42 e 61 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin [®]) por 70 dias.....	66

- Figura 7.** Concentração plasmática de LH (ng/mL) mensurada a cada quinze minutos por seis horas das vacas B, G, H e I no D20 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Cada círculo representa um pico de LH..... **67**
- Figura 8.** Concentração plasmática de LH (ng/mL) mensurada a cada quinze minutos por seis horas das vacas A, B, C, I no D62 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Cada círculo representa um pico de LH..... **68**
- Figura 9.** Média e desvio padrão da concentração plasmática de FSH (ng/mL) em vacas Nelore (n=7) nos D4, 20, 27, 37 e 61 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias..... **69**
- Figura 10.** Porcentagem de núcleos positivos do receptor de estrógeno *alfa* (E α R) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial, de estrógeno *beta* (E β R) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial, de progesterona *isoforma* AB (PABR) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial, de progesterona *isoforma* B (PBR) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*) nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Barras com letras diferem significativamente..... **71**
- Figura 11.** Percentual de intensidade de imunomarcção fraca, moderada e forte dos receptores endometriais de estrógeno *alfa* (E α R) e *beta* (E β R), de progesterona *isoforma* AB (PABR) e B (PBR) de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias..... **72**

- Figura 12.** Expressão relativa média do RNAm (X fold) dos receptores endometriais de estrógeno *alfa* (E α R) e *beta* (E β R), de progesterona *isoforma* AB (PABR) e de ocitocina (OTR) de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias..... **74**

LISTA DE ABREVIATURAS

AMPc = segundo mensageiro

BE = benzoato de estradiol

BMP-15 = proteína morfogenética óssea-15

BST = somatotropina bovina

CL = corpo lúteo

Ckit = receptor do kit ligante

E₂ = estradiol

ECC = escore de condição corporal

EGF = fator de crescimento epidermal

ER = receptor de estrógeno

E α R = receptor de estrógeno α

E β R = receptor de estrógeno β

FLk1/KDR ou VEGF/R1 = receptores tirosina kinase do fator de crescimento endotelial vascular tipo 1

FLt1/KDR ou VEGF/R2 = receptores tirosina kinase do fator de crescimento endotelial vascular tipo 2

FD = folículo dominante

FGF = fator de crescimento fibroblástico

FS = folículo subordinado

FSH = hormônio folículo estimulante

FSHR = receptor do hormônio folículo estimulante

GDF-9 = fator de crescimento diferencial 9

GnRH = hormônio liberador de gonadotrofinas

GnRH α = agonista do hormônio liberador de gonadotrofinas

GnRHR = receptor do hormônio liberador de gonadotrofinas

IATF = inseminação artificial em tempo fixo

IGF = fator de crescimento semelhante a insulina

IGF-I = fator de crescimento semelhante a insulina tipo I

IGFBP-2 = proteínas ligantes a IGF tipo 2

IGFBP-3 = proteínas ligantes a IGF tipo 3

IL = interleucina

i.m = injeção intramuscular

KL = kit ligante

LH = hormônio luteinizante

LHR = receptor do hormônio luteinizante

OT = ocitocina

OTR = receptor de ocitocina

P₄ = progesterona

PR = receptor de progesterona

PAR = receptor de progesterona *isoforma A*

PBR = receptor de progesterona *isoforma B*

PABR = receptor de progesterona *isoforma AB*

PGFM = 13, 14 diidr-15ceto prostaglandina

PIB = produto interno bruto

PR = receptor de progesterona

qRT-PCR = quantitativo transcriptase reversa da reação em cadeia de polimerase (PCR em tempo real)

RT-PCR = transcriptase reversa da reação em cadeia de polimerase

TGF = fator de crescimento transformante

TGF- β = fator de crescimento transformante tipo β

TZP = processo citoplasmático trans-zonais

VEGF = fator de crescimento endotelial vascular

VEGFA = fator de crescimento endotelial vascular A

VPF = fator de permeabilidade vascular

SUMÁRIO

RESUMO	xvii
ABSTRACT	xix
CAPÍTULO 1	1
1. INTRODUÇÃO	2
2. REVISÃO DE LITERATURA	3
2.1 Ciclo estral bovino.....	3
2.2 Hormônios e receptores hormonais.....	4
2.2.1 Hormônio liberador de gonadotrofina.....	5
2.2.2 Gonadotrofinas.....	6
2.2.3 Estrógenos.....	8
2.2.4 Progestágenos.....	12
2.2.5 Ocitocina.....	14
2.2.6 Prostaglandina.....	15
2.3 Dinâmica folicular.....	15
2.3.1 Folículos pré-antrais.....	15
2.3.2 Folículos antrais.....	17
2.3.3 Luteinização.....	19
2.3.4 Luteólise.....	20
2.4 Agonistas de GnRH.....	21

3. REFERÊNCIAS.....	23
CAPÍTULO 2.....	44
Efeito administração de Deslorelina por 70 dias na forma de implante na dinâmica folicular, perfil endócrino e expressão de receptores endometriais de estrógeno, progesterona e ocitocina de vacas Nelore (<i>Bos taurus indicus</i>).....	45
Resumo.....	46
Introdução.....	48
Material e métodos.....	49
Animais e instalações.....	49
Sincronização da ovulação.....	50
Implantação da Deslorelina.....	50
Avaliações ultra-sonográficas.....	51
Dosagem hormonal.....	51
Biópsias endometriais.....	52
Imunoistoquímica.....	53
Extração do RNA, confecção do cDNA e qRT-PCR.....	55
Análise estatística.....	58
Resultados.....	59
Discussão.....	74
Conclusão.....	84

Agradecimentos.....	84
Referências.....	84
CAPÍTULO 3.....	96
Fisiologia do ciclo estral da fêmea bovina.....	97
Resumo.....	98
Abstract.....	99
Resumén.....	100
Introdução.....	101
Ciclo estral bovino.....	102
Dinâmica folicular.....	102
Folículos pré-antrais.....	102
Folículos antrais.....	103
Luteinização.....	105
Luteólise.....	105
Diferenças entre <i>Bos taurus taurus</i> X <i>Bos taurus indicus</i>	106
Hormônios e receptores hormonais.....	106
Hormônio liberador de gonadotrofina.....	107
Gonadotrofinas.....	107
Fatores angiogênicos.....	109
Estrógenos e receptores de estrógeno.....	111

Progestágenos e receptores de progesterona.....	113
Ocitocina e receptores de ocitocina.....	114
Prostaglandina.....	115
Considerações finais.....	116
Referências bibliográficas.....	117

RESUMO

MARQUES FILHO, W. C. **Efeito da administração de Deslorelina por 70 dias na forma de implante na dinâmica folicular, perfil endócrino e expressão de receptores endometriais de estrógeno, progesterona e ocitocina de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*)**. Botucatu, 2011, 124P. (Tese de Doutorado em Medicina Veterinária, Área: Reprodução Animal) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Botucatu.

O objetivo deste foi avaliar os efeitos da utilização de implantes subcutâneos de Deslorelina (agonista de GnRH-Suprelorin[®]) por 70 dias sob a dinâmica folicular, secreção de FSH, LH e P₄ e, a expressão gênica e proteica dos receptores endometriais de estrógeno α e β (E α R e E β R), de progesterona isoformas A e B (PABR e PBR) e de ocitocina (OTR) em vacas Nelore (*Bos taurus indicus*). Foi sincronizada a ovulação de 15 vacas Nelore com escore de condição corporal (ECC) ≥ 3 e, no D0 foram aleatoriamente selecionados 7 animais para serem submetidos a implantação subcutânea de Deslorelina por 70 dias. O exame ultra-sonográfico foi realizado para caracterização da dinâmica folicular e os folículos foram classificados em classes: I (< 0,4 cm), II (0,4-0,6cm) e III (> 0,6cm). Amostras de sangue foram coletadas para mensuração das concentrações plasmáticas de FSH, LH e P₄. A pulsatilidade e os picos de LH foram determinados a partir de amostras sanguíneas coletadas a cada 15 minutos por 6 horas em 4 vacas escolhidas aleatoriamente nos D20 e D62. A mensuração da expressão proteica dos E α R, E β R, PABR e PBR no epitélio glandular e estroma uterino foram mensurados por meio da técnica da imunistoquímica e, a expressão gênica dos E α R, E β R, PABR e OTR foi avaliada com auxílio da técnica de qRT-PCR, ambas a partir de fragmentos coletados por meio de biópsias uterinas nos dias 0, 4, 20 e 27. Os resultados

foram analisados por meio do teste não paramétrico de Friedman e Exato de Fisher. A relação dos resultados entre a dinâmica folicular e expressões gênica e proteica foi analisada pela correlação de Pearson, todos com nível de significância de 0,05. Durante os 70 dias de implantação da Deslorelina nenhum animal ovulou, indicando que o pico pré-ovulatório de LH foi abolido. O número máximo de folículos recrutados foi de 13,7 ($\pm$ 3,86). Os folículos de classe III não foram observados na maioria dos animais a partir do D48. A concentração plasmática da P₄ se manteve em nível basal (0,4 ng/mL) durante todo o período de implantação. A secreção de FSH e LH não foi abolida ao longo do estudo. A frequência de pulsos de LH observada no D20 e D62 foi, respectivamente 1 ($\pm$ 0)/6 h e 1,25 ($\pm$ 0,5)/6h. As concentrações plasmáticas máximas durante os pulsos foram de 1,72 ($\pm$ 0,24) e 1,24 ($\pm$ 0,31) ng/mL, respectivamente. De forma geral, foi observado alto percentual de núcleos positivos dos ER e PR ao longo do estudo, bem como a alta concentração de RNAm de ER, PR e OTR. Sendo assim, se infere que o tratamento por 70 dias com implantes subcutâneos de Deslorelina suprime o recrutamento e a seleção folicular, inibe a ovulação, reduz a pulsatilidade de LH, inibe o pico pré-ovulatório de LH e, mantém elevada a expressão dos receptores endometriais de estrógeno, progesterona e ocitocina em vacas Nelore (*Bos taurus indicus*).

Palavras-chaves: Nelore, Deslorelina, dinâmica folicular, hormônios, receptor endometrial.

ABSTRACT

MARQUES FILHO, W. C. **Effect of administration of Deslorelin for 70 days in the form of implant in follicular dynamic, endocrine regulation, and expression of estrogen, progesterone and oxytocin endometrial receptors in Nelore (*Bos taurus indicus*) cows.** Botucatu, 2011, 124P. (Tese de Doutorado em Medicina Veterinária, Área: Reprodução Animal) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Botucatu.

The objective this study is to evaluate the effects of subcutaneous implant Deslorelin (GnRHa-Suprelorin[®]) by 70 days on the endocrine dynamic, the follicular development and, gene and protein expression of endometrial receptors of estrogen α and β (E α R and E β R), progesterone *isoforms* A and B (PABR and PBR), and oxytocin (OTR) of Nelore (*Bos taurus indicus*) cows. Ovulation of 15 Nelore cows with BCS ≥ 3 was synchronized following of implantation of Deslorelin in 7 animals for 70 days. During this period, the ovaries were scanned by ultrasonography to characterize the follicular dynamics, where the follicles were divided in class: I (< 0.4 cm), II (0.4-0.6 cm) and III (> 0.6 cm). Blood samples were collected before of each ultrasonographic exam for later measurement of plasma FSH, LH and P₄. The assessment of LH pulsatile secretion was measured on blood samples collected every 15 minutes for six hours through the jugular catheterization in four randomly chosen cows on D20 and D62. The protein expression of E α R and E β R, PABR and PBR of endometrial glandular epithelial and stromal was measured using the technique of immunohistochemistry and the quantification of gene expression of E α R, E β R, PABR and OTR by qRT-PCR technique from fragments collected through endometrials biopsies on days 0, 4, 20 and 27. Others two samples of endometrium were used for. The comparison between the moments of the measures was performed using the nonparametrics tests of the Friedman and Fisher's Exact. The relationship between the results of follicular dynamics, gene and protein expression was performed by Pearson correlation, all with a significance level of 0.05. During the 70 days of implantation of Deslorelin neither animal ovulated, indicating that the preovulatory peak of LH was

abolished. The maximum number of follicles (13.7 ± 3.86). The class III follicles were present in most animals until the D48. Plasma concentration of P_4 remained at basal levels (0.4 ng/mL) throughout the period. The serum level of FSH and LH did not differ and was not abolished throughout the study. The frequency of LH pulses observed in D20 and D62 were $1 (\pm 0)/6$ h and $1.25 (\pm 0.5)/6$ h, and the peak plasma concentrations during the pulses were $1.72 (\pm 0.24)$ and $1.24 (\pm 0.31)$ ng/mL, respectively. In general, was observed a high percentage of positive nuclei of ER and Pr throughout the study, as well as the high concentration of mRNA of ER, PR and OTR. Therefore, conclude that the treatment with Deslorelin implants for 70 days suppresses follicular recruitment and selection, inhibits ovulation, reduces the pulsatility and LH surge, inhibits preovulatory peak of LH and remains high the expression of endometrial receptors of estrogen, progesterone and oxytocin in Nelore (*Bos Taurus indicus*) cows.

Keywords: Nelore, Deslorelin, follicular dynamic, hormones, endometrial receptor.

Capítulo 1

1. INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos, o Brasil é o país que mais transferiu embriões produzidos *in vitro* do mundo e é o segundo que mais produziu embriões *in vivo*. Além disso, é o segundo maior produtor de carne e o sexto maior produtor de leite (IETS, 2006; IBGE, 2008).

Em 2007, o rebanho era constituído por aproximadamente 199,7 milhões de cabeças, destas 80% de origem Zebuína, com alto poder de tolerância ao clima tropical (adaptabilidade e rusticidade) e criadas de forma extensiva nas regiões Centro-oeste e Norte (IBGE, 2008).

Apesar disso, o rebanho brasileiro caracteriza-se por índices produtivos médios comprometedores em termos de produtividade e sustentabilidade econômica da atividade, que possuem grande variação de acordo com os autores, o que pode estar associado aos fatores como: a extensão territorial do Brasil, as diferenças de manejo e nutrição nas propriedades, época do ano e variação genética dos animais. A taxa de natalidade é de 65%, a taxa de mortalidade de bezerras é de 8%, a idade ao primeiro parto é de 36 meses, o intervalo entre partos é de 18 meses e o período de serviço de 9 meses (ANUALPEC, 2004).

As particularidades fisiológicas que acometem estes animais durante a fase do anestro pós-parto, as características e os fatores que determinam a duração do anestro e do primeiro ciclo estral após o período de anestro (ciclo curto) ainda não foram totalmente elucidados.

Sabe-se que, independentemente da fase da vida do animal, a regulação entre os vários sistemas do organismo ocorre pela regulação de forma rápida e direta do sistema nervoso por meio dos prolongamentos nervosos dispostos pelo corpo e, de forma indireta e lenta, pelo sistema endócrino que regula a homeostase e as diversas funções específicas, tais como o desenvolvimento folicular ovariano, o comportamento sexual, a gestação, o parto e a lactação (HAFEZ & HAFEZ, 2000; RANDALL *et al.*, 2000; SWENSON & REECE, 2006; CUNNINGHAM, 2008).

A função reprodutiva durante o ciclo estral é modulada pelo padrão de secreção e concentração sérica dos hormônios da reprodução por meio dos processos de retroalimentação, bem como pela expressão gênica e proteica

dos receptores hormonais do aparelho reprodutivo e tecidos conexos (RAW *et al.*, 1995; RAZANDI *et al.*, 1999; MOWA & IWANGA, 2000a, b; MANN *et al.*, 2001; BERISHA *et al.*, 2002).

As pesquisas que visam elucidar a fisiologia geral, a forma de regulação sobre a função reprodutiva e as reações do organismo em específicas fases da vida reprodutiva dos bovinos vêm sendo desenvolvidas com intuito de incrementar o uso da biotécnicas da reprodução, o que resultará na maximização da eficiência reprodutiva do rebanho nacional, no avanço na produção agropecuária e aumento significativo do PIB agrícola.

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da utilização de implantes subcutâneos de Deslorelina (Agonista de GnRH - Suprelorin[®]) por 70 dias, sob a dinâmica folicular, secreção da P₄ e LH e, expressão gênica e proteica dos receptores endometriais de estrógeno α e β (E α R e E β R), progesterona *isoforma* A e B (PAR e PBR) e ocitocina (ROT) de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Ciclo estral bovino

O ciclo estral em fêmeas bovinas maduras sexualmente inicia-se após a puberdade sendo interrompido durante a gestação e as fases de anestro. Trata-se do período compreendido entre dois episódios de estro ou cio, de duração variável que apresenta fases distintas caracterizadas por modificações internas e externas no trato reprodutivo feminino, assim como no comportamento dos animais (SENGER, 2003).

Os bovinos são animais poliéstricos anuais que apresentam um ciclo estral com duração aproximada de 21 (17 a 24) dias e normalmente apresentam 2 a 3 ondas de crescimento folicular (GINTHER *et al.*, 1989a; BARROS *et al.*, 1992; BARROS *et al.*, 1993).

O ciclo estral bovino pode ser dividido em duas fases, baseada nas concentrações plasmáticas dos hormônios predominantes em cada uma delas. A fase denominada folicular compreende o proestro e o estro, perdura três a quatro dias, tem início após a secreção de PGF_{2 α} e a luteólise, caracteriza-se pelo desenvolvimento folicular e a predominância de altas concentrações

plasmáticas de estradiol, culminando com o pico pré-ovulatório de LH e, conseqüentemente a ovulação, que marca o início da fase seguinte. A fase luteal inclui o metaestro e o diestro, caracteriza-se pelo desenvolvimento do CL e pela crescente ou maior concentração de progesterona plasmática, e dura aproximadamente 18 a 19 dias (WILTBANK *et al.*, 2002; SENGER, 2003).

2.2 Hormônios e receptores hormonais

O ciclo estral é regulado por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos envolvendo, principalmente os hormônios hipotalâmicos (hormônio liberador de gonadotrofinas – GnRH), hipofisários (hormônio luteinizante – LH e hormônio folículo estimulante – FSH) e gonadais (E₂, P₄ e inibina) (GINTHER, 2000; HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003).

De maneira geral, esta regulação é efetuada pelas concentrações plasmáticas dos hormônios protéicos e esteróides cíclicos na corrente sanguínea que atingem os diferentes órgãos alvos de diversas formas (RAW *et al.*, 1995; RAZANDI *et al.*, 1999; MOWA & IWANGA, 2000a, b).

A maioria dos hormônios comunica-se com as diversas células do organismo via endócrina, onde as glândulas secretam hormônios diretamente na corrente sanguínea com intuito de regular as células específicas (células-alvo) (SENGER, 2003).

A regulação parácrina consiste na comunicação entre as células vizinhas por meio dos produtos celulares, e a autócrina, caracteriza-se pela produção de mensageiros químicos secretados por células que atuarão sobre elas mesmas ao se unirem à receptores específicos (HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003).

A regulação da secreção dos diversos hormônios ocorre por meio de retroalimentação ou *feedback* negativo, quando inibem a secreção, e positivo, ao estimularem a secreção hormonal. São descritos outros mecanismos de regulação, como por meio de reflexos neuroendócrinos, evidenciado durante o processo de liberação do leite quando o bezerro realiza estimulação mecânica do teto, com conseqüente, liberação de ocitocina (OT) e prolactina. Há ainda o controle exócrino, realizado por meio dos feromônios (HAFEZ & HAFEZ, 2000).

Entretanto, para os hormônios realizarem suas funções no organismo não basta estarem presentes na corrente sanguínea em concentrações

satisfatórias, é imprescindível a sua ligação com receptores específicos de membrana plasmática e nuclear, que normalmente são proteínas ou glicoproteínas (SENGER, 2003; SCHILLO, 2009).

Para os hormônios protéicos LH e FSH exercerem sua função é necessária sua ligação com os receptores presentes na membrana plasmática para que penetrem nas células do tecido-alvo onde se ligam aos seus receptores citoplasmáticos específicos (KUIPER *et al.*, 1997; HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003).

Já os hormônios esteróides penetram pela membrana citoplasmática. Certas células são capazes de concentrar e utilizar esteróides por intermédio da síntese de receptores citoplasmáticos específicos. O complexo esteróide-receptor citoplasmático é transferido para o núcleo, onde se liga aos receptores específicos na cromatina. Segue-se a síntese de RNA polimerase e a produção de RNA mensageiro. Assim, a capacidade de síntese de proteína por uma célula ocorre após 30 minutos da interação inicial entre o esteróide e o receptor citoplasmático (DUKES, 1996; HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003; VALLEJO, 2005).

2.2.1 Hormônio liberador de gonadotrofina

O GnRH é um decapeptídeo sintetizado por células neuroendócrinas na área pré-óptica do hipotálamo, e após ser liberado, sob a forma de pulsos, atinge a adenohipófise através do sistema porta-hipotalâmico-hipofisário, desencadeando a secreção do FSH e LH (CLARKE, 1988; FERRIS & SHUPNIK, 2006; KRIEGSFELD & SILVER, 2006).

O GnRH liga-se aos receptores específicos de membrana que ativam as proteínas G, que por sua vez ativam a enzima adenilciclase, responsável em transformar ATP em AMPc (2º mensageiro) no citoplasma. Este segundo mensageiro ativa quinases proteicas, desencadeando a formação de novas proteínas. As próprias concentrações do GnRH regulam a expressão dos receptores de GnRH (GnRHR) hipofisários (SENGER, 2003; KRIEGSFELD, 2006; SCHILLO, 2009).

O FSH e o LH são liberados de maneira pulsátil na circulação sistêmica e atuam nas gônadas regulando a gametogênese e secreção dos estrógenos gonadais (STANISLAUS *et al.*, 1998; FERRIS & SHUPNIK, 2006).

2.2.2 Gonadotrofinas

O FSH e o LH são secretados pelas células da pituitária anterior (Adenohipófise), de acordo com a estimulação ou a inibição do GnRH, regulados por meio de *feedback* positivo e negativo de acordo com a secreção e a concentração plasmática dos hormônios gonadais, e são chamados de gonadotrofinas por estimular a secreção hormonal dos ovários e dos testículos (gônadas) (SENGER, 2003).

A principal função do FSH na fêmea é promover o crescimento dos folículos, que são responsáveis pela produção de estradiol. O pico de estradiol é seguido pelo pico pré-ovulatório de LH, imprescindível ao processo ovulatório, que acarreta a formação do CL por meio da luteinização das células da granulosa e da teca (HAFEZ & HAFEZ, 2000).

O sistema circulatório envolvido nesse processo é conhecido como sistema porta hipotalâmico-hipofisário, composto por uma rede de capilares. O GnRH é secretado pelo centro tônico hipotalâmico em resposta aos baixos níveis de LH ou FSH (*feedback* positivo) e sua liberação provoca aumento da secreção dos hormônios hipofisários. Aparentemente a liberação de LH é mais responsiva ao hormônio liberador de gonadotrofina que a liberação de FSH (HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003).

A formação do complexo FSH/receptor de FSH (FSHR) desencadeia uma série de processos no interior das células da granulosa do folículo, que incluem o aumento da produção de fluido folicular, da exposição de novos receptores de membrana para FSH, das junções comunicantes GAP, da atividade da enzima aromatase P450, da expressão dos receptores para LH e da síntese de estradiol a partir de andrógenos sob ação sinérgica das células da teca e granulosa (HAFEZ & HAFEZ, 2000).

As concentrações de RNAm de FSHR estão presentes em maior quantidade nas células da granulosa foliculares nos dias 1, 3, 5, 7 e 10 do ciclo estral, e no CL nos primeiros dias após ovulação (RAJAPAKSHA *et al.*, 1996; HAFEZ & HAFEZ, 2000).

Os receptores para LH (LHR) estão presentes nas células da teca e da granulosa dos folículos e no CL dos bovinos (WANDJI *et al.*, 1992; HAFEZ & HAFEZ, 2000). Esses receptores desencadeiam a síntese de andrógenos a

partir do colesterol e a formação de novos receptores para LH (HAFEZ & HAFEZ, 2000; SENGER, 2003).

Os LHR das células da granulosa parecem estar relacionados à dominância folicular. Durante a fase de desvio folicular, de forma sinérgica, o aumento dos receptores para FSH, nas células da granulosa do folículo dominante, e dos receptores para LH, nas células da teca interna, estimula a expressão de receptores de LH nas células da granulosa e, conseqüentemente, o aumento na produção de estradiol pelo folículo pré-ovulatório (BAO & GARVERICK, 1998; BURATINI, 2007).

Após o pico de FSH e o declínio dos níveis circulantes deste hormônio, ocorre a atresia dos folículos subordinados recrutados no início da onda de crescimento folicular (GINTHER *et al.*, 1997). A partir de então ocorre o fenômeno da divergência ou desvio folicular, definida como o início da mudança nas taxas de crescimento entre o folículo selecionado (dominante) e os demais (subordinados) (GINTHER *et al.*, 1996).

Apesar do mecanismo preciso para a seleção do folículo dominante não estar completamente elucidado, sabe-se que o fenômeno do desvio envolve o LH e a expressão de seus receptores pelo maior folículo, bem como os fatores de crescimento semelhante à insulina (IGFs) (FORTUNE *et al.*, 2004).

Neste momento o folículo dominante apresenta diâmetro em torno de 8,5 mm em animais *Bos taurus taurus* (GINTHER *et al.*, 1999; KULICK *et al.*, 1999) e de 6,0 mm em *Bos taurus indicus* (SARTORELLI *et al.*, 2003; SARTORELLI *et al.*, 2005), quando este folículo passa a ser LH dependente, até que ocorra a ovulação ou a atresia (GINTHER *et al.*, 1996; WEBB *et al.*, 2004).

Austin *et al.* (2001) relataram que o futuro folículo dominante produz maiores concentrações de estradiol e possuem baixos níveis de proteínas ligantes a IGF (IGFBP) comparado aos folículos subordinados. Associado a isto, a seleção folicular está associada à queda momentânea da concentração plasmática de FSH por algumas horas no momento da seleção folicular. Isto se deve ao *feedback negativo* ocasionado pelo estradiol sintetizado pelo maior folículo, capaz de manter seu desenvolvimento apesar da queda na secreção de FSH com taxas de crescimento superior aos demais folículos (GINTHER *et al.*, 2000b; FORTUNE *et al.*, 2001).

A partir deste momento, o desenvolvimento deste folículo dominante torna-se dependente dos níveis séricos de LH, os quais apresentam maior concentração de RNAm de LHR detectado por transcriptase reversa da reação em cadeia de polimerase (RT-PCR) em células da granulosa comparado aos folículos subordinados (GINTHER, 2000a; BEG, 2001; FORTUNE *et al.*, 2001).

A expressão do LHR foi observada por PCR em células da granulosa de folículos antrais com 8 mm, obtidos de fêmeas Nelore, exclusivamente após a seleção do folículo dominante que ocorre aos 6 mm nesta espécie (NOGUEIRA *et al.*, 2005; SARTORELLI *et al.*, 2005).

Os LHR do CL elevam-se até o 5^o dia, permanecendo em concentrações elevadas até os dias 15 e 17. A detecção gênica para o mesmo receptor apresentou comportamento semelhante no decorrer do ciclo estral (OKUDA *et al.*, 1999; SCHAMS & BERISHA, 2004).

2.2.3 Estrógenos

Entre os estrógenos, o 17 β -estradiol é o de maior importância para a reprodução e predomina em animais domésticos não gestantes e gestantes. O estrógeno, hormônio esteróide é produzido pelo córtex adrenal e pelas células da granulosa de folículos ovarianos principalmente após a fase de desvio folicular (XU *et al.*, 1995; KINDER *et al.*, 1996; KOMAR *et al.*, 2001) por meio do processo catalítico de aromatização de andrógenos pela enzima aromatase citocromo P450 (HANUKOGLU, 1992; RICHARDS, 1994; CONLEY, 2001; ROSENFELD *et al.*, 2001).

Os estrógenos correspondem aos hormônios esteróides que mais desempenham funções fisiológicas nos animais, entre elas o estro na maioria das espécies (HAFEZ & HAFEZ, 2000).

Sinergicamente com a progesterona agem para possibilitar o crescimento de glândulas uterinas e mamárias. O período de estro é caracterizado por elevados níveis de estrógenos. Os estrógenos estimulam o crescimento uterino por meio da interação com receptores e, conseqüente aumento dos processos sintéticos dentro das células. Outros efeitos incluem o desenvolvimento físico das características sexuais secundárias femininas, o controle da liberação de hormônios hipofisários, potencialização dos efeitos da

OT e prostaglandinas sobre as contrações uterinas e auxílio no processo de implantação (HAFEZ & HAFEZ, 2000).

O estrógeno estimula o crescimento e a secreção das glândulas endometriais momentos antes da implantação necessários para manutenção do zigoto, o crescimento dos ductos nas glândulas mamárias quando atua sinergicamente com a progesterona, atividade secretora no oviduto (favorece a sobrevivência do oócito e espermatozóide), inicia a receptividade sexual, regula a secreção de gonadotrofinas (pico de hormônio luteinizante pela hipófise anterior para ovulação) (DUKES, 1996; SENGER, 2003).

Além disso, o estrógeno é epiteliotrófico, promove anabolismo das proteínas e relaciona-se com a expressão dos receptores de OT no endométrio, os quais constituem o complexo hormônio receptor com a OT secretada pelo CL, que estimulam a liberação de $\text{PGF}_{2\alpha}$ pelo útero gravídico ou não gravídico, desencadeando em ambos os casos a regressão do CL (SENGER, 2003).

Quando produzido na presença do FD, é responsável pelo *feedback* negativo ao FSH e pela retroalimentação positiva ao LH (NETT *et al.*, 2002) que, na ausência de P_4 , induz o pico pré-ovulatório de LH e também o comportamento de estro (BARROS *et al.*, 1995; VASCONCELOS *et al.*, 2008).

As altas concentrações plasmáticas de estradiol e a ausência de progesterona sinalizam a maturação folicular, o que desencadeia a expressão do comportamento de estro, e o pico pré-ovulatório de LH, essencial para a ovulação do folículo dominante (TAYA *et al.*, 1996; DIAZ *et al.*, 2002).

Além de participar na regulação da secreção do FSH, o estradiol está relacionado com importantes funções autócrinas e parácrinas, tais como a proliferação celular (BLEY *et al.*, 1997), o aumento da atividade da enzima aromatase citocromo P450, o aumento na expressão dos LHR e FSHR nas células da granulosa de ratas (RICHARDS *et al.*, 1994) e de bovinos (BERISHA *et al.*, 2000), e a maior sensibilidade do folículo dominante aos hormônios FSH e LH (GINTHER *et al.*, 2001).

Em bovinos, a existência de duas a três ondas foliculares durante o ciclo estral acarreta um perfil oscilatório de produção de estradiol, devido ao crescimento e atresia de diversos folículos em cada uma das ondas foliculares, até a ovulação (IRELAND *et al.*, 1979; GINTHER *et al.*, 1989a); no entanto, o

folículo dominante é considerado o principal responsável pela produção total de estradiol (IRELAND *et al.*, 1984). Este é liberado de maneira pulsátil (WALTERS *et al.*, 1984) e atinge a concentração plasmática máxima momentos antes da ovulação (GLENCROSS & POPE, 1981).

Cupp *et al.* (1995) observaram que durante o início da fase luteínica, a concentração de progesterona é baixa e a de estradiol é alta, resultando em maior frequência dos pulsos de LH. Durante o terço médio da fase luteínica, entre o 11º e 13º dias do ciclo estral, período em que a concentração de progesterona é alta e a de estradiol é baixa, foi observada menor frequência dos pulsos de LH em relação ao início ou ao final da fase luteínica.

Após a luteólise, há diminuição dos níveis de progesterona e elevação na concentração e frequência dos pulsos de LH. Diversos estudos demonstraram que o padrão de secreção da progesterona e do estradiol está inversamente relacionado, e é determinante no controle da frequência dos pulsos de LH (KESNER *et al.*, 1981; BUTLER *et al.*, 1983; STUMPF *et al.*, 1993; BERGFELD *et al.*, 1995; CUPP *et al.*, 1995).

Em bovinos, injeções de estradiol entre os dias 13 e 18 do ciclo estral estimularam a produção de PGFM (LEMON, 1975; BARTOL *et al.*, 1981; RICO *et al.*, 1981; KNICKERBOCKER *et al.*, 1986; THATCHER *et al.*, 1986; LARSON *et al.*, 1991; CASTRO E PAULA *et al.*, 2002).

Bertan (2004) confirmou a capacidade do estradiol em estimular o aumento das concentrações séricas de PGFM no dias 15, 17 e 19 do ciclo estral, mas não no dia 13. Castro E Paula (2003) relataram que a resposta estimulatória à síntese de PGFM não foi observada em todas as fêmeas quando tratadas com estradiol no dia 15 do ciclo estral.

Thatcher *et al.* (1986) demonstraram que grupos de animais tratados com estradiol entravam em luteólise mais cedo do que grupos não tratados. De forma similar, injeções de benzoato de estradiol (BE) em vacas no dia 15 ou injeções de 17 β -estradiol em ovelhas entre os dias 9 e 12 do ciclo estral também desencadeavam a luteólise (HIXON & FLINT, 1987; SHELDRIK, 1992; WALKER *et al.*, 1997).

No entanto, o estradiol isoladamente não é capaz de ativar a resposta do endométrio e ocasionar a lutólise a partir das injeções de OT em vacas e ovelhas ovariectomizadas (HOMANICS & SILVA, 1988; MANN *et al.*, 2001),

devido ao efeito inibitório do estradiol nos receptores de OT na ausência da sensibilização prévia pela progesterona (VALLET *et al.*, 1990; ZHANG *et al.*, 1992)

O início da luteólise é determinada pela prévia sensibilização endometrial pela progesterona oriunda do CL ao longo do ciclo estral, que associado a crescente produção de estradiol pelos folículos, causam uma grande estimulação na produção de receptores de OT e produção de PGF_{2α} pelo útero em bovinos e ovinos (KAMMINSKI *et al.*, 1997; LAU *et al.*, 1993; WALKER *et al.*, 1997).

A função do estrógeno é desencadeada no organismo em tipos celulares específicos do ovário e do útero após a formação do complexo hormônio estrógeno-receptor de estrógeno (E₂/ER), promovendo a ativação genômica e proteica, as quais são reguladas basicamente pelo E₂ e pela P₄ (SCHAMS & BERISHA, 2002; MARTIN, 2005; MARTIN *et al.*, 2008).

Atualmente, foram relatados no endométrio e CL dois tipos de ER com importância para a regulação da função reprodutiva de bovinos, α (EαR) (KUIPER *et al.*, 1996) e β (EβR) (MOSELMAN *et al.*, 1996).

Os receptores de estrógeno possuem maior expressão no endométrio durante os dias 0 e 5 do ciclo, mediado pelos altos níveis plasmáticos do estradiol proveniente do folículo dominante, associado às baixas concentrações séricas de progesterona após a luteólise (MARTIN *et al.*, 2006; MARTIN *et al.*, 2008).

Após a ovulação, a P₄ proveniente do CL recém formado, gradativamente promove a diminuição das concentrações endometriais dos REs que alcançam os seus menores valores por volta do 17^o dia do ciclo estral (diestro) (HENRICKS & HARRIS, 1978; BOSS *et al.*, 1996, MARTIN *et al.*, 2008).

Em ratos o EαR regula a diferenciação, a proliferação celular, possui maior expressão no tecido endometrial e possui maior afinidade de ligação ao tipo estrona de estradiol (COUSE *et al.*, 1997; KUIPER *et al.*, 1998).

Os EβR na maioria das espécies estão presentes em maior concentração no tecido ovárico e estão intimamente relacionados com a liberação de GnRH (COUSE *et al.*, 1997). Em humanos, há relatos que as

células endometriais estromais possuem maior concentração de $E\beta R$, os quais apresentam maior afinidade por estradiol e estriol (LIMA, 2008).

O RNAm para os $E\alpha R$ e $E\beta R$ também foi detectado em CL de bovinos (SCHAMS & BERISHA, 2002), ovinos (ZIEBA et al., 2000; CARDENAS et al., 2001) e suínos (SLOMCZYNSKA & WOZNIAK, 2001). Em bovinos, o $E\alpha R$ teve maior expressão durante a fase luteal inicial e decresceu significativamente durante a fase luteal tardia. Em contraste, o $E\beta R$ não apresentou alterações significativas durante todos os estágios examinados (SCHAMS & BERISHA, 2002).

2.2.4 Progestágenos

O progestágeno mais importante é a P_4 que é produzida em maior quantidade pelo CL, e também pelo córtex adrenal e a placenta (MCDONALD, 1989).

A progesterona é responsável pelo crescimento das glândulas endometriais, crescimento lobuloalveolar das glândulas mamárias, atividade secretora do oviduto e das glândulas endometriais responsável pela nutrição do zigoto, evita a contratilidade do útero durante a gestação e regula a secreção de gonadotrofinas. A função luteal determina a duração fisiológica do ciclo estral e garante a manutenção da prenhez (ROTHCHILD, 1981; DUKES, 1996; SENGER, 2003).

Em zebuínos, a concentração plasmática de P_4 aumenta progressivamente a partir do segundo dia após a ovulação até atingir seu platô por volta do oitavo dia do ciclo, o qual é mantido até o dia quinze, quando começa a declinar até atingir níveis basais por volta dos dias 15 a 18, caracterizando a luteólise (FIGUEIREDO *et al.*, 1997).

Gudermann *et al.* (1992) relataram que o LH estimula o CL a secretar progesterona após a ligação com seu receptor e ativação da adenil ciclase, a qual sintetiza AMPc, um mensageiro intracelular responsável por ativar enzimas envolvidas na síntese de P_4 .

A progesterona inibe a apoptose nas células luteais pelo mecanismo dependente dos receptores de progesterona (PR), visto que a luteólise estrutural é um pré-requisito para o início da apoptose em células endoteliais do CL bovino (FRIEDMAN *et al.*, 2000; MYAMOTO et al., 2009).

Existem duas formas de PR: *isoformas* A (PAR) e B (PBR). O PAR está intimamente relacionado ao desempenho e as patologias reprodutivas, e sua expressão tem correlação negativa com o PBR na espécie humana (SARTORIUS *et al.*, 1994; PIEBER *et al.*, 2001; NUNES, 2007). Ambas *isoformas* estão presentes no trato reprodutivo feminino durante o ciclo e possuem atividades transcricionais diferentes, sendo que a *isoforma* A parece realizar papel modulador sob a expressão dos ER, PR e OTR no sistema reprodutivo mais importante que o PBR (FUJIMOTO *et al.*, 1997).

No endométrio e na glândula mamária, o estrógeno sensibiliza as células para a ação da P₄, promovendo a expressão do PR (CLARKE, 1990; MARTIN, 2005; MARTIN *et al.*, 2008).

No dia 13 do ciclo estral de vacas Nelore, a concentração proteica de PR no endométrio foi menor comparada aos demais dias do ciclo, ainda quando as concentrações plasmáticas de progesterona oriundas do CL permaneceram elevadas (MARTIN *et al.*, 2008).

Estes receptores estão expressos nos folículos durante todo o ciclo estral de bovinos. No fim do ciclo estral, as baixas concentrações plasmáticas de P₄, associada as concentrações plasmáticas crescentes de estrógeno oriundas do folículo dominante, ocasiona o aumento dos receptores de ocitocina (ROT), redução dos PR e ER no endométrio (CASSAR *et al.*, 2002).

Aparentemente no CL, a expressão do RP é coordenada pela própria progesterona e o pico de LH induz a expressão destes RP. Em bovinos, estão presentes no CL, nas células lúteas grandes e pequenas de vacas gestantes e não-gestantes após 48 horas da ovulação, no entanto, em menores quantidades quando comparadas as concentrações encontradas em folículos (RUEDA *et al.*, 2000; VAN DEN BROECK *et al.*, 2002).

O uso da técnica de RT-PCR determinou a maior expressão de RNAm para o RP no tecido luteal bovino durante o estágio inicial. Houve menor expressão destes durante a fase luteal tardia e após a regressão do CL (SCHAMS & BERISHA, 2002). Porém, os níveis de RNAm mantiveram-se durante a regressão luteal enquanto as células RP positivas na técnica de imunocitoquímica declinaram em primatas (CHANDRASEKHER *et al.*, 1994; SUZUKI *et al.*, 1994; DUFFY & STOUFFER, 1995).

2.2.5 Ocitocina

Outro hormônio produzido pelo CL formado após 10 a 15 dias da ovulação é a OT, um hormônio polipeptídeo produzido também pelos neurônios hipotalâmicos, armazenado e liberado pela neurohipófise (SENGER, 2003).

A OT é responsável por promover as contrações uterinas peri-parto e pela ejeção do leite durante a amamentação. Possivelmente, suas funções relacionam-se com a luteólise por meio das prostaglandinas (DUKES, 1996; SCHAMS & BERISHA, 2002; SENGER, 2003).

A expressão dos OTR no endométrio de bovinos é regulada pelo próprio hormônio OT, pelas concentrações plasmáticas de estradiol e progesterona, e seus respectivos hormônios (SILVIA *et al.*, 1991; LAMMING & MANN, 1995; MANN & LAMMING, 1995; BOOS *et al.*, 1996; MANN & LAMMING, 2006).

A interpretação dos dados de diversos autores indica que as elevadas concentrações de P₄ proveniente do CL na metade da fase luteal, quando há baixo nível plasmático de estrógeno, acarretam gradativa redução das concentrações endometriais dos ER que alcançam menores valores por volta do 17º dia do ciclo estral (diestro) em animais de origem taurina e zebuína (HENRICKS & HARRIS, 1978; JENNER *et al.*, 1991; LAMMING & MANN, 1995; BOOS *et al.*, 1996; MANN & LAMMING, 2006; MARTIN *et al.*, 2008).

Em animais *Bos taurus taurus*, a progesterona possui efeito dominante sob o útero, pois inibe a síntese de OTR na primeira metade do ciclo estral (RAZANDI *et al.*, 1999; MANN & LAMMING, 2006).

Na metade da fase luteal, há diminuição dos PR, o que permite a ação do estrógeno produzido pelo folículo dominante e estimula a hipófise e o CL a secretar OT para ligar-se aos seus receptores endometriais. A formação deste complexo hormônio-receptor desencadeia a liberação de PGF_{2α} pelo útero, indispensável para o processo de luteólise (SILVIA *et al.*, 1991; RAZANDI *et al.*, 1999).

Momentos antes da ovulação, as altas concentrações de estrógeno secretadas pelo folículo pré-ovulatório resultam no decréscimo dos OTR, e posteriormente a secreção de progesterona pelo CL, insensibiliza o endométrio à OT durante os primeiros dias do próximo ciclo estral (LAMMING & MANN, 1995).

Desta forma, os OTR variam pouco durante o ciclo estral, exceto pelo período compreendido entre os dias 15 e 17, quando estão presentes em maior concentração, evento relacionado com a luteólise (JENNER *et al.*, 1991; MANN & LAMMING, 2006).

2.2.6 Prostaglandina

As prostaglandinas são substâncias orgânicas derivadas do ácido prostanóico, e estão presentes em diversos tecidos e situações biológicas. Especificamente relacionadas com a reprodução, de acordo com sua estrutura e função podem ser divididas em: E e F (DUKES, 1996).

As prostaglandinas endógenas em geral provocam contrações ou relaxamento das células musculares lisas em diversos órgãos. A série F, especificamente a $F_{2\alpha}$, produzida pelo endométrio, é a de maior importância para a reprodução em ruminantes e está relacionada com o processo da luteólise. A regressão funcional precede a regressão morfológica do CL (TSAI & WILTBANK, 1997; VIANA *et al.*, 1999).

Com o adjunto de fórmulas sintéticas, as aplicações exógenas de prostaglandinas permitiram a aceleração da involução uterina, a modulação da defesa uterina, e a utilização em protocolos de sincronização do estro (FERNANDES *et al.*, 2002a, b; LEWIS, 2004).

2.3 Dinâmica folicular

2.3.1 Folículos pré-antrais

Durante a vida embrionária e a pré-puberdade das fêmeas, a fase inicial de crescimento folicular ocorre independentemente de gonadotropinas e termina quando o folículo ainda é pré-antral. Nessa fase, os principais responsáveis pelo crescimento folicular são alguns fatores de crescimento, tais como, fator de crescimento semelhante a insulina I (IGF-I), fator de crescimento transformante (TGF- β), particularmente o fator de crescimento diferencial-9 (GDF-9) e a proteína morfogenética óssea-15 (BMP-15 ou GDF-9B), activina e fator de crescimento fibroblástico (FGFb) (SILVIA & PRICE, 2002; HAFEZ & HAFEZ, 2000; BURATINI *et al.*, 2005).

O desenvolvimento folicular pré-antral depende também da proliferação e diferenciação das células da granulosa, processo que ocorre devido a

comunicação intercelular através dos processos citoplasmáticos trans-zonais (TZP) (GILCHRIST *et al.*, 2004).

As TZPs são extensões das células da granulosa que penetram através da zona pelúcida e atingem a membrana do oócito, onde junções do tipo Gap permitem passagem bidirecional de íons, metabólitos, aminoácidos e pequenas moléculas reguladoras. Estas extensões se retraem quando o folículo atinge o estágio antral, provavelmente pela ação do LH (MCNATTY *et al.*, 1999; ALBERTINI *et al.*, 2001; GILCHRIST *et al.*, 2004).

No entanto, os padrões temporais de secreção desses fatores de crescimento ainda são desconhecidos. Há relatos que o desenvolvimento folicular inicial é estimulado pela ação sinérgica do kit ligante (KL) e da BMP-15, enquanto o GDF-9 é secretado tardiamente por oócitos maduros, promovendo a proliferação das células da granulosa e modulação da função do KL (SHIMASAKI *et al.*, 2003).

O KL produzido pelas células da granulosa de camundongos e o c-kit, receptor para KL expressos pelo oócito, resultam no complexo c-kit/KL. No folículo primordial e primário, este se relaciona com a proliferação das células da granulosa, estimula a síntese de DNA em células da granulosa e a diferenciação de células do estroma em células da teca (YOSHIDA *et al.*, 1997; PARROT & SKINNER, 2000; OTSUKA & SHIMASAKI, 2002).

No estágio secundário, o GDF-9 é essencial para o desenvolvimento dos folículos por potencializar a proliferação das células da granulosa (DONG *et al.*, 1996; BODENSTEINER *et al.*, 1999; VITT *et al.*, 2000a, b).

A interação entre o BMP-15 e o KL é fundamental para o crescimento folicular, mas são descritos algumas formas de regulação destes fatores de crescimento por meio do *feedback*. O BMP-15 estimula a expressão do KL, que, por sua vez, inibe a expressão da BMP-15 (OTSUKA & SHIMASAKI, 2002; SHIMASAKI *et al.*, 2003). Enquanto, o GDF-9 inibe a expressão do KL em células da granulosa de camundongos (JOYCE *et al.*, 2000).

Os mecanismos endócrinos também possuem papel importante no desenvolvimento de folículos pré-antrais, que expressam receptores de IGF-I e proteínas ligantes de IGFBP-2 e 3, que são reguladores da biodisponibilidade de IGFs extra-ovarianos (WEBB *et al.*, 2003).

O desenvolvimento folicular pré-antral também é regulado de forma parácrina pela ativina, a folistatina, a inibina, o fator de crescimento epidermal (EGF) e o fator de crescimento fibroblástico (FGF) (MCNATTY *et al.*, 1999; SILVIA & PRICE, 2002).

Em bovinos, o FGF-2 foi detectado nos oócitos de folículos primordiais, primários, nas células da granulosa e da teca de folículos pré-antrais em crescimento, em folículos antrais. Este fator é capaz de estimular a ativação de folículos primordiais, em culturas de fragmentos de ovários de ratas, e de promover proliferação de células da granulosa (GOSPODAROWICZ *et al.*, 1989; VAN WEZEL *et al.*, 1995; NILSSON *et al.*, 2001; SILVIA & PRICE, 2002).

Como os demais TGFs, a BMP-15 também estimula desenvolvimento folicular devido ao aumento da sensibilidade ao FSH (OTSUKA *et al.*, 2001; SHIMASAKI *et al.*, 2003).

2.3.2 Folículos antrais

Ainda quando os folículos são pré-antrais, ocorre a síntese de receptores para o FSH nas células da granulosa e para o LH nas células da teca. Com isso, inicia-se uma fase de desenvolvimento folicular dependente de gonadotropinas, caracterizada pelo recrutamento de um grupo de pequenos folículos (emergência folicular) com intervalos de aproximadamente dez dias, sob a influência do FSH secretado após as fêmeas atingirem a puberdade (GINTHER *et al.*, 1989a; XU *et al.*, 1995; KINDER *et al.*, 1996; WILTBANK *et al.*, 1996; CONLEY, 2001; KOMAR *et al.*, 2001; ROSENFELD *et al.*, 2001; SENGER, 2003).

Nas células da granulosa, o FSH estimula a ativação da enzima P450 aromatase, responsável pela metabolização e transformação de andrógenos em estradiol. A influência do FSH e do estradiol acarreta alterações morfológicas no folículo, que passa a apresentar uma cavidade repleta de líquido em seu interior, sendo assim chamado de folículo antral (FORTUNE & QUIRK, 1988; SENGER, 2003).

Entre todos esses folículos, apenas um continua seu desenvolvimento, o folículo dominante, caracterizado por apresentar maior capacidade de produzir 17β -estradiol em relação aos demais recrutados no início da onda. Os demais folículos denominados subordinados começam a apresentar taxa de

crescimento gradativamente menor e posteriormente entram em atresia (LUCY *et al.*, 1992; BAO & GARVERICK, 1998; GINTHER *et al.*, 1989a).

O momento em que se detecta a diferença entre a taxa de crescimento do folículo dominante e do maior folículo subordinado é denominado de desvio ou divergência folicular, que em zebuínos ocorre, respectivamente 2,7 e 3,8 dias após a emergência folicular, quando o folículo dominante possui de 5,4 a 6,1 mm em zebuínos (GIMENES *et al.*, 2005; SARTORELLI *et al.*, 2005; CASTILHO *et al.*, 2006) e entre 10 e 12 mm em *Bos taurus taurus* (TAYLOR *et al.*, 1991; GINTHER *et al.*, 1996).

O sistema IGF atua de forma sinérgica com o FSH no processo de divergência folicular e produção de estrógenos (FORTUNE *et al.*, 2004). Os IGF-I e II são expressos nas células da granulosa e da teca, no entanto, o IGF-II atua de forma parácrina (intraovariana) enquanto o IGF-I atua via endócrina (YUAN *et al.*, 1998; WEBB *et al.*, 1999; ARMSTRONG *et al.*, 2000; BURATINI, 2007).

Os IGFs estimulam a expressão de seus receptores específicos nas células da teca e da granulosa, que estão presentes em concentrações diferentes quando comparados folículos dominantes e subordinados (SPICER *et al.*, 2004). Antes do desvio, o IGF-I livre apresenta-se em maiores concentrações no fluido folicular do maior folículo se comparado às presentes no folículo subordinado (De LA SOTA *et al.*, 1996; BEG *et al.*, 2002)

As proteínas ligantes aos IGFs (IGFBP) modulam as concentrações disponíveis de IGFs na corrente sanguínea e estão presentes no fluido folicular bovino (FORTUNE *et al.*, 2001). A concentração de IGFBP-4 nos folículos dominantes encontra-se reduzida quando comparada aos subordinados, devido à degradação proteolítica destas proteínas ligantes pela proteína plasmática associada à gestação (PAPP-A), refletindo em maiores concentrações de IGF livre capaz de estimular o maior desenvolvimento do folículo dominante (MIHM *et al.*, 2000; MAZERBOURG *et al.*, 2001).

A degradação da IGFBP-5 foi mais alta no maior folículo antes do momento do desvio folicular. Este fenômeno ocorre mais tardiamente no caso dos níveis transcricionais da IGFBP-2, que parece ser regulada pelo FSH (WEBB *et al.*, 2003; FORTUNE *et al.*, 2004).

Após a divergência folicular durante o diestro, fase em que está presente o CL oriundo do ciclo anterior e estão altos os níveis plasmáticos de P_4 , responsáveis pela redução da frequência da pulsatilidade de LH, há o desvio folicular, porém o folículo dominante entra em processo de atresia, tornando-se anovulatório. A partir desse momento observa-se a emergência de uma nova onda de crescimento folicular (GINTHER *et al.*, 1989b; NISWENDER *et al.*, 1994; MONNIAUX *et al.*, 1997; WEBB *et al.*, 1999; SENGER, 2003; SCHILLO, 2009).

No entanto, se após a divergência ocorrer a regressão luteínica, com consequente diminuição da concentração plasmática da progesterona, o folículo dominante continua o seu crescimento, secreta grandes quantidades de estradiol, promovendo o pico ovulatório de LH, que desencadeia a ovulação e a maturação oocitária, com retomada da meiose que havia sido interrompida no início do desenvolvimento folicular (NISWENDER *et al.*, 1994; FORTUNE *et al.*, 2004; SENGER, 2003).

2.3.3 Luteinização

Durante a ovulação ocorre a ruptura da membrana folicular composta pelas células da teca (externa e interna) e da granulosa, e a expulsão do oócito. Imediatamente, a parede do folículo é colapsada e a cavidade invadida por linfa e sangue dos capilares, que serão os componentes de uma nova estrutura, o corpo hemorrágico (DIAZ *et al.*, 2002).

Subsequentemente, o corpo hemorrágico reorganiza-se e origina o corpo lúteo (CL), sob a influência de fatores angiogênicos e mitogênicos (FGF-2, TGF- β , IGF-I, fator de crescimento semelhante à heparina e fator de crescimento endotelial vascular) (SENGER, 2003; GIOMETTI *et al.*, 2009).

O crescimento do CL ocorre rapidamente a partir da proliferação celular e da diferenciação das células da granulosa em células luteínicas grandes, que apresentam receptores para LH, responsáveis pela síntese das elevadas concentrações de progesterona, e das células da teca remanescentes do folículo ovulado em células luteínicas pequenas (LEI *et al.*, 1991; NISWENDER *et al.*, 1994; NISWENDER, 2002).

O CL é primariamente reconhecido pela habilidade em sintetizar e secretar progéstágenos, hormônios que estão intimamente relacionados com a

manutenção de um ambiente adequado ao desenvolvimento embrionário e pela própria manutenção do CL durante o período da ovulação até a implantação, quando ocorre o reconhecimento materno da gestação (NISWENDER, 2002).

Além da progesterona, o CL após 10 a 15 dias de vida, produz uma substância denominada OT, que juntamente com a P_4 e o E_2 , regulam o fenômeno da luteólise (LAMMING & MANN, 1995; MCCRACKEN *et al.*, 1999).

2.3.4 Luteólise

A regressão morfológica e funcional do CL ocorre 17 a 20 dias após a ovulação durante um ciclo estral de aproximadamente 21 dias. Este processo é denominado luteólise e determina a duração do ciclo estral (SENGER, 2003).

As concentrações plasmáticas de E_2 , P_4 e OT estão relacionadas com a secreção de $PGF_{2\alpha}$, substância responsável pela luteólise, que é secretada pelo endométrio bovino de maneira pulsátil e mensurada através do metabólito da prostaglandina $F_{2\alpha}$ encontrada na circulação sanguínea, a 13, 14 diidro-15ceto prostaglandina (PGFM) (IRELAND *et al.*, 1984; VILLA-GODDOY, 1985; ZHANG *et al.*, 1991; SILVIA *et al.*, 1991; MCCRACKEN *et al.*, 1999; SALFEN *et al.*, 1999; MANN *et al.*, 2001; CASTRO E PAULA, 2003; BERTAN, 2004).

A OT participa na luteólise concomitantemente com o estradiol e a $PGF_{2\alpha}$ por também estimular a produção desta pelo endométrio ().

As concentrações plasmáticas de estrógenos regulam o processo da luteólise agindo diretamente sob a cascata de produção de $PGF_{2\alpha}$, iniciada pela ativação da fosfolipase C (WALKER *et al.*, 1997).

Outros autores sugerem uma ação indireta, onde o estradiol proveniente dos folículos em crescimento é responsável pelo aumento na concentração de receptores endometriais de OT associada à sensibilização prévia pela progesterona no final da fase luteínica, e que a OT proveniente do CL ou da neurohipófise, ao acoplar-se a estes receptores, estimula a secreção endometrial de $PGF_{2\alpha}$ (MCCRACKEN *et al.*, 1984; VALLET *et al.*, 1990; ZHANG *et al.*, 1992; WATHES & LAMMING, 1995; KAMMINSKI *et al.*, 1997; WALKER *et al.*, 1997; MCCRACKEN *et al.*, 1999).

Wathes *et al.* (1983, 1984) e Fields *et al.* (1985, 1992) corroboraram com esta hipótese ao demonstrarem que a OT é de fato secretada pelo CL e interage com receptores endometriais próprios (FUCHS *et al.*, 1990) para

estimular a secreção de $\text{PGF}_{2\alpha}$, culminando com a lise do CL (GROSS *et al.*, 1988; PUTNEY *et al.*, 1989; GINTHER *et al.*, 2000; MANN *et al.*, 2001; HAFEZ & HAFEZ, 2000).

Após a luteólise, os elevados níveis plasmáticos de E_2 estimulam os neurônios Kiss-1 no centro pré-ovulatório hipotalâmico, responsável pela liberação de GnRH, que por sua vez, desencadeia o pico pré-ovulatório de LH pela hipófise (KRIEGSFELD, 2006; KRIEGSFELD & SILVER, 2006; SCHILLO, 2009).

Diversos estudos demonstraram que a relação inversa entre as concentrações da P_4 e do E_2 é determinante no controle da frequência dos pulsos de LH (KESNER *et al.*, 1981; BUTLER *et al.*, 1983; STUMPF *et al.*, 1993; BERGFELD *et al.*, 1995; CUPP *et al.*, 1995; MILVAE *et al.*, 1996; ERENO, 2003).

O estrógeno estimula positivamente o centro pré-ovulatório e negativamente o centro tônico hipotalâmico, que induz a liberação de LH de forma constante, caracterizada por altas concentrações e com alta intensidade pela hipófise (SCHILLHO, 2009; WU *et al.*, 2009).

As condições onde as concentrações séricas de E_2 estão baixas associada às altas concentrações de P_4 , caracterizam-se por baixas concentrações de LH secretados continuamente com grande frequência em pequena intensidade, oriundos da estimulação do GnRH secretado da mesma maneira (KRIEGSFELD, 2006; KRIEGSFELD & SILVER, 2006).

Durante o diestro, onde estão presentes um folículo dominante e o CL funcional, há um efeito inibitório do centro pré-ovulatório hipotalâmico e ausência do pico de LH (KRIEGSFELD *et al.*, 2006; SCHILLHO, 2009).

2.4 Agonistas de GnRH

Os agonistas de GnRH (GnRHa) são peptídeos sintéticos obtidos a partir de simples e duplas substituições na sequência de aminoácidos do GnRH, com intuito de retardar a degradação rápida destas substâncias pelo organismo, o que permite a sua utilização em pequenas doses e almejar os mesmos resultados que o GnRH convencional (PADULA, 2005).

Comparado ao hormônio liberador de gonadotrofinas, os GnRHa possuem maior meia-vida e afinidade aos receptores de GnRH, promovendo

intensa resposta aguda pelo organismo frente a estimulação sistêmica com GnRHa. Entre os GnRHa destacam-se: a Deslorelina, Buserelina, Leuprolide e a Gusorelina (D'OCCHIO *et al.*, 2000; MATTOS, 2001).

Este análogo sintético, de forma sistêmica ou por meio de implantes subcutâneos, tem sido usado para tratamento em animais para controle reprodutivo em geral. Há relatos na literatura da sua utilização na forma de implantes em cadelas e em felinos selvagens com intuito de realizar o controle populacional e/ou evitar acasalamentos indesejados entre animais consanguíneos por meio da indução do anestro (Padula *et al.*, 2005).

As vias parenterais, intra-venosa, intra-muscular e subcutânea, são as mais utilizadas. As vias alternativas de tratamento como a forma oral não é eficiente, no entanto, ainda estão sendo estudadas as vias de administração intra-vaginal e intra-nasal (PADULA, 2005).

Estes são utilizados ainda de forma injetável sistêmica durante o tratamento de tumores prostáticos em humanos, os protocolos de sincronização do estro em programas de IATF em bovinos, como indutor da ovulação em equinos, bem como no tratamento de folículos anovulatórios persistentes em vacas de leite (MATTOS *et al.*, 2001; D'OCCHIO *et al.*, 2000; PADULA, 2005; JUNAJDI *et al.*, 2007).

Quando tratado com GnRHa de forma prolongada por meio de implantes subcutâneos, o organismo responde de duas maneiras distintas. A primeira delas trata-se da fase aguda, que perdura vários dias e caracteriza-se pelo aumento imediato das concentrações plasmáticas de LH e FSH, seguido pelo retorno destas concentrações em níveis basais (D'OCCHIO *et al.*, 2000; PADULA, 2005).

A administração na forma de implantes com GnRHa promove a *downregulation* dos GnRHR hipofisários pela dessensibilização dos GnRHR nas células gonadotróficas através da interrupção da sinalização do segundo mensageiro, bloqueando assim a liberação de LH pela hipófise. A liberação de FSH se mantém em níveis basais ao longo de todo período. Conseqüentemente, as concentrações plasmáticas dos hormônios esteróides se mantem baixas (GONG *et al.*, 1996; D'OCCHIO *et al.*, 2000; MATTOS *et al.*, 2001; PADULA, 2005).

A posologia dos diferentes tipos de GnRHa que deve ser empregada ainda é uma questão polêmica de acordo com o efeito desejado e a espécie a ser tratada, uma vez que a via de aplicação, a sensibilidade e os efeitos entre as espécies, assim como o sexo do animal ocasionam respostas fisiológicas distintas (D'OCCHIO *et al.*, 2000; JIMÉNEZ-SEVERIANO *et al.*, 2005).

Atualmente no Brasil, estão sendo desenvolvidos e há alguns produtos de aplicação injetável contendo GnRHa disponíveis no mercado. No entanto, não são encontrados fabricantes brasileiros do produto na forma injetável e de implantes subcutâneos. Este fato torna dispendiosa a aquisição por meio da importação, o que inviabiliza a sua distribuição e uso comercial em larga escala.

Em estudos *in vitro* ou utilizando camundongos, são utilizados para verificar o padrão de liberação de gonadotrofinas em diferentes estádios da vida e tipos celulares, bem como para quantificar a ligação com seu receptor e a expressão dos receptores do GnRH, FSH e LH (PADULA, 2005).

Recentemente, Silvestre *et al.* (2009a, b) corroboraram por meio da avaliação da dinâmica folicular o que havia sido descrito por Gong *et al.* (1995,1996) e Mattos *et al.* (2001) quanto aos efeitos da utilização crônica dos GnRHa, ao utilizar implantes subcutâneos. Going *et al.* (1996) relatam que a Buserelina inibi o padrão de liberação pulsátil de LH e FSH após 8 e 30 dias de tratamento, respectivamente.

Silvestre *et al.* (2009a, b) hipotetizaram que as baixas concentrações plasmáticas de LH e FSH relacionavam-se com a maximização no processo de involução uterina, o que foi comprovado juntamente com a verificação da redução no intervalo entre partos (IP) durante a realização do estudo utilizando vacas Holandesas tratadas com implantes subcutâneos de Deslorelina durante o anestro pós-parto.

3. REFERÊNCIAS

- ALBERTINI, D. F.; COMBELLES, C. M. H.; BENECHCHI, E.; CARABATSOS, M. J. Cellular basis for paracrine regulation of ovarian follicle development. **Reproduction**, v. 121, p. 647-653, 2001.
- ANUALPEC. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: Instituto FNP, 2004. 369p.

ARMSTRONG, D. G.; GUTIERREZ, C. G.; BAXTER, G.; GLAZYRIN, A. L.; MANN, G. E.; WOAD, K. J.; HOGG, C. O.; WEBB, R. Expression of RNAm encoding IGF-I, IGF-II and type 1 IGF receptor in bovine ovarian follicles. **Journal of Endocrinology**, v. 165, p. 101-113, 2000.

AUSTIN, E. J.; MIHM, M.; EVANS, A. C. O.; KNIGHT, P. G.; IRELAND, J. L. H.; IRELAND, J. J.; ROCHE, J. F. Alterations in intrafollicular regulatory factors and apoptosis during selection of follicles in the first wave of the bovine estrous cycle. **Biology of Reproduction**, v. 64, p. 839-848, 2001.

BAO, B.; GARVERICK, H. A. Expression of steroidogenic enzyme and gonadotropin receptor genes in bovine follicles during ovarian follicular waves: a review. **Journal of animal Science**, v. 76, p. 1903-1921, 1998.

BARROS, C. M.; BETTS, J. G.; THATCHER, W. W.; HANSEN, P. J. Possible mechanisms for reduction of circulating concentrations of progesterone by interferon- I in cows: effects on hiperthermia, luteal cells, metabolism of progesterone and secretion of LH. **Journal of Endocrinology**, v. 133, p. 157-182, 1992.

BARROS, C. M.; FIGUEIREDO, R. A.; PAPA, F.O.; ROCHA, G. Follicular growth in Nelore cows (*Bos taurus indicus*) PGF_{2α} administration. **Journal of Animal Science**, v. 71, n. 1, p. 216, 1993.

BARROS, C. M.; FIGUEIREDO, R. A.; PINHEIRO, O. L. Estro ovulação e dinâmica folicular em zebuínos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 19, n. 1-2, p. 9-22, 1995.

BARTOL, F. F.; THATCHER, W. W.; LEWIS, G. S.; BLISS, E. L. L.; DROST, E. L.; BAZER, F. W. Effects of estradiol-17 β on PGF and total protein content in bovine uterine flushings and peripheral blood concentrations of 13,14-dihydro-15keto PGF_{2α}. **Theriogenology**, v. 15, p. 345-358, 1981.

BEG, M. A.; BERGFELT, D. R.; KOT, K.; WILTBANK, M. C.; GINTHER, O. J. Follicular-fluid factors and granulosa-cell gene expression associated with follicle deviation in cattle. **Biology of reproduction**, v. 64, p. 432-441, 2001.

BEG, M. A.; BERGFELT, D. R.; KOT, K.; GUNTHER, O. J. Follicle selection in cattle: dynamics of follicular fluid factors during development of follicle dominance. **Biology of Reproduction**. v. 66, p. 120-126, 2002.

BERGFELD, E. G.; KOJIMA, F. N.; WEHRMAN, M. E.; CUPP, A. S.; MARISCAL, V. E.; SANCHEZ, T. E.; KITOK, R.; GARCIA-WINDR, M.;

KINDER, J. E. Frequency of luteinizing hormone pulses and circulating 17 β -estradiol in cows is related to concentration of progesterone in circulation when the progesterone comes from either an endogenous or exogenous source.

Animal Reproduction Science, v. 37, p. 257, 1995.

BERISHA, B.; SCHAMS, D.; KOSMANN, M.; AMSELGRUBER, W.; EINSRAINER, R. Expression and localization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth factor (FGF-2) during the final growth of bovine ovarian follicles. **Journal of Endocrinology**, v. 167, p. 371-382, 2000.

BERISHA, B.; PFAFFL, M. W.; SCHAMS, D. Expression of Estrogen and Progesterone Receptors in the Bovine Ovary During Estrous Cycle and Pregnancy. **Endocrine**, v. 17, n. 3, p. 207–214, 2002.

BERTAN, C. M. **Mecanismos endócrinos e moleculares pelos quais o estradiol estimula a síntese de prostaglandina F $_{2\alpha}$ no endométrio de fêmeas bovinas**. 2004. 180p. Tese (Doutorado em Reprodução Animal) – Faculdade de medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

BLEY, M. A.; SARAGÜETA, P. E.; BARAÑAO, J. L. Concerted stimulation of rat granulosa cell deoxyribonucleic acid synthesis by sex steroids and follicle-stimulating hormone. **Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology**, v. 62, n. 1, p. 11-19, 1997.

BODENSTEINER, K. J.; CLAY, C. M.; MOELLER, C. L.; SAWYER, H. R. Molecular Cloning of the Ovine Growth/Differentiation Factor-9 Gene and Expression of Growth/Differentiation Factor-9 in Ovine and Bovine Ovaries. **Biology of Reproduction**, v. 60, p. 381-386, 1999.

BOOS, A.; MEYER, W.; SCHWARZ, R.; GRUNERT, E. Immunohistochemical assessment of oestrogen receptor and progesterone receptor distribution in biopsy samples of the bovine endometrium collected throughout the oestrous cycle. **Animal Reproduction Science**, v. 44, p. 11-21, 1996.

BURATINI JR., J. Controle endócrino e local da foliculogênese em bovinos. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 31, n. 2, p. 190-196, 2007.

BURATINI JR., J.; TEIXEIRA, A. B.; COSTA, I. B.; GLAPINSKI, V. F.; PINTO, M. G. L.; GIOMETTI, I. C.; BARROS, C. M.; CAO, M.; NICOLA, E. S.; PRICE, C. A. Expression of fibroblast growth factor-8 and regulation of cognate

receptors, fibroblast growth factor receptor-3c and -4 in bovine antral follicles. **Reproduction**, v. 130, p. 343-350, 2005.

BUTLER, W. R.; KATZ, L. S.; ARRIOLA, J.; MILVAE, R. A.; FOOTE, R. H. On the negative feedback regulation of gonadotropins in castrate and intact cattle with comparison of two FSH radioimmunoassay. **Journal of Animal Science**, v. 56, n. 4, p. 919-929, 1983.

CÁRDENAS, H.; BURKE, K. A.; BIGSBY, R. M.; POPE, W. F.; NEPHEW, K. P. Estrogen receptor β in the sheep ovary during the estrous cycle and early pregnancy. **Biology of Reproduction**, v. 65, p. 128-134, 2001.

CASSAR, C. A.; DOW, M. P. D.; PURSLEY, J. R.; SMITH, G. W. Effect of the preovulatory LH surge on bovine follicular progesterone receptor RNAm expression. **Domestic Animal Endocrinology**, v. 22, n. 3, p. 179-187, 2002.

CASTILHO, C.; GARCIA, J. M.; RENESTO, A.; NOGUEIRA, G. P.; BRITO, L. F. C. Follicular dynamics and plasma FSH and progesterone concentrations during follicular deviation in the first post-ovulatory wave in Nelore (*Bos indicus*) heifers. **Animal Reproduction of Science**, v. 98, p. 189-196, 2006.

CASTRO E PAULA, L. A. **As funções do estradiol no processo da luteólise em bovinos: o papel da ocitocina na produção de PGF 2α** . 2003. 202p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo.

CASTRO E PAULA, L. A.; LOUREIRO, J. G. P.; MEMBRIVE, C. M. B.; CUNHA, P. M.; BERTHOLAZZI, A.; JORGE, P.; MADUREIRA, E. H.; BINELLI, M. Effects of estradiol-17 β on prostaglandin F 2α (PGF) secretion in cattle: in vitro in vivo responses. **Biology and Reproduction**, v. 66, n. 1, p. 324, 2002.

CHANDRASEKHER, Y. A.; MELNER, M. H.; NAGALLA, S. R.; STOUFFER, R. L. Progesterone receptor, but not estradiol receptor, messenger ribonucleic acid is expressed in luteinizing granulosa cells and the corpus luteum in rhesus monkeys. **Endocrinology**, v. 135, p. 307–314, 1994.

CLARKE, J. J. GnRH Secretion. In: International Congress on Animal Reproduction and Artificial Insemination, 5., 1988, Dublin. **Anais...** Dublin: 1988.

CLARKE, C.L., SOUTHERLAND, R.L. Progestin regulation of cellular proliferation. **Endocrine Review**, v. 11, p. 266-301, 1990.

CONLEY, A.; HINSHELWOOD, M. Mammalian aromatases. **Reproduction**, v. 21, p. 685- 695, 2001.

COUSE, J. F.; LINDZEY, J.; GRANDIEN, K.; GUSTAFSSON, J. A.; KORACH, K. S. Tissue distribution and quantitative analysis of estrogen receptor- α (ER α) and estrogen receptor- β (ER β) messenger ribonucleic acid in the wild-type and ER α -knockout Mmouse. **Endocrinology**, v. 138, n. 11, p. 4613-4621, 1997.

CUNNINGHAM, J. G. **Tratado de Fisiologia Veterinária**. 3ª Ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan. 2008, 579p.

CUPP, A. S.; STUMPF, T. T.; KOJIMA, F. N.; WERTH, L. A.; WOLFE, M. W.; BOBERSON, M. S.; KITTOCK, R. J.; KINDER, J. E. Secretion of gonadotropins changes during the luteal phase of the bovine oestrous cycle in the absence of corresponding changes in progesterone or 17 β -oestradiol. **Animal Reproduction Science**, v. 37, n. 2, p. 109-119, 1995.

DE LA SOTA, R. L.; SIMMEN, F. A.; DIAZ T.; THATCHER, W. W. Insulin-like growth factor system in bovine firstwave dominant and subordinate follicles. **Biology of Reproduction**, v. 55, p. 803-812, 1996.

DIAZ, F. J.; ANDERSON, L. E.; WU, Y. L.; RABOT, A.; TSAI, S. J.; WILTBANK, M. C. Regulation of progesterone and prostaglandin F2 α production in the CL. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 191, p. 65-68, 2002.

D'OCCHIO, M. J.; FORDYCEB, G. WHYTEA, T. R. ASPDENA, W. J. TRIGG, T. E. Reproductive responses of cattle to GnRH agonists. **Animal Reproduction Science**, v. 60-61, p. 433-442, 2000.

DONG, J.; ALBERTINI, D. F.; NISHIMORI, K.; KUMAR, T. R.; LU, N.; MATZUK, M. M. Growth differentiation factor- 9 is required during early ovarian folliculogenesis. **Nature**, v. 383, p. 531-535, 1996.

DUKES, H. H. **Fisiologia dos animais domésticos**. 11 ed. Rio de Janeiro. 1996, 856p.

DUFFY, D. M.; STOUFFER, R. L. Progesterone receptor messenger ribonucleic acid in the primate corpus luteum during the menstrual cycle: possible regulation by progesterone. **Endocrinology**, v. 136, p. 1869-1876, 1995.

ERENO, R. L. **Avaliação da taxa de prenhez em novilhas tratadas com protocolo GnRH-PGF2 α -Benzoato de estradiol (GPE) e em vacas submetidas à tratamentos hormonais com progesterona associados ou não a remoção temporária de bezerros**. Botucatu: Universidade Estadual

Paulista Julio de Mesquita, 2003. 73p. Dissertação (Mestrado em Reprodução Animal) – Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita, 2003.

FERNANDES, C. A. C.; VIANA, J. H. M.; FERREIRA, A.M. Efeito do cloprostenol sódico no pós-parto de vacas leiteiras e retorno á atividade reprodutiva. **Hora Veterinária**, n.126, p.13-17, 2002a.

FERNANDES, C. A. C.; VIEIRA, M.R.; VALLE, M. A. G. Efeito do cloprostenol sódico no pós-parto de vacas leiteiras sobre a incidência de infecções uterina e fertilidade. **Hora Veterinária**, n.127, p.41-45, 2002b.

FERRIS, H. A.; SHUPNIK, M. A. Mechanisms for pulsatile regulation of the gonadotropin subunit genes by GnRH. **Biology of Reproduction**, v. 74, p. 993-998, 2006.

FIELDS, M. J.; BARROS, C. M.; WATKINS, W. B.; FIELDS, P. A. Characterization of large luteal cells and their secretory granules during the estrous cycle of the cow. **Biology of Reproduction**, v. 46, p. 535-545, 1992.

FIELDS, M. J.; DUBOIS, W.; FIELDS, P. A. Dynamic features of luteal granules ultrastructural changes during the course of pregnancy in the cow. **Endocrinology**, v. 17, p. 1675-1682, 1985.

FIGUEIREDO, R. A.; BARROS, C. M.; PINHEIRO, O. L.; SOLER, J. M. P. Ovarian follicular dynamics in Nelore breed (*Bos indicus*) cattle. **Theriogenology**, v. 47, p. 1489-1505, 1997.

FORTUNE, J. E.; RIVERA, G. M.; EVANS, A. C. O.; TURZILLO, A. M. Differentiation of dominant versus subordinate follicles in cattle. **Biology of Reproduction**, v. 65, p. 648-654, 2001.

FORTUNE, J. E.; RIVERA, G. M.; YANG, M. Y. Follicular development: the role of the follicular microenvironment in selection of the dominant follicle. **Animal Reproduction Science**, v. 82-83, p. 109-126, 2004.

FORTUNE, J. E.; QUIRK, S. M. Regulation of steroidogenesis in bovine preovulatory follicles. **Journal of Animal Science**, v. 66, p. 1-8, 1998.

FRIEDMAN, A.; WEISS, S.; LEVY, N.; MEIDAN, R. Role of tumor necrosis factor A and its type I receptor in luteal regression: induction of programmed cell death in bovine corpus luteum-derived endothelial cells. **Biology and Reproduction**, v. 63, p. 1905-1912, 2000.

FUCHS, A. R.; BEHRENS, O.; HELMER, H.; LIU, C. H.; BARROS, C. M.; FIELDS, M. J. Oxytocin and vasopressin receptors in bovine endometrium and

myometrium during the estrous cycle and early pregnancy. **Endocrinology**, v. 127, p. 629-636, 1990.

FUJIMOTO, J.; ICHIGO, S.; HIROSE, R.; SAKAGUCHI, H.; TAMAYA, T. Clinical implication of expression of progesterone receptor form A and B RNAs in secondary spreading of gynecologic cancers. **Journal Steroid Biochemistry and Molecular Biology**, v. 62, p. 449-454, 1997.

GILCHRIST, R. B.; RITTER, L. J.; ARMSTRONG, D. T. Oocyte-somatic cell interactions during follicle development in mammals. **Animal Reproduction Science**, v. 82-83, p. 431-446, 2004.

GIMENES, L. U.; SÁ FILHO, M. F.; MADUREIRA, E. H.; TRINCA, L. A.; BARROS, C. M.; BARUSELLI, P. S. Estudo ultra-sonográfico da divergência folicular em novilhas Nelore (*Bos indicus*). **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 33, n. 1, p. 210, 2005.

GINTHER, O. J.; KASTELICK, J. P.; KNOPF, L. Composition and characteristics of follicular waves during the bovine estrous cycle. **Animal Reproduction Science**, v. 20, p. 187-200, 1989a.

GINTHER, O. J.; KNOPF, L.; KASTELIC, J. P. Temporal associations among ovarian events in cattle during oestrous cycles with two or three follicular waves. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 87, p. 223-230, 1989b.

GINTHER, O. J.; WILTBANK, M. C.; FRICKE, P. M. Selection of the dominant follicle in cattle. **Biology of Reproduction**, v. 55, p. 1187-1194, 1996.

GINTHER, O. J.; KOT, K.; KULICK, L. J.; WILTBANK, M. C. Emergence and deviation of follicles during the development of follicular waves in cattle. **Theriogenology**, v. 48, p. 75-87, 1997.

GINTHER, O. J.; BERGFELT, D. R.; KULICK, L. J.; KOT, K. Selection of dominant follicle in cattle: establishment of follicle deviation in less than 8 hours through depression of FSH concentrations. **Theriogenology**, v. 52, p. 1079-1093, 1999.

GINTHER, O. J. Selection of the dominant follicles in cattle and horses. **Animal Reproduction Science**, v. 60-61, p. 61-79, 2000a.

GINTHER, O. J.; BEG, M. A.; BERGFELT, D. R.; DONADEU, F. X.; KOT, K. Follicle selection in monovular species. **Biology of Reproduction**, v. 65, p. 638-647, 2001.

GINTHER, O. J.; BERGFELT, D. R.; KULICK, L. J.; KOT, K. Selection of the dominant follicle in cattle: role of estradiol. **Biology of Reproduction**, v. 63, p. 383-389, 2000b.

GIOMETTI, I. C.; CASTILHO, A. C. S.; SÁ FILHO, O. G.; PAPA, P. C.; BURATINI JR, J. Controle local e endócrino do desenvolvimento e da regressão do corpo lúteo bovino. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 33, n. 1, p. 34-52, 2009

GLENCROSS, R. G.; POPE, G. S. Concentrations of estradiol-17 β and progesterone in the plasma of dairy heifers before and after clorprostenol-induced and natural luteolysis and during early pregnancy. **Animal Reproduction Science**, v. 4, p. 93-106, 1981.

GONG, J. G.; BRAMLEY, T. A.; GUTIERREZ, C. G.; PETERS, A. R.; WEBB, R. Effects of chronic treatment with a gonadotrophin-releasing hormone agonist on peripheral concentrations of fsh and lh, and ovarian function in heifers. *journal of reproduction and fertility*, v. 105, p. 263–270, 1995.

GONG, J. G.; CAMPBELL, B. K.; BRAMLEY, T. A.; GUTIERREZ, C. G.; PETERS, A. R.; WEBB, R. Suppression in the secretion of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone, and ovarian follicle development in heifers continuously infused with a gonadotropin-releasing hormone agonist. *biology and reproduction*, v. 55, p. 68–74, 1996.

GOSPODAROWICZ, D.; PLOUET, J.; FUJII, D. K. Ovarian germinal epithelial cells respond to basic fibroblast growth factor and express its gene: implications for early folliculogenesis. **Endocrinology**. v. 125, p. 1266- 1276, 1989.

GROSS, T. S.; THATCHER, W. W.; HANSEN, P. J.; JOHNSON, J. W.; LACROIX, M. C. Prostaglandin secretion by perfused bovine endometrium: secretion towards the myometrium and luminal sides at day 17 post-estrous as altered by pregnancy. **Prostaglandins**, v. 35, p. 342-357, 1988.

GUDERMANN, T.; BIRNBAUMER, M.; BIRNBAUMER, L. Evidence for dual coupling of the murine luteinizing hormone receptor to adenylyl cyclase and phosphoinositide breakdown and Ca²⁺ mobilization. **The Journal of Biological Chemistry**, v. 267, n. 7, p. 4479-4488,1992.

HAFEZ, B., HAFEZ, E.S.E. *Reprodução Animal*. 7.ed. São Paulo: Manole, 2000.

HANUKOGLU, I. Steroidogenic enzymes: structure, function, and role in regulation of steroid hormone biosynthesis. **Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology**, v. 43, p. 779-804, 1992.

HENRICKS, D. M.; HARRIS, R. B. Cytoplasmatic estrogen receptor and estrogen concentrations in bovine uterine endometrium. **Endocrinology**, v. 103, p. 176-185, 1978.

HIXON, J. E.; FLINT, A. P. F. Effects of a luteolytic dose of oestradiol benzoate on uterine oxytocin receptor concentrations, phosphoinositide turnover and prostaglandin F₂ α secretion in sheep. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 79, p. 457-467, 1987.

HOMANICS, G. E.; SILVIA, W. J. Effects of progesterone and estradiol-17 β on uterine secretion of prostaglandin F₂ α in response to oxytocin in ovariectomized ewes. **Biology of Reproduction**, v. 38, p. 804-811, 1988.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Disponível em:** <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/producaoagropecuaria/default.shtm#animal>. Acesso em: dezembro de 2008.

International embryo transfer society – IETS. **Disponível em:** <http://www.iets.org/index.asp?error=login>. Acesso em dezembro de 2008.

IRELAND, J. J.; COULSON, D. B.; MURPHEE, R. L. Follicular development during four stages of the estrous cycle in beef cattle. **Journal of Animal Science**, v. 50, p. 760, 1979.

IRELAND, J. J.; FOGWELL, R. L.; OXENDER, W. D.; AMES, K.; COWLEY, J. L. Production of estradiol by each ovary during the estrous cycle of cows. **Journal of Animal Science**, v. 59, n. 3, p. 764-771, 1984.

JENNER, L.J.; PARKINSON, T.J.; LAMMING, G.E. Receptores uterinos em vacas cíclicas e grávidas. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 91, p. 49-58, 1991.

JIMÉNEZ-SEVERIANO, H.; MUSSARD, M. L.; FITZPATRICK, L. A.; D'OCCHIO, M. J.; FORD, J. J.; LUNSTRA, D. D.; KINDER, J. E. Testicular development of Zebu bulls after chronic treatment with a gonadotropin-releasing hormone agonist. **Journal of Animal Science**, v. 83, p. 2111-2122, 2005.

JOYCE, I. M.; CLARK, A. T.; PENDOLA, F. L.; EPPIG, J. J. Comparison of recombinant growth factor-9 and oocyte regulation of Kit ligand messenger

ribonucleic acid expression in mouse ovarian follicles. **Biology of Reproduction**, v. 63, p. 1669-1675, 2000.

JUNAIDI, A.; WILLIAMSON, P. E.; MARTIN, G. B.; STANTON, P. G.; BLACKBERRY, M. A.; CUMMINS J. M.; TRIGG T. E. Pituitary and testicular endocrine responses to exogenous gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) and luteinizing hormone in male dogs treated with GnRH agonist implants. **Reproduction, Fertility and Development**, v. 19, p. 891–898, 2007.

KAMINSKI, M. A.; HAYES, S. H.; SILVA, W. J. Effects of progesterone with drawal on uterine secretion of prostaglandin F₂ α in response to oxytocin in ewes. **Reproduction, Fertility and Development**, v. 9, p. 255-262, 1997.

KESNER, J. S.; CONVEY, E. M.; ANDERSON, C. R. Evidence that estradiol induces the preovulatory LH surge in cattle by increasing pituitary sensitivity to LHRH and then increasing LHRH release. **Endocrinology**, v. 108, n. 4, p. 1386-1391, 1981.

KINDER, J. S.; KOJIMA, F. N.; BERGFELD, E. G. M.; WEHRMAN, M. E.; FIKE, K. E. Progestin and estrogen regulation of pulsatile LH release and development of persistent ovarian follicles in cattle. **Journal of Animal Science**, v. 74, n. 6, p. 1424-1440, 1996.

KIMBALL, F.A.; HANSEL, W. Estrogen binding protein in bovine endometrium and corpus luteum. **Biology of Reproduction**, v. 11, p. 566-577, 1974.

KNICKERBOCKER, J. J.; THATCHER, W. W.; FOSTER, D. B.; WOLFWNSON, D.; BARTOL, F. F.; CATON, D. Uterine prostaglandin and blood flow responses to estradiol-17 β in cyclic cattle. **Prostaglandins**, v. 31, p. 757-770, 1986.

KOMAR, C. M.; BERNDTSON, A. K.; EVANS, A. C. O.; FORTUNE, J.E. Decline in circulating estradiol during the periovulatory period is correlated with decrease in estradiol and androgen, and in messenger RNA for P450 aromatase and P450 17 α -hydroxylase, in bovine preovulatory follicles. **Biology of Reproduction**, v. 64, p. 1979-2003, 2001.

KRIEGSFELD. L. J. Driving reproduction: RFamide peptides behind the wheel. **Hormones and Behavior**, v. 50, p. 655–666, 2006.

KRIEGSFELD. L. J.; SILVER, R. The regulation of neuroendocrine function: Timing is everything. **Hormones and Behavior**, v. 49, p. 557–574, 2006.

KUIPER, G. G. J. M.; ENMARK, E.; PELTO-HUIKKO, M.; NILSSON, S.; GUSTAFSSON, J. A. Cloning of a novel receptor expressed in rat prostate and

ovary. Proceeding of the National **Academy of Sciences**, v. 93, p. 5925-5930, 1996.

KUIPER, G. G. J. M.; CARLSSON, B.; GRANDIEN, K.; ENMARK, E.; HÄGGBLAD, J.; NILSSON, S.; GUSTAFSSON, J. A. Comparison of the ligand binding specificity and transcript tissue distribution of estrogen receptors α and β . **Endocrinology**, v. 138, p. 863–870, 1997.

KUIPER, G. G. J. M.; LEMMEN, J. G.; CARLSSON, B.; CORTON, J. C.; SAFE, S. H.; VAN DER SAAG, P. T.; VAN DER BURG, B.; GUSTAFSSON, J. A. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens with estrogen receptor β . **Endocrinology**, v. 139, n. 10, p. 4252-4263, 1998.

KULICK, L. J; KOT, K.; WILTBANK, M. C.; GINTHER, O. J. Follicular and hormonal dynamics during the first follicular waves in heifers. **Theriogenology**, v. 52, p. 913-921, 1999.

LAMMING, G. E.; MANN, G. E. Control of endometrial oxytocin receptors and prostaglandin F₂ α production in cows by progesterone and oestradiol. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 103, p. 69-73, 1995.

LARSON, G. H.; WILLIAMS, W. F.; GROSS, T. S.; RUSSEK-COHEN, E.; MANSPEAKER, J. E. Systemic 13, 14-dihydro-15-ket-prostaglandin F₂ α (PGFM) response to exogenous estradiol by luteal heifers on days 14 and 19 of the estrous cycle and on day 19 of pregnancy. **Animal Reproduction Science**, v. 25, p. 31-9, 1991.

LAU, T. M.; KERTON, D. J.; GOW, C. B.; FAIRCLOUGH, R. J. Role of progesterone in the control of endometrial oxytocin receptors at luteolysis in sheep. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 98, p. 229-233, 1993.

LEI, Z. M.; CHEGINI, N.; RAO, CH. V. Quantitative cell composition of human and bovine corpora lutea from various reproductive states. **Biology of Reproduction**, v. 44, p. 1148-1156, 1991.

LEMON, M. The effect of oestrogens alone or in association with progestagens on the formation and regression of the corpus luteum of the cyclic cow. **Annales de Biologie Animale, Biochimie Biophysique**, v. 15, n. 2, p. 243-253, 1975.

LEWIS, G. S. Steroidal regulation of immune defenses. **Animal Reproduction Science**, v. 82, p. 281-294, 2004.

LIMA, S. R. S. **Ginecomastia**. 2008. 56p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Portugal.

LUCY, M. C.; SAVIO, J. D.; BADINGA, L.; DE LA SOTA, R. L.; THATCHER, W. W. Factors that affect ovarian follicular dynamics in cattle. **Journal of Animal Science**, v. 70, p. 3615-3626, 1992.

MANN, G. E.; LAMMING, G. E. Progesterone inhibition of the development of the luteolytic signal in cows. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 104, p. 1-5, 1995.

MANN, G. E.; PAYNE, J. H.; LAMMING, G. E. Hormonal regulation of oxytocin-induced prostaglandin F₂ α secretion by the bovine and ovine uterus in vivo. **Domestic Animal Endocrinology**, v. 21, p. 127–141, 2001.

MANN, G.E.; LAMMING, G.E. Timing of prostaglandin F₂ α release episodes and oxytocin receptor development during luteolysis in the cow. **Animal of Reproduction and Science**, v. 93, p. 328–336, 2006.

MARTIN, I. **Avaliação ultra-sonográfica, perfil hormonal e imunoistoquímica de receptores de estrógeno e progesterona durante o ciclo estral em vacas Nelore (*Bos taurus indicus*)**. Botucatu, 2005. 140p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Botucatu, 2005.

MARTIN, I.; COSTA, I. B.; MACHADO, M. F.; CASTILHO, A. C. S.; VETORATTO, L. F.; BURATINI Jr., J.; OBA, E.; FERREIRA, J. C. P. Expressão gênica do receptor de ocitocina no endométrio de vacas Nelore (*Bos Taurus indicus*) durante o ciclo estral. **In: XVI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões**, v. 34, 2006, Araxá. Anais...Araxá: Acta Scientiae Veterinariae, 2006, v. 34, sup. 1, p. 329.

MARTIN, I.; TORRES NETO, R.; OBA, E.; BURATINI Jr., J.; BINELI, M.; LAUFER-AMORIM, R.; FERREIRA, J. C. P. Immunohistochemical detection of receptors for oestrogen and progesterone in endometrial glands and stroma during the oestrus cycle in Nelore (*Bos taurus indicus*) cows. **Reproduction Domestic Animals**, v. 43, n. 4, p. 415-421, 2008.

MATTOS, R.; ORLANDI, C.; WILLIAMS, J.; STAPLES, C.R.; TRIGG, T.; THATCHER, W.W. Effect of an implant containing the GnRH agonist deslorelin on secretion of LH, ovarian activity and milk yield of postpartum dairy cows. **Theriogenology**, v. 56, p. 371-386, 2001.

MAZERBOURG, S.; OVERGAARD, T. M.; OXVIG, C.; CHRISTIAMSEN, M.; CONOVER, A. C.; LAURENDEAU, I.; VIDAND, M.; TOSSER-KLOPP, G.; ZAPF, J.; MONGET, P. Pregnancy-associated plasma protein-A (PAPPA) in ovine, bovine, porcine and equine ovarians follicles: involvement in IGF binding protein-4 proteolytic degradation and RNAm expression during follicular development. **Endocrinology**, v. 142, p. 5243-5253, 2001.

MCCRACKEN, J. A., SCHRAM, W., OKULICZ, W. C. Hormone receptor control of pulsatile secretion of PGF2 α from the ovine uterus during luteolysis and its abrogation in early pregnancy. **Animal Reproduction Science**, v. 7, p. 31-56, 1984.

MCCRACKEN, J. A., CUSTER, E. E., LAMSA, J. C. Luteolysis: a neuroendocrine-mediated event. **Physiology Review**, v. 79, p. 263-323, 1999.

MCDONALD, L. E. **Veterinary endocrinology and reproduction**. 4.ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1989.

MCNATTY, K. P.; HEATH, D. A.; LUNDY, T.; FIDLER, A. E.; QUIRKE, L.; O'CONNELL, A.; SMITH, P.; GROOME, N.; TISDALL, D. J. Control of early ovarian follicular development. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 54, p. 3-16, 1999.

MIHM, M.; AUSTIN, E. J.; GOOD, T. E. M.; IRELAND, J. L. H.; KNIGHT, P. G.; ROCHE, J. F.; IREALND, J. J. Identification of potential intrafollicular factors involved in selection of dominant follicles in heifers. **Biology of Reproduction**, v. 63, p. 811-819, 2000.

MILVAE, R. A.; HINCKLEY, S. T.; CARLSON, J. C. Luteotropic and luteolytic mechanisms in the bovine corpus luteum. **Theriogenology**, v. 45, p. 1327-1349, 1996.

MONNIAUX, D.; HUET, C.; BESNARD, N.; CLEMENT, F.; BOSC, M.; PISSELET, C.; MONGET, P.; MARIANA, J. C. Follicular growth and ovarian dynamics in mammals. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 51, p. 3-23, 1997.

MOSELMAN, S.; POLMAN, J.; DIJKMA, S. E β R: identification and characterization of a novel human estrogen receptor. **Febs Letters**, v. 392, p. 49-53, 1996.

MOWA, C. N.; IWANGA, T. Differential distribution of estrogen receptor – α , β m RNAs in the female reproductive organ of rats as revealed by in situ hybridization. **Journal of Endocrinology**, v. 165, p. 59-66, 2000a.

MOWA, C. N.; IWANGA, T. Developmental changes of the estrogen receptor – alpha and beta m RNA in the female reproductive organ of the rat – na analysis by in situ hybridization. **Journal of Endocrinology**, v. 167, p. 363-369, 2000b.

MYAMOTO, A.; SHIRASUNA, K.; SASAHARA, K. Local regulation of corpus luteum development and regression in the cow: impact of angiogenic and vasoactive factors. **Domestic Animal Endocrinology**, v. 37, p. 159-169, 2009.

NETT, T. M.; TURZILLO, A. M.; BARATTA, M.; RISPOLI, L. A. Pituitary effects of steroids hormones on secretion of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. **Domestic Animal Endocrinology**, v. 23, p. 33-42, 2002.

NILSSON, E.; PARROTT, J. A.; SKINNER, M. K. Basic fibroblast growth factor induces primordial follicle development and initiates folliculogenesis. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 175, p. 123-130, 2001.

NISWENDER, G. D.; JUENGEL, J. L.; MCGUIRE, W. J.; BELFIORE, C. J.; WILTBANK, M. C. Luteal function: the estrous cycle and early pregnancy. **Biology of Reproduction**, v. 50, p. 239-247, 1994.

NISWENDER, G. D. Molecular control of luteal secretion of progesterone. **Reproduction**, v. 123, 333–339, 2002.

NOGUEIRA, M. F. G.; PINTO, M. L. G.; RAINHO, C. A.; AVELLAR, M. C. W.; PRICE, C. A.; BURATINI, J. R. J.; BARROS, C. M. Expressão das isoformas do gene codificador do receptor de LH em células da teca e da granulosa de folículos antrais bovinos. **Acta Scientiae Veterinariae**, 2005 (resumo aceito).

NUNES, C. B. **Estudo imunoistoquímico comparativo entre seis anticorpos anti-HER2 em arrays de carcinomas mamários: correlação com hibridação in situ cromogênica e avaliação interobservador**. Belo Horizonte, 2007. 97p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.

OKUDA, K.; UENOYAMA, Y.; NAITO, C.; SAKABE, Y.; KAWATE, N. Luteinizing hormone receptors in the bovine corpus luteum during the oestrous cycle and pregnancy. **Reproduction, Fertility and Development**, v. 11, p. 147-151, 1999.

OTSUKA F, YAMAMOTO S, ERICKSON GF, SHIMASAKI S. Bone morphogenetic protein-15 inhibits follicle-stimulating hormone (FSH) action by suppressing FSH receptor expression. **Journal of Biological Chemistry**, v. 276, p. 11387-11392, 2001.

OTSUKA F, SHIMASAKI S. A negative feedback system between oocyte bone morphogenetic protein-15 and granulosa cell kit ligand: its role in regulating granulosa cell mitosis. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 89, p. 8060-8065, 2002.

PADULA, A. M. GnRH analogues—agonists and antagonists. **Animal Reproduction of Science**, v. 88, p. 115–126, 2005.

PIEBER, D.; ALLPORT, V. C.; HILLS, F.; JOHNSON, M.; BENNETT, P. R. Interactions between progesterone receptor isoformas in myometrial cells in human labour. **Molecular Human Reproduction**, v. 7, n. 9, p. 875-879, 2001.

PUTNEY, D. J., TORRES, C. A. A., GROSS, T. S., THATCHER, W. W. PLANT, C., DROST, M. Modulation of uterine prostaglandin biosynthesis by pregnant and nonpregnant cows at day 17 post-estrous in response to in vivo and in vitro heat stress. **Animal Reproduction Science**, v. 20, p. 31-47, 1989.

RAJAPAKSHA, W. R. A. K. J. S.; ROBERTSON, L.; O'SHAUGHNESSY, P. J. Expression of follicle- stimulating hormone-receptor RNAm alternate transcripts in bovine granulosa cells during luteinization in vivo and in vitro. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 120, n. 1, p. 25-30, 1996.

RANDALL, D. BURGGREN, W.; FRENCH, K. **Fisiologia Animal: mecanismos e adaptações**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2000, 729p.

RAZANDI, M.; PEDRAN, A.; GREENE, G. L.; LEVIN, E. R. Cell membrane and nuclear estrogen receptors (Ers) originate from a single transcript: studies of E α R and E α expressed in Chinese Hamster ovary cells. **Molecular Endocrinology**, v. 13, n. 2, p. 307-319, 1999.

RAW, R. E.; SILVIA, W. J.; CURRY, T. E. effects of progesterone and estradiol on prostaglandin endoperoxide synthase in ovine endometrial tissue. **Animal Reproduction Science**, v. 40, p. 17-30, 1995.

RICHARDS, A. S. Hormonal control of gene expression in the ovary. **Endocrine Reviews**, v. 15, n. 6, p. 725-751, 1994.

RICO, L. W.; THATCHER, W. W.; DROST, M.; WOLFENSON, D.; TERQUI, M. Plasma PGFM responses to estradiol injection in pregnant and cycling cows. **Journal of Animal Science**, v. 53, N. 1, p. 363, 1981.

ROSENFELD, C. S.; WAGNER, J. S.; ROBERTS, R. M.; LUBAHN, D. B. Intraovarian actions of oestrogen. **Reproduction**, v. 122, p. 215-36, 2001.

ROTHCHILD, I. The regulation of the mammalian corpus luteum. **Recent Progress in Hormone Research**, v. 37, p. 183-298, 1981.

RUEDA, B. R.; HENDRY, I. R.; HENDRY, W. J.; STORMSHAK, F.; SLAYDEN, O. D.; DAVIS, J. S. Decreased progesterone levels and progesterone receptor antagonists promote apoptotic cell death in bovine luteal cells. **Biology of Reproduction**, v. 62, p. 269–276, 2000.

SALFEN, B. E.; CRESSWELL, J. R.; XU, Z. Z.; BAO, B.; GARVERICK, H. A. Effects of the presence of a dominant follicle and exogenous oestradiol on the duration of the luteal phase of the bovine oestrous cycle. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 115, p. 15-21, 1999.

SARTORELLI, E. S.; CARVALHO, L. M.; BERGFELT, D. R.; GINTHER, O. J.; BARROS, C. M. Caracterização morfológica do início do desvio (divergência) folicular, em novilhas e vacas da raça Nelore. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 31, p. 558-559, 2003.

SARTORELLI, E. S.; CARVALHO, L. M.; BERGFELT, D. R.; GINTHER, O. J.; BARROS, C. M. Morphological characterization of follicle deviation in Nelore (*Bos indicus*) heifers and cows. **Theriogenology**, v. 63, p. 2382-2394, 2005.

SARTORIUS, C. A.; MELVILLE, M. Y.; HOVLAND, A. R.; TUNG, L.; TAKIMOTO, G. S.; HORWITZ, K. B. A third transactivation function (AF3) of human progesterone receptors located in the unique N-terminal segment of the B-isoform. **Molecular Endocrinology**, v. 8, p. 1347-1360, 1994.

SCHAMS, D.; BERISHA, B. Steroids as local regulators of ovarian activity in domestic animals. **Domestic Animal Endocrinology**, v. 23, n. 1-2, p. 53-65, 2002.

SCHAMS, D.; BERISHA, B. Regulation of corpus luteum function in cattle – an overview. **Reproduction in Domestic Animals**, v. 39, p. 241-251, 2004.

SCHILLO, K. K. **Reproductive Physiology of Mammals: from farm to field and beyond**. 1^a ed. Delmar, Cengage Learning, Clifton Park, NY. 2009, 462p.

SENGER, P. L. **Pathways to pregnancy and parturition**. 2^a ed. Washington: Current Conceptions, IC, 2003, 373p.

SHELDRIK, E. L. Oxytocin delays oestradiol-induced luteolysis but does not affect oestradiol-induced luteinizing hormone secretion in the ewe. **Reproduction Fertility and Development**, v. 4, p. 593-599, 1992.

SILVIA, W. J.; LEWIS, G. S.; MCCRACKEN, J. A.; THATCHER, W. W.; WILSON, L. J. Hormonal regulation of uterine secretion of prostaglandin F_{2a} secretion during luteolysis in ruminants. **Biology of Reproduction**, v. 45, p. 655—663, 1991.

SILVA, J. M.; PRICE, C. A. Insulin and IGF-I are necessary for FSH-induced cytochrome P450 aromatase but not cytochrome P450 side-chain cleavage gene expression in oestrogenic bovine granulosa cells in vitro. **Journal of Endocrinology**, v. 174, p. 499-507, 2002.

SILVESTRE, F. T.; BARTOLOME, J. A.; KAMIMURA, S.; ARTECHE, A. C.; PANCARCI, S. M.; TRIGG, T.; TATCHER, W. W. Postpartum suppression of ovarian activity with a deslorelin implant enhanced uterine involution in lactating dairy cows. **Animal Reproduction of Science**, v. 110, p. 79-95, 2009a.

SILVESTRE, F.T.; KAMIMURA, S.; ARTECHE, A.C.; BARTOLOME, J.; PANCARCI, S.M.; THATCHER, W.W. Reproductive responses following postpartum suppression of ovarian follicular development with a deslorelin implant during summer heat stress in lactating dairy cows. **Animal Reproduction Science**, v. 11, p. 320–337, 2009b.

SLOMCZYNSKA, M.; DUDA, M.; SI-ZAK, K. The expression of androgen receptor, cytochrome P450 aromatase and FSH receptor RNAm in the porcine ovary. **Folia Histochemica et Cytobiologica**, v. 39, n. 1, p. 562-574, 2001.

SPICER, L. J. Proteolytic degradation of insulin-like growth factor binding proteins by ovarian follicles: a control mechanism for selection of dominant follicles. **Biology of Reproduction**, v. 70, p. 1223-1230, 2004.

STANISLAUS, D.; PINTER, J. H.; JANOVICH, J. A. Mechanisms mediating multiple physiological responses to gonadotrofin-releasing hormone. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 144, n. 1, p. 1-10, 1998.

STUMPF, T. T.; ROBERSON, M. S.; WOLFE, M. W.; HAMERNIK, D. L.; KITOK, R. J.; KINDER, J. E. Progesterone, 17 β -estradiol and opioid

neuropeptides modulate pattern of LH in circulation of the cow. **Biology of Reproduction**, v. 49, n. 5, p. 1096-101, 1993.

SUZUKI, T.; SASANO, H.; KIMURA, N.; TAMURA, M.; FUKAYA, T.; YAJIMA, A.; NAGURA, H. Immunohistochemical distribution of progesterone, androgen and oestrogen receptors in the human ovary during the menstrual cycle: relationship to expression of steroidogenic enzymes. **Human Reproduction**, v. 9, n. 9, p. 1589-1595, 1994.

SWENSON, M. J.; REECE, W. O. **Fisiologia dos Animais Domésticos**. 12^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006, 946p.

TAYA, K.; KANEKO, H.; TAKEDOMI, T.; KISHI, H.; WATANABE, G. Role of inhibin in the regulation of FSH secretion and folliculogenesis in cows. **Animal Reproduction Science**, v. 42, p. 563-70, 1996.

TAYLOR, C.; RAJAMAHENDRAN, R. Follicular dynamics, corpus luteum growth and regression in lactating dairy cattle. **Canadian Journal of Animal Science**, v. 71, p. 61-68, 1991.

THATCHER, W. W.; TERQUI, M.; THIMONIER, J.; MAULEON, P. Effects of estradiol-17 β on peripheral plasma concentration of 15-keto-13, 14-dihydro PGF $_{2\alpha}$ and luteolysis in cyclic cattle. **Prostaglandins**, v. 31, n. 4, p. 745-756, 1986.

TSAI, S.; WILTBANK, M. C. Prostaglandin F $_{2\alpha}$ induces expression of prostaglandin G/H Synthase-2 in the ovine corpus luteum: a potential positive feedback loop during luteolysis. **Biology of Reproduction**, v. 57, p. 1016-1022, 1997.

VALLEJO, A. N. CD28 extinction in human T cells: altered functions and the program of T-cell senescence. **Immunological Reviews**, v. 205, p. 158–169, 2005.

VALLET, J. L.; LAMMING, G. E.; BATTEN, M. Control of endometrial oxytocin receptor and uterine response to oxytocin by progesterone and oestradiol in the ewe. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 90, p. 625-634, 1990.

VAN DEN BROECK, W.; D'HAESELEER, M.; CORYN, M.; SIMOENS, P. Cell-specific distribution of progesterone receptors in the bovine ovary. **Reproduction in Domestic Animals**, v. 37, p. 164-170, 2002.

VAN WEZEL, I. L.; UMAPATHYSIVAM, K.; TILLEY, W. D.; RODGERS, R. J. Immunohistochemical localization of basic fibroblast growth factor in bovine

ovarian follicles. **Molecular and Cellular Endocrinology**, v. 115, p. 133-140, 1995.

VASCONCELOS, J. L. M.; SANTOS, R. M.; PEREZ, G. C. Estratégias para aumentar a eficiência reprodutiva em bovinos de corte. [on line]. Botucatu: FMVZ-UNESP, 2008. Disponível em: <http://www.agripoint.com.br/cursos>. Acesso em: 22 jan. 2008.

VIANA, J. H. M.; FERREIRA, A.M.; SÁ, W. F.; FERNANDES, C. A. C. Regressão luteal e dinâmica folicular após luteólise natural ou induzida por cloprostenol em vacas da raça. Gir. **Arquivo Brasileiro Medico Veterinária e Zootecnia**, v. 51, p. 257-262, 1999.

VILLA-GODDOY, A.; IRELAND, J. J.; WORTMAN, J. A.; AMES, N. K.; HUGHES, T. L.; FOGWELL, R. L. Effect of ovarian follicles on luteal regression in heifers. **Journal of Animal Science**, v. 60, n. 2, p. 519-527, 1985.

VITT, U. A.; MCGEE, E. A.; HAYASHI, M.; HSUEH, A. J. W. In vivo treatment with GDF-9 stimulates primordial and primary follicle progression and theca cell marker CYP17 in ovaries of immature rats. **Endocrinology**, v. 141, p. 3814-3820, 2000a.

VITT, U. A.; HAYASHI, M.; KLEIN, C.; HSUEH, A. J. W. Growth differentiation factor-9 stimulates proliferation but suppresses the follicle stimulating hormone-induced differentiation of cultured granulosa cells from small antral and preovulatory rat follicles. **Biology of Reproduction**, v. 62, p. 370-377, 2000b.

XU, Z.; GARVERICK, H. A.; SMITH, G. W.; SMITH, M. F.; HAMILTON, S. A.; YOUNGQUIST, R. S. Expression of follicle-stimulating hormone and luteinizing Hormone receptor messenger ribonucleic acids in bovine follicles during the first follicular wave. **Biology of Reproduction**, v. 53, p. 951-957, 1995.

WALKER, D. L.; WESTON, P. G.; HIXON, J. E. Influence of estradiol and progesterone withdrawal on the secretion of and the temporal correlation between pulses of oxytocin and prostaglandin F₂ α in ewes. **Biology of Reproduction**, v. 56, p. 1228-38, 1997.

WALTERS, D. L.; SCHAMS, D.; SCHALLENBERGER, E. Pulsatile secretion of gonadotrophins, ovarian steroids and ovarian oxytocin during the luteal phase of the oestrous cycle in the cow. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 71, p. 479-91, 1984.

- WANDJI, S. A.; PELLETIER, G.; SIRARD, M. A. Ontogeny and cellular localization of 125I-labeled basic fibroblast growth factor and 125I-labeled epidermal growth factor binding sites in ovaries from bovine fetuses and neonatal calves. **Biology of Reproduction**, v. 47, p. 807-813, 1992.
- WATHES, D. C.; SWANN, R. W.; BIRKETT, S. D.; PORTER, G.; PICHERING, B.T. Characterization of oxytocin, vasopressin and neurophysin from the bovine corpus luteum. **Endocrinology**, v. 113, p. 693-698, 1983.
- WATHES, D. C.; SWANN, R. W.; PICHERING, B. T. Variations in oxytocin, vasopressin and neurophysin concentrations in the bovine ovary during the oestrous cycle and pregnancy. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 71, p. 551-557, 1984.
- WATHES, D. C.; LAMMING, G. E. The oxytocin receptor, luteolysis and the maintenance of pregnancy. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 49, p. 53-57, 1995.
- WEBB, R.; GOSDEN, R. G.; TELFER, E. E.; MOOR, R. M. Factors affecting folliculogenesis in ruminants. **Animal Science**, v. 68, p. 257-284, 1999.
- WEBB R, NICHOLAS B, GONG JG, CAMPBELL BK, GUTIERREZ CG, GARVERICK, HA, ARMSTRONG DG. Mechanisms regulating follicular development and selection of the dominant follicle. **Reproduction Supplement**, v. 61, p. 71-90, 2003.
- WEBB, R.; GARNSWORTHY, P. C.; GONG, J. G.; ARMSTRONG, D. G. Control of follicular growth: Local interactions and nutritional influences. **Journal of Animal Science**, v. 82, p. 63-74, 2004.
- WILTBANK, M. C.; GÜMEN, A.; SARTORI, R. Physiological classification of anovulatory conditions in cattle. **Theriogenology**, v. 57, p. 21-52, 2002.
- WILTBANK, M. C.; PURSLEY, R. P.; FIRCKE, P. M.; VASCONCELOS, J.; GUENTHER, J. N.; GIBBONS, J. R.; GINTHER, O. J. Development of AI and ET programs that do not require detection of estrus using recent information on follicular growth. **In: ANNUAL CONVENTION PORTLAND**, 15, 1996, Oregon. Proceedings...Oregon: American Embryo Transfer Association, p. 23-44, 1996.
- WU, M.; DUMALSKA, I.; MOROZOVA, E.; VAN DEN POL, A. N.; ALREJA, M. Gonadotropin inhibitory hormone inhibits basal forebrain vGluT2-gonadotropin-releasing hormone neurons via a direct postsynaptic mechanism. **Journal of Physiology**, v. 587, n.7, p. 1401–1411, 2009.

YOSHIDA, H.; TAKAKURA, N.; KATAOKA, H.; KUNISADA, T.; OKAMURA, H.; NISHIKAWA, S. Stepwise requirement of c-Kit tyrosine kinase in mouse ovarian follicle development. **Development and Biology**, v. 184, p. 122-37, 1997.

YUAN, W.; BAO, B.; GARVERICK, H. A.; YOUNGQUIST, R. S.; LUCY, M. C. Follicular dominance in cattle is associated with divergent patterns of ovarian gene expression for insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF-II binding protein-2 in dominant and subordinate follicles. **Domestic Animals of Endocrinology**, v. 15, p. 55-63, 1998.

ZHANG, J.; WESTON, P. G.; HIXON, J. E. Influence of estradiol on the secretion of oxytocin and prostaglandin F₂α during luteolysis in the ewe. **Biology of Reproduction**, v. 45, p. 395- 403, 1991.

ZHANG, J.; WESTON, P. G.; HIXON, J. E. Role of progesterone and oestradiol in the regulation of uterine oxytocin receptors in ewe. **Journal of Reproduction and Fertility**, v. 94, p. 395-404, 1992.

ZIEBA, D.; BILINSKA, B.; SCHMALZ-FRACZEK, B.; MURAWSKI, M. Immunohistochemical localization of estrogen receptors in the ovine corpus luteum throughout the estrous cycle. **Folia Histochemistry Cytobiology**, v. 38, n. 3, p. 111-117, 2000.

Capítulo 2

TRABALHO REDIGIDO SEGUNDO AS NORMAS DA REVISTA
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, EXCETO O IDIOMA

**Efeitos da administração de Deslorelina por 70 dias na
forma de implante na dinâmica folicular, perfil
endócrino e expressão de receptores endometriais de
estrógeno, progesterona e ocitocina de vacas Nelore
(*Bos taurus indicus*)**

Wolff Camargo Marques Filho, João Carlos Pinheiro Ferreira, Eduardo Trevisol,
Giovana Wingeter Di Santis, Alexandre Secorun Borges, José Paes de Oliveira
Filho, Ian Martin, Miriam Harumi Tsunemi

26 aleatoriamente selecionados 7 animais para serem submetidos a implantação subcutânea
27 de Deslorelina por 70 dias. O exame ultra-sonográfico foi realizado a cada 2 a 3 dias
28 para caracterização da dinâmica folicular e os folículos classificados de acordo com o
29 seu diâmetro em: classe I (< 0,4 cm), II (0,4-0,6cm) e III (> 0,6cm). Amostras
30 sanguíneas foram coletadas para mensuração das concentrações plasmáticas de FSH,
31 LH e P₄. A pulsatilidade e os picos de LH foram determinados a partir de amostras
32 sanguíneas coletadas a cada 15 minutos por 6 horas em 4 vacas escolhidas
33 aleatoriamente nos D20 e 62. A mensuração da expressão proteica dos EαR, EβR,
34 PABR e PBR no epitélio glandular e estroma endometrial foram realizadas por meio da
35 técnica da imunistoquímica e, a expressão gênica dos EαR, EβR, PABR e OTR foi
36 avaliada com auxílio do qRT-PCR, ambas a partir de fragmentos coletados por meio de
37 biópsias uterinas nos dias 0, 4, 20 e 27. Os resultados foram analisados por meio do
38 teste não paramétrico de Friedman e Exato de Fisher. A relação dos resultados entre a
39 dinâmica folicular e expressões gênica e proteica foi analisada pela correlação de
40 Pearson, todos com nível de significância de 0,05. Durante o período de implantação da
41 Deslorelina nenhum animal ovulou, o que indica que o pico pré-ovulatório de LH foi
42 abolido. O número máximo de folículos recrutados foi de 13,7 (± 3,86). Os folículos de
43 classe III não foram observados na maioria dos animais a partir do D48. A concentração
44 plasmática da P₄ se manteve em nível basal (0,4 ng/mL) durante todo o período de
45 implantação. A secreção de FSH e LH não foi abolida ao longo do estudo. A frequência
46 de pulsos de LH observada no D20 e D62 foi, respectivamente 1 (± 0)/6 h e 1,25 (±
47 0,5)/6h. As concentrações plasmáticas máximas durante os pulsos foram de 1,72 (±
48 0,24) e 1,24 (± 0,31) ng/mL, respectivamente. De forma geral, foi observado alto
49 percentual de núcleos positivos dos ER e PR ao longo do estudo, bem como a alta
50 concentração de RNAm de ER, PR e OTR. Sendo assim, se infere que o tratamento por

51 70 dias com implantes subcutâneos de Deslorelina suprime o recrutamento e a seleção
52 folicular, reduz a pulsatilidade e o pico de LH, inibe a ovulação e, mantém elevada a
53 expressão dos receptores endometriais de estrógeno, progesterona e ocitocina em vacas
54 Nelore (*Bos taurus indicus*).

55 **Palavras-chaves:** Nelore, anestro, Deslorelina, dinâmica folicular, receptor
56 endometrial.

57 **Introdução**

58 No Brasil, cerca de 80% dos 199,7 milhões de bovinos são da raça Nelore (*Bos*
59 *taurus indicus*), que se caracteriza pela alta tolerância ao clima tropical. Devido a esta
60 rusticidade e adaptabilidade, estes animais são criados, em sua maioria, de forma
61 extensiva nas regiões Centro-oeste e Norte (IBGE, 2008).

62 Em bovinos, a produtividade está diretamente relacionada à eficiência
63 reprodutiva. Deste modo, o longo período de anestro e de restabelecimento da
64 atividade ovariana após o parto, e o baixo índice de fertilidade no primeiro ciclo estral
65 subsequente são alguns dos fatores que limitam a produtividade e resultam em
66 significativas perdas econômicas (Baruselli et al., 2007).

67 Tratamentos por longos períodos com agonistas de GnRH, como a Deslorelina,
68 têm sido utilizados para reduzir o intervalo entre partos de vacas de origem taurina,
69 tratar cistos foliculares e controlar a atividade reprodutiva de várias espécies animais,
70 em machos e fêmeas, uma vez que este tipo de agonista promove
71 *downregulation* dos receptores de GnRH hipofisários, com consequente redução na
72 secreção de gonadotrofinas (D'occhio et al., 1996; Mattos et al., 2001; Padula, 2005;
73 Silvestre et al., 2009a, 2009b; Güngör et al., 2010).

74 Em vacas Holandesas, foi constatado que a implantação subcutânea de
75 Deslorelina por 30 dias beneficiou o processo de involução uterina e limitou o

76 desenvolvimento folicular máximo até 3,2 mm de diâmetro. Nestes animais, foi
77 observada a ovulação entre 10 e 20 dias após a remoção do implante de Deslorelina
78 (Silvestre et al., 2009a, 2009b). Em novilhas de origem européia, o implante de
79 Buserelina suprimiu a liberação de LH e FSH, respectivamente, 8 e 30 dias após o início
80 do tratamento (Gong et al., 1996). No entanto, não há relatos dos efeitos deste análogo
81 do GnRH em *Bos taurus indicus*.

82 Sabendo que há diferenças entre *Bos taurus taurus* e *Bos taurus indicus* quanto à
83 fisiologia da reprodução e peculiaridades da dinâmica folicular (Barros et al., 2000;
84 Buratini et al., 2000), este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da utilização de
85 implantes subcutâneos de Deslorelina (GnRHa-Suprelorlin[®]) por 70 dias, sob a
86 dinâmica folicular, secreção da P₄ e LH e, expressão gênica e proteica dos receptores
87 endometriais de estrógeno α e β (E α R e E β R), de progesterona *isoformas* A e B (PAR e
88 PBR) e de ocitocina (OTR) de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*).

89 MATERIAL e MÉTODOS

90 Animais e instalações

91 O presente estudo foi conduzido entre os meses de julho e outubro de 2009
92 na Fazenda Experimental da FMVZ /UNESP-Botucatu, no município de São
93 Manuel/SP (latitude -22°43'52'', longitude -48°34'14''), Brasil. Foram utilizadas 15
94 vacas adultas não lactantes da raça Nelore clinicamente normais com escore de
95 condição corporal (ECC) ≥ 3 (0-5, Houghton et al., 1990).

96 As vacas permaneceram em pastejo de *Brachiara decumbens* e foram
97 suplementadas com ração 18% PB, minerais e água *ad libitum*.

98

99

100

101 Sincronização da ovulação

102 A sincronização da ovulação foi realizada por meio do protocolo (Figura 1).

103

104 **Fig 1.** Protocolo de sincronização da ovulação de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*). * BE (Estrogin[®],
 105 Farmavet Ltda, Brasil); P₄ (DIB[®], Intervet Schering-Plough, Brasil); PGF_{2α} (Dinoprost
 106 trometamina, Lutalyse[®], Pfizer Saúde Animal, Brasil); D-1 e D0: exame ultra-sonográfico
 107 transretal a cada 12 horas para determinação da ovulação.

108 Implantação da Deslorelina

109 Foi constatada a ovulação em todos os animais no D0 e destes, 10 foram
 110 aleatoriamente selecionados para receber o implante subcutâneo não degradável de
 111 4,7mg do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®], Peptech Animal Health, North
 112 Ride, Austrália) na face externa do pavilhão auditivo direito. Para descrição e
 113 diferenciação dos animais, cada um recebeu um código que variou de “A” a “J”.

114 Antes da realização do procedimento o local foi higienizado com água e sabão,
 115 seguida deposição de iodo degermante com gaze. Cinco minutos antes da implantação
 116 no local da deposição da Deslorelina, foi feito um botão anestésico pela infiltração
 117 subcutânea de 3 mL de lidocaína (Xylestesin 2%[®], Cristália, Brasil) por incisão/animal.

118 No D8 todos os animais receberam 12,5 mg i.m dinoprost trometamina i.m
 119 (Lutalyse[®], Pfizer Saúde Animal, Brasil). O implante de Deslorelina foi removido no
 120 D70 seguindo os mesmos cuidados anti-sépticos e anestésicos anteriormente descritos.

121

122

123 **Avaliações ultra-sonográficas**

124 A partir do dia da implantação subcutânea da Deslorelina até o D70, os ovários
125 dos animais foram examinados, a cada 2 a 3 dias, com auxílio do aparelho ultra-
126 sonográfico transretal (Mindray DP 3300, Mindray Biomedical Electronics Co. Ltda,
127 Shenzhen, China).

128 A cada avaliação foram identificados e determinado o diâmetro dos folículos
129 ovarianos presentes, que de acordo com os seus diâmetros foram classificados nas
130 seguintes classes, segundo Gimenes et al. (2008): classe I (< 0,4 cm), II (0,4-0,6 cm) e
131 III (> 0,6 cm).

132 No D47, com intuito de sincronizar a emergência de onda e relacioná-la ao padrão
133 de liberação de gonadotrofinas, todos os folículos visualizados nos ovários foram
134 aspirados por meio de uma guia de aspiração (Cook VBOA 18 L), agulhas 18G, uma
135 bomba à vácuo ajustada em 240 mmHg, um equipamento ultra-sonográfico Scan Vet
136 240 – Parus (Pie-Medical, Pie Medical Systems e Esaote Europe, Maastricht,
137 Netherland) e um transdutor linear transretal de 5 mHz.

138 **Dosagem hormonal**

139 Nos mesmos dias das avaliações ultra-sonográficas, amostras sanguíneas foram
140 coletadas por meio da venopunção dos vasos coccígeos com auxílio de agulha 21 G e
141 sistema à vácuo em tubos heparinizados, para determinação da concentração plasmática
142 de FSH, LH e P₄. Imediatamente após a coleta, estas amostras foram refrigeradas para
143 posterior centrifugação a 2500G por 15 minutos e armazenamento em tubos tipo
144 eppendorf de 1,5 mL em freezer a -20°C.

145 De acordo com o padrão da dinâmica folicular dos animais, a mensuração da
146 concentração plasmática de P₄ foi realizada nos D3, 4, 6, 8, 11, 19, 25, 32, 34, 48, 56,
147 62 e 68. A mensuração plasmática da P₄ foi realizada pela técnica de radioimunoensaio

148 usando Count-A-Count Kit (Diagnostics Products Corporation[®], Los Angeles, CA,
149 USA) seguindo-se as recomendações dos fabricantes em cinco ensaios em dias
150 consecutivos com coeficiente de variação interensaio e intraensaio de 6,35% e 4,87%,
151 respectivamente.

152 De acordo com o padrão da dinâmica folicular dos animais, a mensuração da
153 concentração plasmática de FSH e LH durante o período de implantação da Deslorelina,
154 nos dias 4, 20, 27, 37, 42 e 61 foram determinadas em todos os animais em amostras
155 sanguíneas coletadas da mesma forma como descrito anteriormente para mensurar a
156 concentração plasmática de P₄.

157 Já o padrão de pulsatilidade e os picos de LH foram determinados a partir de
158 amostras sanguíneas coletadas a cada 15 minutos por 6 horas por meio da cateterização
159 da jugular, nos dias 20 e 62 após a implantação da Deslorelina, em 4 animais escolhidos
160 aleatoriamente em cada dia.

161 O nível sérico de FSH e LH, em todas as análises, foi mensurado pelo teste de
162 radioimunoensaio de duplo anticorpo no laboratório de endocrinologia da UNESP-
163 Araçatuba utilizando a técnica modificada de Bolt & Rollings (1983) e a classificação
164 de pulsos de Fitzgerald et al. (1985).

165 Para o ensaio de FSH, utilizou-se o USDA-bFSH para iodinação, e primeiro
166 anticorpo NIDDK-anti-oFSH-1 a uma diluição de 1:300.000. A sensibilidade do ensaio
167 de FSH foi de 0,005 ng/mL e a de LH de 0,02 ng/mL. Os coeficientes de variação intra-
168 ensaio foram 4,09% e 5,06%, respectivamente. O coeficiente inter-ensaio do LH foi de
169 6,37%.

170 **Biópsias endometriais**

171 Em cada animal, quatro amostras de tecido endometrial foram coletadas
172 semanalmente por meio de biópsias via transcervical utilizando uma pinça de biópsia

173 modelo Yomann (Hauptner[®], Solingen, Alamenha).

174 Todas as pinças utilizadas no presente estudo eram lavadas diariamente em água
175 corrente e sabão neutro, secas em estufa convencional e, posteriormente, mantidas
176 embrulhadas em um campo cirúrgico. Antes da sua utilização, a pinça era mantida
177 submersa em álcool 70%.

178 No momento da colheita procedia-se uma limpeza da região perineal e vulvar do
179 animal com papel toalha. A pinça era introduzida pela vulva até alcançar o cérvix, que
180 era manipulado por via transretal, a fim de permitir a intromissão da mesma no útero. O
181 útero era então pressionado contra a mesma, por via transretal, para facilitar a obtenção
182 de um fragmento de tamanho significativo (entre 4 e 5 mm de diâmetro).

183 O fragmento era retirado da pinça com auxílio de uma agulha, lavado em solução
184 fisiológica 0,9%. Duas destas amostras foram acondicionadas em cassetes plásticos
185 identificados com o número do animal e data da colheita para inclusão e fixação em
186 formol tamponado 10% por 24 horas. Posteriormente, foram armazenadas em etanol
187 70% até a inclusão em parafina para a realização da técnica de imunistoquímica.

188 As outras duas amostras foram rapidamente lavadas com a mesma solução, secas
189 em papel toalha e, imediatamente, congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em
190 freezer -80°C para posterior análise da quantificação da concentração relativa do RNAm
191 dos genes alvos ($E\alpha R$, $E\beta R$, OTR e PABR) por qRT-PCR.

192 **Imunistoquímica**

193 Após a inclusão das amostras de tecido endometrial em parafina, foram realizados
194 cortes histológicos de 4 μ m para confecção das lâminas utilizadas na rotina da técnica
195 de imunistoquímica. Algumas destas lâminas foram utilizadas para caracterização
196 histológica do tecido endometrial coletado por meio da coloração de hematoxilina e
197 eosina (HE) e análise em microscópio óptico Leica DML[®] (Leica Microsystems,

198 DMLB, Wetzler, Germany), com aumento de 400 e 1000X.

199 Outras lâminas foram utilizadas para realização da técnica da imunoistoquímica, a
200 qual teve início com a desparafinização tecidual em cuba contendo xilol e reidratação
201 em soluções de álcool. Posteriormente, as lâminas foram imersas em cuba contendo
202 solução de citrato 2,1% pH 6,0 para serem submetidas ao tratamento térmico e
203 recuperação antigênica na Pascal Modelo S2800 Dako[®] (Dako Cytomation California
204 Incorporation, Carpinteria, CA, USA).

205 Para o bloqueio da peroxidase endógena, as lâminas foram incubadas em H₂O₂
206 3%, seguido da inibição das ligações com anticorpos inespecíficos utilizando solução de
207 caseína.

208 O E α R (monoclonal de camundongo anti-humano receptor de estrogênio alfa
209 clone 1D5, Dako, Carpinteria, CA, EUA), o PRAB (PGR-Ab-8 cocktail mouse MAb
210 Neomarkers MS-298-P1, Fremont, CA, EUA) e o PRB (PR- B-30 SC-811 monoclonal
211 IgG1, Santa Cruz Biotechnonlogy, São Paulo, Campinas, Brasil) foram utilizados na
212 diluição de 1:50. O E β R (beta receptores monoclonais, anti-humano estrogênio
213 PPG5/10 clone 1, Dako, Carpinteria, CA, EUA) foi utilizado na proporção 1:200. Todos
214 os anticorpos primários foram incubados em câmara úmida por 18 horas a 4°C.

215 O controle negativo foi realizado por meio de um anticorpo de camundongo
216 (Mouse Immunoglobulin – Universal Negative Control; Dako, Carpinteria, CA, USA)
217 incubado também por 18 horas a 4°C em algumas lâminas em todas as rotinas de
218 imunoistoquímica.

219 O anticorpo secundário AdvanceTM HRP[®] (Dako, Carpinteria, CA, USA) foi
220 incubado por 60 minutos. As lâminas foram lavadas com solução TRIS 7,4 duas vezes
221 por 5 minutos. A reveleção com o cromógeno DAB (3,3 ϕ -diaminobenzidine; Liquid
222 Dako Dab 7 Sistema de substrato cromógeno, Carpinteria, CA, EUA) foi realizada por 2

223 minutos.

224 A reação foi interrompida com 2 banhos de TRIS pH 7,4 por 5 minutos. As
225 lâminas foram contra-coradas com HE por 3 minutos, observadas e fotografadas usando
226 microscópio óptico Leica DML[®] equipado com uma câmera DC300F Leica[®] (Leica
227 Microsystems, DMLB, Wetzler, Germany), nos aumentos de 400X e 1000X.

228 A expressão proteica do E α R, E β R, PRAB e PRB em cada lâmina foi realizada
229 pela mesma pessoa em 10 campos escolhidos aleatoriamente. Os métodos utilizados
230 para avaliar a imunocoloração foi o número de núcleos corados positivamente em
231 contagem de 300 células (epitélio glandular) e outras 300 células (estroma uterino) em
232 aumento de 1000X e, posterior, transformação em porcentagem. Para avaliar a
233 intensidade da imunomarcção dos núcleos marcados no endométrio foi utilizado
234 aumento de 400X e a classificação: fraca (até 25% dos núcleos fortemente marcados),
235 moderada (entre 25% a 75% dos núcleos fortemente marcados) ou forte (acima de 75%
236 dos núcleos fortemente marcados) (Martin et al., 2008).

237 **Extração do RNA, confecção do cDNA e qRT-PCR**

238 O RNA total foi extraído das amostras de tecido endometrial utilizando RNeasy[®]
239 Fibrous Tissue Mini Kit (Qiagen Incorporation, Valencia, CA), seguindo as instruções
240 do fabricante. A concentração e a pureza das amostras de RNA foram determinadas por
241 espectrofotometria (Nanodrop[®] 2000 Espectrophotometer, Thermo Scientific,
242 Wilmington, EUA) e a razão A260/A280nm foi superior a 1,8 em todas as amostras
243 avaliadas.

244 As amostras de RNA foram tratadas com RQ1 RNase-free DNase (Promega,
245 Wisconsin, EUA) para eliminar possível contaminação com DNA genômico. O cDNA
246 foi confeccionado (volume final de 40 μ L) utilizando a enzima ImProm-II[™] Reverse
247 Transcriptase (Promega[®], Wisconsin, EUA) e 500 ng de RNA seguindo as

248 recomendações do fabricante.

249 Os *primers* utilizados na quantificação relativa da expressão gênica do receptor de
250 progesterona *isoforma* AB (PABR) foram previamente descritos (Ulbrich et al., 2003),
251 enquanto que aqueles utilizados na mensuração da expressão dos genes do $E\alpha R$, do $E\beta R$
252 e do OTR foram desenhados no programa Primer Express[®] v2.0 (Applied Biosystem
253 Foster City, CA, USA) utilizando como “molde” as sequências de RNAm contidas no
254 GenBank[™] para *Bos taurus taurus* estrogen receptor *alfa* (NM_001001443.1), *Bos*
255 *taurus taurus* estrogen receptor *beta* (NM_174051.3) e *Bos taurus taurus* oxytocin
256 receptor (NM_174134.2), respectivamente.

257 Os primers do gene normalizador das reações de PCR em tempo real (qRT-PCR),
258 gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GaPDH), foram desenhados no programa Primer
259 Express[®] v2.0 (Applied Biosystem, Califórnia, USA) utilizando como “molde” a
260 sequência do RNAm contidas no GenBank[™] para *Bos taurus taurus* glyceraldehyde-3-
261 phosphate dehydrogenase (NM_001034034.1).

262 Os primers utilizados que foram testados, *in silico*, em relação à especificidade
263 utilizando a ferramenta BLASTn (Blast/ncbi) contra as sequências depositadas no
264 GenBank[™], as quais apresentaram 100% de identidade e foram específicos apenas para
265 os seus respectivos alvos (Tabela 1).

266

267

268

269

270

271

272

273 **TABELA 1.** Sequências nucleotídicas dos primers utilizados nas reações de PCR em tempo real.

Gene	Nome do primer	Sequência (5' – 3')	Produto amplificado
E α R	JP-E α R Forward	ACAAGCGCCAGAGAGATGAT	120 pb
	JP-E α R Reverse	CCGGGCTGTTCTTCTTAGTG	
E β R	JP-E β R Forward	AGAGTCCTTGGCGTGAAACCAGAT	114 pb
	JP-E β R Reverse	AACTGCTCCCACTAGCCTTCCTTT	
PABR	JP-PABR Forward	GAGAGCTCATCAAGGCAATTGG	227 pb
	JP-PABR Reverse	CACCATCCCTGCCAAGATCTTG	
OTR	JP-OXTR Forward	CTTCCTCTGCTGCTCATTCC	119 pb
	JP-OXTR Reverse	ATCTTCTCTGGCTGGAGCTG	
GaPDH	JP- GaPDH Forward	TGACCCCTTCATTGACCTTC	120 pb
	JP- GaPDH reverse	ATGGCCTTTCCATTGATGAC	

274

275 A quantificação relativa da concentração do RNAm dos genes alvos (E α R, E β R,
276 PABR e OTR) foi realizada utilizando o método da curva padrão relativa previamente
277 descrito (Larionov et al., 2005), utilizando o termociclador em tempo real 7500 Real-
278 Time PCR Systems[®] (Applied Biosystems, Califórnia, EUA) e Master Mix Power
279 Syber Green PCR[®] (Applied Biosystems, Califórnia, EUA).

280 Cada reação (qRT-PCR) foi realizada em duplicata com volume final de 20 μ L,
281 que continha 0,2 μ M de cada forward e reverse primer, 2 μ L de cDNA template, 10 μ L
282 q-PCR máster mix e 7,2 μ L água livre de nuclease. Adicionalmente, foi realizado em
283 duplicata, em cada placa, o controle negativo (amostra sem cDNA) para cada gene para

284 confirmar a ausência de contaminação.

285 As condições de termociclagem foram: desnaturação inicial a 95°C por 10 min e 40
286 ciclos a 95°C por 15 s e 60°C por 60 s, em seguida foi realizada a curva de dissociação.
287 A amplificação de produtos específicos para cada um dos genes foi confirmado pela
288 análise da curva de dissociação ao final de cada corrida.

289 A expressão basal de cada gene alvo foi normalizada pelo gene GaPDH. O
290 restabelecimento da atividade ovariana e o primeiro ciclo estral após o restabelecimento
291 da atividade ovariana foram estudados posteriormente e, a expressão gênica de cada
292 gene alvo no dia da segunda ovulação após a retirada do implante subcutâneo de
293 Deslorelina recebeu o valor relativo de 1,0 e a concentração nos demais momentos foi
294 normalizada proporcionalmente em relação a este momento.

295 **Análise estatística**

296 O número de folículos em cada classe, a presença de CL, a concentração
297 plasmática de P₄ (ng/mL), a expressão gênica e proteica dos receptores endometriais,
298 além da intensidade de imunomarcção destes receptores avaliados pela
299 imunistoquímica, foram considerados variáveis dependentes. A comparação das
300 medidas entre os momentos foi realizada através do teste não paramétrico de Friedman
301 e Exato de Fisher pelo BioEstat 5.0 (Ayres et al., 2007) e SPSS 17.0 (Chicago, EUA),
302 considerando nível de significância de 0,05 ($p < 0,05$).

303 O número de folículos observados e a taxa de crescimento folicular foram
304 calculados por meio da média e desvio padrão. A relação dos resultados entre a
305 dinâmica folicular e expressão gênica e proteica foi analisada pela correlação de
306 Pearson, considerando efeito significativo para $p < 0,05$.

307 A concentração plasmática de LH e FSH (ng/mL) foram calculadas por meio da
308 média e desvio padrão. A pulsatilidade de LH (ng/mL) foi analisada pela obtenção da

309 média e do coeficiente de variação necessários para a posterior confecção dos gráficos
310 contendo frequência, amplitude e pulsatilidade realizada pelo software GraphPad Prism
311 version 4.0 2003.

312

RESULTADOS

313 Após planejamento da análise estatística do projeto, foi determinado que 10
314 animais eram suficientes para análise dos dados. Sendo assim, no D0 foram
315 aleatoriamente selecionadas 10 vacas entre os 15 animais previamente submetidos à
316 sincronização da ovulação para receber os implantes subcutâneos de Deslorelina.

317 Entre os animais experimentais tratados com $PGF_{2\alpha}$, um não apresentou luteólise e
318 foi eliminado do estudo. Ao longo do estudo, um animal teve que ser sacrificado após
319 sua queda no tronco durante a coleta seriada de sangue a cada 15 minutos por 6 horas
320 com auxílio da cateterização da jugular para posterior determinação dos picos de LH,
321 que resultou em paraparesia dos membros anteriores, seguida da tetraparalisia e apatia
322 do animal. Posteriormente, outro animal foi excluído do estudo após o diagnóstico de
323 infecção uterina em decorrência da perfuração uterina em virtude da falha no manuseio
324 da pinça de colheta de biopsia endometrial.

325 Portanto, o experimento permaneceu com 7 animais até o final e não foram
326 observadas ovulações durante os 70 dias em que os animais permaneceram com o
327 implante subcutâneo de Deslorelina.

328 Em virtude do padrão de crescimento folicular e da análise da dinâmica folicular
329 observada nos animais, após a realização da análise estatística, foi preconizada a
330 ilustração dos dados referentes ao número de folículos nos dias 0, 6, 13, 20, 27, 34, 41,
331 48, 56, 62, 70 (Figura 2).

332 O número de folículos classe I observado nos dias 0, 6 e 13 após a implantação da
333 Deslorelina foi menor que o constatado nos demais dias ($p < 0,05$), sendo que o maior

334 número médio de folículos foi verificado nos dias 56, 62 e 70 (Figura 2).

335 Não foi constatada diferença com relação ao número médio de folículos classe II
336 ($p>0,05$) (Figura 2).

337 O grande número de folículos classe III foi detectado 27 dias após a implantação
338 da Deslorelina, que diferiu do observado nos dias 0, 6, 48, 56, 62 e 70 ($p<0,05$) (Figura
339 2).

340 Não houve correlação entre as classes foliculares e as demais variáveis do estudo
341 ($p>0,05$).

342

343

344

345

346

347 **Fig 2.** Número médio de folículos classe I (< 0,4 cm), II (0,4-0,6 cm) e III (> 0,6 cm) em vacas Nelore
 348 (*Bos taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-
 349 Suprelorin[®]) por 70 dias. Barras com letras diferem significativamente ($p < 0,05$).

350 Durante os 70 dias de implantação da Deslorelina, a taxa de crescimento folicular
 351 média por dia foi de 0,08 ($\pm$ 0,01) cm e foram constatados dois padrões de
 352 desenvolvimento folicular. Nos primeiros 35 dias, em média nos animais, o
 353 recrutamento de cada onda folicular ocorreu com intervalos de 11 ($\pm$ 5) dias, e o maior
 354 diâmetro folicular verificado apresentava entre 1,1 a 1,4 cm.

355 Este padrão de desenvolvimento folicular médio observado durante os primeiros
 356 35 dias de implantação subcutânea da Deslorelina pode ser pela dinâmica folicular da
 357 vaca “A” (Figura 3).

358

359

360

361 **Fig 3.** Dinâmica folicular da vaca A durante os primeiros 35 dias durante o período de implantação
 362 subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e
 363 folículos subordinados (FS).

364 O número médio de folículos recrutados por onda de crescimento folicular durante
 365 os primeiros 35 dias de implantação da Deslorelina foi de 8,12 ($\pm$ 2,15).

366 Três animais apresentaram padrão de crescimento folicular similar durante os
 367 primeiros 35 dias do período de implantação da Deslorelina, sendo que os maiores
 368 folículos atingiram diâmetro máximo entre 1,5 e 1,6 cm (Figura 4). Dois animais
 369 apresentaram dinâmica folicular constituída por folículos de no máximo 0,8 a 1,0 cm de
 370 diâmetro.

371 **Fig 4.** Dinâmica folicular da vaca I durante os primeiros 35 dias durante o período de implantação
 372 subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e
 373 folículos subordinados (FS).

374 Durante os últimos 20 dias de implantação subcutânea do GnRHa, houve
 375 crescimento folicular com intervalo médio de $10 (\pm 4)$ dias, sendo que a emergência
 376 média de folículos por onda foi de $13,7 (\pm 3,86)$.

377 Um dos animais apresentou diâmetro folicular máximo inferior a 0,6 cm,
 378 enquanto que em outros dois animais, foram detectados folículos com até 0,6 e 0,9 cm.
 379 O padrão de desenvolvimento folicular médio representativo dos animais experimentais
 380 foi mais uma vez o da vaca “A” (Figura 5).

381 Esta modificação na dinâmica folicular durante os últimos 20 dias do estudo
 382 comparada aos primeiros 35 dias ocorreu em 5/7 (71,42%) animais.

383

384

385 **Fig 5.** Dinâmica folicular da vaca A durante os últimos 20 dias durante o período de implantação
 386 subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Folículos dominantes (FD) e
 387 folículos subordinados (FS).

388 Durante a análise da dinâmica folicular ao longo do período de implantação da
 389 Deslorelina, foi observado em três (3/7) animais a presença de folículos anovulatórios
 390 persistentes maiores que 1 cm por aproximadamente 18 ($\pm$ 1) dias, simultâneos ao
 391 recrutamento e seleção dos outros folículos.

392 Para verificar o efeito da presença destes folículos anovulatórios persistentes
 393 associado ao objetivo de sincronizar a emergência de uma nova onda folicular e
 394 relacioná-la ao padrão de liberação de gonadotrofinas justificou a realização da
 395 aspiração folicular. Devido à disponibilidade do técnico e do aparelho de ultra-
 396 sonografia necessário para o procedimento, esta foi realizada no D47.

397 Nos dias 3, 4, 6 e 8, o nível sérico de P₄ foi maior que o constatado nos demais
 398 dias, nos quais se manteve abaixo de 0,4 ng/mL ($p < 0,05$) (Tabela 2).

399 Não houve correlação entre a concentração plasmática de P₄ e as demais variáveis
 400 do estudo ($p > 0,05$).

401

402 **TABELA 2.** Concentração plasmática de P₄ (média ± desvio padrão) (ng/mL) de vacas Nelore (*Bos*
 403 *taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina -
 404 Suprelorin[®]) por 70 dias. Valores com letras diferentes são significativamente diferentes.

Dias após a implantação da Deslorelina	Média ± desvio padrão (ng/mL)
D3	1,24 ± 0,05 ^a
D4	1,88 ± 1,08 ^a
D6	2,43 ± 1,45 ^a
D8	3,56 ± 3,76 ^a
D11	0,56 ± 0,40 ^b
D19	0,39 ± 0,23 ^b
D25	0,23 ± 0,08 ^b
D32	0,21 ± 0,09 ^b
D34	0,07 ± 0,05 ^b
D48	0,06 ± 0,05 ^b
D56	0,25 ± 0,31 ^b
D62	0,36 ± 0,21 ^b
D68	0,03 ± 0,01 ^b

405

406 Não houve variação quanto a concentração plasmática de LH, mensurada nos dias
 407 4, 20, 27, 37, 42, 61 ($p>0,05$), ao longo do período de implantação da Deslorelina, cujo
 408 valor médio foi de 1,22 ($\pm 0,11$) ng/mL (Figura 6).

409 Não houve correlação entre a concentração plasmática de LH e as demais variáveis
 410 do estudo ($p>0,05$).

411

412

413

414

415 **Fig 6.** Média e desvio padrão da concentração plasmática de LH (ng/mL) em vacas Nelore (n=7) nos D4,
 416 20, 27, 37, 42 e 61 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-
 417 Suprelorin[®]) por 70 dias.

418 Em virtude da modificação do padrão da dinâmica folicular dos animais nos
 419 primeiros 35 dias do período de implantação subcutânea da Deslorelina comparada aos
 420 últimos 20 dias, a pulsatilidade e os picos de LH foram determinados nos dias 20 e 62.

421 Foram escolhidos aleatoriamente 4 dos 7 animais do estudo para posterior
 422 cateterização da veia jugular nos D20 e 62 devido ao tempo necessário para coletar as
 423 amostras sanguíneas, manutenção do cateter em todos animais e o intervalo de 15
 424 minutos entre as coletas, as limitações de manejo dos animais, o tipo e tamanho da
 425 estrutura física e, ao comportamento indócil dos animais.

426 A frequência de pulsos de LH observada no D20 e D62 foi, respectivamente $1 (\pm$
 427 $0)/6$ h e $1,25 (\pm 0,5)/6$ h. Os valores máximos durante os pulsos foram de $1,72 (\pm 0,24)$ e
 428 $1,24 (\pm 0,31)$ ng/mL, respectivamente.

429 O padrão de pulsatilidade da concentração plasmática de LH a partir das amostras
 430 coletadas a cada 15 minutos por 6 horas com auxílio da cateterização da veia jugular no

431 D20 das vacas B, G, H e I estão ilustrados na figura 7.

432 **Fig 7.** Concentração plasmática de LH (ng/mL) mensurada a cada quinze minutos por seis horas das
 433 vacas B, G, H e I no D20 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH
 434 (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Cada círculo representa um pico de LH.

435 Já a concentração plasmática do padrão de pulsatilidade do LH no D62 durante o
 436 período de implantação da Deslorelina por 70 dias das vacas A, B, C e I estão
 437 representados na figura 8.

438

439

440

441

442

443 **Fig 8.** Concentração plasmática de LH (ng/mL) mensurada a cada quinze minutos por seis horas das
 444 vacas A, B, C e I no D62 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH
 445 (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Cada círculo representa um pico de LH.

446 Não houve variação da concentração plasmática de FSH, mensurada nos dias 4,
 447 20, 27, 37, 42, 61 ($p>0,05$), ao longo do período de implantação da Deslorelina, cujo
 448 valor médio foi de 1,58 ($\pm 0,04$) ng/mL (Figura 9).

449 Não houve correlação entre a concentração plasmática de FSH e as demais
 450 variáveis do estudo ($p>0,05$).

451

452

453

454

455

456

457

458 **Fig 9.** Média e desvio padrão da concentração plasmática de FSH (ng/mL) em vacas Nelore (n=7) nos
 459 D4, 20, 27, 37, 42 e 61 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-
 460 Suprelorin[®]) por 70 dias.

461 Em virtude da semelhança da dinâmica folicular nos animais e do perfil endócrino
 462 observado durante os 35 primeiros dias do período de implantação da Deslorelina; e
 463 devido a ausência de tecido endometrial e/ou quantidade de células do estroma e
 464 epitélio glandular coletados necessários para realização das técnicas de
 465 imunohistoquímica e qRT-PCR, foram mensuradas a expressão gênica e proteica dos
 466 receptores endometriais nos dias 0, 4, 20 e 27.

467 A porcentagem de núcleos positivos dos E α R no estroma uterino foi maior no
 468 D27, que não diferiu do constatado no D0 e D20 durante o período de implantação da
 469 Deslorelina por 70 dias, mas foi superior que o verificado no D4. No entanto, os
 470 resultados obtidos nos D0, D4 e D20 não diferiram entre si ($p>0,05$) (Figura 10).

471 Diferentemente do observado no estroma uterino, o percentual médio de
 472 imunomarcção dos E α R no epitélio glandular endometrial não diferiu ao longo do
 473 período de implantação da Deslorelina ($p>0,05$) (Figura 10).

474 O percentual médio de imunomarcção dos E β R no estroma uterino não diferiu
 475 após a implantação da Deslorelina (Figura 10). Do mesmo modo, não houve diferença

476 quanto ao percentual médio de imunomarcção dos E β R no epitélio glandular uterino
477 nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o período de implantação de Deslorelina (Figura 10).

478 Não houve correlação entre o percentual de núcleos positivos dos ER no estroma
479 uterino e no epitélio glandular e, as demais varáveis do estudo ($p>0,05$).

480 Com relação à expressão proteica dos PABR e PBR no estroma uterino, foi
481 constatado que no D27 a porcentagem média de imunomarcção destes receptores foi
482 inferior ao observado nos dias 0, 4 e 20 durante o período de implantação da Deslorelina
483 por 70 dias ($p<0,05$). Vale ressaltar ainda que os resultados obtidos nos D0, D4 e D20
484 não diferiram entre si (Figuras 10).

485 A porcentagem média de imunomarcção dos PABR no epitélio glandular
486 endometrial no D0 foi menor que nos demais dias ($p>0,05$) e diferente do verificado no
487 D4 ($p<0,05$). No entanto, não foi constatada diferença entre os dias 4, 20 e 27 durante o
488 período de implantação de Deslorelina. Além disso, é importante salientar que o perfil
489 de expressão proteica destes receptores no epitélio glandular ao longo do período de
490 implantação da Deslorelina diferiu do observado no estroma uterino ($p<0,05$) (Figura
491 10).

492 Com relação ao perfil de expressão proteica dos PBR no epitélio glandular
493 endometrial, constata-se que o percentual médio de imunomarcção destes receptores
494 no D27 foi menor que o verificado nos demais dias ($p>0,05$), no entanto, diferiu apenas
495 do D4, em que se obteve maior percentual ($p<0,05$) (Figura 10).

496 Não houve correlação entre o percentual de núcleos positivos dos PR no estroma
497 uterino e no epitélio glandular e, as demais varáveis do estudo ($p>0,05$).

498

499

500

501

Fig 10. Porcentagem de núcleos positivos do receptor de estrógeno *alfa* (E α R) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial, de estrógeno *beta* (E β R) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial, de progesterona *isoforma* AB (PABR) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial e de progesterona *isoforma* B (PBR) no estroma uterino e no epitélio glandular endometrial de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*) nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin[®]) por 70 dias. Barras com letras diferem significativamente ($p < 0,05$).

532 As lâminas de imunistoquímica classificadas de acordo com a intensidade de
 533 imunomarcção durante o período de implantação da Deslorelina por 70 dias
 534 apresentaram somente classificação de intensidade moderada e forte para todos os
 535 receptores avaliados ao longo do estudo.

536 O percentual de amostras de acordo com a classificação da intensidade de
 537 imunomarcção dos $E\alpha R$, $E\beta R$, PABR e PBR no endométrio de vacas Nelore tratadas
 538 com Deslorelina não diferiram ao longo do estudo ($p>0,05$) (Figura 11).

539 Não houve correlação entre a intensidade de imunomarcção classificada como
 540 fraca, moderada e forte e, as demais varáveis do estudo ($p>0,05$).

553 **Fig 11.** Percentual de intensidade de imunomarcção fraca, moderada e forte dos receptores endometriais
 554 de estrógeno *alfa* ($E\alpha R$) e *beta* ($E\beta R$), de progesterona *isoformas* AB (PABR) e B (PBR) de vacas Nelore
 555 (*Bos taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-
 556 Suprelorin[®]) por 70 dias.

557

558 Houve aumento da concentração de RNAm do E α R no D0, sem contudo, que
559 fosse observada diferença quanto à expressão relativa média do RNAm (X fold) do
560 E α R no endométrico de vacas Nelore ($p>0,05$), quantificada nos D0, 4, 20 e 27 durante
561 o período de implantação da Deslorelina por 70 dias (Figura 12).

562 Do mesmo modo, não foi detectada diferença quanto à expressão relativa média
563 do RNAm (X fold) do E β R nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o período de implantação da
564 Deslorelina por 70 dias ($p>0,05$) (Figura 12).

565 Não houve correlação entre a concentração de RNAm dos ER e as demais
566 variáveis do estudo ($p>0,05$).

567 Também não foi constatada diferença com relação à expressão relativa média do
568 RNAm (X fold) do PABR nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o período de implantação de
569 Deslorelina por 70 dias ($p>0,05$) (Figura 12).

570 Não houve correlação entre a concentração de RNAm dos PR e as demais
571 variáveis do estudo ($p>0,05$).

572 A maior expressão gênica dos OTR foi observada no D20 ($p>0,05$) e, assim como
573 verificado para os receptores de estrógeno e progesterona, não houve diferença quanto à
574 expressão relativa média do RNAm (X fold) do OTR nos dias 0, 4, 20 e 27 durante o
575 período de implantação de Deslorelina por 70 dias (Figura 12).

576 Não houve correlação entre a concentração de RNAm dos OTR e as demais
577 variáveis do estudo ($p>0,05$).

578

579

580

581

582

583

Fig 12. Expressão relativa média do RNAm (X fold) dos receptores endometriais de estrógeno *alfa* (EαR) e *beta* (EβR), de progesterona *isoforma* AB (PABR) e de ocitocina (OTR) de vacas Nelore (*Bos taurus indicus*) durante o período de implantação subcutânea do agonista de GnRH (Deslorelina-Suprelorin®) por 70 dias.

Discussão

Assim como relatado por Meneghetti et al. (2005), em vacas Nelore, o protocolo de sincronização da ovulação empregado no presente estudo foi eficiente uma vez que todos os animais estavam ovulados no D0.

Do mesmo modo, durante o período em que os animais permaneceram com o implante subcutâneo da Deslorelina nenhum deles ovulou durante os 70 dias de implantação, provavelmente devido a inibição do pico pré-ovulatório de LH, conforme observado por D'Occchio et al. (2000) em vacas de origem taurina.

A presença de folículos das classes I e II, ao longo dos 70 dias de implantação com Deslorelina, indica que os animais apresentaram dinâmica de crescimento folicular

612 composta pelas fases de recrutamento e seleção folicular, caracterizada por folículos de
613 0,2 a 0,5 cm, conforme elucidaram Sartorelli et al. (2005) e Gimenes et al. (2008, 2009)
614 com o estudo acerca da dinâmica folicular em Nelore.

615 Já a presença de folículos classe III até a metade do período de implantação da
616 Deslorelina indica que houve o fenômeno de divergência folicular e os folículos
617 atingiram diâmetros compatíveis com o tamanho pré-ovulatório considerado para
618 animais zebuínos, quando são dependentes de LH (Sartorelli et al., 2005).

619 A alteração no padrão da dinâmica folicular na maioria dos animais durante os
620 últimos 20 dias comparada aos primeiros 35 dias do estudo, sem que fosse determinada
621 diferença na concentração plasmática de FSH e LH ao longo do estudo, sugere há uma
622 possível relação entre o tempo de implantação da Deslorelina e o padrão de
623 desenvolvimento folicular em consequência da diminuição do padrão de liberação de
624 gonadotrofinas após 35 dias do período de implantação subcutânea do GnRH α .

625 O número médio de folículos recrutados por onda de crescimento folicular nos
626 dois padrões diferentes de dinâmica folicular observados nos primeiros 35 dias e nos
627 últimos 20 dias do estudo, com média aproximada de 8 e 14 folículos por onda,
628 respectivamente, foram menores que o relatado pela literatura em animais taurinos (30 a
629 60 folículos - Ginther et al., 1996; Carvalho et al, 2008; Sartori et al., 2010) e zebuínos
630 (15 a 33 folículos - Buratini et al., 2000; Bastos et al., 2010; Sartori et al., 2010),
631 durante o ciclo estral normal, e em taurinos no pós-parto (20 folículos - Flores et al.,
632 2008), sugerindo que a implantação subcutânea da Deslorelina inibiu a liberação de
633 FSH em vacas Nelore.

634 O menor número de folículos classe I após a implantação da Deslorelina
635 contrapõe o que foi relatado por Ireland et al. (2007) e Mossa et al. (2010) que, em seus
636 estudos durante o ciclo estral normal de vacas taurinas, não observaram diferença entre

637 a quantidade de folículos recrutados por onda folicular e a concentração plasmática de
638 gonadotrofinas.

639 O intervalo médio entre a emergência de ondas de crescimento folicular (± 10
640 dias) corrobora com o observado por Figueiredo et al. (1997) e Sartori et al. (2004)
641 durante o ciclo estral normal em animais Zebu, e no pós-parto de vacas taurinas (Yavas
642 et al., 1999; Flores et al., 2008) e zebuínos (Rubio et al., 2010).

643 Vale ressaltar ainda que a taxa de crescimento folicular diário ao longo dos 70
644 dias em que as vacas Nelore permaneceram com o implante de Deslorelina foi
645 semelhante ao constatado por Mantovani et al. (2010) ao analisar protocolos de
646 sincronização para IATF em animais meio sangue zebuínos e, por Figueiredo et al.
647 (1996) e Borges et al. (2003) em vacas Nelore, no entanto foi menor que a citada em
648 novilhas Nelore tratadas com BST (Buratini et al., 2000).

649 A avaliação da dinâmica de crescimento folicular em vacas Nelore tratadas com
650 Deslorelina durante os primeiros 35 dias do período de implantação sugere que a
651 liberação de FSH e LH, foram suficientes para ocorrer a emergência, seleção e
652 divergência dos folículos. Este padrão foi semelhante ao observado por Martin et al.
653 (2008) em vacas Nelore durante o ciclo estral normal e, em vacas taurinas gestantes
654 (Ginther et al., 1989b, 1989c; Bó et al., 1995; Okamura & Ohkura, 2007).

655 Já nos últimos 20 dias do período de implantação, o modelo de desenvolvimento
656 folicular dos animais sugere que houve supressão do padrão de liberação pulsátil de LH
657 necessário ao desenvolvimento do folículo dominante, bem como o pico pré-ovulatório
658 de LH, essencial para a ovulação (Cupp et al., 1995; Ambrose et al., 2005), visto que os
659 folículos ultrapassavam o tamanho de desvio caracterizado por Castilho et al. (2007) e
660 Gimenes et al. (2008), durante a fase da divergência folicular em Nelore (0,6 cm), mas
661 não atingiam o tamanho pré-ovulatório e ovulavam.

662 Os agonistas de GnRH tem maior afinidade à receptores hipofisários específicos
663 que o GnRH endógeno e, sua utilização prolongada culmina com efeitos agudos e
664 crônicos sobre o eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal, resultando em *downregulation*
665 destes receptores e, a consequente alteração no perfil de secreção das gonadotrofinas
666 (D’Occhio et al., 2000). No entanto, o aumento na concentração plasmática de LH
667 imediatamente após a implantação da Deslorelina que caracteriza o efeito agudo
668 ocasionado pelo tratamento com GnRHa, não foi constatado em nosso estudo conforme
669 descrito em animais taurinos por Gong et al. (1996).

670 Já o efeito crônico da implantação subcutânea da Deslorelina se caracteriza pela
671 ausência do pico pré-ovulatório de LH. No entanto, em vacas Nelore submetidas ao
672 tratamento por 70 dias com GnRHa não foi constatado o bloqueio total da secreção de
673 LH, como observado por D’Occhio & Aspeden (1996) em vacas de origem taurina.

674 A ausência de ovulações indica, no entanto, que o pico pré-ovulatório de LH, que
675 é estimulado pelo pico de E₂ e é imprescindível para que ocorra a ovulação (Fortune et
676 al., 2001; Ginther et al., 2001; Okamura & Ohkura, 2007), foi abolido durante todo o
677 período em que os animais permaneceram com o implante subcutâneo de Deslorelina.

678 Apesar disto, o padrão de pulsatilidade do LH se manteve, uma vez que, ao longo
679 de todo estudo, foi constatado o contínuo crescimento folicular após estabelecimento da
680 divergência. Estes resultados diferem, contudo, do observado por Gong et al. (1995,
681 1996) em novilhas Holandesas tratadas com a busarelina por 30 dias, nas quais o pico e
682 a pulsatilidade de LH foram abolidos, e sua concentração plasmática permaneceu em
683 níveis basais.

684 A concentração plasmática média de LH liberado de forma pulsátil em vacas
685 Nelore ao longo do período de implantação da Deslorelina, indica que o tratamento por
686 70 dias com GnRHa deprimiu a secreção pulsátil de LH, comparado ao padrão em vacas

687 Nelore durante o protocolo de sincronização da ovulação (Monteiro et al., 2009). Esta
688 concentração foi maior que a relatada em vacas e novilhas Nelore submetidas ao
689 protocolo de sincronização da ovulação por (Ferraz, 2007) e durante o diestro em vacas
690 taurinas de corte (Cupp et al., 1995), no entanto foram menores que as relatadas em
691 novilhas Holandesas durante o protocolo de sincronização do estro (Ambrose et al.,
692 2005).

693 Durante a fase do diestro do ciclo estral de vacas Holandesas, os pulsos de LH
694 ocasionam aumento das concentrações plasmáticas de P₄ (Cupp et al., 1995; Ginther et
695 al., 2011a). Do mesmo modo, Humphrey et al. (1983) durante o pós-parto de vacas
696 taurinas e Ginther et al. (2011b) em novilhas Holandesas após o início do processo da
697 luteólise observaram que a baixa pulsatilidade e a frequência de LH foi acompanhada
698 por baixa concentração plasmática de P₄ em novilhas holandesas tratadas com 3 µg/Kg
699 de antagonistas de GnRH (Aciline) no D15 do ciclo, bem como foi observado em vacas
700 Nelore tratadas com implantes subcutâneos de Deslorelina durante 70 dias.

701 Entretanto, a dosagem da concentração plasmática de LH a cada 15 minutos por 6
702 horas em vacas Nelore não evidenciou diferença no padrão de liberação quanto a
703 frequência e amplitude quando comparados os D20 e D62 após a implantação da
704 Deslorelina. A concentração e o número de picos constatados no intervalo de 6 horas
705 foram menores que os relatados em vacas e novilhas Nelore durante o protocolo de
706 sincronização da ovulação por Maio et al. (2006) e Ferraz (2007).

707 Com relação ao FSH, não foi observado a elevada concentração plasmática de
708 FSH imediatamente após a Deslorelina, o que caracteriza o efeito da fase aguda do
709 tratamento com implantes subcutâneos de GnRH_a e foi observado após o parto em
710 vacas de origem taurina (Wiltbank et al., 2002; Bó et al., 2003).

711 O padrão de crescimento folicular e a presença de folículos maiores que 0,4 cm

712 indicam que a secreção deste hormônio não foi abolida em vacas Nelore durante o
713 período de implantação subcutânea de Deslorelina por 70 dias, sendo que a
714 concentração plasmática permaneceu entre 1 e 1,5 ng/mL ao longo de todo estudo, ao
715 contrário do que foi relatado em novilhas Holandesas submetidas ao tratamento
716 subcutâneo com Buserelina durante 30 dias, nas quais a secreção de FSH foi inibida
717 após 30 dias de implantação e apresentaram somente folículos entre 2 e 5 mm de
718 diâmetro (Gong et al., 1995, 1996).

719 Este resultado indica que a administração por 30 dias de GnRHa deprime a
720 liberação de FSH pela hipófise, posteriormente relatada também por D'occhio et al.,
721 (2000) e Mattos et al. (2001).

722 No entanto, este efeito crônico da implantação subcutânea do GnRHa não foi
723 comprovado durante as avaliações da dinâmica ovariana em Nelore tratadas durante 70
724 dias com implantes subcutâneos de Deslorelina, visto que os folículos emergiram e
725 ultrapassaram o diâmetro de desvio folicular até o tamanho pré-ovulatório, diferente da
726 dinâmica composta exclusivamente composta de pequenos folículos a partir do D27 em
727 vacas Holandesas durante o pós-parto tratadas com implantes de Deslorelina por 30 dias
728 (Silvestre et al., 2009a, 2009b).

729 Isto pode ser justificado, sabendo que a liberação de FSH relaciona-se com a fase
730 da emergência folicular até o fenômeno do desvio, quando o folículo dominante produz
731 grandes quantidades de E_2 e inibina, responsáveis pela inibição da secreção de FSH pela
732 hipófise. Momento em que a concentração de FSH passa a ser basal, quantidade
733 insuficiente para o desenvolvimento dos folículos subordinados, porém ainda necessário
734 ao crescimento gradativo do folículo dominante (Ginther, 2000).

735 As concentrações plasmáticas de FSH em vacas Nelore durante a implantação
736 subcutânea da Deslorelina por 70 dias foi menor que a relatada anteriormente por

737 Ginther et al. (1996b) durante o período de gestação e após o parto de vacas
738 Holandesas. Bem como durante o diestro de novilhas Holandesas antes e após a
739 caracterização do desvio folicular (Ginther et al., 1996a; Ginther, 2000). Entretanto, foi
740 maior que a concentração plasmática média de FSH (0,42 ng/mL) de novilhas Nelore
741 antes e após o fenômeno da divergência folicular durante o protocolo de sincronização
742 do estro (Gimenes et al., 2008).

743 Ao longo de todo período de implantação da Deslorelina, a concentração
744 plasmática de FSH foi maior que a observada durante o crescimento folicular ao longo
745 do ciclo estral de novilhas Nelore tratadas com BST (Buratini et al., 2000) e que em
746 novilhas Nelore ao longo da primeira onda de crescimento folicular.

747 Durante as avaliações ultra-sonográficas, foi constatada a persistência de folículos
748 com diâmetro superior a 1,4 cm, que não ovularam devido a abolição do pico pré-
749 ovulatório de LH ocasionado pela administração subcutânea da Deslorelina por 70 dias,
750 mas que não entraram em atresia. Estruturas semelhantes foram relatadas anteriormente,
751 são chamadas de folículos anovulatórios persistentes, que se caracterizam pelo diâmetro
752 considerado pré-ovulatório, que não ovulam e podem ou não interferir sobre o
753 desenvolvimento dos demais folículos (Wiltbank et al., 2002).

754 Em nosso estudo, estruturas semelhantes foram observadas, as quais não
755 influenciaram a secreção de FSH e, conseqüentemente, o desenvolvimento de novas
756 ondas foliculares durante todo o período em que as vacas Nelore permaneceram com o
757 implante subcutâneo de Deslorelina, indicando que estes folículos tratavam-se de
758 estruturas afuncionais, conforme relatado por Hamilton et al. (1995).

759 A aspiração de todos os folículos no D47 foi realizada com intuito de verificar a
760 influencia dos folículos anovulatórios persistentes sobre a dinâmica folicular de vacas
761 Nelore durante o período de implantação subcutânea da Deslorelina, de sincronizar a

762 emergência de uma nova onda folicular e a avaliação do padrão de liberação das
763 gonadotrofinas. No entanto, esta ocorreu posteriormente à metade do experimento,
764 momento em que foi constatada alteração abrupta no padrão da dinâmica folicular na
765 maioria dos animais.

766 O fato destes folículos anovulatórios persistentes, anteriormente a aspiração
767 folicular, não serem capazes de inibir a emergência e desvio dos demais folículos nos
768 sugere que a sua remoção coincidiu, mas não foi fundamental para ocorrer a alteração
769 na dinâmica folicular dos animais, por meio da modificação do padrão de liberação de
770 gonadotrofinas e pelo possível *feedback* negativo do E₂, sintetizado por estes folículos
771 aspirados no D47.

772 A hipótese mais provável é que o tempo de implantação subcutânea da
773 Deslorelina em vacas Nelore é importante para determinação do padrão de secreção de
774 FSH e LH, responsável pelo perfil de crescimento folicular.

775 A concentração plasmática de P₄ a partir do D0 até o D8 acima de 1 ng/mL indica
776 a presença do CL e está de acordo com Niswender et al.(1994). Já a concentração basal
777 de P₄ no restante do estudo após a indução da luteólise, confirma a ausência de
778 ovulações em Nelore durante o período de implantação da Deslorelina e, corrobora com
779 o verificado em vacas taurinas após o parto tratadas por 30 dias com implantes
780 semelhantes por Silvestre et al. (2009a) em vacas de leite.

781 A imunomarcção dos E α R, E β R, PAR e PBR no epitélio glandular e no estroma
782 do endométrio de vacas Nelore foi tão eficiente quanto o relatado em animais de origem
783 taurina durante a realização da técnica da imunoistoquímica (Kuiper et al., 1996;
784 Mosselman et al., 1996; Conneely & Lydon, 2000).

785 Após a indução da luteólise no D8 até o fim do estudo, as baixas concentrações
786 plasmáticas de P₄ e a presença de folículos em crescimento, responsáveis pela produção

787 de E₂, favoreceram a elevada expressão proteica de EαR e EβR no epitélio glandular e
788 no estroma uterino em vacas Nelore durante o período de implantação subcutânea da
789 Deslorelina, conforme relatado por meio da técnica da imunistoquímica em amostras
790 coletadas no fim do diestro (luteólise) e o estro em vacas Holandesas (Lamming &
791 Mann, 1995; Robinson et al., 2001; Mann & Lamming, 2006), no pós-parto de vacas
792 taurinas (Vesanen et al., 1988) e, durante o estro em vacas Nelore (Martin et al., 2008).
793 Este fato se justifica uma vez que a expressão proteica dos receptores endometriais de
794 estrógeno é regulada principalmente pelas concentrações plasmáticas de P₄ (Boos et al.,
795 1996; Boos et al., 2000; Goff, 2004; Martin et al., 2008).

796 Assim como os receptores endometriais de estrógeno, existem dois tipos de
797 receptores de P₄, as *isoformas* A e B (Fujimoto et al., 1997; Conneely & Lydon, 2000),
798 que são reguladas pela concentração plasmática de P₄ (Vesanen et al., 1992; Martin,
799 2005). No entanto, durante o estudo não foi possível verificar diferença entre a
800 expressão proteica destas *isoformas* no tecido endometrial conforme realizado por
801 Nunes et al. (2007) em tecido mamário de humanos.

802 O alto percentual de núcleos positivamente marcados dos ER e a alta expressão do
803 RNAm dos OTR, constatados neste estudo, sugerem que a possível mensuração da
804 expressão proteica dos OTR em Nelore revelaria uma alta expressão destes receptores,
805 assim como citado por Tasende et al. (2002) durante o anestro pós-parto de vacas. Estes
806 autores relataram ainda que a elevada concentração plasmática de E₂ e a baixa de P₄
807 favorecem a elevada expressão de ER e de OTR. Segundo alguns pesquisadores, esta
808 situação resulta na luteólise prematura durante ciclo estral subsequente (Zollers et al.,
809 1993; Mann et al., 2001; Day, 2004; Goff et al., 2006).

810 A intensidade de imunomarcção dos ER e dos PR não variou ao longo do
811 período de anestro em vacas Nelore tratadas com Deslorelina, ao contrário do que foi

812 relatado ao longo do ciclo estral de vacas Nelore por Martin et al. (2008). Segundo este
813 autor, a maior intensidade de imunomarcção dos ER e dos PR foi observado durante o
814 estro e o início da fase lútea do ciclo, respectivamente, o que não foi verificado em
815 nosso estudo devido a baixa concentração de P_4 ao longo de todo período de
816 implantação da Deslorelina, responsável pela inibição da ovulação.

817 A quantificação da expressão relativa do RNAm dos $E\alpha R$, $E\beta R$, PABR e OTR
818 pela técnica de qRT-PCR no tecido endometrial em Nelore foi eficiente assim como
819 constatado anteriormente em animais de origem taurina por meio da técnica do qRT-
820 PCR (Robinson et al., 2001; Schams & Berischa 2002; Ulbrich et al., 2003).

821 A elevação da expressão do RNAm dos ER até o D4 em relação aos demais dias
822 experimentais, porém esta não diferiu dos demais momentos ($p>0,05$), como foi
823 relatado por Robinson et al. (2001), Schams & Berischa (2002) e Bollwein et al. (2010),
824 que observaram alta expressão dos ER durante a fase inicial do diestro de bovinos,
825 momento em que as concentrações de P_4 estão aumentando gradativamente.

826 Estes mesmos autores constataram elevada expressão dos ER no fim da fase lútea
827 do ciclo estral, do mesmo modo como verificado, no presente estudo, ao longo de todo
828 o período de implantação da Deslorelina, quando as concentrações de P_4 estavam baixas
829 e havia crescimento folicular com conseqüente produção de E_2 .

830 Mesmo não sendo diferente, o período em que houve aumento da concentração
831 média de RNAm dos PABR coincidiu com o período de viabilidade do CL, padrão de
832 expressão gênica semelhante ao descrito por Robinson et al. (2001) e Jordan et al.
833 (2009), que verificaram maior concentração gênica dos PR entre os dias 6 e 14 do ciclo
834 estral em vacas Holandesas.

835 A expressão relativa média do RNAm dos OTR permaneceu elevada ao longo de
836 todo o período de implantação da Deslorelina em Nelore, no entanto, não foi constatada

837 diferença comparado aos dias em que o CL estava presente($p>0,05$) que corresponde ao
838 D4, conforme citado por Robinson et al. (2001). Este padrão de expressão dos OTR foi
839 semelhante durante o estro e luteólise em vacas Holandesas Robinson et al. (2001) e,
840 enfatiza a existência de correlação positiva entre a expressão dos OTR e as
841 concentrações plasmáticas de E_2 concomitantemente com o crescimento folicular e a
842 redução da concentração plasmática de P_4 .

843

Conclusão

844 O tratamento de vacas Nelore com implantes subcutâneos de Deslorelina
845 (GnRHa-Suprelorin[®]), por 70 dias ininterruptos, influencia a dinâmica folicular, sem
846 contudo, suprimir o recrutamento e a seleção folicular. Inibe a ovulação, reduz a
847 pulsatilidade e amplitude do padrão de secreção de LH, inibe o pico pré-ovulatório de
848 LH e, mantém elevada a expressão dos receptores endometriais de estrógeno,
849 progesterona e ocitocina.

850 *Agradecimentos*

851 Esta pesquisa foi financiada pela FMVZ/UNESP-Botucatu, FAPESP (processos n.
852 2008/00906-1 e 2008/05253-1), FUNDUNESP (01189/08) e Peptech Animal Health.

853

Referências

854 AMBROSE JD, KASTELIC JP, RAJAMAHENDRAN R, AALI M, DINN N, 2005:
855 Progesterone (CIDR)-based timed AI protocols using GnRH, porcine LH or estradiol
856 cypionate for dairy heifers: ovarian and endocrine responses and pregnancy rates.
857 *Theriogenology* **64**, 1457-1474.

858 AYRES M, AYRES JRM, AYRES DL, SANTOS AS, 2007: BioEstat 5.0-Aplicações
859 Estatísticas nas Áreas das Ciências Biológicas e Médicas: Sociedade Civil Mamirauá,
860 Belém. CNPq, Brasília. 290p.

- 861 BARROS CM, MOREIRA MBP, FIGUEIREDO RA, TEIXEIRA AB, TRINCA LA,
862 2000: Synchronization of ovulation in beef cows (*Bos indicus*) using GnRH, PGF_{2α} and
863 estradiol benzoate. *Theriogenology* **53**, 1121–1134.
- 864 BARUSELLI PS, GIMINES LU, SALES JNS, 2007: Fisiologia reprodutiva de fêmeas
865 taurinas e zebuínas. *Revista Brasileira de Reprodução Animal* **31**, 205-211.
- 866 BASTOS MR, MATTOS MCC, MESCHIATTI MAP, SURJUS RS, GUARDIEIRO M
867 M, MOURÃO GB, PIRES AV, PEDROSO AM, SANTOS FAP, SARTORI R, 2010:
868 Ovarian function and circulating hormones in nonlactating Nelore versus Holstein cows.
869 *Acta Scientiae Veterinariae* (Abstract in press).
- 870 BLAST/NCBI. Disponível em: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: maio de 2009.
- 871 BÓ GA, ADAMS GP, PIERSON RA, MAPLETOFT RJ, 1995: Exogenous control of
872 follicular wave emergence in cattle. *Theriogenology* **43**, 31-40.
- 873 BÓ GA, BARUSELLI, PS, MARTÍNEZ MF, 2003: Pattern and manipulation of
874 follicular development in *Bos indicus* cattle. *Animal Reproduction Science* **78**, 307-326.
- 875 BOLLWEIN H, PROST D, ULBRICH SE, NIEMANN H, HONNENS A, 2010: Effects
876 of a shortened preovulatory follicular phase on genital blood flow and endometrial
877 hormone receptor concentrations in Holstein-Friesian cows. *Theriogenology* **73**, 242–
878 249.
- 879 BOLT DJ, ROLLINGS R, 1983: Development and application of a radioimmunoassay
880 for bovine FSH. *Journal of Animal Science* **56**, 146-154.
- 881 BOOS A, MEYER W, SCHWARZ R, GRUNERT E, 1996: Immunohistochemical
882 assessment of oestrogen receptor and progesterone receptor distribution in biopsy
883 samples of the bovine endometrium collected throughout the oestrous cycle. *Animal*
884 *Reproduction Science* **44**, 11-21.

- 885 BOOS A, KOHTES J, STELLJES A, ZERBE H, THOLE HH, 2000:
886 Immunohistochemical assessment of progesterone, oestrogen and glucocorticoid
887 receptors in bovine placentomes during pregnancy, induced parturition, and after birth
888 with or without retention of foetal membranes. *Journal of Reproduction and Fertility*
889 **120**, 351–360.
- 890 BORGES A M, TORRES CAA, RUAS JRM, ROCHA JÚNIOR VR, CARVALHO
891 GR, FONSECA JF, NETO AM, ASSIS AJ, 2003: Características da dinâmica folicular
892 e regressão luteal de vacas das raças gir e nelore após tratamento com cloprostenol
893 sódico. *Revista Brasileira de Zootecnia* **32**, 85-92.
- 894 BURATINI JR J, PRICE CA, VISINTIN JA, BÓ GA, 2000: Effects of dominant
895 follicle aspiration and treatment with recombinant bovine somatotropin (BST) on
896 ovarian follicular development in nelore (*Bos indicus*) heifers. *Theriogenology* **54**,
897 421-431.
- 898 CARVALHO JB, CARVALHO NA, REIS EL, NICHI M, SOUZA AH, BARUSELLI
899 OS, 2008: Effect of early luteolysis in progesterone based timed AI protocols in *Bos*
900 *indicus*, *Bos indicus X taurus*, and *Bos taurus* heifers. *Theriogenology* **69**, 167-175.
- 901 CASTILHO C, GARCIA JM, RENESTO A, NOGUEIRA GP, BRITO LFC, 2007:
902 Follicular dynamics and plasma FSH and progesterone concentrations during follicular
903 deviation in the first post-ovulatory wave in Nelore (*Bos indicus*) heifers. *Animal*
904 *Reproduction of Science* **98**, 189-196.
- 905 CONNEELY OM., LYDON JP, 2000: Progesterone receptors in reproduction:
906 functional impact of the A and B isoforms. *Steroids* **65**, 571–577.
- 907 CUPP AS, STUMPF TT, KOJIMA FN, WERTH LA, WOLFE MW, BOBERSON MS,
908 KITTOK RJ, KINDER JE, 1995: Secretion of gonadotropins changes during the luteal

- 909 phase of the bovine oestrous cycle in the absence of corresponding changes in
910 progesterone or 17β -oestradiol. *Animal Reproduction Science* **37**, 109-119.
- 911 DAY ML, 2004: Hormonal induction of estrous cycles in anestrous *Bos taurus* beef
912 cows. *Animal Reproduction Science* **82**, 487-494.
- 913 D'OCCHIO MJ, ASPDEN WJ, 1996: Characteristics of luteinizing hormone LH. and
914 testosterone secretion, pituitary responses to LH-releasing hormone LHRH. and
915 reproductive function in young bulls receiving the LHRH agonist deslorelin: effect of
916 castration on LH responses to LHRH. *Biology and Reproduction* **54**, 45-52.
- 917 D'OCCHIO MJ, FORDYCEB G, WHYTEA TR, ASPDEN AWJ, TRIGG TE, 2000:
918 Reproductive responses of cattle to GnRH agonists. *Animal Reproduction Science* **60**,
919 433-442.
- 920 FERRAZ HT, 2007: Dinâmica folicular, concentração sérica de hormônio luteinizante e
921 citologia vaginal de fêmeas Nelore (*Bos taurus indicus*) submetidas à sincronização da
922 ovulação. Goiânia, 2007. 47p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Veterinária da
923 Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Goiás-UFG, Goiânia, 2007.
- 924 FIGUEIREDO RA, BARROS CM, PINHEIRO OL, SOLER JMP, 1997: Ovarian
925 follicular dynamics in Nelore breed (*Bos indicus*) cattle. *Theriogenology* **47**, 1489-1505.
- 926 FITZGERALD BP, I'ANSON H, LEGAN S, LOY RG, 1985: Changes in pattern of
927 luteinizing hormone secretion before and after the first ovulation in the postpartum
928 mare. *Biology of Reproduction* **33**, 316-323.
- 929 FLORES R, LOOPER ML, RORIE RW, HALLFORD DM, ROSENKRANS CF, 2008:
930 Endocrine factors and ovarian follicles are influenced by body condition and
931 somatotropin in postpartum beef cows. *Journal of Animal Science* **86**, 1335-1344.
- 932 FORTUNE J. E, RIVERA GM, EVANS ACO, TURZILLO AM, 2001: Differentiation
933 of dominant versus subordinate follicles in cattle. *Biology of Reproduction* **65**, 648-654.

- 934 FUJIMOTO J, ICHIGO S, HIROSE R, SAKAGUCHI H, TAMAYA T 1997: Clinical
935 implication of expression of progesterone receptor form A and B RNAs in secondary
936 spreading of gynecologic cancers. *Journal Steroid Biochemistry and Molecular Biology*
937 **62**, 449-454.
- 938 GIMENES LU, FANTINATO NETO P, ARANGO JSP, AYRES H, BARUSELLI OS,
939 2009: Follicular dynamics of *Bos indicus*, *Bos taurus* and *Bubalus bubalis* heifers
940 treated with norgestomet ear implant associated or not to injectable progesterone.
941 *Animal Reproduction of Science* **6**, 256.
- 942 GIMENES LU, SÁ FILHO MF, CARVALHO NAT, TORRES-JÚNIOR JRS, SOUZA
943 AH, MADUREIRA EH, TRINCA LA, SARTORELLI ES, BARROS CM,
944 CARVALHO JBP, MAPLETOFT RJ, BARUSELLI OS, 2008: Follicle deviation and
945 ovulatory capacity in *Bos indicus* heifers. *Theriogenology* **69**, 852–858.
- 946 GINTHER OJ, KNOPF L, KASTELIC JP, 1989a: Temporal associations among
947 ovarian events in cattle during oestrous cycles with two or three follicular waves.
948 *Journal of Reproduction and Fertility* **87**, 223-230.
- 949 GINTHER OJ, KNOPF L, KASTELIC JP, 1989b: Ovarian follicular dynamics in
950 heifers during early pregnancy. *Biology of Reproduction* **41**, 247-254.
- 951 GINTHER OJ, KOT K, KULICK LJ, WILTBANK MC, 1996a: Emergence and
952 deviation of follicles during the development of follicular waves in cattle.
953 *Theriogenology*
- 954 GINTHER OJ, KOT K, KULICK LJ, MARTIN S, WILTBANK MC, 1996b:
955 Relationships between FSH and ovarian follicular waves during the last six months of
956 pregnancy in cattle. *Journal of Reproduction and Fertility* **108**, 271-279.
- 957 GINTHER OJ, 2000: Selection of the dominant follicle in cattle and horses. *Animal*
958 *Reproduction Science* **60-61**, 61-79.

- 959 GINTHER OJ, BEG MA, BERGFELT DR, DONADEU FX, KOT K, 2001: Follicle
960 selection in monovular species. *Biology of Reproduction* **65**, 638-647.
- 961 GINTHER OJ, FUENZALIDA MJ, PUGLIESI G, HANNAN MA, BEG MA, 2011a:
962 Effect of luteinizing hormone oscillations on progesterone concentrations based on
963 treatment with a gonadotropin-releasing hormone antagonist in heifers. *Domestic*
964 *Animal Endocrinology* **40**, 119–127.
- 965 GINTHER OJ, FUENZALIDA MJ, SHRESTHA HK, BEG MA, 2011b: Concomitance
966 of luteinizing hormone and progesterone oscillations during the transition from
967 preluteolysis to luteolysis in cattle. *Domestic Animal Endocrinology* **40**, 77–86.
- 968 GOFF AK, 2004: Steroid hormone modulation of prostaglandin secretion in the
969 ruminant endometrium during the estrous cycle. *Biology of Reproduction* **71**, 11-16.
- 970 GOFF AK, JAMSHIDI AA, KOMBÉ A, 2006: Inhibition of prostaglandin F_{2α}
971 synthesis and oxytocin receptor by progesterone antagonists in bovine endometrial cells
972 in vitro. *Steroids* **71**, 785–791.
- 973 GONG JG, BRAMLEY TA, GUTIERREZ CG, PETERS AR, WEBB R, 1995: Effects
974 of chronic treatment with a gonadotrophin-releasing hormone agonist on peripheral
975 concentrations of FSH and LH, and ovarian function in heifers. *Journal of Reproduction*
976 *and Fertility* **105**, 263–270.
- 977 GONG JG, CAMPBELL BK, BRAMLEY TA, GUTIERREZ CG, PETERS AR,
978 WEBB R, 1996: Suppression in the secretion of follicle-stimulating hormone and
979 luteinizing hormone, and ovarian follicle development in heifers continuously infused
980 with a gonadotropin-releasing hormone agonist. *Biology and Reproduction* **55**, 68–74.
- 981 GÜNGÖR O, KAYA M, GÜRBULAK K, ORAL H, KAYA S, KAÇAR C, 2010: Use
982 of GnRH agonist (Deslorelin) in combination with PGF_{2α} on the termination of
983 pregnancy in bitches. *Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi* **16**, 903-908.

- 984 HAMILTON SA, GARVERICK HA, KEISLER DH, XU ZZ, LOOS K,
985 YOUNGQUIST RS, SALFEN BE, 1995: Characterization of ovarian follicular
986 cysts and associated endocrine profiles in dairy cows. *Biology of Reproduction* **53**,
987 890-898.
- 988 HOUGHTON PL, LEMENAGER RP, HORSTMAN LA, HENDRIX KS, MOSS GE,
989 1990: Effects of body composition, pre- and postpartum energy level and early weaning
990 on reproductive performance of beef cows and preweaning calf gain. *Journal of Animal*
991 *Science* **68**, 1438-1446
- 992 HUMPHREY WD, KALTENBACH CC, DUNN TG, KORITNIK DR, NISWENDER
993 GD, 1983: Characterization of Hormonal Patterns in the Beef Cow during Postpartum
994 Anestrus. *Journal of Animal Science* **56**, 445-453.
- 995 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
996 <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/producaoagropecuaria/default.shtm#animal>. Acesso em: dezembro de 2008.
- 998 IRELAND JJ, WARD F, JIMENEZ-KRASSEL F, IRELAND JL, SMITH GW,
999 LONERGAN P, EVANS ACO, 2007: Follicle numbers are highly repeatable within
1000 individual animals but inversely correlated with FSH concentrations and the proportion
1001 of good-quality embryos after ovarian stimulation in cattle. *Human Reproduction* **22**,
1002 1687-1695.
- 1003 JORDAN A, HERZOG K, ULBRICH SE, BEINDORFF N, HONNES Ä, KRÜGER L,
1004 MYAMOTO A, BOLLWEIN H, 2009: Genital blood endometrial gene expression
1005 during the preovulatory period after prostaglandin F_{2α}-induced luteolysis in different
1006 luteal phases in cows. *Journal of Reproduction and Development* **55**, 309-315.

- 1007 KUIPER GGJM, ENMARK E, PELTO-HUIKKO M, NILSSON S, GUSTAFSSON JA,
1008 1996: Cloning of a novel receptor expressed in rat prostate and ovary. Proceeding of the
1009 National Academy of Sciences **93**, 5925-5930.
- 1010 LAMMING GE, MANN GE, 1995: Control of endometrial oxytocin receptors and
1011 prostaglandin F₂ α production in cows by progesterone and oestradiol. Journal of
1012 Reproduction and Fertility **103**, 69-73.
- 1013 LARIONOV A, KRAUSE A, MILLER W, 2005: A standard curve based method for
1014 relative real time PCR data processing. BMC Bioinformatics **6**, 1-16.
- 1015 MAIO JRG, SANDOVAL GAF, SOUZA EDF, NOGUEIRA GP, CIPRIANO RS,
1016 PERECIN F, GARCIA JM, 2006: Concentração sérica de LH em vacas Nelore ciclando
1017 ou ovariectomizadas submetidas ao tratamento com 2,0 mg de benzoato de estradiol. In:
1018 REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE TRANSFERÊNCIA DE
1019 EMBRIÃO, 2006, Angra do Reis. Acta Scientiae Veterinariae, **34**, 360.
- 1020 MANN GE, LAMMING GE, 2006: Timing of prostaglandin F₂ α release episodes and
1021 oxytocin receptor development during luteolysis in the cow. Animal Reproduction
1022 Science **93**, 328–336.
- 1023 MANTOVANI AP, NICH M, SÁ FILHO MF, AYRES H, VETTORATO LF, BÓ GA,
1024 BARUSELLI OS, 2010: Follicular growth and plasma progesterone patterns in *Bos*
1025 *indicus* X *Bos taurus* heifers submitted to different PGF₂ α /progesterone-based
1026 synchronization protocols. Animal Reproduction **7**, 91-96.
- 1027 MARTIN I, 2005: Avaliação ultra-sonográfica, perfil hormonal e imunoistoquímica de
1028 receptores de estrógeno e progesterona durante o ciclo estral em vacas Nelore (*Bos*
1029 *taurus indicus*). Botucatu, 2005. 140p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina
1030 Veterinária e Zootecnia, Universidade Estadual Paulista-UNESP, Botucatu, 2005.

- 1031 MARTIN I, TORRES NETO R, OBA E, BURATINI JÚNIOR, J, BINELI M,
1032 LAUFER-AMORIM R, FERREIRA JCP, 2008: Immunohistochemical detection of
1033 receptors for oestrogen and progesterone in endometrial glands and stroma during the
1034 oestrus cycle in Nelore (*Bos taurus indicus*) cows. *Reproduction Domestic Animals* **43**,
1035 415-421.
- 1036 MATTOS R, ORLANDI C, WILLIAMS J, STAPLES CR, TRIGG T, THATCHER
1037 WW, 2001: Effect of an implant containing the GnRH agonist deslorelin on secretion of
1038 LH, ovarian activity and milk yield of postpartum dairy cows. *Theriogenology* **56**, 371-
1039 386.
- 1040 MENEGHETTI M, LOSI TC, MARTINS JÚNIOR AP, VILELA ER,
1041 VASCONCELOS JLM, 2005: Protocolos de sincronização de ovulação a base de
1042 progesterona e estradiol, em vacas de corte paridas. 3: Efeito do uso de ECP, Benzoato
1043 de Estradiol e GnRH como estímulo ovulatório. Congresso Brasileiro de Reprodução
1044 Animal **16**, 2005, Goiânia. Anais: Resumo 188.
- 1045 MONTEIRO FM, MELO DS, FERREIRA MMG, CARVALHO LM, SARTORELI ES,
1046 EDERHARDT BG, NOGUEIRA GP, BARROS CM, 2009: LH surge in Nelore cows
1047 (*Bos indicus*), after induced estrus or after ovarian superstimulation. *Animal*
1048 *Reproduction Science* **110**, 128–138.
- 1049 MOSSELMAN S, POLMAN J, DIJKMA S, 1996: E β R: identification and
1050 characterization of a novel human estrogen receptor. *Febs Letters* **392**, 49-53.
- 1051 NISWENDER GD, JUENGEL JL, MCGUIRE WJ, BELFIORE CJ, WILTBANK
1052 MC, 1994: Luteal Function: the estrous cycle and early pregnancy. *Biology of*
1053 *Reproduction* **50**, 239-247.
- 1054 NUNES CB, 2007: Estudo imunoistoquímico comparativo entre seis anticorpos anti-
1055 HER2 em arrays de carcinomas mamários: correlação com hibridação in situ

- 1056 cromogênica e avaliação interobservador. Belo Horizonte, 2007. 97p. Dissertação
1057 (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
1058 Horizonte, 2007.
- 1059 OKAMURA H, OHKURA S, 2007: Neuroendocrine control of reproductive function in
1060 ruminants. *Animal Science Journal* **78**, 105–111.
- 1061 PADULA AM, 2005: GnRH analogues—agonists and antagonists. *Animal*
1062 *Reproduction of Science* **88**, 115–126.
- 1063 PADULA AM, MACMILLAN KL, 2002: Reproductive responses of early postpartum
1064 dairy cattle to continuous treatment with a GnRH agonist (Deslorelin) for 28 days to
1065 delay the resumption of ovulation. *Animal Reproduction of Science* **70**, 23–36.
- 1066 ROBINSON RS, MANN GE, LAMMING GE, WATHES DC, 2001: Expression of
1067 oxytocin, oestrogen and progesterone receptors in uterine biopsy samples throughout
1068 the oestrous cycle and early pregnancy in cows. *Reproduction* **122**, 965–979.
- 1069 RUBIO I, CASTILLO E, SOTO R, ALARCÓN F, MURCIA C, GALINA CS, 2010:
1070 Postpartum follicular development in Brahman cows under two stocking rates. *Tropical*
1071 *Animal Health and Production* **42**, 539–545.
- 1072 SARTORELLI ES, CARVALHO LM, BERGFELT DR, GINTHER OJ, BARROS CM,
1073 2005: Morphological characterization of follicle deviation in Nelore (*Bos indicus*)
1074 heifers and cows. *Theriogenology* **63**, 2382-2394.
- 1075 SARTORI R, HAUGHIAN JM, SHAVER RD, ROSA GJM, WILTBANK MC, 2004:
1076 Comparison of ovarian function and circulating steroids in estrous cycles of Holstein
1077 heifers and lactating cows. *Journal of Dairy Science* **87**, 905-920.
- 1078 SARTORI R, BASTOS MR, BARUSELLI PS, GIMENES LU, ERENO RL, BARROS
1079 CM, 2010: Physiological differences and implications to reproductive management of
1080 *Bos taurus* and *Bos indicus* cattle in a tropical environment. In: *Reproduction in*

- 1081 Domestic Ruminants VII, v. 67, 2010, Anchorage. Proceedings...Anchorage: Society of
1082 Reproduction and Fertility **67**, 357.
- 1083 SCHAMS D, BERISHA B, 2002: Steroids as local regulators of ovarian activity in
1084 domestic animals. Domestic Animal Endocrinology **23**, 53-65.
- 1085 SILVESTRE FT, BARTOLOME JA, KAMIMURA S, ARTECHE AC, PANCARCI
1086 SM, TRIGG T, TATCHER WW, 2009a: Postpartum suppression of ovarian activity
1087 with a deslorelin implant enhanced uterine involution in lacting dairy cows. Animal
1088 Reproduction of Science **110**, 79-95.
- 1089 SILVESTRE FT, KAMIMURA S, ARTECHE AC, BARTOLOME J, PANCARCI SM,
1090 THATCHER WW, 2009b: Reproductive responses following postpartum suppression
1091 of ovarian follicular development with a deslorelin implant during summer heat stress in
1092 lactating dairy cows. Animal Reproduction Science **11**, 320–337.
- 1093 TASENDE C, MEIKLE A, RODRÍGUEZ-PIÑÓN M, FORSBERG M, GÁRAFALO
1094 EG, 2002: Estrogen and progesterone receptor content in the pituitary gland and uterus
1095 of progesterone-primed and gonadotropin releasing hormone-treated anestrous ewes.
1096 Theriogenology **57**, 1719-1731.
- 1097 ULBRICH SE, KETTLER A, EINSPANIER R, 2003: Expression and localization of
1098 estrogen receptor α , estrogen receptor β and progesterone receptor in the bovine oviduct
1099 in vivo and in vitro. Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology **84**, 279–289.
- 1100 VESANEN M, ISOMAA V, ALANKO M, VIHKO R, 1988: Cytosol estrogen and
1101 progesterone receptors in bovine endometrium after uterine involution postpartum and in
1102 the estrous cycle. Animal Reproduction of Science **17**, 9-20.
- 1103 VESANEN M, ISOMAA V, ALANKO M, VIHKO R, 1992: Bovine uterine, cervical
1104 and ovarian estrogen and progesterone receptor concentrations. Acta Veterinaria
1105 Scandinavica **33**, 379-386.

- 1106 WILTBANK MC, GÜIMEN A, SARTORI R, 2002: Physiological classification of
1107 anovulatory conditions in cattle. *Theriogenology* **57**, 21-52.
- 1108 YAVAS Y, JOHNSON WH, WALTON JS, 1999: Modification of follicular dynamics
1109 by exogenous FSH and progesterone, and the induction of ovulation using HCG in
1110 postpartum beef cows. *Theriogenology* **52**, 949-963.
- 1111 ZOLLERS JUNIOR WG, GARVERICK HA, SMITH MF, MOFFATT RJ, SALFEN B.
1112 E, YOUNGQUIST RS, 1993: Concentrations of progesterone and oxytocin receptors in
1113 endometrium of postpartum cows expected to have a short or normal oestrous cycle.
1114 *Journal of Reproduction and Fertility* **97**, 329-337.

Capítulo 3

REVISÃO ENVIADA PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA
VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

Fisiologia do ciclo estral da fêmea bovina

Wolff Camargo Marques Filho, Letícia Ferrari Crocomo, João Carlos Pinheiro
Ferreira

FISIOLOGIA DO CICLO ESTRAL DA FÊMA BOVINA

Wolff Camargo Marques Filho^{1*}
Letícia Ferrari Crocomo²
João Carlos Pinheiro Ferreira³

RESUMO

No Brasil, cerca de 80% dos 199,7 milhões de bovinos são da raça Nelore (*Bos taurus indicus*), que se caracteriza pela rusticidade e elevada tolerância ao clima tropical. Estas características favorecem a distribuição e criação de animais Nelore, em sua maioria, de forma extensiva. Como nas demais atividades, para a criação de bovinos se tornar viável economicamente, é necessário o aprimoramento do manejo de criação e das biotecnologias reprodutivas, com intuito de reduzir o intervalo entre partos, o período de serviço, e consequentemente obter 1 bezerro/vaca/ano. Deste modo, o longo período de anestro e de restabelecimento da atividade ovariana após o parto, e o baixo índice de fertilidade no primeiro ciclo estral subsequente são alguns dos fatores que limitam a produtividade e resultam em significativas perdas econômicas na bovinocultura brasileira. Ao longo da vida reprodutiva dos animais domésticos ocorrem oscilações na concentração plasmática dos hormônios da reprodução que, por meio da ligação com seus receptores específicos, promovem a regulação do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonadal, com consequente alterações morfológicas e endocrinológicas do trato reprodutivo. Existem, no entanto, diferenças entre *Bos taurus taurus* e *Bos taurus indicus* quanto à fisiologia da reprodução e peculiaridades da dinâmica folicular. Em zebuínos, as particularidades relacionadas ao anestro pós-parto, ao ciclo curto e à baixa eficiência reprodutiva relacionada ao uso da primeira ovulação pós-parto, decorrente da luteólise prematura do primeiro corpo lúteo, ainda são desconhecidas. O retorno à atividade ovariana pós-parto na vaca ocorre após o restabelecimento da síntese e do estoque disponível de LH na hipófise. Isto ocorre em virtude da depleção do estoque de LH durante a gestação, em decorrência do *feedback* negativo e prolongado do estradiol (E₂) e progesterona (P₄) (principalmente P₄) sobre o hipotálamo, diminuindo a liberação de GnRH e, consequentemente, a síntese e liberação de LH pela hipó-

1*Médico Veterinário, Doutor em Reprodução Animal, bolsista **FAPESP**, UNESP, Botucatu, São Paulo, Brasil.
E-mail: wolffcmf@gmail.com

*Médica Veterinária, Mestre em Reprodução Animal, bolsista **CAPES**, UNESP, Botucatu, São Paulo, Brasil

2* Prof. Dr. do Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária da FMVZ – UNESP, Botucatu, São Paulo.

* Correspondência: Distrito de Rubião Jr, s/n, CEP 18618-000 Botucatu – SP

1 fise anterior. Após o parto, há diminuição da concentração plasmática de P_4 , que resulta
2 no acúmulo de LH na hipófise anterior. A secreção de FSH aumenta rapidamente,
3 suficiente para estimular o recrutamento folicular, enquanto que os pulsos de LH são
4 retomados cerca de 20 a 30 dias pós-parto. Deste modo, a compreensão da fisiologia do
5 ciclo estral da fêmea bovina e dos mecanismos de regulação das funções ovarianas e
6 endometrial por meio do eixo hipotalâmico-hipofisário é fundamental para o
7 desenvolvimento científico e aprimoramento biotecnológico.

8 **Palavras-chaves:** Bovinos, ciclo estral, dinâmica folicular, hormônios, receptores.

10 **PHYSIOLOGY OF THE FEMALE BOVINE ESTROUS CYCLE**

11 **ABSTRACT**

12 In Brazil, about 80% of 119.7 million of bovines are Nelore (*Bos taurus*
13 *indicus*), which is characterized by hardiness and high tolerance to the tropical climate.
14 These characteristics favor the distribution and breeding of Nelore animals, mostly, in
15 extensive form. As in other activities, for the cattle breeding become economically
16 viable is necessary to improve the breeding management and the reproductive
17 biotechnologies, aiming to reduce the calving interval, the service period, and
18 consequently get a calf/cow/year. Thus, the long anoestrus period and ovarian activity
19 restoration after parturition, and the low fertility rate in the following first cycle are
20 some of the factors that limit the productivity and result in significant economic losses
21 in Brazilian cattle rearing. Throughout the reproductive life of domestic animals there
22 are fluctuations in serum concentrations of reproductive hormones that, by binding to
23 their specific receptors, promote the regulation of the hypothalamic-pituitary-gonadal
24 axis, with subsequent morphological and endocrinological changes in tract reproductive.
25 There are, however, differences between *Bos taurus taurus* and *Bos Taurus indicus* with
26 regard to the reproductive physiology and follicular dynamics peculiarities. In zebu
27 cattle, the specifics related to postpartum anoestrus, short cycle and low reproductive
28 efficiency related to the use of first postpartum ovulation, due to premature luteolysis of
29 the first corpus luteum, are still unknown. The return to ovarian activity in postpartum
30 cows occurs after the restoration of synthesis and the available stock of LH in the
31 pituitary gland. This is due to the depletion of the LH stock during pregnancy, due to
32 the prolonged negative feedback of E_2 and P_4 (P_4 mainly) on the hypothalamus,
33 decreasing the release of GnRH and, consequently, the synthesis and release of LH by
34 anterior pituitary. After parturition, there is P_4 serum concentration reduction, resulting

1 in the LH accumulation in anterior pituitary. The FSH secretion increases rapidly
2 enough to stimulate follicular recruitment, while LH pulses are resumed about 20 to 30
3 days postpartum. Thus, the understanding the physiology of the female bovine estrous
4 cycle and the mechanisms of endometrial and ovarian function regulation, through the
5 hypothalamic-pituitary axis is essential for improving the scientific development and
6 biotechnology improvement.

7 **Keywords:** cattle, estrous cycle, follicular dynamics, hormones, receptors.

8
9
10 **FISIOLOGÍA DE CICLO ESTRAL DE LA HEMBRA BOVINA**
11 **RESUMÉN**
12

13 En Brasil, alrededor del 80% de los 199.7 millones de bovinos son de la raza
14 Nelore (*Bos taurus indicus*), que se caracteriza por la rusticidad y alta tolerancia al
15 clima tropical. Estas características favorecen la creación y distribución del Nelore, en
16 su mayoría, de forma extensiva. Como en otras actividades, para que la creación de
17 ganado se convierta en económicamente viable, es necesario mejorar el manejo de
18 creación y de las biotecnologías reproductivas, con el objetivo de reducir el intervalo
19 entre parto, el período de servicio, y en consecuencia obtener un ternero/vaca/año. Así,
20 el largo período de anestro y de restauración de la actividad ovárica después del parto, y
21 la baja tasa de fecundidad en el primer ciclo estral siguiente son algunos de los factores
22 que limitan la productividad y conducen a importantes pérdidas económicas en el
23 ganado bovino en Brasil. A lo largo de la vida reproductiva de los animales domésticos
24 se producen fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas de las hormonas
25 reproductivas, que al unirse a sus receptores específicos, promueven la regulación del
26 eje hipotálamo-hipofisis-gonadal, con posterior modificaciones morfológicas y
27 endocrinológicas en el tracto reproductivo. Hay, sin embargo, diferencias entre *Bos*
28 *taurus* y *Bos indicus* en la fisiología reproductiva con respecto a la fisiología
29 reproductiva y a las peculiaridades de la dinámica folicular. En cebú, los detalles
30 relacionados con el anestro posparto, el ciclo corto y a la baja eficiencia reproductiva,
31 relacionada con el uso de la primera ovulación posparto, debido a la luteolisis prematura
32 del primer cuerpo lúteo, aún son desconocidos. El retorno a la actividad ovárica en
33 vacas posparto ocurre después de la restauración de la síntesis y de la disposición de LH
34 en la hipófisis. Esto se debe al agotamiento de las existencias de LH durante la
35 gestación, debido a la retroalimentación negativa y prolongada de E₂ e P₄

1 (especialmente P₄) en el hipotálamo, disminuyendo la liberación de GnRH y, en
2 consecuencia, la síntesis y liberación de LH por la hipófisis anterior. Después del parto,
3 la concentración plasmática de P₄ se reduce, lo que resulta en la acumulación de LH en
4 la pituitaria anterior. La secreción de FSH aumenta con rapidez suficiente para estimular
5 el reclutamiento folicular, mientras que los pulsos de LH se repiten entre 20 y 30 días
6 después del parto. Así, la comprensión de la fisiología del ciclo estral de la hembra
7 bovina y de los mecanismos de regulación del endometrio y de las funciones ováricas
8 por medio del eje hipotálamo-hipófisis es esencial para el desarrollo científico y mejora
9 biotecnológica.

10 **Palabras claves:** ciclo estral, dinámica folicular, hormonas, receptores.

11 12 INTRODUÇÃO

13 O rebanho bovino é constituído por aproximadamente 199,7 milhões de cabeças,
14 sendo 80% de origem Zebuína, com alto poder de tolerância ao clima tropical
15 (adaptabilidade e rusticidade) (1). No entanto, o intervalo entre partos é de 18 meses e o
16 período de serviço é de 9 meses (2).

17 O organismo como um todo é regulado pelo sistema nervoso, de forma rápida e
18 direta, por meio dos prolongamentos nervosos dispostos pelo corpo e, de forma indireta
19 e lenta, pelo sistema endócrino que regula a homeostase e as diversas funções
20 específicas, tais como o desenvolvimento folicular ovariano, o comportamento sexual, a
21 gestação, o parto e a lactação (3,4).

22 A função reprodutiva durante o ciclo estral é modulada pelo padrão de secreção
23 e concentração sérica dos hormônios da reprodução por meio dos processos de
24 retroalimentação, bem como pela expressão gênica e proteica dos receptores hormonais
25 do aparelho reprodutivo e tecidos conexos (5,6).

26 As particularidades fisiológicas que acometem estes animais durante a fase do
27 anestro pós-parto, os fatores que determinam a duração desta fase e do primeiro ciclo
28 estral após o período de anestro (ciclo curto) ainda não foram totalmente elucidados.

29 Neste contexto, pesquisas referentes à fisiologia geral, à forma de regulação da
30 função reprodutiva e às reações do organismo em fases específicas da vida reprodutiva
31 dos bovinos vêm sendo desenvolvidas com intuito de incrementar o uso da biotécnicas
32 da reprodução e maximizar a eficiência reprodutiva do rebanho nacional.

33

34

CICLO ESTRAL BOVINO

O ciclo estral de fêmeas bovinas sexualmente maduras se inicia após a puberdade sendo interrompido durante a gestação e o anestro. Trata-se do período compreendido entre dois episódios de estro ou cio, de duração variável, que apresenta fases distintas caracterizadas por modificações internas e externas no trato reprodutivo feminino, assim como no comportamento dos animais (7).

Os bovinos são animais poliéstricos anuais que apresentam ciclo estral com duração aproximada de 21 (17 a 24) dias e normalmente apresentam 2 a 3 ondas de crescimento folicular (8,9). Neste animais, o ciclo estral bovino pode ser dividido em duas fases, baseada nas concentrações plasmáticas dos hormônios predominantes em cada uma delas.

A fase folicular, com duração de 3 a 4 dias, compreende o proestro e o estro e, tem início após a secreção de prostaglandina $F_{2\alpha}$ ($PGF_{2\alpha}$) e o processo da luteólise. Se caracteriza pelo desenvolvimento folicular e predominância de altas concentrações plasmáticas de estradiol (E_2), culminando com o pico pré-ovulatório de hormônio luteinizante (LH) e, a consequente ovulação, que marca o início da fase seguinte. A fase luteal, com duração aproximada de 18 a 19 dias, inclui o metaestro e o diestro e, se caracteriza pelo desenvolvimento do corpo lúteo (CL) e pela crescente ou maior concentração plasmática de P_4 (7,10).

DINÂMICA FOLICULAR

- FOLÍCULOS PRÉ-ANTRAIS

Durante a vida embrionária e a pré-puberdade das fêmeas, a fase inicial de crescimento folicular ocorre independentemente de gonadotropinas e termina quando o folículo ainda é pré-antral, momento em que são dependentes dos fatores de crescimento, tais como, fator de crescimento semelhante a insulina I (IGF-I), fator de crescimento transformante ($TGF-\beta$), particularmente o fator de crescimento diferencial-9 (GDF-9) e a proteína morfogenética óssea-15 (BMP-15 ou GDF-9B), activina e fator de crescimento fibroblástico (FGF) (11).

O desenvolvimento folicular pré-antral depende também da proliferação e diferenciação das células da granulosa, processo que ocorre devido a comunicação intercelular através dos processos citoplasmáticos trans-zonais (TZP) (12), que permitem a passagem bidirecional de íons, metabólitos, aminoácidos e pequenas

1 moléculas reguladoras. Estas extensões se retraem quando o folículo atinge o estágio
2 antral, provavelmente pela ação do LH (12,13).

3 O crescimento folicular inicial é estimulado pela ação sinérgica do kit ligante
4 (KL) e da BMP-15, enquanto o GDF-9 é secretado tardiamente por oócitos maduros,
5 promovendo a proliferação das células da granulosa e modulação da função do KL (14).

6 O KL produzido pelas células da granulosa de camundongos e seu receptor
7 específico (c-kit), expressos no oócito, formam o complexo c-kit/KL. No folículo
8 primordial e primário, este se relaciona com a proliferação e síntese de DNA nas células
9 da granulosa, e estimula a diferenciação de células do estroma em células da teca
10 (15,16).

11 No estágio secundário, o GDF-9 é essencial para o desenvolvimento dos
12 folículos, uma vez que potencializa a proliferação das células da granulosa (17). A
13 interação entre o BMP-15 e o KL também é fundamental para o crescimento folicular.
14 O BMP-15 estimula a expressão do KL, que, por sua vez, inibe a expressão da BMP-15
15 (14). Enquanto o GDF-9 inibe a expressão do KL em células da granulosa de
16 camundongos (18).

17 Os mecanismos endócrinos também exercem importante função no
18 desenvolvimento de folículos pré-antrais, os quais expressam receptores de IGF-I e
19 proteínas ligantes de IGFBP-2 e 3, que são reguladores da biodisponibilidade de IGFs
20 extra-ovarianos (19).

21 O desenvolvimento folicular pré-antral também é regulado de forma parácrina
22 pela ativina, folistatina, inibina, fator de crescimento epidermal (EGF) e FGF (20). O
23 FGF-2 é capaz de estimular a ativação de folículos primordiais em culturas de
24 fragmentos de ovários de ratas, e de promover proliferação de células da granulosa
25 (20,21).

26 27 **- FOLÍCULOS ANTRAIS**

28 Nos folículos pré-antrais, há expressão de receptores para o FSH, nas células da
29 granulosa, e para o LH, nas células da teca. Com isso, se inicia uma fase de
30 desenvolvimento folicular dependente de gonadotropinas, caracterizada pelo
31 recrutamento de um grupo de pequenos folículos (emergência folicular) com intervalos
32 de aproximadamente dez dias, sob a influência do FSH secretado após as fêmeas
33 atingirem a puberdade (7,8).

1 Nas células da granulosa, o FSH estimula a ativação da enzima P450 aromatase,
2 responsável pela metabolização e transformação de andrógenos em estradiol. A
3 influência do FSH e do estradiol acarreta alterações morfológicas no folículo, que passa
4 a apresentar uma cavidade repleta de líquido em seu interior, sendo chamado de folículo
5 antral (7,22).

6 Entre todos esses folículos, apenas um continua seu desenvolvimento, o folículo
7 dominante, caracterizado pela maior capacidade de produzir 17β -estradiol em relação
8 aos demais recrutados no início da onda. Os demais folículos denominados
9 subordinados começam a apresentar taxa de crescimento gradativamente menor e
10 entram em atresia (8).

11 O momento em que se detecta diferença entre a taxa de crescimento do folículo
12 dominante e do maior folículo subordinado é denominado de desvio ou divergência
13 folicular que ocorre, respectivamente, 2,7 e 3,8 dias após a emergência folicular, quando
14 o folículo dominante possui de 5,4 a 6,1 mm em zebuínos (23) e entre 10 e 12 mm em
15 *Bos taurus taurus* (24).

16 O sistema IGF atua de forma sinérgica com o FSH no processo de divergência
17 folicular e produção de estrógenos (25). Os IGF-I e II são expressos nas células da
18 granulosa e da teca, no entanto, o IGF-II atua de forma parácrina (intraovariana)
19 enquanto o IGF-I atua via endócrina (26).

20 Os IGFs estimulam a expressão de seus receptores específicos nas células da
21 teca e da granulosa, que estão presentes em concentrações diferentes quando
22 comparados folículos dominantes e subordinados (27). As IGFbps modulam as
23 concentrações disponíveis de IGFs na corrente sanguínea e estão presentes no fluido
24 folicular bovino (28).

25 Após a divergência folicular durante o diestro, fase em que o CL oriundo do
26 ciclo anterior está presente e o nível plasmático de P_4 , responsável pela redução da
27 frequência da pulsatilidade de LH, está alto, ocorre o desvio folicular. No entanto, o
28 folículo dominante entra em processo de atresia e se torna anovulatório. A partir desse
29 momento ocorre a emergência de uma nova onda de crescimento folicular (8).

30 No entanto, se após a divergência ocorrer a regressão luteínica com consequente
31 diminuição da concentração plasmática da P_4 , o folículo dominante continua o seu
32 crescimento e secreta grande quantidade de estradiol promovendo o pico ovulatório de
33 LH, que desencadeia a ovulação e à maturação oocitária (7,25).

1 **- LUTEINIZAÇÃO**

2 Durante a ovulação ocorre a ruptura da membrana folicular composta pelas
3 células da teca (externa e interna) e da granulosa, e a expulsão do oócito.
4 Imediatamente, a parede do folículo é colapsada e a cavidade invadida por linfa e
5 sangue dos capilares, que serão os componentes de uma nova estrutura, o corpo
6 hemorrágico (29).

7 Subsequentemente, o corpo hemorrágico se reorganiza e origina o CL, sob a
8 influência de fatores angiogênicos e mitogênicos (FGF-2, TGF- β , IGF-I, fator de
9 crescimento semelhante à heparina e fator de crescimento endotelial vascular) (30).

10 O crescimento do CL ocorre rapidamente a partir da proliferação celular e da
11 diferenciação das células da granulosa em células luteínicas grandes, que apresentam
12 receptores para LH, responsáveis pela síntese das elevadas concentrações de P₄, e das
13 células da teca remanescentes do folículo ovulado em células luteínicas pequenas (31).

14 O CL é primariamente reconhecido pela habilidade em sintetizar e secretar
15 progesterágenos, hormônios que estão relacionados com a manutenção de um ambiente
16 adequado ao desenvolvimento embrionário e pela própria manutenção do CL durante o
17 período da ovulação até a implantação, quando ocorre o reconhecimento materno da
18 gestação (31). Além da P₄, o CL após 10 a 15 dias de vida, produz uma substância
19 denominada ocitocina (OT), que juntamente com a P₄ e o E₂, regulam o fenômeno da
20 luteólise (32).

21 **-LUTEÓLISE**

22 A regressão morfológica e funcional do CL ocorre 17 a 20 dias após a ovulação
23 durante o ciclo estral de aproximadamente 21 dias. Este processo é denominado
24 luteólise e determina a duração do ciclo estral (7).

25 As concentrações plasmáticas de E₂, P₄ e OT estão relacionadas com a secreção
26 de PGF_{2 α} , substância responsável pela luteólise, que é secretada pelo endométrio bovino
27 de maneira pulsátil e mensurada através do metabólito da PGF_{2 α} encontrada na
28 circulação sanguínea, a 13, 14 diidr-15ceto prostaglandina (PGFM) (33).

29 Há relatos de ação indireta, onde o estradiol proveniente dos folículos em
30 crescimento é estimula o aumento na concentração de receptores endometriais de OT
31 associada à sensibilização prévia pela P₄ no final da fase luteínica. A OT proveniente do
32 CL ou da neurohipófise, ao se acoplar a estes receptores, estimula a secreção
33 endometrial de PGF_{2 α} (34; 32).

1 Após a luteólise, os elevados níveis plasmáticos de E₂ estimulam os neurônios
2 Kiss-1 no centro pré-ovulatório hipotalâmico, responsável pela liberação de GnRH, que
3 por sua vez, desencadeia o pico pré-ovulatório de LH pela hipófise (35; 36).

5 **DIFERENÇAS ENTRE *Bos taurus indicus* X *Bos taurus taurus***

6 Alguns estudos demonstram que os zebuínos apresentam menor fertilidade que
7 os *Bos taurus taurus*. Assim como a espécie de origem européia, o *Bos taurus indicus*
8 apresenta 2 ou 3 ondas de crescimento folicular durante o ciclo estral (37).

9 Há diferenças na dinâmica folicular entre *Bos taurus taurus* e *Bos taurus indicus*
10 quanto ao número de folículos recrutados. Os zebuínos apresentam maior número de
11 ondas de crescimento foliculares por ciclo estral (38), e menor diâmetro do folículo pré-
12 ovulatório e do CL (37; 39).

14 **HORMÔNIOS E RECEPTORES HORMONAIS**

15 O ciclo estral é regulado por mecanismos endócrinos e neuroendócrinos
16 envolvendo, principalmente os hormônios hipotalâmicos (hormônio liberador de
17 gonadotrofinas – GnRH), hipofisários (LH e FSH) e gonadais (E₂, P₄ e inibina) (3; 7).

18 De maneira geral, esta regulação é efetuada pelas concentrações plasmáticas dos
19 hormônios protéicos e esteróides circulantes na corrente sanguínea que atingem os
20 diferentes órgãos alvos de diversas formas (40). Também ocorre regulação via
21 parácrina, que consiste na comunicação entre células vizinhas por meio dos produtos
22 celulares, e autócrina, que se caracteriza pela produção de mensageiros químicos
23 secretados por células que atuarão sobre elas mesmas ao se unirem à receptores
24 específicos (7).

25 A regulação da secreção dos diversos hormônios ocorre por meio de *feedback*
26 negativo, com inibição da secreção, e positivo, com estimulação da secreção hormonal.
27 São descritos outros mecanismos de regulação, como por meio de reflexos
28 neuroendócrinos, evidenciado durante o processo de liberação do leite quando o bezerro
29 realiza estimulação mecânica do teto, com consequente, liberação de OT e prolactina.
30 Há ainda o controle exócrino, realizado por meio dos feromônios (3).

31 Para que os hormônios desencadearem suas funções no organismo é
32 imprescindível a ligação com receptores específicos de membrana plasmática e nuclear,
33 que normalmente são proteínas ou glicoproteínas (7; 36).

1 O LH e FSH exercerem sua função por meio da ligação com os receptores
2 específicos na membrana plasmática, seguida da penetração nas células-alvo onde se
3 ligam aos seus receptores citoplasmáticos específicos (3; 7).

4 Enquanto os hormônios esteróides penetram pela membrana citoplasmática, o
5 complexo esteróide-receptor citoplasmático é transferido para o núcleo, onde se liga aos
6 receptores específicos na cromatina. Segue-se a síntese de RNA polimerase e a
7 produção de RNA mensageiro. Assim, a capacidade de síntese de proteína por uma
8 célula ocorre após 30 minutos da interação inicial entre o esteróide e o receptor
9 citoplasmático (7; 41).

10 11 **-HORMÔNIO LIBERADOR DE GONADOTROFINA**

12 O GnRH é um decapeptídeo sintetizado por células neuroendócrinas na área pré-
13 óptica do hipotálamo, e após ser liberado sob a forma de pulsos, atinge a adenohipófise
14 através do sistema porta-hipotalâmico-hipofisário, desencadeando a secreção do FSH e
15 LH (35).

16 A ligação do GnRH aos receptores específicos de membrana ativa as proteínas
17 G, que por sua vez ativam a enzima adenilciclase, responsável em transformar ATP em
18 AMPc (2º mensageiro) no citoplasma. Este segundo mensageiro ativa quinases
19 proteicas, desencadeando a formação de novas proteínas. As próprias concentrações do
20 GnRH regulam a expressão dos receptores de GnRH (GnRHR) hipofisários (7; 36).

21 O sistema circulatório envolvido nesse processo é conhecido como sistema porta
22 hipotalâmico-hipofisário, composto por uma rede de capilares. O GnRH é secretado
23 pelo centro tônico hipotalâmico em resposta aos baixos níveis de LH ou FSH (*feedback*
24 positivo) e sua liberação provoca aumento da secreção dos hormônios hipofisários.(3;
25 7).

26 27 **-GONADOTROFINAS**

28 A secreção do FSH e o LH pelas células da pituitária anterior (Adenohipófise) é
29 regulada pelo *feedback* positivo e negativo e pela concentração plasmática dos
30 hormônios gonadais (7).

31 A principal função do FSH na fêmea é promover o crescimento dos folículos,
32 que são responsáveis pela produção de estradiol. O pico de estradiol é seguido pelo pico
33 pré-ovulatório de LH, imprescindível ao processo ovulatório, que acarreta a formação
34 do CL por meio da luteinização das células da granulosa e da teca (3).

1 A formação do complexo FSH/receptor de FSH (FSHR) desencadeia uma série
2 de processos no interior das células da granulosa, que incluem aumento da produção de
3 fluido folicular, expressão de novos receptores de membrana para LH e FSH e das
4 junções comunicantes GAP, estímulo da atividade da enzima aromatase P450 e da
5 síntese de estradiol a partir de andrógenos sob ação sinérgica das células da teca e
6 granulosa (3).

7 As concentrações de RNAm de FSHR estão presentes em maior quantidade nas
8 células da granulosa foliculares nos dias 1, 3, 5, 7 e 10 do ciclo estral, e no CL nos
9 primeiros dias após ovulação (42; 3).

10 Os receptores para LH (LHR) estão presentes nas células da teca e da granulosa
11 dos folículos e no CL dos bovinos. Esses receptores desencadeiam a síntese de
12 andrógenos a partir do colesterol e a formação de novos receptores para LH (3; 7).

13 Os LHR das células da granulosa parecem estar relacionados à dominância
14 folicular. Durante a fase de desvio folicular, o aumento dos receptores para FSH, nas
15 células da granulosa do folículo dominante, e dos receptores para LH, nas células da
16 teca interna, estimula a expressão de receptores de LH nas células da granulosa e,
17 conseqüentemente, o aumento na produção de estradiol pelo folículo pré-ovulatório
18 (26).

19 Após o pico de FSH e o declínio dos níveis circulantes deste hormônio, ocorre a
20 atresia dos folículos subordinados recrutados no início da onda de crescimento folicular
21 (43). A partir de então ocorre o fenômeno da divergência ou desvio folicular, definida
22 como o início da mudança nas taxas de crescimento entre o folículo selecionado
23 (dominante - FD) e os demais (subordinados - FS) (24).

24 Apesar do mecanismo preciso para a seleção do folículo dominante não estar
25 completamente elucidado, sabe-se que o fenômeno do desvio envolve o LH e a
26 expressão de seus receptores pelo maior folículo, bem como os IGFs (25).

27 Neste momento, o folículo dominante apresenta diâmetro em torno de 8,5 mm
28 em animais *Bos taurus taurus* (44) e de 6,0 mm em *Bos taurus indicus* (23), quando este
29 folículo passa a ser LH dependente, até que ocorra a ovulação ou a atresia (24).

30 Austin et al. (45) relataram que o futuro folículo dominante produz maiores
31 concentrações de estradiol e possuem baixos níveis de IGFBP comparado aos folículos
32 subordinados. Associado a isto, a seleção folicular está relacionada à queda
33 momentânea da concentração plasmática de FSH, decorrente do *feedback negativo*
34 promovido pelo E₂ proveniente do maior folículo, capaz de manter seu desenvolvimento

1 apesar da queda na secreção de FSH. A partir deste momento, o desenvolvimento deste
2 FD se torna dependente dos níveis séricos de LH (44; 28).

3 A expressão do LHR foi observada por meio do PCR em células da granulosa de
4 folículos antrais com 8 mm, obtidos de fêmeas Nelore, exclusivamente após a seleção
5 do FD que ocorre aos 6 mm nesta espécie (46; 23).

6 Os LHR presentes no CL elevam-se até o 5º dia, permanecendo em
7 concentrações elevadas até os dias 15 e 17. A detecção gênica para o mesmo receptor
8 apresentou comportamento semelhante no decorrer do ciclo estral (47,48).

9 10 **-FATORES ANGIOGÊNICOS**

11 Durante o ciclo estral, ocorrem mudanças na vascularização do trato reprodutivo
12 quanto ao tamanho e morfologia, as quais desencadeiam alterações funcionais e
13 estruturais (49). O processo de crescimento vascular no organismo é denominado de
14 angiogênese, essencial para nutrição, regulação endócrina da reprodução, crescimento e
15 diferenciação celulares (50; 51).

16 A circulação sanguínea intra-ovariana e endometrial é caracterizada por redes
17 capilares que permitem a manutenção dos níveis séricos das gonatropinas, fatores de
18 crescimento, de E₂ e da P₄ para as diversas estruturas presentes no decorrer do ciclo
19 estral (52).

20 A função e a síntese cíclica dos fatores angiogênicos ao longo do tempo e a
21 forma de controle que caracteriza o trato reprodutivo feminino sugerem a existência de
22 uma relação entre a angiogênese e a reprodução. Este fenômeno ocorre por meio dos
23 componentes angiogênicos e anti-angiogênicos de forma parácrina, sendo responsáveis
24 pela neovascularização, proliferação celular, estimulação e inibição do
25 desenvolvimento folicular (53).

26 O controle da angiogênese é realizado por fatores endógenos moduladores. As
27 famílias dos fatores de crescimento endoteliais vasculares células-específicas (fator de
28 crescimento endotelial vascular – VEGF -, fator de permeabilidade vascular – VPF - e
29 angiopoitinas – 1 e 2) e seus receptores foram detectados no trato reprodutivo feminino,
30 sendo relacionados com a seleção e maturação foliculares, a ovulação e as modificações
31 endometriais. Além de que são mediadores dos hormônios reprodutivos na
32 vascularização endometrial (54).

1 O VEGF é um fator pró-angiogênico e, juntamente com os seus receptores
2 tirosina kinase (Flk1/KDR – VEGF/R1 e Flt1 – VEGF/R2), estimulam a angiogênese
3 nos folículos e no CL (55).

4 Os folículos pré-antrais não possuem vascularização própria, portanto dependem
5 da circulação presente no estroma ovariano. Quando o antro é formado, surge uma rede
6 capilar nas camadas interna e externa da teca, que fornecem aos folículos fatores de
7 crescimento, gonadotrofinas, oxigênio e substâncias precursoras esteroidais (56; 51).

8 Durante o desenvolvimento folicular, há formação de uma rede vascular na
9 camada das células tecais e, no momento da ovulação, observa-se a separação das
10 camadas formadas pelas células da teca e da granulosa, concomitante ao aumento da
11 angiogênese (53).

12 Em humanos, a hipóxia estimula a expressão do VEGF, do VPF e da
13 angiopoetina 2. Observa-se uma intensa imunomarcção de VEGF na camada das
14 células da teca de folículos saudáveis e a mínima marcação nas células da granulosa. Há
15 grande expressão gênica de VEGF em CL jovens de ratos, enquanto a angiopoetina 1
16 surge quando o CL está maduro, contribuindo com a sua manutenção. A angiopoetina 2
17 possui os mesmos receptores que a angiopoetina 1 no ovário, no entanto, sua expressão
18 é maior durante a fase inicial de maturação do CL e exerce ação sinérgica ao VEGF, os
19 quais antecedem a função exercida pela angiopoetina 1 (53; 54).

20 As maiores atividades angiogênicas foram observadas na porção apical da
21 camada capilar interna de folículos com tamanho mediano e nas porções média e basal
22 das camadas capilares internas de folículos dominantes de bovinos. A degeneração
23 capilar foi observada principalmente na camada vascular de folículos pequenos e de
24 folículos antrais médios (57).

25 As células da teca e da granulosa dos folículos pré-ovulatórios, e as células
26 lúteas grandes e pequenas, apresentam grande expressão gênica de VEGF em ratos e,
27 VEGFA em bovinos (50,58). A angiopoetina 2 possui ação sinérgica ao VEGFA, assim
28 como com o VEGF, que apresenta grande expressão gênica nas células tecais e na zona
29 pelúcida de folículos pré-ovulatórios (57; 59).

30 Entretanto, em folículos atrésicos de ratos não se observou a expressão gênica de
31 VEGF, mas foram detectados genes codificadores para angiopoetina 2 na célula da
32 granulosa, assim como em corpos lúteos velhos (53; 54), uma vez que as ações
33 parácrina e autócrina do VEGF e do VEGFA impedem a apoptose das células da

1 granulosa, que age como um agente citoprotetor para as células endoteliais por induzir a
2 formação de proteínas antiapoptóticas em ratos (51) e em bovíos (50).

3 O VEGF tem sua expressão estimulada pelos IGFs, TGFs, EGFs e inter-leucinas
4 (ILs), bem como pelo óxido nítrico, que por sua vez, estimula a esteroidogênese e a
5 proliferação celular (51).

6 Ao longo do ciclo, o útero sofre diversas modificações. A expressão gênica de
7 VEGF é maior no epitélio glandular e aumenta rapidamente a partir de estímulos
8 realizados pelo estradiol (54).

10 **-ESTRÓGENOS E RECEPTORES DE ESTRÓGENO**

11 Entre os estrógenos, o 17β -estradiol é o de maior importância para a reprodução
12 e predomina em animais domésticos não gestantes e gestantes. O estrógeno é produzido
13 pelo córtex adrenal e pelas células da granulosa de folículos ovarianos, principalmente
14 após a fase de desvio folicular, por meio do processo catalítico de aromatização de
15 andrógenos pela enzima aromatase citocromo P450 (60; 61).

16 A dinâmica folicular de bovinos ao longo do ciclo estral acarreta um perfil
17 oscilatório de produção de E_2 , devido ao crescimento e atresia de diversos folículos em
18 cada uma das ondas foliculares, até a ovulação (24). O FD é considerado o principal
19 responsável pela produção total de E_2 . Este é liberado de maneira pulsátil e atinge a
20 concentração plasmática máxima momentos antes da ovulação (44).

21 Sinergicamente com a P_4 agem para possibilitar o crescimento de glândulas
22 uterinas e mamárias. O período de estro é caracterizado por elevados níveis de
23 estrógenos, que estimulam o crescimento uterino por meio da interação com seus
24 receptores e, o conseqüente aumento dos processos sintéticos dentro das células. Outros
25 efeitos incluem o desenvolvimento físico das características sexuais secundárias
26 femininas, o controle da liberação de hormônios hipofisários, potencialização dos
27 efeitos da OT e PGFs sobre as contrações uterinas e auxílio no processo de implantação
28 (3).

29 O estrógeno estimula o crescimento e a secreção das glândulas endometriais
30 momentos antes da implantação necessários para manutenção do zigoto, o crescimento
31 dos ductos nas glândulas mamárias quando atua sinergicamente com a P_4 , atividade
32 secretora no oviduto (favorece a sobrevivência do oócito e espermatozóide), inicia a
33 receptividade sexual, regula a secreção de gonadotrofinas (pico de LH pela hipófise
34 anterior para ovulação) (7).

1 Além disso, o estrógeno é epiteliotrófico, promove anabolismo das proteínas e
2 relaciona-se com a expressão dos receptores de OT no endométrio, os quais constituem
3 o complexo hormônio receptor com a OT secretada pelo CL, que estimulam a liberação
4 de PGF_{2α} pelo útero gravídico ou não gravídico, desencadeando em ambos os casos a
5 regressão do CL (7).

6 Quando produzido na presença do FD, é responsável pelo *feedback* negativo ao
7 FSH e pela retroalimentação positiva ao LH que, na ausência de P₄, induz o pico pré-
8 ovulatório de LH e também o comportamento de estro (62; 63).

9 As altas concentrações plasmáticas de E₂ e a ausência de P₄ sinalizam a
10 maturação folicular, que desencadeia a expressão do comportamento de estro e o pico
11 pré-ovulatório de LH, essencial para a ovulação do FD (64; 29).

12 Além de participar na regulação da secreção do FSH, o E₂ está relacionado com
13 importantes funções autócrinas e parácrinas, tais como a proliferação celular (65), o
14 aumento da atividade da enzima aromatase citocromo P450, o aumento na expressão
15 dos LHR e FSHR nas células da granulosa de bovinos (66), e a maior sensibilidade do
16 folículo dominante aos hormônios FSH e LH (67).

17 Foi observado que durante o início da fase luteínica, a concentração de P₄ é
18 baixa e a de E₂ é alta, resultando em maior frequência dos pulsos de LH. Durante o
19 terço médio da fase luteínica, entre o 11º e 13º dias do ciclo estral, período em que a
20 concentração de P₄ é alta e a de E₂ é baixa, foi observada menor frequência dos pulsos
21 de LH em relação ao início ou ao final da fase luteínica (68).

22 Após a luteólise, há diminuição dos níveis de P₄ e elevação na concentração e
23 frequência dos pulsos de LH. Diversos estudos demonstraram que o padrão de secreção
24 da P₄ e do E₂ está inversamente relacionado, e é determinante no controle da frequência
25 dos pulsos de LH (68; 69).

26 No entanto, o E₂ isoladamente não é capaz de ativar a resposta do endométrio e
27 ocasionar a lutólise a partir das injeções de OT em vacas e ovelhas ovariectomizadas
28 (5), devido ao efeito inibitório do E₂ nos receptores de OT na ausência da sensibilização
29 prévia pela P₄ (70; 71)

30 O início da luteólise é determinado pela prévia sensibilização endometrial pela
31 P₄ oriunda do CL ao longo do ciclo estral, que associado a crescente produção de E₂
32 pelos folículos, causam uma grande estimulação na produção de receptores de OT e
33 produção de PGF_{2α} pelo útero em bovinos e ovinos (72; 73).

1 A função do estrógeno é desencadeada no organismo em tipos celulares
2 específicos do ovário e do útero após a formação do complexo hormônio estrógeno-
3 receptor de estrógeno (E_2/ER), promovendo a ativação genômica e proteica, as quais são
4 reguladas basicamente pelo E_2 e pela P_4 (48; 74).

5 Atualmente, foram relatados no endométrio e CL dois tipos de ER com
6 importância para a regulação da função reprodutiva de bovinos, α ($E\alpha R$) (75) e β ($E\beta R$)
7 (76).

8 Os receptores de E_2 possuem maior expressão no endométrio durante os dias 0 e
9 5 do ciclo, mediado pelos altos níveis plasmáticos do E_2 proveniente do FD, associado
10 às baixas concentrações séricas de P_4 após a luteólise (74).

11 Após a ovulação, a P_4 proveniente do CL recém formado, gradativamente
12 promove a diminuição das concentrações endometriais dos ER que alcançam os seus
13 menores valores por volta do 17º dia do ciclo estral (diestro) (77).

14 Em ratos o $E\alpha R$ regula a diferenciação, a proliferação celular e possui maior
15 expressão no tecido endometrial (75). Em bovinos, o $E\alpha R$ teve maior expressão durante
16 a fase luteal inicial e decresceu significativamente durante a fase luteal tardia (48).

17 Os $E\beta R$ na maioria das espécies estão presentes em maior concentração no
18 tecido ovárico e estão intimamente relacionados com a liberação de GnRH (78) e, em
19 bovinos, não varia ao longo do ciclo estral (48). Em humanos, há relatos que as células
20 endometriais estromais possuem maior concentração de $E\beta R$, os quais apresentam
21 maior afinidade por E_2 e estriol (79).

22 23 **-PROGESTÁGENOS E RECEPTORES DE PROGESTERONA**

24 A P_4 é responsável pelo crescimento das glândulas endometriais, crescimento
25 lóbulo-alveolar das glândulas mamárias, atividade secretora do oviduto e das glândulas
26 endometriais responsável pela nutrição do zigoto, evita a contratilidade do útero durante
27 a gestação e regula a secreção de gonadotrofinas. A função luteal determina a duração
28 fisiológica do ciclo estral e garante a manutenção da prenhez (7).

29 A concentração plasmática de P_4 aumenta progressivamente a partir do segundo
30 dia após a ovulação até atingir seu platô por volta do oitavo dia do ciclo, o qual é
31 mantido até o dia quinze, quando começa a declinar até atingir níveis basais por volta
32 dos dias 15 a 18, caracterizando a luteólise (37).

33 Há relatos de que o LH estimula o CL a secretar P_4 após a ligação com seu
34 receptor e ativação da adenil ciclase, a qual sintetiza AMPc, um mensageiro intracelular

1 responsável por ativar enzimas envolvidas na síntese de P_4 (80). A P_4 inibe a apoptose
2 nas células luteais pelo mecanismo dependente dos receptores de progesterona (PR),
3 visto que a luteólise estrutural é um pré-requisito para o início da apoptose em células
4 endoteliais do CL bovino (81).

5 Existem duas formas de PR: *isoformas* A (PAR) e B (PBR). O PAR está
6 intimamente relacionado ao desempenho e as patologias reprodutivas e, sua expressão
7 tem correlação negativa com o PBR na espécie humana (82; 83; 84). Ambas *isoformas*
8 estão presentes no trato reprodutivo feminino durante o ciclo e possuem atividades
9 transcricionais diferentes, sendo que a *isoforma* A parece realizar papel modulador sob
10 a expressão dos ER, PR e receptor de ocitocina (OTR) no sistema reprodutivo mais
11 importante que o PBR (85).

12 No endométrio e na glândula mamária, o estrógeno sensibiliza as células para a
13 ação da P_4 , promovendo a expressão do PR (74; 86). No dia 13 do ciclo estral de vacas
14 Nelore, a concentração proteica de PR no endométrio foi menor comparada aos demais
15 dias do ciclo, ainda quando as concentrações plasmáticas de P_4 oriundas do CL
16 permanceceram elevadas (74).

17 Estes receptores estão expressos nos folículos durante todo o ciclo estral de
18 bovinos. No fim do ciclo estral, as baixas concentrações plasmáticas de P_4 , associada as
19 concentrações plasmáticas crescentes de E_2 oriundas do FD, ocasiona o aumento dos
20 OTR, redução dos PR e ER no endométrio (87).

21 Aparentemente no CL, a expressão do PR é coordenada pela própria P_4 e o pico
22 de LH induz a expressão destes RP. Em bovinos, estão presentes no CL, nas células
23 lúteas grandes e pequenas de vacas gestantes e não-gestantes após 48 horas da ovulação,
24 no entanto, em menores quantidades quando comparadas as concentrações encontradas
25 em folículos (88).

26 O uso da técnica de RT-PCR determinou a maior expressão de RNAm para o PR
27 no tecido luteal bovino durante o estágio inicial. Houve menor expressão destes durante
28 a fase luteal tardia e após a regressão do CL (48). Porém, os níveis de RNAm
29 mantiveram-se durante a regressão luteal enquanto as células PR positivas na técnica de
30 imunocitoquímica declinaram em primatas (89).

31

32 **-OCITOCINA E RECEPTORES DE OCITOCINA**

33 Outro hormônio produzido pelo CL formado após 10 a 15 dias da ovulação é a
34 OT, um hormônio polipeptídeo produzido também pelos neurônios hipotalâmicos,

1 armazenado e liberado pela neurohipófise, relacionada às contrações uterinas peri-parto
2 e pela ejeção do leite durante a amamentação. Possivelmente, suas funções relacionam-
3 se com a luteólise por meio das PGFs (7; 48).

4 A expressão dos OTR no endométrio de bovinos é regulada pelo próprio
5 hormônio OT, pelas concentrações plasmáticas de E_2 e P_4 , e seus respectivos receptores
6 (90). As elevadas concentrações de P_4 proveniente do CL na metade da fase luteal,
7 quando há baixo nível plasmático de E_2 , acarretam gradativa redução das concentrações
8 endometriais dos ER que alcançam menores valores por volta do 17º dia do ciclo estral
9 em animais de origem taurina e zebuína (90; 74).

10 Em animais *Bos taurus taurus*, a P_4 possui efeito dominante sob o útero, pois
11 inibe a síntese de OTR na primeira metade do ciclo estral (90). Na metade da fase luteal,
12 há diminuição dos PR, o que permite a ação do estrógeno produzido pelo folículo
13 dominante e estimula a hipófise e o CL a secretar OT para ligar-se aos seus receptores
14 endometriais. A formação deste complexo hormônio-receptor desencadeia a liberação
15 de $PGF_{2\alpha}$ pelo útero, indispensável para o processo de luteólise (91).

16 Momentos antes da ovulação, as altas concentrações de E_2 secretadas pelo
17 folículo pré-ovulatório resultam no decréscimo dos OTR, e posteriormente a secreção
18 de P_4 pelo CL, insensibiliza o endométrio à OT durante os primeiros dias do próximo
19 ciclo estral (92).

20 Desta forma, os OTR variam pouco durante o ciclo estral, exceto pelo período
21 compreendido entre os dias 15 e 17, quando estão presentes em maior concentração,
22 evento relacionado com a luteólise (90).

23 24 **-PROSTAGLANDINA**

25 As PGFs são substâncias orgânicas derivadas do ácido aracônico, e estão
26 presentes em diversos tecidos e situações biológicas. Especificamente relacionadas com
27 a reprodução, de acordo com sua estrutura e função podem ser divididas em: E e F (7).
28 Em geral, provocam contrações ou relaxamento das células musculares lisas em
29 diversos órgãos. A série F, especificamente a $F_{2\alpha}$, produzida pelo endométrio, é a de
30 maior importância para a reprodução em ruminantes e está relacionada com o processo
31 da luteólise. A regressão funcional precede a regressão morfológica do CL (38).

32 Com o adjunto de fórmulas sintéticas, as aplicações exógenas de PGFs
33 permitiram a aceleração da involução uterina, a modulação da defesa uterina, e a
34 utilização em protocolos de sincronização do estro (93).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ciclo estral da fêmea bovina e a dinâmica do desenvolvimento folicular são regulados de maneira endócrina, parácrina e autócrina, por fatores angiogênicos, de crescimento, pelas gonadotrofinas, pelos hormônios esteróides e seus receptores. Apesar do grande número de estudos, ainda são desconhecidos fenômenos que interferem na eficiência reprodutiva dos animais.

O adjunto das técnicas que envolvem a biologia molecular e a compreensão dos mecanismos reguladores do ciclo estral normal permitem o esclarecimento que determinam alterações no ciclo estral bovino, como por exemplo o anestro pós-parto, a baixa eficiência reprodutiva relacionada ao uso da primeira ovulação pós-parto e a luteólise prematura do primeiro corpo lúteo, que não permite que ocorra o reconhecimento materno da gestação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Botucatu; 2008 [cited 2008 Dez 05]. Available from: <<http://www.ibge.gov.br/home/estatística/indicadores/agropecuária/produçãoagropecuária>>.
- (2) Anualpec. Anuário da Pecuária Brasileira. São Paulo: Instituto FNP, 2004. 369p.
- (3) Hafez B, Hafez ESE. Reprodução Animal. 7.ed. São Paulo: Manole, 2000.
- (4) Cunningham JG. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008, 579p.
- (5) Mann GE, Payne JH, Lamming GE. Hormonal regulation of oxytocin-induced prostaglandin F_{2α} secretion by the bovine and ovine uterus in vivo. Dom. Anim. Endocrin. 2001, 21: 127–141.
- (6) Berisha B, Pfaffl MW, Schams D. Expression of estrogen and progesterone receptors in the bovine ovary during estrous cycle and pregnancy. Endocrine, 2002, 17: 207–214.
- (7) Senger PL. Pathways to pregnancy and parturition. 2ª ed. Washington: Current Conceptions, IC, 2003, 373p.
- (8) Ginther OJ, Kastelick JP, Knopf L. Composition and characteristics of follicular waves during the bovine estrous cycle. Anim. Reprod. Sci., 1989. 20: 187-200.
- (9) Barros CM, Figueiredo RA, Papa FO, Rocha G. Follicular growth in Nelore cows (*Bos taurus indicus*) PGF_{2α} administration. J. Anim. Sci., 1993. 71: 216.

- 1 (10) Wiltbank MC, Gümen A, Sartori R. Physiological classification of anovulatory
2 conditions in cattle. *Theriogenology*, 2002. 57: 21-52.
- 3 (11) Buratini Jr. J, Teixeira ABC, Costa I, Glapinski VF, Pinto MG, Giometti IC, Barros
4 CM, Cao M, Nicola ES, Price CA. Expression of fibroblast growth factor-8 and
5 regulation of cognate receptors, fibroblast growth factor receptor-3c and -4, in bovine
6 antral follicles. *Reproduction*, 2005. 130: 343-350.
- 7 (12) Gilchrist RB, Ritter LJ, Armstrong DT. Oocyte-somatic cell interactions during
8 follicle development in mammals. *Anim. Reprod. Sci.*, 2004. 82-83: 431-446.
- 9 (13) Albertini DF, Combelles CMH, Benecchi E, Carabatsos M J. Cellular basis for
10 paracrine regulation of ovarian follicle development. *Reproduction*, 2001. 121: 647-653.
- 11 (14) Shimasaki S, Moore RK, Erickson GF, Otsuka F. The role of bone morphogenetic
12 proteins in ovarian function. *Reproduction*, 2003. 61: 323-337.
- 13 (15) Parrott, JA, Skinner MK. Kit ligand actions on ovarian stromal cells: effects on
14 theca cell. *Rec. Mol. Reprod. Develop.*, 2000. 55: 55-64.
- 15 (16) Otsuka F, Shimasaki S. A negative feedback system between oocyte bone
16 morphogenetic protein-15 and granulosa cell kit ligand: its role in regulating granulosa
17 cell mitosis. *Proc. Nat. Acad. Sci. Unit. Stat. Am.*, 2002. 89: 8060-8065.
- 18 (17) Vitt UA, Mcgee EA, Hayashi M, Hsueh AJW. In vivo treatment with GDF-9
19 stimulates primordial and primary follicle progression and theca cell marker CYP17 in
20 ovaries of immature rats. *Endocrin.*, 2000. 141: 3814-3820.
- 21 (18) Joyce IM, Clark AT, Pendola FL, Eppig JJ. Comparison of recombinant growth
22 factor-9 and oocyte regulation of Kit ligand messenger ribonucleic acid expression in
23 mouse ovarian follicles. *Biol. Reprod.*, 2000. 63: 1669-1675.
- 24 (19) Webb R, Nicholas B, Gong JG, Campbell BK, Gutierrez CG, Garverick HA,
25 Armstrong DG. Mechanisms regulating follicular development and selection of the
26 dominant follicle. *Reprod. Sup.* 2003. 61: 71-90.
- 27 (20) Silva JM, Price CA. Insulin and IGF-I are necessary for FSH-induced cytochrome
28 P450 aromatase but not cytochrome P450 side-chain cleavage gene expression in
29 oestrogenic bovine granulosa cells in vitro. *J. Endocrin.*, 2002. 174: 499-507.
- 30 (21) Nilsson E, Parrott JA, Skinner MK. Basic fibroblast growth factor induces
31 primordial follicle development and initiates folliculogenesis. *Molecular and Cellular*
32 *Endocrinology*, 2001. 175: 123-130.
- 33 (22) Fortune JE, Quirk SM. Regulation of steroidogenesis in bovine preovulatory
34 follicles. *J. Anim. Sci.*, 1998. 66: 1-8.

- 1 (23) Sartorelli ES, Carvalho LM, Bergfelt DR, Ginther OJ, Barros CM. Morphological
2 characterization of follicle deviation in Nelore (*Bos indicus*) heifers and cows.
3 *Theriogenology*, 2005. 63: 2382-2394.
- 4 (24) Ginther OJ, Wiltbank MC, Fricke PM. Selection of the dominant follicle in cattle.
5 *Biol. Reprod.*, 1996. 55: 1187-1194.
- 6 (25) Fortune JE, RIVERA GM, YANG MY. Follicular development: the role of the
7 follicular microenvironment in selection of the dominant follicle. *Anim. Reprod. Sci.*,
8 2004. 82-83: 109-126.
- 9 (26) Buratini Jr. J. Controle endócrino e local da foliculogênese em bovinos. *Rev.*
10 *Brasil. Reprod. Anim.*, 2007. 31: 190-196.
- 11 (27) Spicer LJ. Proteolytic degradation of insulin-like growth factor binding proteins by
12 ovarian follicles: a control mechanism for selection of dominant follicles. *Biol. Reprod.*,
13 2004. 70: 1223-1230.
- 14 (28) Fortune JE, Rivera GM, Evans ACO, Turzillo AM. Differentiation of dominant
15 versus subordinate follicles in cattle. *Biol. Reprod.*, 2001. 65: 648-654.
- 16 (29) Diaz FJ, Anderson LE, Wu YL, Rabot A, Tsai SJ, Wiltbank MC. Regulation of
17 progesterone and prostaglandin F_{2α} production in the CL. *Mol. Cell. Endocrin.*, 2002.
18 191: 65-68.
- 19 (30) Giometti IC, Castilho ACS, Sá Filho OG, Papa PC, Buratini Jr J. Controle local e
20 endócrino do desenvolvimento e da regressão do corpo lúteo bovino. *Ver. Bras. Reprod.*
21 *Anim.*, 2009. 33: 34-52.
- 22 (31) Niswender GD. Molecular control of luteal secretion of progesterone.
23 *Reproduction*, 2002. 123: 333-339.
- 24 (32) McCracken JA, Custer EE, Lamsa JC. Luteolysis: a neuroendocrine-mediated
25 event. *Physiol. Rev.*, 199. 79: 263-323.
- 26 (33) Bertan CM. Mecanismos endócrinos e moleculares pelos quais o estradiol estimula
27 a síntese de PGF_{2α} no endométrio de fêmeas bovinas. 2004. 180p. Tese (Doutorado em
28 Reprodução Animal) – Faculdade de medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
29 São Paulo, São Paulo, 2004.
- 30 (34) Wathes DC, Lamming GE. The oxytocin receptor, luteolysis and the maintenance
31 of pregnancy. *J. Reprod. Fert.*, 1995. 49: 53-57.
- 32 (35) Krigsfeld LJ, Silver R. The regulation of neuroendocrine function: timing is
33 everything. *Horm. Beh.*, 2006. 49: 557-574.

- 1 (36) Schillo KK. Reproductive Physiology of Mammals: from farm to field and beyond.
2 1^a ed. Delmar, Cengage Learning, Clifton Park, NY. 2009, 462p.
- 3 (37) Figueiredo RA, Barros CM, Pinheiro OL, Soler JMP. Ovarian follicular dynamics
4 in Nelore breed (*Bos indicus*) cattle. Theriogenology, 1997. 47: 1489-1505.
- 5 (38) Viana JHM, Ferreira AM, Sá WF, Fernandes CAC. Regressão luteal e dinâmica
6 folicular após luteólise natural ou induzida por cloprostenol em vacas da raça. Gir. Arq.
7 Brasil. Med. Vet. Zoot., 1999. 51: 257-262.
- 8 (39) Gimenes LU, Sá Filho MF, Madureira EH, Trinca LA, Barros CM, Baruselli PS.
9 Estudo ultra-sonográfico da divergência folicular em novilhas Nelore (*Bos indicus*).
10 Act. Scie. Vet., 2005. 33: 210.
- 11 (40) Mowa CN, Iwanga T. Differential distribution of estrogen receptor – α , β m RNAs
12 in the female reproductive organ of rats as revealed by in situ hybridization. J.
13 Endocrinol., 2000. 165: 59-66.
- 14 (41) Vallejo AN. CD28 extinction in human T cells: altered functions and the program
15 of T-cell senescence. Immunol. Rev., 2005. 205: 158–169.
- 16 (42) Rajapaksha WRAKS, Robertson L, O'shaughnessy PJ. Expression of follicle-
17 stimulating hormone-receptor RNAm alternate transcripts in bovine granulosa cells
18 during luteinization in vivo and in vitro. Mol. Cell. Endocrinol., 1996. 120: 25-30.
- 19 (43) Ginther OJ, Kot K, Kulick LJ, Wiltbank MC. Emergence and deviation of follicles
20 during the development of follicular waves in cattle. Theriogenology, 1997. 48: 75-87.
- 21 (44) Ginther OJ, Bergfelt DR, Kulick LJ, Kot K. Selection of dominant follicle in cattle:
22 establishment of follicle deviation in less than 8 hours through depression of FSH
23 concentrations. Theriogenology, 1999. 52: 1079-1093.
- 24 (45) Austin EJ, Mihm M, Evans ACO, Knight PG, Ireland JLH, Ireland JJ, Roche JF.
25 Alterations in intrafollicular regulatory factors and apoptosis during selection of follicles
26 in the first wave of the bovine estrous cycle. Biol. Reprod., 2001. 64: 839-848.
- 27 (46) Nogueira MFG, Pinto MLG, Rainho CA, Avellar MCW, Price CA, Buratini JRJ,
28 Barros CM. Expressão das isoformas do gene codificador do receptor de LH em células
29 da teca e da granulosa de folículos antrais bovinos. Act. Scie. Vet., 2005 (resumo
30 aceito).
- 31 (47) Okuda K, Uenoyama Y, Naito C, Sakabe Y, Kawate N. Luteinizing hormone
32 receptors in the bovine corpus luteum during the oestrous cycle and pregnancy. Reprod.
33 Fert. Develop., 1999. 11: 147-151.

- 1 (48) Schams D, Berisha B. Regulation of corpus luteum function in cattle – an
2 overview. *Reprod. Dom. Anim.*, 2004. 39: 241-251.
- 3 (49) Nottola SA, Macchiarelli G, Motta PM. The angioarchitecture of estrous,
4 pseudopregnant and pregnant rabbit ovary as seen by scanning electronmicroscopy of
5 vascular corrosion casts. *Cell Tis. Res.*, 1997. 288: 353–363.
- 6 (50) Greenaway J, Gentry PA, Feigi J, Lamarre J, Petrik JJ. Thrombospondin and
7 vascular endothelial growth factor are cyclically expressed in an inverse pattern during
8 bovine ovarian follicle development. *Biol. Reprod.*, 2005. 72: 1071-1078.
- 9 (51) Abramovich D, Parborell F, Tesone M. Effect of a vascular endothelial growth
10 factor (VEGF) inhibitory treatment on the folliculogenesis and ovarian apoptosis in
11 gonadotropin-treated prepubertal rats. *Biol. Reprod.*, 2006. 75: 434-441.
- 12 (52) Danforth DR, Arbogast LK, Ghosh S, Dickerman A, Rofagha R, Friedman CI.
13 Vascular endothelial growth factor stimulates preantral follicle growth in the rat ovary.
14 *Biol. Reprod.*, 2003. 68: 1736–1741.
- 15 (53) Fraser HM, Lunn SF. Angiogenesis and its control in the female reproductive
16 system. *Brit. Med. Bul.*, 2000. 56: 787-797.
- 17 (54) Jafe RB. Importance of Angiogenesis in Reproductive Physiology. *Sem. Perinat.*,
18 2000. 24: 79-81.
- 19 (55) Shimizu T, JIANG JY, SASADA H, SATO E. Changes of messenger RNA
20 expression of angiogenic factors and related receptors during follicular development in
21 gilts. *Biol. Reprod.*, 2002. 67: 1846–1852.
- 22 (56) Stouffer RL, Martinez-Chequer JC, Molkness TA, Xu F, Hazzard TM. Regulation
23 and action of angiogenic factors in the primate ovary. *Arch. Med. Res.*, 2001. 32: 567-
24 575.
- 25 (57) Jiang JY, Macchiarelli G, Tsang BK, Sato E. Capillary angiogenesis and
26 degeneration in bovine ovarian antral follicles. *Reproduction*, 2003. 125: 211–223.
- 27 (58) Kobayashi S, Berisha B, Amselgruber WM, Schams D, Miyamoto A. Production
28 and localisation of angiotensin II in the bovine early corpus luteum: a possible
29 interaction with luteal angiogenic factors and prostaglandin F_{2α}. *J. Endocrinol.*, 2001.
30 170: 369-380.
- 31 (59) Celik-Ozenci C, Akkoyunlu G, Kayisly UA, Arici A, Demir R. Localization of
32 vascular endothelial growth factor in the zona pellucid of developing ovarian follicles in
33 the rat: a possible role in destiny of follicles. *Histochem. Cell Biol.*, 2003. 120: 383–
34 390.

- 1 (60) Conley A, Hinshelwood M. Mammalian aromatases. *Reproduction*, 2001. 21: 685-
2 695.
- 3 (61) Rosenfeld CS, Wagner JS, Roberts RM, Lubahn DB. Intraovarian actions of
4 oestrogen. *Reproduction*, 2001. 122: 215-36.
- 5 (62) Nett TM, Turzillo AM, Baratta M, Rispoli L. A. Pituitary effects of steroids
6 hormones on secretion of follicle-stimulating hormone and luteinizing hormone. *Dom.*
7 *Anim. Endocrinol.*, 2002. 23: 33-42.
- 8 (63) Vasconcelos JLM, Santos RM, Perez GC. Estratégias para aumentar a eficiência
9 reprodutiva em bovinos de corte. Botucatu, 2008 [cited 2008 Jan 22]. Available from:
10 <http://www.agripoint.com.br/cursos>.
- 11 (64) Taya K, Kaneko H, Takedomi T, Kishi H, Watanabe G. Role of inhibin in the
12 regulation of FSH secretion and folliculogenesis in cows. *Anim. Reprod. Sci.*, 1996. 42:
13 563-70.
- 14 (65) Bley MA, Saragüeta PE, Barañao JL. Concerted stimulation of rat granulosa cell
15 deoxyribonucleic acid synthesis by sex steroids and follicle-stimulating hormone. *J.*
16 *Steroid Biochem. Mol. Biol.*, 1997. 62: 11-19.
- 17 (66) Berisha B, Schams D, Kosmann M, Amselgruber W, Einspainer R. Expression and
18 localization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth
19 factor (FGF-2) during the final growth of bovine ovarian follicles. *J. Endocrinol.*, 2000.
20 167: 371-382.
- 21 (67) Ginther, OJ, Beg MA, Bergfelt DR, Donadeu FX, Kot K. Follicle selection in
22 monovular species. *Biol. Reprod.*, 2001. 65: 638-647.
- 23 (68) Cupp AS, Stumpf TT, Kojima FN, Werth LA, Wolfe MW, Boberson MS, Kittok
24 RJ, Kinder JE. Secretion of gonadotropins changes during the luteal phase of the bovine
25 oestrous cycle in the absence of corresponding changes in progesterone or 17 β -
26 oestradiol. *Anim. Reprod. Sci.*, 1995. 37: 109-119.
- 27 (69) Bergfeld EG, Kojima FN, Wehrman ME, Cupp AS, Mariscal VE, Sanchez TE,
28 Kittok R, Garcia-Windr M, Kinder JE. Frequency of luteinizing hormone pulses and
29 circulating 17 β -estradiol in cows is related to concentration of progesterone in
30 circulation when the progesterone comes from either an endogenous or exogenous
31 source. *Anim. Reprod. Sci.*, 1995. 37: 257.
- 32 (70) Vallet JL, Lamming GE, Batten M. Control of endometrial oxytocin receptor and
33 uterine response to oxytocin by progesterone and oestradiol in the ewe. *J. Reprod. Fert.*,
34 1990. 90: 625-634.

- 1 (71) Zhang J, Weston PG, Hixon JE. Role of progesterone and oestradiol in the
2 regulation of uterine oxytocin receptors in ewe. *J. Reprod. Fert.*, 1992. 94: 395-404.
- 3 (72) Lau TM, Kerton DJ, Gow CB, Fairclough RJ. Role of progesterone in the control
4 of endometrial oxytocin receptors at luteolysis in sheep. *J. Reprod. Fert.*, 1993. 9: 229-
5 233.
- 6 (73) Walker DL, Weston PG, Hixon JE. Influence of estradiol and progesterone
7 withdrawal on the secretion of and the temporal correlation between pulses of oxytocin
8 and prostaglandin F₂ α in ewes. *Biol. Reprod.*, 1997. 56: 1228-38.
- 9 (74) Martin I, Torres Neto R, Oba E, Buratini Jr. J, Binelli M, Laufer-Amorim R,
10 FERREIRA JCP. Immunohistochemical detection of receptors for oestrogen and
11 progesterone in endometrial glands and stroma during the oestrus cycle in Nelore (*Bos*
12 *taurus indicus*) cows. *Reprod. Dom. Anim.*, 2008. 43: 415-421.
- 13 (75) Kuiper GGJM, Lemmen JG, Carlsson B, Corton JC, Safe SH, Van Der Saag PT,
14 Van Der Burg B, Gustafsson JA. Interaction of estrogenic chemicals and phytoestrogens
15 with estrogen receptor β . *Endocrinology*, 1998. 139: 4252-4263.
- 16 (76) Mosselman S, Polman J, Dijkma S. E β R: identification and characterization of a
17 novel human estrogen receptor. *Febs Lett.*, 1996. 392: 49-53.
- 18 (77) Boos A, Meyer W, Schwarz R, Grunert E. Immunohistochemical assessment of
19 oestrogen receptor and progesterone receptor distribution in biopsy samples of the
20 bovine endometrium collected throughout the oestrous cycle. *Anim. Reprod. Sci.*, 1996.
21 44: 11-21.
- 22 (78) Couse JF, Lindzey J, Grandien K, Gustafsson JA, Korach KS. Tissue distribution
23 and quantitative analysis of estrogen receptor- α (ER α) and estrogen receptor- β (ER β)
24 messenger ribonucleic acid in the wild-type and er α -knockout mouse. *Endocrinology*,
25 1997. 138: 4613-4621.
- 26 (79) Lima SRS. Ginecomastia. 2008. 56p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
27 Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Portugal.
- 28 (80) Gudermann T, Birnbaumer M, Birnbaumer L. Evidence for dual coupling of the
29 murine luteinizing hormone receptor to adenylyl cyclase and phosphoinositide
30 breakdown and Ca²⁺ mobilization. *J. Biol. Chem.*, 1992. 267: 4479-4488.
- 31 (81) Myamoto A, Shirasuna K, Sasahara K. Local regulation of corpus luteum
32 development and regression in the cow: impact of angiogenic and vasoactive factors.
33 *Dom. Anim. Endocrinol.*, 2009. 37: 159-169.

- 1 (82) Sartorius CA, Melville MY, Hovland AR, Tung L, Takamoto GS, Horwitz KB. A
2 third transactivation function (AF3) of human progesterone receptors located in the
3 unique N-terminal segment of the B-isoform. *Mol. Endocrinol.*, 1994. 8: 1347-1360.
- 4 (83) Pieber D, Allport VC, Hills F, Johnson M, Bennett PR. Interactions between
5 progesterone receptor isoformas in myometrial cells in human labour. *Mol. Hum.
6 Reprod.*, 2001. 7: 875-879.
- 7 (84) NUNES, C. B. Estudo imunoistoquímico comparativo entre seis anticorpos anti-
8 HER2 em arrays de carcinomas mamários: correlação com hibridação in situ
9 cromogênica e avaliação interobservador. Belo Horizonte, 2007. 97p. Dissertação
10 (Mestrado) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
11 Horizonte, 2007.
- 12 (85) Fujimoto J, Ichigo S, Hirose R, Sakaguchi H, Tamaya T. Clinical implication of
13 expression of progesterone receptor form A and B RNAs in secondary spreading of
14 gynecologic cancers. *J. Steroid Biochem. Mol. Biol.*, 1997. 62: 449-454.
- 15 (86) Clarke CL, Southerland RL. Progesterone regulation of cellular proliferation. *Endoc.
16 Review*, 1990. 11: 266-301.
- 17 (87) Cassar CA, Dow MPD, Pursley JR, Smith GW. Effect of the preovulatory LH
18 surge on bovine follicular progesterone receptor RNAm expression. *Domestic Animal
19 Endocrinology*, 2002. 22: 179-187.
- 20 (88) Van Den Broeck W, D'haeselleer M, Coryn M, Simoens P. Cell-specific
21 distribution of progesterone receptors in the bovine ovary. *Reprod. Dom. Anim.*, 2002.
22 37: 164-170.
- 23 (89) Duffy DM, Stouffer RL. Progesterone receptor messenger ribonucleic acid in the
24 primate corpus luteum during the menstrual cycle: possible regulation by progesterone.
25 *Endocrinology*, 1995. 136: 1869-1876.
- 26 (90) Mann GE, Lamming GE. Timing of prostaglandin F_{2α} release episodes and
27 oxytocin receptor development during luteolysis in the cow. *Anim. Reprod. Sci.*, 2006.
28 93: 328–336.
- 29 (91) Razandi M, Pedran A, Greene GL, Levin ER. Cell membrane and nuclear estrogen
30 receptors (Ers) originate from a single transcript: studies of EαR and Eα expressed in
31 Chinese Hamster ovary cells. *Mol. Endocrinol.*, 1999. 13: 307-319.
- 32 (92) Lamming GE, Mann GE. Control of endometrial oxytocin receptors and
33 prostaglandin F_{2α} production in cows by progesterone and oestradiol. *J. Reprod. Fert.*,
34 1995. 103: 69-73.

- 1 (93) Lewis GS. Steroidal regulation of immune defenses. *Anim. Reprod. Sci.*, 2004. 82:
- 2 281-294.