REVISTA DOS CRIADORES

NESTE NUMERO

- AS COMEMORAÇÕES DO IV CENTENÁRIO DE S. PAULO, NO SETOR DA PECUARIA
- A FAZENDA LEITEIRA
- XV EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA
- SEÇÃO JURIDICA — COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS
- ECONOMIA — A SITUAÇÃO NÃO É CALAMITOSA, É DE RECUPERAÇÃO
- A INDUSTRIA LEITEIRA NO ESTADO DE SAO PAULO
- ADUBAÇÃO DA LARANJEIRA

As **RAÇÕES AVISCO** são perfeitamente balanceadas; não só aumentam consistentemente a produção como nutrem o animal, proporcionando crias fortes e saudáveis. **AVISCO** é também a ração ideal para Touros, Novilhas e Aleitamento Artificial.

Avisco - Avicultura Comércio e Indústria S/A.
Rua Artur Azevedo, 1643/47 - C. P. 6.920 - Telefone 80-4114 - São Paulo

UMA ORGANIZAÇÃO DE CRIADORES PARA CRIADORES

DIRETOR-RESPONSÁVEL

Luz A. Penna

COLABORADORES ESPECIALIZADOS

Dr. Fldelis Alves Netto
Dr. José de Assis Ribeiro
Dr. Henrique Raimo
Dr. Rolando Lemos

REPRESENTANTE NO DISTRITO FEDERAL

Mario Land Ferreira Lima
Rua Paulo Barreto, 69
Tel.: 46-0589

VENDA AVULSA NO DISTRITO FEDERAL

José Fico
Rua da Constituição, 36 — 2.º.

CORRESPONDENTE EM MOÇAMBIQUE

José Antonio Cardoso Vilhena
Médico Veterinário

REDAÇÃO

Rua Senador Feijó, 30 - s/loja
Tel.: 35-7962

Endereço telegrafico:
«CRIADORES»

SÃO PAULO — Brasil.

ASSINATURAS

1 ano	Cr\$ 100,00
1 ano (sob registro postal)	Cr\$ 106,00
Semestre	Cr\$ 60,00
Numero avulso	Cr\$ 10,00
Numero atrasado	Cr\$ 12,00

Revista dos Criadores

ORGÃO OFICIOSO DA ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS

ANO XXIV

OUTUBRO - 1953

NUMERO 10

SUMARIO

As comemorações do IV Centenário em S. Paulo, no setor da pecuária	2
A Fazenda Leiteira — Clarence H. Eckles, Ernest L. Anthony e Leroy S. Palmer	4
Biologia do Berne	5
Um touro chelo de glórias — Jan de Bozun conta sua historia	8
Queijo ricota ou queijo de albumina — José de Assis Ribeiro	10
Os bufalos de Marajó	12
XV Exposição Agropecuária e Industrial de Juiz de Fora	18
Carne congelada para abastecimento publico — P. Mucicelo	24
Avicultura — A fertilização dos ovos — Henrique F. Raimo	26
Secção jurídica — Compensação de dividas — Rolando Lemos	28
Economia — A situação não é calamitosa: é de recuperação — Brenno Ferraz do Amaral	29
O cultivo da alfafa no Rio da Prata	30
O bezerro recém-nascido	31
A industria leiteira no Estado de S. Paulo — José de Assis Ribeiro, Oswaldo D. Soldado e Carlos Scalzo Filho ..	32
O mundo em foco — Eduardo del Campo	34
Higiene rural — O que se deve saber sobre a verminose — G. P.	38
Criação de cabritos — Coriolano Caldas Filho	43
Adubação da laranjeira — Herculano de Godoy Passos ..	45
Bibliografia	46
Fabricação de embutidos	47
Influencia do meio ambiente na vida dos animais	50
Pecuaria do mes	52
Registro genealogico das raças suínas	54
Instantaneos rurais	57
Viveiros de café — condições para boa localização	58
Cotações do mercado de carnes e derivados	61
Mercado de laticínios	63
Relatório n.º 105 do Serviço de Registro Genealogico da A. P. C. B.	64

NOSSA CAPA

Ilustra a capa da presente edição o esplendido conjunto Gir, que se sagrou CAMPEÃO DA RAÇA no grande certame de Barra do Pirai. A partir da esquerda: GRAN-FINA, notavel reprodutora que obteve, individualmente, o titulo de CAMPEÃ DA RAÇA; INDIA, filha do magnifico raçador IMPERADOR; DIAMANTINA e, finalmente, DITADOR, que conquistou o titulo de campeão da raça no certame.

Sobre o plantel das FAZENDAS REUNIDAS PACIENCIA, ao qual pertencem finísimos exemplares, publicamos ampla reportagem ilustrada nas paginas do centro da presente edição.

Resta-nos apresentar ao SR. ANTONIO DE PAULA AFFONSO, proprietário desse modelar estabelecimento de criar, os nossos cumprimentos pelo exito alcançado na 8.ª Exposição de Barra do Pirai.

As comemorações do IV Centenario de São Paulo no Setor da Pecuaria

Estão praticamente estabelecidos os planos para as comemorações do IV Centenario de S. Paulo no setor da pecuaria. Após absoluto desinteresse e lamentavel descuido da Comissão Central de Festejos, jaz-se alguma luz na questão, unicamente porque os criadores, preocupados com a incerteza reinante, resolveram tomar a iniciativa. Infelizmente, porém, essa iniciativa veio muito tarde; o que está programado não condiz com os desejos dos criadores, representados por suas associações de registro genealógico e, o que é pior, já não se admitem modificações, ou não é mais possível modifica-lo.

As dificuldades começaram a surgir com a organização da segunda comissão de festejos, a qual, ao contrario da que foi dissolvida, já não conta com elementos relacionados com assuntos de pecuaria. Ademais, dificuldades financeiras, problemas de verbas puzeram em perigo a realização do plano de reformas do recinto da Agua Branca, não obstante a data e o plano da exposição estivessem firmados de ha muito! Houvera apenas temor de anuncia-la, fosse porque perigasse a reforma daquele proprio, fosse porque os criadores não tivessem sido ouvidos no momento oportuno. Assim é que, pelo que pôde ser apurado, está definitivamente fixada, com poucas probabilidades de alteração, a realização de uma exposição unica no recinto da Agua Branca, com carater internacional e nacional, na primeira quinzena de Abril de 1954.

As razões apresentadas para a marcação de tal data e a consequente impossibilidade de altera-la decorrem da fixação de datas para outros festejos do ano e da escolha da mesma epoca para a realização conjunta do Congresso Pan-Americano de Veterinaria, já anunciado. Como a exposição de 1954 deverá ter carater nacional, pois levada a efeito em colaboração com o Ministerio da Agricultura, julgam os responsáveis de São Paulo ser impossível alterar o programa do convenio, razão pela qual se decidiram pela exposição unica, não obstante a data marcada não seja muito favoravel para o recebimento dos recursos financeiros da União destinados a esse fim.

Como se vê, doravante nada mais será possível fazer para que a pecuaria nacional tenha condigna participação no IV Centenario. O recinto da Agua Branca, que há muitos anos se mostra pequeno para conter a um só tempo representações de animais de todas as espécies e raças do País todo, terá agora que receber, possivelmente, animais também de outros países. E' quasi certo que sofra alterações, com o objetivo de aumentar sua capacidade, na proporção de 10 ou 02%, na parte destinada a bovinos — e não se admirará se tudo for improvisado.

Desde já, devem os criadores paulistas munir-se de paciencia e se conformar com os costumeiros e inevitaveis côrtes, pois não haverá lugar para representação numerosa. Os representantes das associações de registro genealógico sugeriram a realização de duas exposições: bovinos de raça leiteira em Maio e bovinos de raça de corte em Setembro, mas essa idéia terá que aguardar melhor oportunidade. Em 1955, depois de reformado o recinto, depois de realizada alguma nova exposição nacional e, desde que não sobrevenham ou não sejam criadas outras dificuldades, talvez essa aspiração dos criadores paulistas possa ser levada a efeito. Ai, então, S. Paulo poderá realizar exposições de animais à altura de seu progresso com o realce desejado.

S A L — p/ criação — "Kodex" grasso, quireira e moído — Importação direta (marca registrada).

ARAME — para cercas, farpado "Chavantes", liso, oval, aço — extra-resistencia — "Catieland Wire" — (marca registrada) — incomparavel para cercas de criação (n. exclusividade).

- GRAMPOS — p/ cerca — Carrapato — (n. exclusividade) — Pás de ponta e Ferros de pua para cercas.
- FIVELAS — Veda-tudo, p/ balancim e armar tela no local.
- INSETICIDAS — Arseniato de Chumbo e Rhodiatox p/ combater pragas de algodão, mascaras, polvilhadeiras.
- CREOLINA — Pearson, Bichol, Aphtal (p/ Afosa), Motaberne, Benzofenol Azul, Vacinas, Seringas Vet., etc.
- ALICATES — p/ marcar orelha de bezerras e torquezas cast.
- FORMICIDA — Blenco — Apar. portátil (comprovada eficiencia) mator formigas, Imunizantes — Carbalunium etc.
- ARADOS — Semeadeiras, Carpadeiras, Desmatadeiras, Engenhos — Stomato, mainhos para quireiras, etc.
- MACHADOS — Collins, Foices, Enxada, Enxadões, Serrotes, Ancinhos, etc.
- SEMENTES — Alfafa, Colonião, Gorduro (roxo e cabelo negro), Jaraguá, farinha de osso.
- ENCERADOS — "Chavantes" — Todos os tamanhos e para todos os fins, sacos de colheitos.
- TELHAS — Onduladas p/ coberturas — refratarias ao calor, Caixas d'agua, Canos, Ferros para construções, Cimento.
- MATERIAL ELETRICO — Enceradeiras, Liquidificadores — Painéis de pressão, Talheres (faqueiros), Lanternas, Pilhas, lampadas, fios electricos, etc.

SOCIEDADE COMERCIAL S. PAULO-M. GROSSO

S. PAULO — Rua S. Bento, 484 - 2.º andar
Fones 33-4053 e 33-1548
ARAÇATUBA — Osvaldo Cruz, 42
Fone 330
CAMPO GRANDE — 14 de Julho, 668
Fone 146
Teleg. KADEZ — Firma de fazendeiros para fazendeiros diretamente ao consumidor.
Preços especiais.

RAÇÕES DE COMPLEMENTO (proteicas)

MELATORTA — F

COMPONENTES	ANALISE	
Melaço concentrado	Humidade	10,00
Torta de babaçu	Materia seca	90,00
Sal	Proteína	16,65
Pó Calcareo	Materia graxa	1,42
Farinha de ossos	Extrativos Não Azot.	58,15
	Fibra	6,53
	Materia mineral	7,25
	P	0,66
	Ca	1,06

Ton.: Cr\$ 1.730,00

MELATORTA — G

COMPONENTES	ANALISE	
Melaço concentrado	Humidade	10,99
Torta de babaçu	Materia seca	89,01
Sal	Proteína	14,20
Pó Calcareo	Materia graxa	2,30
Farinha de ossos	Extrativos Não Azot.	51,38
	Fibra	12,99
	Materia mineral	8,14
	P	0,89
	Ca	1,14

Ton.: Cr\$ 1.680,00

MELATORTA — H

COMPONENTES	ANALISE	
Melaço concentrado	Humidade	10,94
Torta de babaçu	Materia seca	89,06
Sal	Proteína	13,67
Pó Calcareo	Materia graxa	2,30
Farinha de ossos	Extrativos Não Azot.	52,01
	Fibra	12,92
	Materia mineral	8,16
	P	0,86
	Ca	0,91

Ton.: Cr\$ 1.630,00

Estes preços são para mercadoria posta na Usina Piracicaba-Industrias Anexas, sem a sacaria, que poderá ser facultativamente fornecida pelo cliente. Para compras inferiores a 500 quilos, haverá sobre os preços acima um acrescimo de 5%.

SOCIÉTÉ SUCRERIES BRESILIANNES
USINA PIRACICABA -- PIRACICABA -- C. P.

Laboratorio Paulista de Biologia

novos brotos da velha arvore

produtos veterinarios

O LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA S/A

coloca a disposição
dos médicos veterinários
sua nova linha
veterinária, na
campanha de defeza
do patrimonio pecuário
que é
incontestavelmente
uma das fontes da
riqueza nacional.

VITAMINA "C" VETERINÁRIA LPB - 4g = 80.000 U. I. por ampola de 20cc.

FERROHEPATINA VETERINÁRIA (insuficiência hepática, convalescença e depauperamento orgânico) ampolas de 10cc. em solução de 2% - citrato de ferro amoniacal e extrato de fígado proteolizado.

VITAMINA "B1" VETERINÁRIA LPB - 240mg = 80.000 U. I. por ampola de 10cc.

CYTOSAN VETERINÁRIO (cacodilato de sódio, citrato de ferro amoniacal e sulfato de estriquina) indicado para os animais fracos, reprodutores e cavalos de corrida. Ampolas de 10cc.

DEPARTAMENTO DE PROPAGANDA DO

LABORATÓRIO PAULISTA DE BIOLOGIA S/A

RUA SÃO LUIZ, 161 — CAIXA POSTAL, 8.086 — TELEFONE: 35-3141 — SÃO PAULO — BRASIL

A FAZENDA LEITEIRA

(Dairy Farming — Clarence H. Eckles, Ernest L. Anthony e Leroy S. Palmer — E. U. A. — 1950) — Gado Holandês, "Holstein-Friesian" ou Frisio-Holandês

Origem e distribuição na Europa — Esta raça é originária da Holanda, mais especialmente da província da Frísia (Friesland) na parte Norte do país. Não é, como o nome poderia indicar, nativa do ducado de Holstein, província do Norte da Alemanha. O nome composto "Holstein-Friesian" é a designação oficial da raça na América do Norte, resultado da união da Associação de Criadores "Holstein" com a Associação "Dutch Friesian" em 1885. O nome comum, agora, nos Estados Unidos é Holstein para os animais desta raça (Holandesa).

O ancestral da raça é o "Bos primigenius". A Holandesa é uma das mais velhas raças. Referências históricas indicam que esta raça vem sendo criada, na mesma região atual, desde há 2.000 anos, tendo sido, possivelmente, evitada a introdução de sangue estranho. Desde os tempos de Cesar que a região ora conhecida por Holanda, era famosa por seu gado. Esta reputação foi mantida e, durante os últimos séculos, este gado foi quase o negócio exclusivo do fazendeiro holandês. Ainda hoje, os cuidados para com as vacas, com o cultivo de forragens e com o preparo de alimentos para elas, bem como o beneficiamento e a industrialização do leite, monopolizam as atividades do fazendeiro.

Influência em outras raças — A "Holstein-Friesian" é a raça mais desenvolvida nas suas regiões de origem, a província da Frísia, através do Zuyder Zee, na Holanda do Norte. O gado holandês, entretanto, é muito distribuído por todos os países da Europa do Norte, indo até a Rússia. Nos séculos XVII e XVIII, foi levado à Inglaterra, participando da formação da raça Shorthorn (na qual há a variedade leiteira). É também aceita por grandes autoridades a observação de que o sangue holandês

foi um dos fatores importantes na formação dos rebanhos iniciais da raça Ayrshire.

Condições na Holanda — Grande parte da Holanda vive quase inteiramente abaixo do nível do mar, situação que é mantida graças a enormes diques. A terra é muito fértil e quase exclusivamente usada para pastagens. Os fazendeiros, que são quase sempre rendeiros, pagam cerca de 30 dólares (perto de Cr\$ 1.400,00 ao câmbio negro atual) pelo aluguel anual de um acre. A terra, para ser comprada, é avaliada à razão de 800 a 2.000 dólares por acre (35 a 85 mil cruzeiros o alqueire!)

Em nenhuma outra parte do mundo, a vaca recebe trato mais carinhoso do que na Holanda. No início de outubro, o gado permanece no estabulo, que frequentemente, é separado somente por uma porta da sala de estar da residência da família do fazendeiro. Assim permanece até princípios de maio. Os estabulos e as vacas são mantidos em condições superiores à crítica, do ponto de vista higiênico e sanitário. Se um animal se suja com excremento, é logo lavado e enxugado cuidadosamente. O alimento é principalmente feno e silagem, com pequeno acréscimo de farelos de linhaça ou de outras oleaginosas. No verão, o gado é mantido nas pastagens e não é trazido ao estabulo. Rotação das pastagens é a prática comum, tendo a Holanda as melhores pastagens do mundo. É comum a ordenha no campo, evitando a fadiga das vacas, no caminho até o estabulo. Quando há vento frio, as vacas são cobertas por manto quente, no pasto. Grandes cuidados são tomados, principalmente na manutenção dos melhores animais. Dadas as restrições normais, somente poucos touros e cerca de 1/5 das novilhas são conservados, e destas, somente as mais leiteiras. Os be-

zerros excedentes são vendidos ao matadouro, como vitelos, e as vacas, em geral, são abatidas dos 8 aos 9 anos, depois de atingida a produção máxima. Na Frísia, o leite é empregado largamente na fabricação da manteiga; no Norte da Holanda, a maior produção é de queijos. Não é possível apontar as consequências da ocupação germanica na II.ª guerra mundial, sobre a indústria leiteira nesta região, tais as proporções do descalabro.

Importação e distribuição na América do Norte — O Holstein foi importado pela América em 1795, mas, não eram puros, esses animais. A primeira importação de sangue considerado puro foi feita em Massachusetts, em 1861. Foi relativamente pouco o gado trazido antes de 1875, mas, dessa data a 1885, cerca de dez mil cabeças foram importadas, delas descendendo muitos dos atuais melhores animais holandeses da América. A princípio a "Holstein-Friesian Association" registrou poucos animais, devido aos surtos de aftosa na Holanda, razão por que os animais ficavam de quarentena durante 35 dias. Atualmente, há cerca de 500.000 animais holandeses registrados nos Estados Unidos. Os cinco principais Estados são: Nova York, Wisconsin, Pensilvânia, Ohio e Michigan. A criação no Sul do país é limitada. Ha zonas inteiras, em Nova York e Wisconsin, onde poucas vacas leiteiras de outra raça podem ser encontradas.

Associações de criadores — A primeira associação conhecida por "Associação do Herb-Book Holstein" foi organizada em 1873. Cinco anos depois, criava-se a Associação "Dutch Friesian" da América. Em 1885, as duas se uniram, sob o nome de Associação Holstein-Friesian. Os registros aumentaram rapidamente de 1900 a 1920. Em 1930 existiam cerca de 650 mil Holstein

HIPERFOSFATO

O ADUBO IDEAL

porque não se perde por infiltração no solo, levado pelas águas pluviais.

puros nas fazendas dos associados. Só em 1937 registraram-se 16.687 machos e 62.421 fêmeas. Já em 1938, o total de animais registrados era de 2.722.655, sendo de touros a sua terça parte.

Tamanho e tipo — A Holstein é a raça leiteira de animais de maior porte. O peso desejável nas vacas adultas é de 600 kg, indo os limites de 500 a 820 kg. Os touros variam de 820 a 1.000 kg, raramente atingindo 1.150 kg, mais. Nos últimos anos tem havido preferência pelos tipos grandes, porque as vacas recordistas em produção estavam acima da média do tamanho da raça: algumas pesavam 820 a 910 kg!

Tipo americano versus tipo holandês — A média do gado desta raça, como se encontra na Holanda, mostra características de animal de corte, ao passo que o tipo preferido na América do Norte é o leiteiro. O fazendeiro holandês vende sua vaca para o matadouro, onde alcança melhor preço, quando ainda não seja muito velha, e o vitelo é aproveitado também, para o consumo. Por estas razões, prefere animais retacos, menos angulosos e mais curtos e cheios de carne. Daí a insistência em manter no rebanho holandês a capacidade de produzir carne. O Holstein na América é criado especialmente para a produção de leite, não se preocupando os criadores com o aproveitamento da carne. Daí a predominância das características leiteiras, preferindo-se animais mais finos, mais angulosos e mais compridos.

BIOLOGIA DA MOSCA DO BERNE

(*Dermatobia homini*) observada em todas as suas fases

Da "Memoria Historica do Instituto Butantan", de Vital Brasil, publicada em 1941, exemplar gentilmente cedido pelo dr. Demetrio de Toledo, medico e fazendeiro em Amparo, extraímos a seguinte instrutiva pagina:

Em 1917, começaram as interessantes investigações que não só confirmavam os fatos anteriormente estabelecidos por Morales, Gonzalez Rincones e outros, como completaram-nos, esclarecendo definitivamente a biologia da mosca do berne, cujo ciclo evolutivo foi, pela primeira vez, conseguido no laboratorio, de adulto a adulto. O sumario aqui consignado condensa as observações feitas pelo dr. Arthur Neiva

e pelo dr. João Florencio Gomes, autores deste trabalho:

1 — A *Dermatobia hominis* pode viver em condições artificiais, n'uma camara humida, durante 19 dias. Os casais copulam varias vezes por dia; a primeira

cópula da-se durante as 24 horas que seguem à sua saída dos casulos. A *Dermatobia* não começa a desovar senão no 7.º dia, ainda que seja posta em contato com o macho, desde o segundo dia de vida. Se a aproximação sexual só se der no 15.º dia da vida adulta da fêmea, as posturas começam cerca de 48 horas depois da cópula.

2 — A *Dermatobia* efetua as suas posturas diretamente sobre os dipteros. Para encontrar estes insetos, frequenta os equideos e os ruminantes, que são assiduamente visitados por moscas silvestres e culicideos, nos capões ou bosques e nas matas, que constituem o habitat da mosca do berne. Quando esses dipteros se aproximam do lugar onde ela está pousada no couro do animal, ela os agarra, voa com a presa e, librando-se no ar, deposita-lhe num lado do abdome um cacho de ovos, que se mantêm fortemente aderentes graças a um inducto que os envolve e que se solidifica rapidamente. A *Dermatobia* pode realizar varias posturas; em cativo, um espécime poz 182 ovos, distribuidos em posturas parceladas sobre 4 moscas domesticas. Dois exemplares capturados sobre cavalos, no momento em que tentavam agarrar insetos, puzeram de 376 a 396

SNR. CRIADOR: vacine seus animais com as

VACINAS MANGUINHOS

- ★ CONTRA A PESTE DA MANQUEIRA (carbúnculo sintomático)
- ★ ANTICARBUNCULOSA (carbúnculo hemático, verdadeiro)
- ★ CONTRA A PNEUMO-ENTERITE DOS BEZERROS
- ★ CONTRA A PNEUMO-ENTERITE DOS PORCOS

PEÇA AO SEU REVENDEDOR

PRODUTOS VETERINARIOS MANGUINHOS LTDA. - C. P. 1420 - RIO DE JANEIRO

Associação Paulista de Criadores Bovinos

25 ANOS DE BONS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CRIADORES

DIRETORIA

Presidente
Dr. João de Moraes Barros
Vice-Presidente
Dr. João Baptista Lara
1.º Secretário
Dr. Bernardo Gavião Monteiro
2.º Secretário
Dr. Osni da Silva Pinto
1.º Tesoureiro
José C. Moraes
2.º Tesoureiro
Paulo Eduardo de Souza

DIRETOR-GERENTE

Dr. Arnaldo de Camargo

CONSELHO CONSULTIVO

Dr. Mario Masagão
Dr. Lafayette Alvaro de Souza
Camargo
Eliseu Teixeira de Camargo
Dario Freire Meirelles
Antonio Calo da Silva Ramos
Orlando Barros Pereira
Dr. Naur Martins
A. Antony Assumpção
Carlos Alberto Willy Auerbach

SUPLENTES

Cel. José Rezende Meirelles
Dr. Pio de Almeida Prado
Dr. Francisco Pereira Lima
Dr. Fernando Leite Ferraz
Alberto Ferraz
Dr. Franklin Siqueira

MEDICOS VETERINARIOS

Dr. Celso de Souza Meireles
Dr. Walter Batiston

TÉCNICOS

LEITE E DERIVADOS
E CONTROLE LEITEIRO
Dr. Fidélis Alves Netto
AVICULTURA
Dr. Henrique Raimo
GERENTE COMERCIAL
Virgílio de Almêida Penna

Rua Senador Feijó, 30 — Telefones: 32-3832 e 32-6429 — SÃO PAULO

ovos em 16 posturas efetuadas sobre muscideos e sobre as paredes do recipiente.

3 — Na America Central e na Venezuela, o diptero encontrado como portador destes ovos tem sido apenas o *Psorophora (Janthinosoma) lutzi*. Nós verificamos no Estado de São Paulo (Brasil) que o *Psorophora posticus J. musica in Peryassu* é muito maior numero de vezes; varias especies de muscideos frequentadoras de animais tambem veiculam os ovos de *Dermatobia*. Os habitos desses insetos permitem às larvas provenientes desses ovos porem-se em contato, seguramente, com a pele de vertebrados de sangue quente.

4 — As posturas sobre folhas, assim como sobre animais, sobre a terra e, experimentalmente sobre o papel e as paredes de vidro do recipiente, têm a explicação seguinte. Num dado momento para a femêa fecundada, a necessidade de realizar uma postura torna-se irremediável; se lhe escapa então o inseto que tentou agarrar, ela desova onde poussa.

Conservadas em camara humida, estas posturas podem dar

larvas; fóra desta condição, os ovos murcham e esterilizam-se.

E' muito provavel que tenham ordinariamente o mesmo fim os ovos que na natureza não sejam depositos sobre insetos.

5 — Os ovos começam a fornecer larvas cerca de uma semana depois da postura. Estas larvas, que medem 1 mm 6 de comprimento, permanecem no interior do ovo até que o diptero veiculador pouse num vertebrado de sangue quente; então, elas abandonam os ovos, passando à pele, onde penetram em 5 ou 10 minutos. Quando o diptero veiculador se afasta do animal, as larvas que não abandonaram completamente os ovos, voltam para o seu interior, fechando-se o operculo.

Estas tentativas podem repetir-se varias vezes diariamente; assim, podem as larvas resistir durante 20 dias sem penetrar na pele de animais. Esta penetração não depende da existencia de solução de continuidade na pele.

6 — Muitos mamiferos são susceptiveis ao berne, particularmente o boi e o cão; o homem é frequentemente infestado, em varias regiões do Brasil. A dura-

ção do periodo larval no cão é bastante variavel, parecendo depender da temperatura exterior; ela foi de 31 a 41 dias numa serie de experiencias, e de 64 a 74 em outra. Pesando-se a larva no dia em que abandona o hospedeiro, pode-se prever o sexo da imagem, em que vão transformar-se. As larvas maduras de mais de 0 gr. 600 dão imagens femêas.

7 — A duração do periodo ninfal é tambem muito influenciada pela temperatura. Na estufa, a 23 - 25 graus, ela foi de 34 dias; no laboratorio, durante o inverno (12 a 18 graus durante o dia) durou 78 dias.

O casulo, que se abre por um operculo, situado lateralmente na extremidade anterior, dá ordinariamente a imagem nas horas mais quentes do dia.

8 — Nestas experiencias, toda a vida da *Dermatobia*, desde o ovo (dia da postura) até a morte da imagem, durou de 120 a 141 dias. Parte da evolução destes especimes deu-se durante o verão e parte durante o inverno, o que permite tomar estas cifras como a média da vida da *Dermatobia* no Estado de São Paulo.

CARRETA AGRÍCOLA

FORTRAC

- tôda de ferro e aço,
feita para os serviços pesados
da fazenda!

É o mais útil veículo numa fazenda! É poderosamente reforçado e transforma-se rapidamente na carreta do tipo desejado. Especialmente construída para terrenos irregulares, a Carreta FORTRAC é tracionada sem dificuldades em carreadores, caminhos e campos de cultura.

- Chassi com distância variável entre eixos
- Conversão para reboque de 2 rodas
- Sistema de direção idêntico ao de automóvel
- Freios hidráulicos, com dispositivo de segurança
- Rodas reforçadas, montadas sobre rolamento de esferas
- Engate traseiro para outras carretas
- Suportes para fixação da carroceria
- Eixo tubular telescópico de grande flexibilidade
- 6.000 quilos de carga máxima, com pneus 7.50x16

Pode-se usar na carreta a carroceria "standard", que presta os mais variados serviços.

Transforma-se igualmente numa carreta de duas rodas, muito leve e fácil de manobrar.

Esta carroceria, de adaptação simples, é própria para o transporte de madeiras.

Procure o seu Revendedor Ford — Solicite informações sobre a Carreta Agrícola FORTRAC

Um produto da
FORD MOTOR COMPANY, EXPORTS, INC.
São Paulo

UM TOURO CHEIO DE GLORIAS

JAN DE BOZUM CONTA SUA HISTORIA

Todos sabem que as pessoas idosas gostam de falar dos tempos passados, os quais, foram sempre melhores do que os atuais. Sinal de velhice...

No estábulo de criação, a que chamam "de Hoot", em St. Nicolaasga, fomos também encontrar um velho, que a luta pela vida encanecera. Mas... era um velho que galhardamente se sustentava em quatro pés e que, embora fosse o mais antigo dentre os companheiros na mostra central de Leeuwarden, soubera ainda colocar-se na classe dos premiados. Prova de vitalidade do velho Jan, considerando-se a concorrência e, ainda, a sua idade. Constituía ele um protesto, um desmentido vivo a tôdas as críticas, aparecidas nos relatórios dos ultimos concursos, a respeito do andar dos nossos touros atuais. De um modo que se diria quase elegante e juvenil, o Jan de Bozum fez os seus volteios por entre os touros, como ele, melhor classificados, parecendo querer demonstrar aos companheiros mais novos que um membro da velha guarda ainda sabe marchar. Os olhos de Jan eram os de um ancião, que vive no passado

e, atentando para os seus chifres, onde os algarismos do registro do seu "pedigree" da Frisia estavam quase apagados, pudemos adivinhar-lhe a idade. Um ancião amadurecido pela vida! Isto nos levou a entrevistar o velho Jan.

Começamos por perguntar-lhe se queria externar alguma queixa contra os homens que o tinham tratado.

— Não, isto nunca — mugiu o velho Jan — só posso elogiar todos os que me trataram; mais ainda agora, que já estou velho. O meu tratamento é especial: basta-me ver: Não pense que nada ouço quando caminho atrás do meu dono na feira de Leeuwarden ou na exposição de Wilhelmina. Não ficaremos plenamente satisfeitos se o velho Jan não estiver presente — já ouvi alguém dizer. E outras coisas semelhantes. Não julgue, entretanto, rapaz, que me interessem os elogios ou as críticas que me possam fazer; nada disso, pois, geralmente, o que se diz é a repetição do que foi ouvido. Poucos são os indivíduos que, no terreno do tratamento do gado, têm a coragem de opinião própria.

A esta altura, pareceu que o

velho Jan caçoava de nós, mas êle continuou:

— Há os que frequentam o meio das pessoas realmente entendidas no tratamento do gado e, por esse motivo, podem conversar e fazer-se passar por entendidos também. Quantos incapazes há na difícil função de examinar a forma exterior do gado. Mas uma vez: pouco me interessam seus conceitos e opiniões. A minha divisa é: "Cada um cumpra o seu dever e deixe que os outros falem". É uma divisa que vale dólares! Isto fala mais aos seus corações materialistas, acho eu...

Agora, a minha biografia. Nasci a 2 de Novembro de 1940, no estábulo de criação de E. S. de Groot, em Bozum. Foi no inicio da guerra. Eu era um novilho, mas de boa raça, como o demonstra a minha arvore genealogica. Meu experimentado criador tinha confiança na minha jovem mãe Froukje XVII e uniu-a ao conhecido e preferido Botje's Adema. Deste modo, o celebre Adema 197 tornou-se meu avô. (?) Mas o meu nascimento causou a morte de minha mãe Froukje XVII, vitima de inflamação do utero. Nestas circunstâncias, sua

Maquinas Agricolas

ARADOS DE DISCOS

Recebemos dos Estados Unidos um novo lote de arados "Case" com 2, 3 e 4 discos. — PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES.

MOTORES DIESEL

Para máquinas de beneficiar, ceramica, para luz, etc.

De 5 a 120 H.P. e geradores de 5 a 500 KVA

O MAIOR ESTOQUE DA PRAÇA

IRRIGAÇÃO Por chuva artificial

Instalação portátil própria para lavoura de café, arroz, batata, trigo e de pastagens durante a seca.

PEREIRA DE MAGALHÃES & CIA. LTDA.
VISITEM NOSSA LOJA: AV. DUQUE DE CAXIAS, 346 - FONE 52-4400 - S. PAULO

morte constituiu serio obstáculo no meu árduo caminho pela conquista dos louros oficiais e da consagração dos touros, pois Froukje, morreu sem deixar valores produtivos de renome.

Ao dizer isto, Jan foi se tornando triste, pois, embora sabendo não lhe caber responsabilidade pela morte de sua mãe, ocorrida no início de promissora carreira produtiva, parecia ter conhecimento de que algumas pessoas o julgavam de modo diferente. Com esta magua, contudo, Jan sempre procurou, com toda sua modéstia, cumprir fielmente seus deveres.

Depois, Jan nos contou como deixou, novinho ainda, sua terra natal e foi para junto do criador I. Boersma, em Hartwerd, vila que viu seu avô ascendendo no caminho da fama. Naquela transação de compra e venda, entrou, como sócio, o comissário A. L. de Witte de Boksum. E' nesta quadra que Jan, pela primeira vez, se vê frente à frente com os exigentes examinadores do gado de "pedigree" da Frisia, os quais, inicialmente, lhe deram 77 pontos pela forma exterior.

Como se desenrola a vida de um touro de apresentação? A princípio, com um premio no concurso local. Mais tarde, tem que desempenhar o primeiro papel na exposição de touros da capital da província, com a conquista do prêmio 1B, classe de vitelos de um ano: isto para Jan, aconteceu em 1942. E assim, competindo e vencendo, continuou ele, ano após ano, pois, não tendo 13 anos ainda, já ostenta 12 premios. Quando ficou famoso, os italianos pretenderam comprá-lo. Mas o criador Boersman resistiu sempre, já que nele depositava grandes esperanças. E Jan não o decepcionou. Os descendentes, de Jan, eram de linhas bonitas, de proporções exatas, tinham as ancas corretas, os uberes bem colocados e formados, e disponentes possuidores de qualidades produtivas excepcionais. Havia muita procura para os descendentes de Jan, até mesmo de fóra do país.

Em 1944, nosso touro mudou-se para Kleiterp, para o estábulo do criador H. A. De Vries, redondezas

de Bozum, onde nascera. A maior parte do gado desse criador desce diretamente de Jan 27.501 F.R.S. Jan presenteou seu dono com muitas vacas de cabeças lindas, dimensões exatíssimas e especial produção: abundantes fontes de leite. Para esses animais não constitue raridade a classificação de 13 pontos pela forma e colocação do ubere, enquanto a produção média das novilhas até 2 anos, está acima de 13 quilos. Não é preciso dizer, que, também, em Kleiterp, Jan foi alvo da atenção de inumeras pessoas. Já em 1947, mudou-se ele para Lekkun, afim de prestar serviço a um grupo de criadores. Em 1949, por determinação dos seus novos donos, tomou parte no grande concurso da exposição jubilar da S. F. R. S. e com 9 anos de idade, em meio de sérios concorrentes, conquistou o premio 1C. Nesse mesmo ano, furtava-se à especial atenção que sempre lhe fora tributada retirando-se e elegendo para abrigo da velhice o Gaasterland, perto de "t Huis ter Heide", lugar mais conhecido pela criação de cavalos do que de gado.

Fornecemos orçamentos e instalações completas para:
**USINAS DE LEITE E DERIVADOS
FRIGORIFICOS PARA TODAS AS
CAPACIDADES E PARA TODOS OS FINIS**

Consultem-nos sem compromisso

SOCIEDADE IMPORTADORA SUÍSSA LTDA

RIO DE JANEIRO
Av. R. Branco, 14
C. Postal, 1404

SÃO PAULO
Rua 7 Abril, 264
C. Postal, 7939

HIPERFOSFATO

único adubo
comparável à
farinha de ossos.

Alí o esperava um trabalho de pioneiro. Passou os ultimos anos numa vida mais sossegada, o que foi de ótimo proveito para o seu estado geral. Desse modo, esperamos que esses três anos não tenham sido os últimos.

("De Friese Veefokkery" — Maio de 1952).

(x) Adema 197 é também avô de Ruurd, touro que o dr. Lafayette Alvaro de Souza Camargo adquiriu em sua recente visita à Holanda e que ora se encontra em Vila Brandina, Campinas. Ruurd é filho de Jan de Bazum.

**A DESNATADEIRA
PREDILETA
DE TODO O BRASIL**

NOVAMENTE NO PAÍS O AFAMADO MATERIAL ALEMÃO
PARA LABORATORIO

PAUL FUNKE

QUEIJO RICOTA OU QUEIJO DE ALBUMINA

J. ASSIS RIBEIRO

O queijo Ricota ou de albumina é um queijo de baixo teor de gordura, constituído quasi sómente de albumina. Por isso, é grande a indicação de seu consumo por pessoas em regime dietético.

A matéria prima deste produto é o soro de qualquer dos queijos de fabricação típica (Prato, Parmesão, Minas, etc.) havendo, entretanto, preferência pelos de massa crua (Minas, Provoloni, Mussarela, etc.) Assim, o soro do queijo Minas produz melhor Ricota que o do Parmesão. O soro recém-obtido recebe um volume de leite integral, fresco, correspondente a 10 ou 20% do seu volume. Alguns fabricantes empregam somente 5 a 8% de leite integral; outros adicionam 10 a 22%, porém, de leite desnatado. Como é natural, o leite integral melhora a qualidade da Ricota resultante, mórmente se for defumada. A mistura de leite e soro é recebida em tacha própria, em forma de calota esférica, de fundo duplo, com circulação de vapor. Pode também ser a fogo direto, o que dificulta o controle do aquecimento. Aquece-se, gradativamente até 85-90°C sempre em agitação com mexedor metálico ou de madeira. Chegando a esta temperatura, adiciona-se o "soro-fermento", que é soro da fabricação do dia anterior guardado em vasilha de vidro ou de madeira. Adicionando-se rodelas ou suco de limão ao soro no início da fermentação, dará soro melhor. A quantidade de soro a ser aplicada varia conforme sua acidez, e, quando esta estiver baixa, adiciona-se caldo de limão, ou vinagre. A acidez do soro-fermento ou da mistura (soro-caldo de limão ou vinagre) deve atingir 95 a 100°C. Usa-se de 2,5 a 4%. Adicionado o soro-fermento, continua-se a agitação e abre-se o vapor, aumentando a temperatura a 92-99°C, momento em que a albumina se floccula, arrastando outros elementos dissolvidos (caseína, gordura, etc.) formando massa branco-creme que flutua no líquido esverdeado de que se separou. A flocculação se verifica rapidamente, terminando logo no começo da ebulição do soro. Espera-se esfriar um pouco, e, por meio de colher própria ou concha com furos, a massa é apanhada e colocada em fôrmas previamente preparadas.

São fôrmas pequenas, metálicas, cilíndricas, de 8 ou 12 cm de diâmetro por 15 ou 20 cm de altura, cheias de furos, para intenso dessôro. Ligeira prensagem é feita a mão, saindo grande quantidade de soro. Pode ser consumida assim, com sal ou açúcar. O mais comum, entretanto, é ser deixada na própria fôrma até o dia seguinte, fazendo-se três ou quatro viradas, para facilitar o dessôro. A massa se encolhe bastante, em vista do dessôro. Pode ser vendida assim, como "Ricota fresca, sem sal". O melhor é submetê-la à salga, para maior conservação. Coloca-se sal de granulação média na parte superior do queijo mantido na fôrma. Depois que o queijo já apresenta consistência, tira-se da fôrma e esfrega-se sal diretamente por toda a superfície. Esta salga dura 10 a 12 horas nos queijos pequenos, e 22 a 24 nos grandes, depois do que estes estão em condições de serem consumidos ou remetidos ao mercado, como Ricota fresca, salgada, ou de ir para a defumação. No fumeiro, a Ricota é defumada por 10 a 15 dias, em fogo fraco, com pouca fumaça. Nos primeiros dias, recebe pas-

sadas de salmoura, por toda a superfície, porém, depois, só é virada diariamente. O soro que vai sendo expellido se evapora na superfície do queijo, formando uma crosta escura, resistente, rugosa. O calor facilita esta dessecação e o queijo vai absorvendo elementos da fumaça, apresentando, nas defumações bem conduzidas, um gosto típico, agradável. Para o gosto próprio, até a qualidade da madeira influi, evitando-se as resinosas com cheiro desagradável. A Ricota defumada apresenta-se firme, de massa consistente, homogênea, sendo produto altamente resistente a condições desfavoráveis de ambiente, de transporte e de exposição à venda. Tem gosto ligeiramente picante e é usada por muitos como condimento, substituindo o Parmesão.

Indicamos a fabricação da Ricota fresca somente nas proximidades dos centros de consumo, pois, sendo produto de pequena consistência, de alto teor de umidade, de fácil dessôro durante o transporte, é de difícil acondicionamento em condições satisfatórias. Comumente se emprega folha de bananeira para envolver os produtos, que são acondicionados em caixas de madeira comumente caixas que serviram para latas de querosene, isso tudo

em condições contrárias à regulamentação vigente.

Para os estabelecimentos situados longe dos mercados consumidores, o mais indicável é a fabricação da Ricota defumada, cujo transporte é facilitado pela resistência do produto.

Sabendo-se que o rendimento médio é de 7 a 8 kg de Ricota fresca por 100 litros da mistura de soro e leite, caindo para 5,5 a 6 kg na Ricota defumada, verifica-se a vantagem da fabricação deste queijo, como aproveitamento do soro. Os preços de venda do produto são compensadores.

Alguns fabricantes não se interessam pela Ricota, por julgarem que o líquido mais bem feita a Ricota) não serve para alimentação de animais. Sabendo-se que o soro da Ricota ainda possui alta porcentagem de lactose (até 5%) além de sais minerais, substâncias azotadas (restos de caseína, albumina, globulina, etc.) se verifica tratar-se de resíduo que pode e deve ser aproveitado na alimentação animal. Havendo volume suficiente, ainda é mais interessante seu aproveitamento na fabricação de lactose, assunto do qual trataremos oportunamente.

ESTABELECIMENTO Mecanico TUPAN

SÃO PAULO

BRASIL

— PRODUTOS TUPAN —

Modelo A-5, curso de 4" a 5 1/2". Com motor elétrico, trifásico ou monofásico, 50 ou 60 ciclos. Para profundidade até 40 metros. Cilíndrico especial internamente, de bronze. Rendimento horário: 950 a 1200 litros. — Nossa Organização possui o mais eficiente serviço técnico. — Nossas bombas tem eficiência e durabilidade — Peças substituíveis facilmente, sem o uso de ferramentas especiais. — Grande estoque de peças sobressalentes.

Rua Padre Raposo, n. 377

Telefone: 9-77-34

S. PAULO

*Uma grande oportunidade
para os produtores de leite*

Está no Brasil

a mais moderna e robusta
desnatadeira do mundo:

ALFA-LAVAL

MODÉLO

100

tôda de aço inoxidável!

Famosa desde 1870, Alfa-Laval conquistou a preferência absoluta da indústria mundial de laticínios. No Brasil, cerca de 80% dos produtores de leite a preferem e usam, porque Alfa-Laval rende mais e dura mais. Surge agora a nova maravilha dessa magnífica série de desnatadeiras superaperfeiçoadas. Veja quantas vantagens oferece a nova Alfa-Laval "100":

- Tôdas as partes vitais de aço inoxidável suco da mais alta qualidade, inclusive depósito e bicas.
- O tambor, coração da desnatadeira, também inteiramente de aço inoxidável, garantindo desnatado completo por tôda a vida.
- Montada sobre rolamentos de esferas. Rotação permanentemente suave.
- Limpeza fácil e higiênica.
- Durabilidade ilimitada.
- Leve, prática, silenciosa e de absoluta confiança.

TROQUE A SUA VELHA DESNATADEIRA

POR UMA **ALFA-LAVAL**

modelos ROSE, JUNIOR, 60, 100

Garantia de peças e assistência em todo o país

CIA. FÁBIO BASTOS

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

A MAIOR EXPERIÊNCIA NO RAMO DE LACTICÍNIOS NO BRASIL

Fone - Casa de Amigos

em vários tamanhos

para acionamento manual, elétrico ou a gasolina

MUITO BREVE

a rainha das desnatadeiras,
que chegará da Suécia - a
sensacional

ALFA-LAVAL 100

inteiramente elétrica!

Rio de Janeiro: Rua Teófilo Ottoni, 81 — Tel. 43-4810
São Paulo: Rua Florência de Abreu, 828 — Tel. 35-2111
Belo Horizonte: Rua Tupinambás, 363 — Tel. 2-4677
Porto Alegre: Av. Júlio de Castilhos, 30 — Tel. 9-2038
Juiz de Fora: Rua Halfeld, 399 — Tel. 2 15 4

63.022

OS BUFALOS DE MARAJÓ

Uma vigorosa raça bovina que se adaptou bem às condições climáticas da grande ilha amazonica

Uma característica sócio-econômica das mais interessantes do extremo norte brasileiro, e que mais impressionam o turista que viaja através da ilha de Marajó, é a generalizada criação de bufalos, encontrados em grandes manadas, nos pantanos e à beira das lagoas ali existentes.

Esse gado vigoroso é talvez o maior recurso econômico explorado em terras marajoaras. Perfeitamente adaptado às condições climáticas e fisiográficas da ilha, desde o século passado, apresenta grandes vantagens sobre outras raças, devido ao seu maior peso, à sua carne excelente e à sua notável resistência a várias doenças.

A criação do bufalo é praticada na ilha em centenas de grandes fazendas, atingindo a muitos milhares de cabeças. Tal como de outras raças bovinas, do bufalo tudo se aproveita. Seu couro é de extraordinária resistência e durabilidade, enquanto o leite, base de alimentação de muitas famílias de vaqueiros, é de máximo valor nutritivo, com elevado teor de açúcar e gordura.

Alem do bufalo negro, de pêlo espesso e hirsuto, que é o representante doméstico desse tipo bovino, Marajó conta com ricas manadas selvagens chamado bufalo rosideo, uma das grandes sensações dos valentes caçadores ilheus.

A caça aos búfalos selvagens é um dos esportes mais emocionantes e arriscados, sendo praticada durante a estação úmida.

Em regra, os caçadores não abatem os animais, preferindo, antes capturá-los a laço a fim de domesticá-los nas fazendas.

No foto à esquerda, flagrante da captura de um rosideo. — À direita, vaqueiros marajoaras peam um bufalo para marcá-lo.

Sendo soltos do brete, os bufalos partem em disparada, rumo aos postos

Mostra-se aqui um vaqueiro serrando as pontas dos chifres de um bufalo domesticado. O objetivo dessa medida é impedir que tais pontas, muito longas e agudas, possam causar danos aos outros bufalos ou aos tratadores. Apesar de mansos, esses animais, quando assustados, oferecem serio perigo.

Nesta ilustração podemos observar

Embora não sejam nunca empregados em trabalhos de lavoura, os bufalos são treinados, ainda quando novos, com a finalidade de montar, constituindo uma das características

A CAÇA AO ROSIDEO

O rosideo se caracteriza pelo acinzentado do pêlo, que é curto e escasso, pelos grandes chifres em ponta acerada, pela testa larga, porte agigantado e riscas horizontais na região do peito. Há bufalos selvagens em varios países da Asia e da África, como o bufalo aquático do Cabo, considerado o animal mais mais bravio do Continente Negro, onde é mais temido do que os hipopótamos e leopardos. O rosideo marajoara, tido como originario da India, difere das espécies do Velho Mundo devido à sua aclimação no Brasil. Sem embargo, como aqueles, é grande amante da agua, vivendo de preferencia nos imensos pantanais da ilha e às margens dos igarapés. Não raro, juntam-se aos bufalos domesticos, acompanhando as manadas de criação. Quem voa sobre a ilha, a pequena altura, pôde localizá-los facilmente em seu «habitat», onde vivem livres.

O rosideo é um dos animais mais perigosos e temidos do mundo, representando sua caça um esporte arriscado, mas muito praticado, pondo à prova o admiravel destemor da brava gente marajoara. A caça é sempre feita na estação das chuvas, sendo os animais perseguidos através dos pantanos, aos quais o caçador vadia, com agua pela cintura, a fim de tocaiar a presa. Uma vez isolado da manada um bando de rosideos, os animais são perseguidos, com risco relativamente menor, pelos caçadores, até que alcancem seu objetivo temerario.

Em regra, o caçador não abate o bufalo, sendo sua intenção, antes, cansa-lo, para então captura-lo a laço, a fim de domestica-lo, o que concorre para a preservação constante das manadas selvagens e seu melhor aproveitamento economico. Cativo, o rosideo adapta-se facilmente às fazendas, engordando rapidamente. Embora seja destinado exclusivamente ao abate e à produção de leite, este ultimo apenas para cobrir o consumo das familias dos proprios vaqueiros, o bufalo, não raro, é treinado, desde pequeno, como montaria, devido não só à sua resistencia às epizootias como à sua habilidade em percorrer com segurança, leguas e leguas, os banhados traiçoeiros da ilha, que são um desafio à vida.

(Fotos e texto gentilmente cedidos pela Revista «Esso», na qual foram publicados na edição de maio-junho).

detalhes desso vigorosa raça bovina

os mais pitorescos do interessante mundo os cavalos, nas estações das chuvas, em geral não resistem aos pan-

Esse tipo de gado produz um leite de elevado teor de gordura e açúcar, proporcionando aos vaqueiros marajoaras e suas familias um alimento saboroso e revigorante. Entretanto, a criação desses animais é principalmente destinado ao abate, abastecendo de carne o mercado de Belém.

GRANJA MARISTELA

PROPRIEDADE DA

Cia. Agricola Maristela

TREMEMBE' — ESTADO DE S. PAULO
Criação e seleção de gado holandês, preto
e branco, puro sangue de origem e puro
sangue por cruzo. Venda permanente de
reprodutores.

UNO - EEPA, 785. Reprodutor da raça holandesa, puro sangue de origem, é o chefe do plantel. Nasceu em 15 de abril de 1951, na Estação Experimental de Pindamonhangaba. Oferta do Governo do Estado como prêmio pela vitória da Granja Maristela no Concurso Leiteiro de 1952.

FOLIA — A campeã absoluta dos Torneios Leiteiros Regionais de 1952. Alcançou a produção de 4.229,388 quilos de leite em 180 dias. Sua produção continuou a ser oficialmente controlada pela A.P.C.B. e em 360 dias alcançou de 6.146,600 kg e 269,735 kg de gordura, com 3,92% de matéria gorda. Está inscrita no Livro de Mérito do Serviço de Controle Leiteiro da A. P. C. B.

Esplendido lote de produtoras.

A ordenha é mecânica e o estábulo sofre diariamente uma desinfecção.

GRANJA MARISTELA

PROPRIEDADE DA

Cia. Agricola Maristela

TREMEMBE' — ESTADO DE S. PAULO

Criação e seleção de gado holandês, preto e branco, puro sangue de origem e puro sangue por cruz. Venda permanente de reprodutores.

BAGDA — Essa esplendida produtora está inscrita no Livro de Merito do Serviço de Controle Leiteiro do A.P.C.B. Em 365 dias produziu 6.868,570 kg de leite e 269 kg de gordura, com 3,92% de mat. gorda.

AMAZONAS ESPANTADA — Em 365 dias produziu 6.259,750 kg de leite e 162,500 kg de gordura, com 3% de materia gorda.

AMAZONAS ENIOBE — Outra produtora inscrita no Livro de Merito do Serviço de Controle Leiteiro. Sua produção em 365 dias atingiu a 5.408,205 K. de leite e 196,600 k. de gordura com 3,14% de materia gorda

GUASTALA — Em seu 7.º controle oficialmente realizado pela A.P.C.B. produziu 14,900 K. de leite e 0,465 k. de gordura com 3,12% de materia gorda. Em seu 1.º controle produziu 20,910 K. de leite e 0,780 k. de gordura. No 2.º, produziu 18,920 K. de leite e 0,642 de gordura. No 3.º, produziu 14,450 K. de leite e 0,447 k. de gordura. No 4.º, produziu 17,250 K. de leite e 0,584 k. de gordura. No 5.º, produziu 16,650 K. de leite e 0,554 k. de gordura. No 6.º, produziu 15,430 K. de leite e 0,497 k. de gordura. No 7.º, produziu 14,900 K. de leite e 0,465 k. de gordura. A media de 7 lactações foi de 16,930 quilos de leite e 0,593 quilos de gordura.

XV Exposição-Feira Agro-Pecuária e Industrial de Juiz de Fora

O general Zeno Estillac Leal e o prefeito municipal de Juiz de Fora, no momento em que inauguravam a XV Exposição

Realizou-se em Juiz de Fora (Estado de Minas) a XV Exposição-Feira Agro-Pecuária e Industrial. Encontravam-se presentes os srs. general Zeno Estillac Leal, comandante da 4.^a Região Militar e representante do presidente da República; o dr. Olavo Costa, prefeito municipal; Juarez de Souza Carmo, secretário da Agricultura do Estado, representando o governador Juscelino Kubitschek; e João Ferreira Barreto, representando o ministro da Agricultura.

Iniciada a solenidade com o hasteamento do Pavilhão Nacional pelo general Zeno Estillac Leal e pelo prefeito Olavo Costa, falaram os srs. Elias Vilela de Andrade, presidente da Associação Rural de Juiz de Fora, entidade promotora do importante certame, e, o general Zeno Estillac Leal.

Em seguida, os srs. general Zeno Estillac Leal e prefeito Olavo Costa desataram a fita simbólica, que vedava o recinto da Exposição, dando-a por inaugurada, sob vibrante salva de palmas dos presentes. Após a inauguração, as autoridades e o povo passaram a visitar todas as dependências do certame.

O certame confirmou e excedeu mesmo todas as previsões: grande foi o número de animais expostos, de várias raças e espécies, enquanto os estandes da indústria e do comércio ofereciam variedade impressionante, atestando o progresso do município e vizinhanças.

O Collarinho
TRUBENIZADO
é molle e não enruga

**CASA
KOSMOS**

A partir da esquerda, o sr. José de Andrade Reis, destacado expositor, tendo a seu lado o sr. Ede Nogueira, grande criador em Barra do Piraí, e o Dr. João Geraldo Frerichs, um dos mais antigos criadores do país.

JOSÉ DE ANDRADE REIS APRESENTA AS CAMPEÃS DA RAÇA HOLANDESA, TAMBEM EM JUIZ DE FÓRA

BISANDO O GRANDE ÊXITO ALCANÇADO NO ÚLTIMO CERTAME DE LEOPOLDINA, ONDE APRESENTOU A CAMPEÃ ABSOLUTA DA RAÇA HOLANDESA, JOSÉ DE ANDRADE REIS CONQUISTOU DESTA FEITA, EM JUIZ DE FÓRA, O DUPLO CAMPEONATO DA RAÇA PARA FEMEAS.

JULIANA 33, "Grande Campeã" da raça holandesa preta e branca, P. O. no certame de Juiz de Fôra. Nascida em 25-12-45. Reg. A.B.C.R.H. 448. Pai: JULIUS, Mãe: JULIANA 25. Em seu pedigree figuram 14 "preferentes" e 18 "Registros de Escol". É neta do famoso "Adema 197".

FAZENDA DA HERDADE JOSE' DE ANDRADE REIS

MATIAS BARBOSA — E. F. C. B.
Tel. Simão Pereira, 4 — MINAS

"RECREIO DEA", 1.º premio e "Campeão Junior" da raça holandesa preta e branca, pura de origem. Reg. Provisorio. Nascida 15-3-51. Pai: JAN, 1.º premio em KLAASWAAL Holanda, 1947; Mãe: "MIETJE 41", HBB/F1-457, 1.º premio e campeã da raça no certame de Leopoldina. Seu avô TSJALLING, N.º 22.179 é RECOMENDADO PELO GOVERNO da Holanda e tres vezes campeã em seu pais de origem.

ANA 13, GRANDE CAMPEÃ da raça holandesa vermelha e branca, no ultimo certame de Juiz de Fôra. Pura de origem. Reg. HBB/BB-158. Nascida em 22-1-50. Vencedora do concurso leiteiro de Juiz de Fôra, na categoria de novilhas, tendo produzido, em três dias, 77 quilos de leite. No serviço de controle leiteiro do Ministério da Agricultura, registrou a produção de 4.145 quilos em 335 dias, em sua primeira lactação, com a idade de 28 meses. Sua bisavó TRUDA, 39.933, produziu, aos 7 anos e 11 meses, 8315 quilos de leite c/ 4% de materia gorda em uma lactação.

No alto, à esquerda: TRIUNFO, 1.º premio e campeão da raça Gir. Pai: WITHE; Mãe: PERPETUA. Idade 48 meses. À direita: COLOSSO, reservado campeão da raça Gir em Juiz de Fora. Pai: WITHE. Idade 53 meses. Em baixo: MULATO, 1.º premio na sua categoria. Filho de Rex e Mulato.

VENDA DE REPRODUTORES

FAZENDA ROCHEDO

DR. HENRIQUE CERQUEIRA PEREIRA

Rochedo de Minas — E. F. L.

APRESENTAMOS OS CAMPEÕES DA RAÇA GIR

FAZENDA SANTO ANTONIO

JOSÉ AUGUSTO DE ARAUJO

ESTRADA DE RETIRO — JUIZ DE FORA

À esquerda: CASCATINHA, 1.º premio e "Campeã Junior", pura por cruzamento. Nascida a 15-352. — Pai: CENTENARIO; Mãe: FORMATURA. — À direita: GAROTA, 1.º premio na sua categoria. Pai: CENTENARIO; Mãe: CABRITA. Idade 15 meses.

GADO HOLANDÊS VERMELHO E BRANCO

GRANJA FRISIA

JOÃO GERALDO FRERICHES

SANTOS DUMONT — MANTIQUEIRA — E. F. C. B.

APRESENTAMOS OS CAMPEÕES DA RAÇA HOLANDESA NA XV EXPOSIÇÃO DE JUIZ DE FORA.

GRETHA TICNOS, grande campeão da Raça Holandesa em Juiz de Fora. Nascido em 23-4-50. Pai: TICNUS; Mãe: GRETHA. Reg. A.B.C.B.R.H. N.º E1-266. Puro d'origem. Crioulo da nossa fazenda.

HA 20 ANOS, VIMOS FORNECENDO VACAS DE LEITE ÀS GRANJAS DE SÃO PAULO.

FRISIA ORION, "Reservado Campeão" da raça Holandesa preto e branco. Puro por cruzamento. Nascido em 15-11-50. Pai: MARFIM; Mãe: F. NUVEM BRANCA. Crioulo da nossa fazenda.

FRISIA PURINHA VAN DER MEER, 1.º premio entre as novilhas puras de origem em Juiz de Fora. Nascida a 5-10-51. Reg. 4-PB-7-1811 — Pai: FRISIA MARECHAL; Mãe: FRISIA MIMO. Crioula de nossa fazenda.

VENDA PERMANENTE DE REPRODUTORES

FAZENDA SÃO JOSÉ

SEVERINO DOS REIS MEIRELES

JUIZ DE FÓRA — ESTRADA VERDE - QUILOMETRO 21 — MINAS

PROVIDENCIA DONO, Campeão Junior da raça Holandesa, preto e branco, puro de origem. Adquirido na FAZENDA SOLEDADE em Leopoldina. Filho de reprodutores importados. Nascido a 5-5-952. Pai: DORUS; Mãe: ARAUNA, registrados na A. B. C. B. R. H.

CONCEIÇÃO PRINCESA, 1.º premio na sua categoria, em Juiz de Fóra. E' filha de TABATINGA SALITETE e CONCEIÇÃO TENTACÃO, campeões da XIII Exposição de Juiz de Fóra. Animal de impressionante beleza, no dizer dos tecnicos julgadores.

Holandês vermelho e branco

CATETE - LEOPOLDO, 1.º premio e 'Campeão Junior' da raça Holandesa vermelho e branco na XV Exposição de Juiz de Fóra. Nascida a 20-6-51. Reg. HBB-AA-1-119 — Pai: BERNARDE HBB/EE.1-9; Mãe: ALEGRIA TILDA LEOPOLDINA. Reg. HBB/BB-1-102. Pertence ao destacado criador Cel. José Custódio Pinto — FAZENDA CATETE — MATIAS BARBOSA - E.F.C.B. — Minas

A CAMPEÃ DO CONCURSO LEITEIRO DE JUIZ DE FÓRA

ARATINGA, a campeã absoluta do concurso leiteiro do XV EXPOSIÇÃO DE JUIZ DE FORA. Propriedade de Nelson Araujo Meireles, "Fazenda Boa Vista", município de BICAS - Minas Gerais. — ARATINGA, submetida a regime de 3 ordenhas, produziu, em 3 dias, 92,940 quilos de leite, media diaria de 30,980 quilos de leite, registrando, assim, um dos melhores resultados do ano.

ARATINGA, no momento em que recebia o "batismo" de champagne. O casal Nelson Araujo Meireles cumpre, assim, a tradição, proporcionando à sua ARATINGA a maior honra que se confere às campeãs leiteiras.

CARNE CONGELADA PARA ABASTECIMENTO PUBLICO

P. Mucciolo

O frio, aplicado na conservação dos alimentos, é indiscutivelmente o processo mais perfeito de que se pode dispor, quer para bem abastecer os mercados, quer como instrumento regulador de preços. No entanto, o fenomeno que atualmente se observa em São Paulo quando, compulsoriamente, se obriga a população ao consumo de carne congelada, levanta acirrada celeuma, em razão da repulsa causada pelo produto submetido à ação conservadora do frio. Entretanto, em sã consciência, não se pode responsabilizar a congelação em si por essa impossibilidade, que é unicamente devida ao erroneo emprego do agente conservador. Eis porque nos propomos a abordar alguns pontos fundamentais, que devem despertar a atenção das autoridades responsáveis pelo abastecimento de nossas populações.

Desde que Teller, com justiça cognominado o "Pae do Frio", porque com seu navio "Frigorifique", pela primeira vez, conseguiu transportar da França à Argentina e vice-versa, carne sob proteção do frio, ficou definitivamente demonstrada a possibilidade de se usar o frio artificial como veículo de produtos perecíveis de paizes grandes produtores para os de produção insufficiente. Com o correr dos tempos, surgindo a necessidade de uma conservação mais longa, passaram os industriais a empregar temperaturas muito mais baixas do que as utilizadas para o simples resfriamento e, isto, graças ao aperfeiçoamento tecnico das maquinas frigorificas e aos meios mais efficientes de isolamento termico. Apareceu assim a congelação que, aplicada lentamente, como fase complementar do resfriamento, se por um lado dilatava de muito o periodo da conservação, por outro determinava profundas e irreversíveis modificações na carne. De fato, a primeira alteração observada quando a carne é congelada, consiste na mudança de estado fisico do plasma muscular que, contendo proteínas soluveis, à medida que avança a ação do frio, a concentração da solução também aumenta, determinando a insolubilidade das proteínas e irreversibilidade da reação. Isto quer dizer que, na descongelação, grande parte das proteínas soluveis, não se incorporando à fibra muscular, perde-se com o liquido que abandona a carne quando esta fôr retirada das camaras. Por outro lado, os primeiros cristais de gelo, devidos à congelação da agua da fibra muscular, começam a se formar entre 1 e 4 graus centigrados, fenomeno que determina aumento da concentração da solução restante, fazendo baixar o ponto crioscopico do plasma muscular. Esta é a razão de continuarem a aparecer cristais de gelo localizados nos espaços inter-fibrilares, mesmo depois de passado o limite crítico de temperatura que acima indicamos. Em

consequencia desses fenomenos fisicos, ha ruptura de fibras musculares durante a descongelação e perda de plasma constituido de água, sais, substancias extrativas e proteínas soluveis. Com isto, a carne descongelada se apresenta com aspecto repugnante, como se tivesse sofrido maceração, e é prejudicada sensivelmente quanto ao sabor, aroma e valor nutritivo.

Para minorar os inconvenientes da congelação lenta foi preconizado o controle das temperaturas de descongelação, passando esta última operação a ser realizada paulatinamente. Embora a velocidade de descongelação seja de menor importancia do que a de congelação, porque os prejuizos causados à fibra muscular são irremediaveis, a opinião da maioria dos autores, principalmente australianos e americanos, é a de que a descongelação lenta e controlada parece aumentar a capacidade dos tecidos no reabsorver parte dos elementos nutritivos dissolvidos, fato que seria influenciado decisivamente pelo estado de maturação das carnes no momento da entrada para as camaras.

Partindo do conhecimento geral de que a carne congelada, depois de ter sido descongelada, é definitivamente mais sensível às contaminações externas, e daí ter vida comercial muito mais curta do que a carne fresca ou apenas resfriada, facilmente se compreende por que a tecnica aconselha que tais carnes sejam submetidas a um minimo de manipulações. Ora, se a congelação lenta, como acontece entre nós, for aplicada a peças grandes de carne, como são os quartos, é claro que a parte higienica ficará seriamente comprometida pelo intenso manuseio exigido pelo trabalho de segmentação nos açougues. Resta ainda considerar o tempo necessario para que tais carnes cheguem à cozinha do consumidor, para podermos avaliar a soma de vicissitudes porque passa produto tão perecível.

Foi devido às dificuldades apontadas que surgiu a tecnica do congelamento rapido, realizada por imersão direta, por contato indireto ou atravez de correntes de ar, porem sempre empregando temperaturas de menos cinquenta graus centigrados ou mais baixas, oferecendo à industria meio seguro de conservação e ao publico produtos que, por todas as características, são comparaveis ao produto fresco. Quando a congelação foi tão rapida que a distribuição do sistema coloidal foi fixada, a estrutura original dos alimentos é usualmente reproduzido na descongelação. Isto se dá graças ao diminuto tamanho dos cristais de gelo formados, os quais, sendo menores do que as proprias celulas e localizados no seu interior não determinam, durante a descongelação, ruptura de fibras; consequentemente, não ha saída de plasma.

A congelção, realizada em minutos ou frações de minuto e utilizada para alimentos já acondicionados no envolucro especial e definitivo, com peso unitario de alguns quilos ou frações, constitue hoje importante industria em paizes de extenso territorio, cuja população, possuindo elevado padrão alimentar, deve ser abastecida, em quantidade e qualidade, durante todas as estações do ano.

As vantagens da congelção rapida não se prendem, portanto, apenas aos efeitos da tecnica do processo, mas também ao fato de permitir a distribuição do produto em condições absolutamente higienicas, uma vez que os pacotes serão abertos só no momento do preparo culinario. Embora não possamos usufruir as vantagens da congelção rapida, porque não dispomos de equipamento adequado para o comercio desse tipo de alimentos, acreditamos que, dentro das atuais possibilidades de nossa industria, muito se poderia conseguir no sentido do melhor desfruto de nossos rebanhos na epoca da safra, quando os animais apresentam rendimento e preço compensadores. Aliás, o expediente de estocar carne congelada, aproveitando o momento em que o gado oferece maior peso, é prática economica já utilizada alhures, em ocasiões em que a manutenção das boiadas seria contraproducente e dispendiosa, quando não impossível.

Se nosso mercado de gado gordo apresenta, como é de conhecimento geral, epocas de maior rendimento e melhores preços, parece-nos principio elementar de economia que se fizessem, nessas épocas, tamanha reserva de carne quanto o permitissem as disponibilidades de instalação da nossa industria. Com isto desapareceria o perigo das quebras sofridas pelas boiadas que, não sendo negociadas ao termo da engorda, entram fatalmente em declínio por falta de pastagens que as suportem na estação seca.

Esse objetivo poderia ser atingido, dentro das nossas atuais possibilidades exigindo apenas modificações na presente tecnica de congelção e distribuição do produto, modificações que estudo meticoloso poderia indicar e cujos resultados seriam, sem duvida, de notavel alcance higienico, social e economico para o abastecimento das populações dos grandes centros.

HIPERFOSFATO
É ADUBO
DE FATOI

PESTE SUINA!

O flagelo das
criações de porcos.

EVITE-A COM A
VACINA

HERTAPE

(CRISTAL VIOLETA)

PARTIDAS TESTADAS PELO
MINISTERIO DA AGRICULTURA

★ Fabricamos, ainda, as vacinas: contra a *Febre Aftosa*, contendo os virus existentes no país; contra *raiva*; contra a *Bouba Aviarica* e contra a *pneumo enterite dos suinos*.

LABORATORIO HERTAPE LTDA.

Caixa Postal, 692

BELO HORIZONTE Estado de Minas

Representantes em São Paulo:

MACHADO & CIA. — Rua Caraibas, 68

A FERTILIZAÇÃO DOS OVOS

Henrique F. RAIMO

(Med. Vet. - D.P.A.)

A fertilidade nos lotes de aves em reprodução interessa aos avicultores que fornecem ovos às casas de incubação ou que fazem a incubação na própria granja.

Escolhidas as galinhas e os galos que vão compor os galinheiros de reprodução, surge a inevitável pergunta: Quando começar a incubar os ovos, depois de juntar os galos com as galinhas?

A pergunta é razoável, porque quanto mais depressa se aproveitam os ovos, tanto maior será o número de pintos obtido.

Anotando a hora do acasalamento e colocando os ovos na chocadeira, foi observado que os primeiros ovos galados ou fertilizados são obtidos 19 a 25 horas depois do acasalamento. Portanto, um dia depois de juntar os galos com as galinhas, já são obtidos os ovos galados. Na prática, porém, sabe-se que são acasaladas no mínimo 10 galinhas para cada galo. Logo, no dia seguinte do acasalamento, não vamos ter todos os ovos galados. Em controles bem feitos, pôde-se verificar que, no fim do quarto dia de acasalamento, cerca de 70% dos ovos produzidos estão galados. O máximo de fertilidade, em um lote de reprodução, ou seja de 90 a 100%, é conseguido no fim do oitavo dia, depois de juntar os galos com as galinhas. Assim, na prática da reprodução, os ovos serão aproveitados com segurança, a partir da primeira semana, depois de iniciado o acasalamento.

Outra pergunta também é feita com frequência: Depois de retirados os galos dos abrigos de reprodução, por quanto tempo ainda, são obtidos ovos galados?

Do mesmo modo, em controles bem feitos, observou-se que os ovos galados podem ser obtidos

até 25 a 30 dias depois de retirados os galos. O recorde é de 32 dias, mas resultados extremos não valem na prática. Observou-se que, depois de retirados os galos, a fertilidade baixa bastante depois de cinco a sete dias. Em vista disso, aconselha-se aproveitar os ovos, até dez a doze dias no máximo, depois de retirados os galos dos galinheiros.

Os galos, depois de escolhidos, podem ser juntados às galinhas, ao meio dia. Desse modo, terão tempo de travar conhecimento com o novo abrigo e com suas companheiras. Como as galaduras mais eficientes são as do período da tarde, é possível, com isso, conseguir mais rápida fertilização.

A presença de um ovo completo no oviduto bloqueia a passagem dos espermatozoides pelo oviduto acima. Desse modo, o avanço se processa em ritmo acelerado, logo após a postura do ovo. Como a postura é mais intensa até a metade do dia, explica-se a maior eficiência da galadura no período da tarde.

Nos acasalamentos em lotes, ou seja de um galo e dez galinhas, nos aviários de seleção, acontece, por vezes, haver necessidade de se proceder à troca dos galos, seja por infertilidade, seja por morte ou contingências do próprio plano de seleção. O problema é saber quando serão anotados os ovos, galados pelo galo substituto. Na prática, deve-se retirar o galo efetivo do lote e em seguida acasalar o galo substituto. No fim de tres dias, os ovos postos pelas galinhas já estão galados pelo novo galo. A constatação desse fato foi positivada pelo acasalamento de aves de côr da plumagem diferente umas das outras. Assim sendo, o avicultor selecionador não perderá tempo nem ovos, em seu trabalho de testar o valor biológico de seus galos.

SEMENTES DE CAPIM E FORRAGEIRAS

Germinação garantida

Acabamos de receber:

Capim Jaraguá do Cacho

Capim Catingueiro Roxo

Capim Colônião

Feijão Mucuna

Beterraba Forrageira

Cenoura Forrageira

Casa das Sementes Carlos Corradini Ltda.

R. S. Caetano, 234. Tel.: 34-6347. A maior casa de sementes do Brasil

CRIADOR

CONTRA BERNES E BICHEIRAS, CONTINUE USANDO

BIBE-TOX

O PIONEIRO E AINDA O MELHOR

SAIBA QUE:

O BIBE-TOX — fórmula brasileira — é largamente usado na Suíça, para garantir a boa qualidade dos couros produzidos naquele País.

NO TRATAMENTO DA MAMITE DAS VACAS, OBTENHA SEMPRE O MAIS RÁPIDO E PERFEITO RESULTADO COM O

TETOCILIN

SAIBA QUE:

NO TETOCILIN, a extraordinária ação bactericida da Penicilina G Rhodia é ainda reforçada pela Sulfametazina. Cada tubo de Tetocilin contém 100.000 unidades de Penicilina G Sódica e 0,5 g de Sulfametazina.

*DESCONFIE SEMPRE DAS IMITAÇÕES
BIBE-TOX E TETOCILIN SÃO GARANTIDOS PELA*

A marca de confiança

TAMBÉM A SERVIÇO DA PECUÁRIA

COMPANHIA QUÍMICA RHODIA BRASILEIRA

Departamento Agropecuário

RUA LIBERO BADARÓ, 119 — 4.º ANDAR — C. POSTAL 1329 — SÃO PAULO, S. P.

COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS

Enseja o nosso trabalho de hoje uma consulta desta Capital, sobre compensação de dividas entre credor, devedor e fiador.

E' um principio geral que o devedor só pode compensar com o credor o que este lhe deve, e não o que deve a terceiro. Entretanto, o fiador, que paga uma divida do afiançado, tem o direito de pretender uma compensação entre o seu debito para com o credor e o credito que teria seu afiançado.

Inegavelmente, a lei civil quiz, com a exceção mencionada, vir em socorro do fiador, garantindo, pelo direito regressivo, uma vez que fica subrogado nos direitos do credor.

Aí está a lei civil, no seu artigo 1.013, a nos ensinar que "o devedor só pode compensar com o credor o que este lhe deve; mas o fiador pode compensar sua divida com a de seu credor ao afiançado".

Acontece, no caso em questão, que o debito do credor ao afiançado com o qual o fiador pretende uma compensação, não nos parece ser liquido e certo, condição exigida pela lei, para ser objeto de uma compensação. Assim, pretende o fiador compensar divida resultante de alugueis com credito decorrente de uma corretagem de imoveis.

ROLANDO LEMOS

Os debitos dos alugueis são liquidos e certos: dez meses a 2.500,00, totalizando Cr\$ 25.000,00. Evidentemente, o fiador, ao subrogar-se nos direitos do credor, não poderá exigir deste a compensação com um eventual credito de seu afiançado, sobre corretagem na venda de um imovel.

E' verdade que o artigo 1.013 do Codigo Civil faculta-lhe, excepcionalmente, tal direito de compensação, mas faltar-lhe-á a condição primordial, regulada pelo artigo 1.010 que é expresso: "A compensação efetua-se entre dividas liquidas, vencidas e de coisas fungiveis."

De outro lado, mesmo que aquela divida do credor para com o afiançado já esteja determinada por uma sentença judicial, nem assim estaria ela revestida dos elementos — vencibilidade e liquidez — para legitimar uma compensação. Isto porque só ha certeza quando não mais fôr possível recorrer-se daquela decisão, e só haverá liquidez quando o contador judicial ou o proprio juiz fixam em execução de sentença o quantum da condenação.

E' verdade que dessa decisão só caberá recurso extraordinario e, portanto, definitivas as execuções, mas, mesmo nesses casos,

não ha ainda o elemento certeza, pois o Supremo Tribunal Federal poderá reformar a decisão da Justiça estadual, obrigando tudo a voltar ao estado primitivo.

Como se viu, é mesmo impossível ao fiador pretender uma compensação dessa natureza. Ele que se garanta do direito de sub-rogação, previsto pelo artigo... 1.495 do Codigo Civil, e oportunamente penhore os direitos do seu afiançado, quando este tiver ganho de causa definitivo contra aquele credor. Esse o seu unico direito, salvo se puder cobrar-se do seu afiançado pela penhora de outros bens desse, porventura existentes.

O que não é possível é exigir aquela compensação autorizada no artigo 1.013, quando o credito do seu afiançado, embora bastante provavel, não é certo nem liquido.

Não importa ainda que o afiançado esteja executando a decisão que lhe deu ganho de causa, contra o credor, porque, com tal execução, o maximo que poderia o afiançado conseguir seria liquidez da divida, mas nunca a certeza, só caracterizada com o transito em julgado da decisão, ou seja, quando não mais couber recurso algum.

Isto posto, na qualidade de advogado do credor, pensamos que nosso cliente não póde temer tal pretensão do fiador, a qual, a principio cabivel, carece de fundamento legal. E' o nosso parecer, salvo melhor juizo.

SEMENTES FORRAGEIRAS

Gramineas e Leguminosas

PARA A FORMAÇÃO DE PASTAGENS E FENAÇÃO

Gramineas:

Catingueiro roxo - Catingueiro Cabelo de Negro - Cabelo de Negro - Jaraguá - Colonião - Rhodes - Azevem - Grama Batatais - Gramas Diversas - Aveia - Sorgo - Cevada - Milho Hibrido Agroceres.

Leguminosas:

Alfafa Murcia e Creola do R. Grande - Feijão de Porco - Mucuna Preta - Mucuna Anã - Guandú - Soja - Trevo - Amendoim - Serradela - Ervilhaca - Tremoço - Feijão Fradinho - Nabo Forrageiro.

Lista de Preços Gratis:

CASA DA LAVOURA IMPORTADORA LTDA.
Rua São Caetano n.º 204 — SÃO PAULO

A SITUAÇÃO NÃO É CALAMITOSA: É DE RECUPERAÇÃO

Brenno Ferraz do AMARAL

"A situação não é má; é calamitosa" — declarou o ilustre sr. Quartim Barbosa, secretário da Fazenda do Estado.

Permito-me, com certa ordenação nas ideias, opor objeções a s. excia. A economia do Estado de São Paulo é parte de um todo: a economia nacional do Brasil. As finanças paulistas, por seu turno, se enquadram nas finanças brasileiras. Toda finança tem assento na atividade econômica de produção, não só para consumo interno — comer, vestir-se e morar é indispensável ao trabalhador — mas também e, principalmente, para manter nossa vida de relação — essencial aos seres vivos — isto é, exportar para importar e fazer reservas, estoques de sentido financeiro. Não há economia sem poupança e sem liquidez. Sabe s. excia. muito bem disso tudo, tanto que opera em concordância com o governo da República.

Se assim é, uma situação estadual de moratória — talvez, não de concordata — para conservar o simile de s. excia., é evidentemente menos grave que a de falência. A esta — ao fechar de portas, com a perda de independência e iniciativa da produção — é que caberia o qualificativo de calamitosa. Muito grave, tocaria à concordata. E grave, à moratória.

Seja de concordata — concedamos — a situação estadual. Será a de prazo certo, meramente financeira: a firma carece de liquidez, no momento; com alguma dilatação, pagará 100%. Seria catastrófica a situação econômica de São Paulo? Nada, absolutamente. Seu estalo — o café — é algo de rara solidez. Sustenta, não só o Estado, mas toda a União Brasileira. Temos ainda o algodão, o chá, a laranja, os cereais. Calamitosa, acaso, a conjuntura econômica nacional? Também não. Igualmente, esta se distingue pela carencia de liquidez: os "gravosos" da inflação. O Brasil — que tem o poder monetário e financeiro, não concedido aos Estados — perdeu as duas oportunidades que teve (1946 e 1950) para amealhar reservas líquidas, afim de enfrentar "deficit" de exportação e foi colhido pela necessidade de fazer a pior espécie de empréstimo, "a posteriori" a esse genero de crise deficitária. Empréstimo não produtivo, perfeitamente financeiro. Moeda estrangeira, que não entra no país, para pagar credores individuais no exterior. Qualquer coisa reveladora de completo desaparecimento na esfera das finanças internacionais. Basta dizer que nossos bancos não interferiram — proibidos pela lei ou pelos regulamentos — no desenrolar do intercâmbio externo, que resultou no "deficit"-monstro de 1952 (42%). Primitivismo. Não valeram as advertências dos banqueiros paulistas, em 1947 e 1948. (Ver artigo do autor no "Correio Paulistano" sob o título "O crédito dos bancos paulistas e o cruzeiro no Exterior".) Consequentemente, caso de desorganização de finanças.

O resto — produtos gravosos, crise de energia elétrica, excesso de importação, industrialização apressada — não tem tamanha importância. As demasias da importação estão contidas, como contido está o mercado livre de câmbio. A exportação se restabelece. A escassez de força elétrica cede lugar, como valor negativo, à falta de matéria prima para a indústria. E' o que diz muito bem e com grande eloquência o sr. Antonio Devisate, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, ao declarar "ser muito mais importante (que a falta de energia) para a indústria, para os trabalhadores em geral e para a economia do país, o problema da falta de matérias primas". ("Diário de São Paulo, 23-9-53). E faz ingente apelo ao governo federal. Foi o que já tivemos ocasião de dizer em artigos de Julho findo, quando encarecemos a necessidade de aumentar a exportação e de cooperar nessa empresa a indústria, como elemento da alta finança. Só do aumento da exportação — combatido o capital estrangeiro — hão de vir as divisas indispensáveis à aquisição de matéria prima.

Certamente, cumpre fazer ainda um grande esforço de exportação e de atração de capitais estrangeiros. Mas, como se verá adiante, já existem índices estupendos de recuperação. E' preciso fazer justiça à peregrina inteligência do sr. Oswaldo Aranha, ministro da Fazenda, e ao seu prestígio no governo. Sua administração está sendo coroada do maior êxito. "A Tribuna" de Santos, a 9 de Setembro findo, surpreendeu-nos com a mais impressionante das notícias: o movimento do porto de Santos, muito fraco no primeiro semestre, reagiu, bravamente, a partir de Julho e, em fim de Agosto, "bate todos os recordes mensais do porto." Importação e exportação so-

maram, nesse mez, 657.548 toneladas, com o que foi ultrapassado o mez de maior movimento, até então, ou seja Dezembro de 1951, com 654.126 toneladas. Por seu turno, a exportação por si só, que em alguns mezes do primeiro semestre não alcançava 100.000 toneladas, atingiu, no referido mez, a 121.445 toneladas. A continuar assim, é "muito provável que o exercício corrente alcance o total do passado". "A Tribuna" assinala ainda, nos primeiros oito meses, "a impressionante porcentagem dos combustíveis líquidos em relação ao total da importação do estrangeiro", isto é, 1.142.597 toneladas, ou 50,638%. Sómente a gasolina e o óleo combustível somam 41%. De outro lado, apenas 1,623% da importação em máquinas e seus pertences.

Não é preciso dizer que os fatos — algo difícil — obedecem à lei. E que de eficácia tal de lei correta resulta o bem publico. A crise medeou entre Junho de 52 e Junho de 53. Não seria justo esquecer que o sr. Horacio Lafer assentou os fundamentos dessa recuperação, como justo não seria desconhecer quanto fazem, no momento, os srs. Oswaldo Aranha e Souza Dantas. E' preciso que outros índices — em mais largo campo — sejam publicados. Mas esses, só o governo os possui.

E' a recuperação que se esboça.

NAS PASTAGENS!...

uma aplicação do Pó Calcario Magnesiano - "BONANÇA", trará um duplo resultado: Melhoria das condições físico-químicas dos terrenos e calcio-magnesianos para o gado.

Pedidos a

Italo Barbeiro & Cia.

Caixa Postal, 45 — Rio Claro - C. P.

Conclusão da pag. 31

que tem a America Latina de explorar a industria das carnes congeladas.

Um plantador de algodão da California acaba de lançar a idéia de se substituir a foice por ganhos para combater as ervas daninhas nos algodoais. Realmente, observou êle que, soltando aqueles palmípedes nas plantações, as aves procuram cuidadosamente para comer, as ervas prejudiciais, que acham mais saborosas e, dada a sua voracidade, fazem um eficiente e rápido trabalho de limpeza.

O CULTIVO DA ALFAFA NO RIO DA PRATA

As enormes extensões dos alfafais da Argentina não encontram paralelo em nenhuma outra parte do mundo

A alfafa é forrageira sumamente importante para a economia contemporânea das republicas rio-platenses. Qualquer iniciativa tendente a ampliar a base nutritiva dos animais domesticos produtores de carne, couro, lã, leite, etc., todos nobres e de alto valor, se reveste de alto alcance economico para estes paises, criadores por excelencia. A grande difusão dos alfafais na Argentina, substituindo pastagens naturais de qualidade inferior constitui um fato importante, digno de atenção, como elemento histórico das conquistas rio platenses no campo das ciencias naturais.

Quanto ao significado economico, o que se fez é comparavel à rapida e intensa difusão da cultura do trigo nas últimas décadas do seculo XIX. O caso da alfafa ganha assim maior interesse porque representa um extraordinario avanço no trato do gado, crescendo a extensão das áreas bem cultivadas. O manejo do gado, tão em uso que já é considerado rotina, começou a ser praticado logo a partir da oitava década do século passado. A extensão das areas cobertas de alfafa na Argentina coincide com o periodo de pratica da divisão das pastagens como medida fundamental no melhoramento dos rebanhos. A divisão das pastagens, possibilitando adequada rotação e obtenção de sementes destinadas a propagar ainda mais os alfafais, favoreceu a disseminação do cultivo da valiosa forrageira. Substituir campos naturais de escassa produção por alfafais de pastoreio, que nestas regiões de clima favoravel, frequentemente são aproveitados durante o ano todo, significa transformar substancialmente o panorama da produção animal. As condições naturais favoreceram o melhoramento pois, além do clima favoravel, o solo também ajudou. Vastas extensões de sub-solo permeavel, rico de substancia calcarea oferecem à alfafa um substrato especial para seu desenvolvimento. A alfafa, com sua raiz pivotante, retira alimentos, inclusive agua, de grande profundidade. As sementes se espalharam de tal maneira que, atualmente, as enormes extensões de alfafais na Argentina não encontram paralelo em nenhuma outra parte do mundo. Os 5,5 milhões de hectares de superficie cultivados com alfafa existentes atualmente na Argentina, representam a tērcia parte do total mundial de alfafais.

Este fato tem significação no progresso da pecuária rio platense, devendo ser lembrado, dada sua importancia do ponto de vista histórico.

Pouco depois do descobrimento das Américas, os conquistadores espanhóis levaram ao Mexico a "mielga" ou "melga", possivelmente, corruptela de "médica", palavra greco-romana que deu "Medicago sativa", nome científico da alfafa. Do Mexico iniciou ela sua rota pelo Pacifico, indo até o Peru e o Chile. Começa o seu cultivo na metade do seculo XVI, distribuindo-se daí para os demais paí-

ses sul-americanos. Na Argentina, a rainha das forrageiras encontra seu "habitat". Já em 1872 se cultivavam na Argentina 2.000 hectares de alfafais, cifra esta que duplicou em 1888, chegando em 1913 a 6,5 milhões de hectares. O cultivo da alfafa então se impôs definitivamente, em vastas extensões da região pampeana.

A area total cultivada na Argentina se divide em duas partes: uma abrangendo superficies, cuja alfafa se destina ao corte, para consumo verde ou fenada; outra, que serve para o pastoreio. Durante o quinquenio 1942/43 a 1946/47, numa extensão de quase 5.700.000 hectares de alfafa, 1,25 milhões foram destinados ao corte e o restante ao pastoreio. Predomina, pois, este tipo de aproveitamento da alfafa. Trata-se de um fato sugestivo e até impressionante para tecnicos e criadores alheios ao meio. Em outros paises, salvo raras exceções a alfafa é utilizada como forragem de corte. Sua transformação em planta de pastoreio

O HOMEM QUE SABE ESCOLHER
EMPREGA

TELHAS FIBRO - ASFALTICAS
MINERALIZADAS

ONDALIT

2 Cores branca ou vermelha

LEVES
DURAVEIS
PRATICAS
ECONOMICAS

FACIL TRANSPORTE - MADEIRAMENTO LEVE
COLOCAÇÃO SIMPLES

Solicite folheto as casas do ramo ou a fábrica:

ONDALIT Caixa Postal. 3398 - SÃO PAULO

O BEZERRO RECEM-NASCIDO

(Globe Press)

NOVA YORK - O bezerro recém-nascido merece cuidados especiais. A umidade do chão e as correntes de ar no estábulo podem arruinar-lhe a saúde e mesmo provocar-lhe a morte.

Isto pode ser evitado facilmente, construindo-se, com o próprio material de refugio que sempre se encontra nas fazendas e sítios, uma especie de plataforma, onde o bezerro ficará livre do perigo da frialdade. Foi o que fiz recentemente, quando o encarregado de meu sítio me preveniu de que o ultimo bezerrinho nascido na fazenda estava ameaçado de morte, se continuasse no chão frio do estábulo. Com meu soldador para fazendas da General Electric, soldei algumas varetas de metal de 75 centímetros de comprimento, aproximadamente. Enterrei-as no chão e, a uns dez

centímetros de altura soldei ás mesmas varetas transversais. Cobri três dos lados com pedaços de papelão e, para servir de porta, usei um pedaço de tela, suspensa num cano de meia polegada de diametro. Uma chapa metálica serviu de soalho; coberta de palha; constitui um magnifico curral para o bezerrinho.

Segundo anuncia, em Chicago, o centro produtor de carnes dos Estados Unidos, no ano passado o povo norte-americano consumiu a quantidade recorde de cerca de um bilhão e duzentos milhões de quilos de carne em conserva. Esse total representa um aumento de 7% em comparação com o ano anterior e três vezes mais do que o consumo de antes da guerra. Contudo, o consumo de carne em geral teve, nos

Estados Unidos, apenas um aumento de 9% de 1939 a 1952.

Sonquanto continue a importação do gado em pé procedente do México e planos para o aumento dessa importação estejam sendo organizados, os exportadores de carne latino-americanos não souberam ainda explorar o mercado de carnes em conserva.

As restrições á importação de carne da America Latina são atualmente menos rigorosas e, tendo-se em conta a crescente aceitação de carnes e conservas, que se deve em grande parte ao seu custo reduzido, é de esperar que os exportadores latino-americanos venham a aproveitar da possibilidade que lhes está aberta.

A grande usina de congelação de peixe, montada pela Worthington Corporation em Lima, constitui um exemplo da facilidade

Conclui na pag. 29

significa a presença de condições muito favoráveis á sua vegetação. O subsolo permeavel permite alcançar com facilidade os elementos nutritivos e a agua até grandes profundidades, dando origem a uma vegetação luxuriante e resistindo á ação repetida da preensão dos animais e do pisoteio. A pastagem continua e o pisoteio atuaram como forças eliminadoras das formas inadaptaeis este sistema de utilização.

No Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, na parte austral do vasto territorio brasileiro, que pertence ecologicamente á zona rio-platense, se registra uma superficie de 28.000 hectares cultivados com alfafa, área esta reduzida em comparação com a extensão da Argentina. No Brasil, o total de áreas cultivadas com alfafais oscila ao redor de 30.000 hectares, pondo em destaque o Rio Grande do Sul. Apesar de pequena, a superficie cultivada no Rio Grande do Sul supera de forma apreciavel a do Uruguai. A extensão dos alfafais do Uruguai, que era de 10.708 hectares em 1937, passou para 15.132 hectares em 1946, chegando a 17.078 hectares em 1951. Justifica-se esta pequena plantação no Uruguai: seus solos são compactos, impermeaveis, ligeiramente acidos, o que difere do observado na Argentina e mesmo no Rio Grande do Sul. Aqui, os alfafais se encontram em geral na região serrana.

(Resumo e adaptação por J. Assis Ribeiro do trabalho publicado na revista "Asociación Rural del Uruguai" n. 2-3, Ano LXXX — Fevereiro — Março de 1953)

A indústria leiteira do Estado de São Paulo

José ASSIS RIBEIRO

Med. Vet. - Assistente da Faculdade de
Med. Veterinária de São Paulo

Oswaldo D. SOLDADO

Med. Vet. - Chefe da Seção de Derivados
do Leite do Departamento de Produção
Animal

Carlos SCALZO FILHO

Med. Vet. - Da Seção de Beneficio-
mento do Leite do Departamento de
Produção Animal - S. Paulo - Brasil.

II

PRODUÇÃO DE MANTEIGA

O Estado de S. Paulo não é grande produtor de manteiga; sua produção não ultrapassou 4.900 toneladas em 1951. Houve diminuição de 900 toneladas com relação a 1950, por motivo da seca prolongada, da escassez de concentrados, do desvio de leite para consumo, e, principalmente, do baixo preço pago pelo creme. Todos estes fatores negativos não se verificaram no corrente ano de 1952, no qual temos tido manteiga em quantidade suficiente. Os armazéns frigoríficos da Capital mantêm grande tonagem do produto, caso virgem neste setor da indústria de laticínios em nosso meio, nestes últimos anos, pois, esta época se caracteriza pela escassez de manteiga.

A ausência de seca no corrente ano afastou a costumeira quebra da produção; o aumento do preço do leite, tanto para o consumo como para a indústria, estimulou os fazendeiros à maior tiragem; a permissão da padronização da gordura do leite de consumo (tipo C) para 3% possibilitou a obtenção de cerca de três toneladas diárias de manteiga extra, nas usinas da Capital, e, finalmente, a distribuição racional dos concentrados (torta de algodão) aos fazendeiros possibilitou melhor arraçoamento das vacas leiteiras, resultando aumento geral da produção leiteira e, conseqüentemente, da manteiga.

Teve o poder público paulista uma visão exata do problema da produção da manteiga, quando determinou melhor remuneração ao leite e seu pagamento pelo teor de gordura. Isso, aliado à padronização da gordura do leite de consumo completou, efetivamente, a estrada larga e segura do aumento da produção do leite.

A manteiga paulista pôde ser considerada uma das melhores do País, porquanto sua produção se processa em nível técnico elevado, não só quanto à matéria prima, como quanto às instalações, havendo vários estabelecimentos com aparelhagem completa para obtenção da manteiga extra. O consumidor paulista é exigente e prefere esta qualidade, embora mais cara. A quasi totalidade da manteiga vendida na Capital é sem sal e empacotada mecanicamente, algumas em embalagem artística, em papel metálico com rotulagem decorativa. Dado o grande número de estabelecimentos que empacotam manteiga, S. Paulo é, no momento, a cidade brasileira mais bem servida de aparelhagem de empacotamento, com capacidade superior a 10 mil quilos por hora.

PRODUÇÃO DE QUEIJOS

A produção paulista de queijos é pequena, não ultrapassando 3.500 toneladas anuais, menos de 10% da produção nacional. Estatísticas de há uns vinte anos revelam maiores tonagens de produção. Este decréscimo pode ser atribuído ao sensível aumento do consumo do leite em natureza. Os estabelecimentos inspecionados (inspeção estadual ou federal) acusam uma produção de 2.120 toneladas em 1951, calculando-se em 1.200 toneladas a produção sem inspeção.

Bons estabelecimentos industriais especializados em queijos finos estão sendo montados no Estado, indicio das possibilidades disponíveis. Se, de um lado, nessas condições climáticas não facultam ambiente para determinados tipos de queijos moles, devemos salientar que, apesar do nosso clima tropical, podem ser produzidos queijos macios e duros de ótima qualidade, iguais e mesmo melhores que congêneres importados. A prova temo-la nos queijos tipo Parmesão, Provoloni, Edam, etc. que, fabricados em determinadas regiões, podem ser comparados, em seus caracteres organolépticos e físico-químicos, aos congêneres estrangeiros de alta qualidade. Para elucidação, diremos que estes queijos têm atingido maior produção e melhor qualidade, nas zonas de Angatuba, S. João da Boa Vista, Batatais, Franca e Altinópolis. A conhecida "mussarela", tão procurada pela colônia italiana, tem sua fabricação disseminada por todo o Estado.

Dos queijos nacionais devemos ressaltar o Minas e o Prato, que constituem tipos perfeitamente adaptados às nossas condições. Para isso contribuíram de maneira efetiva a colaboração prestada pelos Cursos de Laticínios do Departamento de Produção Animal, e da Fabrica-Escola de Laticínios "Candido Tostes", em Juiz de Fora, Minas, onde nossos técnicos têm realizado cursos de aperfeiçoamento na técnica de fabricação destes e de outros queijos.

Técnicos nacionais e estrangeiros, estes emigrados de varias regiões da Europa, principalmente da Itália, têm procurado não só aperfeiçoar tipos conhecidos como introduzir outros.

Nossa Capital dispõe da maior fabrica de requeijão do País, e, em Campinas, são fabricados os mais interessantes tipos de "creme-suisse" e "duplo-creme". Também já está sendo fabricado, em Iporanga, com a mesma técnica nordestina, e tendo boa aceitação, o "requeijão do sertão".

As fabricas de manteiga do Interior adotam o sistema de trabalho com cremes ácidos (tres a cinco), batidos sem tratamento prévio; lavagem com agua filtrada refrigerada, batição e malaxagem em batedeira conjugada e enlatamento em latas de folha de Flandres. Os grandes estabelecimentos tendem a melhorar as instalações para obtenção de produto de melhor qualidade.

O consumo de manteiga na Capital Paulista é, em media, de 20 toneladas diárias, o que corresponde a perto de 40% do consumo total do Estado. Nesta base, a produção paulista corresponde a 1/3 do seu consumo, participando do fornecimento os Estados de Goiás e Minas Gerais.

Sabe-se que a manteiga é um dos muitos produtos cujo custo de produção, no País, é superior ao preço de importação do congêneres estrangeiro. Por isso, o êxito da industria da nossa manteiga depende das restrições da importação.

Por outro lado, o custo da produção da manteiga está diretamente subordinado ao preço da caseína, como sub-produto da industria manteigueira. O leite desnatado tem, em nosso meio, grande aplicação na fabricação de caseína. Quando a caseína alcança bom preço, baixa o custo da produção da manteiga e, assim, pode ser vendida barato. No momento, a caseína está sem preço. A manteiga nacional tem que enfrentar, de um lado, a concorrência do produto importado (por quasi a metade do preço de tabelamento) e de outro, os preços altos da matéria prima, juntamente com a depreciação da caseína. É o inicio da crise desta industria, já nitida em varias zonas de produção, cujos industriais não sabem que direção tomar. A solução está nas restrições da importação de manteiga e de caseína.

PRODUÇÃO DE MARGARINA

S. Paulo dispõe de fabricas de margarina de mesa modelarmente instaladas, obedecendo a fabricação deste produto às mais recentes aquisições tecnologicas. O tipo preferido pelas fabricas paulistas é o da margarina vegetal, sem participação de gordura animal na composição. Isso apresenta, ao nosso ver, dupla vantagem: barateia o produto, por empregar oleos vegetais hidrogenados, de preço relativamente baixo e o torna mais tolerado por organismos sensíveis a gorduras animais.

A produção nos estabelecimentos da Capital, no primeiro semestre de 1952, foi de 786.387 kg de margarina de mesa e 398.540 kg de margarina para pastelaria.

PRODUÇÃO DE CASEINA

S. Paulo é o maior Estado produtor de caseína. Dispondo de boas instalações para obtenção do produto, possui mesmo uma fábrica dos melhores secadores rotativos para caseína.

O tipo obtido em nossas fábricas é a "caseína láctica", isto é, da fermentação ou acidificação natural do leite desnatado, destinando-se ao preparo de cola de madeira. Nossa produção de caseína está assim subordinada diretamente à sua aceitação pelas fábricas de cola para madeira compensada. A maior fábrica de cola se acha no Paraná, justamente na zona que influi sobre este Estado e o de Santa Catarina — os dois maiores centros de produção de madeira. Dada a relativa proximidade da Argentina, a caseína deste País é a maior concorrente da caseína nacional. A Argentina, em certas épocas, pode fornecer-nos caseína de qualidade igual ou superior à nossa, por preço que corresponde à metade, às vezes, menos! Como os industriais da madeira compensada têm interesse em diminuir o custo da produção (pois a madeira nacional é muito cara), a preferência é para o emprego da caseína importada. Importações de caseína têm sido feitas, em flagrante prejuízo da indústria nacional deste produto, que se encontra, no momento, em sua mais grave crise, estando prestes a desaparecer totalmente.

Como caseína é produto que se conserva por muito tempo, nossos fabricantes costumam retê-la em estoques, até conseguirem bons preços, o que somente acontece quando há restrições à importação. No ano passado, a caseína alcançou até Cr\$ 22,00 o kg, e todo o estoque foi vendido. Atualmente, está a Cr\$ 10,00 e não acha compradores. É que, no momento, está aberta a importação da caseína argentina, que nos chega por menos da metade deste preço. Em consequência, a indústria da caseína está paralisada.

Sabe-se que nossa produção de caseína pode alcançar e mesmo ultrapassar as necessidades do nosso consumo, bastando para isso confiança no mercado. Esta confiança será conseguida com a estabilização do preço do produto em base econômica, e isso só será possível se se proibir a importação. 75% dos produtos nacionais têm custo de produção superior ao preço de importação do estrangeiro. A caseína é um destes. E, si para os demais há restrições, em amparo da indústria nacional, o mesmo se deve aplicar à caseína, a fim de que a sua produção possa desenvolver-se em nosso meio.

FABRICAÇÃO DE LACTOSE

A produção de lactose, em nosso Estado, é mínima, não tendo chegado a uma tonelada em 1951. Todavia, esta produção já foi bem maior. As poucas firmas que se interessaram por ela já desistiram, por não encontrarem bases econômicas. A situação da indústria da lactose muito se assemelha à da caseína: a produção depende dos preços de venda do produto importado; quando há restrições à importação, a lactose nacional sobe de preço, sua produção aumenta, mas logo tende a desaparecer, porque surge o concorrente estrangeiro.

A lactose em nosso meio é aplicada em produtos farmacêuticos, tendendo o maior consumo a se verificar na produção de antibióticos, o principal dos quais é a penicilina.

O maior prejudicado com a inexistência da lactose nacional talvez não seja a indústria leiteira, pois, estando a lactose a preços ínfimos, o aproveitamento da sua matéria prima (soro de queijo ou de caseína ácida ou de coalho) se faz na alimentação de porcos, bastante comoda e lucrativa. Como o preço da lactose importada corresponde a 55-60% do custo da produção nacional, a venda desta lactose pelo preço da importada proporciona vantagem inferior ao aproveitamento do soro na alimentação de suínos.

Consideramos que a inexistência da indústria nacional de lactose é prejudicial à indústria farmacêutica, que sempre ficará na dependência da importação. Como nada pode garantir-nos importações constantes (pois as vicissitudes do nosso comércio internacional são manifestas), nossa produção de antibióticos pode sofrer sensíveis colapsos, de graves consequências para todos.

Se a lactose figura nos 75% dos produtos nacionais cujo custo de produção é superior ao preço de importação do congener estrangeiro e, se para todos estes produtos há restrições de importação, o mesmo critério deve ser adotado para com a lactose, a fim de que, em nosso meio, tanto a indústria leiteira, como a farmacêutica possam desenvolver a produção de antibióticos.

LEITES DESIDRATADOS

Estão localizados no Estado de S. Paulo os maiores estabelecimentos de desidratação de leite, tais como os de Araraquara, Araras, Cruzeiro e Porto Ferreira, estes dois últimos inaugurados no ano corrente. São ainda pequenos os de Mococa (especialidade em leite em pó) e o de Taubaté (especialidade em leite condensado), havendo projetos de construção em várias localidades.

A pequena produção de queijos e manteiga é fartamente compensada pela de leites desidratados (condensado, evaporado, em pó, farinhas lácteas, etc.) cujos estabelecimentos produtores no Estado são modelares, e cuja produção é a maior do País. A produção dos principais produtos têm sido crescente, bastando-nos citar as referentes aos anos de 1949 a 1951, assim distribuídas:

ANOS	LEITE CONDENSADO kg	LEITE EVAPORADO kg	LEITE EM PÓ kg
1949	11.707.895	24.112	5.088.018
1950	12.401.358	48.6222	5.304.926
1951	11.288.581	50.178	7.609.637

S. Paulo, 1952.

Apesar das facilidades na importação de leite em pó, cuja grande parte é exposta ao consumo por preço inferior ao do congener nacional, nossa produção continua intensa e tende a aumentar. Nota-se visível preferência do público pelas marcas nacionais, que são vendidas por preço relativamente alto. Na opinião dos consumidores, poucas são as marcas de leite em pó estrangeiro melhores que as nacionais. Isso é procedente, sabendo-se que nossas fábricas são novas, ou de recente reforma, dispoem da mais moderna e mais eficiente aparelhagem, onde o leite é atomizado, dessecado, embalado e gaseificado pelos mais modernos processos.

É interessante notar três pontos de valor, neste assunto:

1.º Não dispomos de maior número de fábricas de leite em pó, por efeito de dificuldades de obtenção de cambiais para importação de máquinas.

2.º A regulamentação federal atual exige o mínimo de 26% de gordura nos leite em pó integral. Somos contrários a esta tão alta porcentagem (que deveria ser 24%, como sempre foi), dado que maior quantidade de gordura torna o leite mais caro, mais perecível e menos tolerado pelas crianças hipersensíveis às gorduras animais.

3.º Em nenhuma época como a atual nossa Capital dispôs de tanto estoque de leite em pó. Houve excesso de importação e, em consequência, o produto está sendo distribuído a preços reconhecidamente baixos. Calcula-se em 9.500.000 kg a importação total do leite em pó, no corrente ano, justamente o dobro de 1951. A maior parte se destina ao Estado de S. Paulo, que funciona como redistribuidor.

Ao encerrar, queremos consignar nossos agradecimentos ao sr. Altino Neto, estatístico da D.I.P.A.O.A. do D.P.A., pela presteza com que nos forneceu os elementos numéricos para este trabalho.

A "REVISTA DOS CRIADOS"

já mantem as seguintes secções:

- JURIDICA
- ECONOMIA
- HIGIENE RURAL
- ADUBAÇÃO
- AVICULTURA

Que outras secções julga o leitor que devemos criar? Escreva-nos dando sua resposta.

O MUNDO EM FOCO

Eduardo del Campo
(Da Globe Press)

Rejubilem-se os carecas

Os carecas podem ter afinal um consolo. A revista da Associação Médica Britânica afirma solenemente que, em geral, os calvos são mais viris que os homens de opulentas cabeleiras.

Segundo experiencias bioquímicas, num grupo de 20 homens com deficiência de hormônios masculinos, 18 não ficam calvos. Quando foram aplicadas injeções de hormônios em homens nessas condições, seus cabelos começaram a cair imediatamente.

A relação entre a calvície e a virilidade parece estar corroborada por experiencias semelhantes realizadas nos Estados Unidos, pela Escola de Medicina de Brooklyn e Universidade de Pensilvânia.

Fiquem sabendo, portanto, os leitores — e principalmente as leitoras. Os carecas valem muito mais do que se pensa. . .

As vacas e o rum

Até agora, as vacas comiam milho e capim. Mas tudo se complica no mundo, e estão sendo feitas experiencias para se alimentar as vacas com melaço que, como é sabido, provem da cana de açúcar e serve para produzir rum.

A idéia foi ministrar às vacas, não o rum, mas glicose e carboidratos, juntando-se melaço a forragem. O problema, porém, consistia em elevar-se o pegajoso produto até a parte alta do paiol, a fim de misturá-lo à forragem. Os interessados consultaram então a Worthington Corporation, uma das maiores produtoras de bombas do mundo e os engenheiros apresentaram um tipo de bomba que se mostra plenamente satisfatório para o caso. Agora, as vacas podem deliciar-se com o melaço, já que o rum é privilégio dos homens.

A lei contra os gordos

No Estado de Rhode Island, engordar muito, se não é crime, é, pelo menos, uma contravenção, segundo parece. . . De fato, uma senhora que pesava 112 quilos foi condenada por um tribunal a emagrecer 15 quilos em dez semanas. Trata-se da sra. Filomena Skinner, de 29 anos, que, ha cinco anos, vítima de acidente de trabalho, passou a receber um seguro e seu peso aumentou de 78 para 112 quilos. A não ser isto, goza saúde perfeita, mas como está excessivamente gorda para trabalhar, preferia continuar recebendo o seguro.

A sentença que a condenou declara que sua gordura nada tem que ver com o acidente e que "tal obesidade é um luxo". Terá que perder peso e voltar para o trabalho ou deixar de receber o seguro.

Ao mesmo tempo, em Hanover, Alemanha, um acusado estava excessivamente gordo para com-

parecer perante o Tribunal e o Tribunal compareceu perante êle. O cavalheiro em questão pesa a bagatela de 200 quilos e, como não havia automovel capaz de conduzi-lo até o tribunal, os magistrados foram interrogá-lo em sua própria casa. Sua absolvição parece, aliás, garantida, não devido à sua inocencia, mas sim devido à sua obesidade; não caberia numa prisão.

Quem quer comprar tartarugas?

Uma fábrica de conservas de Erlangen, na Alemanha, encomendou 8.000 tartarugas para fazer sopas e recebeu, em vez da espécie marítima, que é comestível, exemplares da espécie terrestre. As 8.000 tartarugas estão ocupando muito espaço e a fábrica se dispõe a vendê-las a qualquer preço. . .

Bichol

O SALVADOR DOS ANIMAIS
MARCA REGISTRADA

GRACIAS AO BICHOL OS ANIMAIS
ESTÃO FORTES E SADIOS

REMÉDIO INFALÍVEL
PARA A CURA DE
BICHEIRAS, FERIDAS
BERNES, PISADURAS, ETC

CUIDADO COM
AS IMITAÇÕES

FABRICAÇÃO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA VENTURACCI

FÁBRICA E ESCRITÓRIO
RUA FAUSTOLO, 898 * SÃO PAULO * TEL. 5-0791

Á VENDA TAMBÉM NA
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES
RUA SENADOR FEIJÓ, 30 — SOBRE LOJA

REVISTA DOS CRIADORES

SUPERFOSFATO

«ELEKEIROZ»

SUPER COLHEITAS com o mais poderoso fertilizante

SUPERFOSFATO
20/21% DE P_2O_5

Elekeiroz
MARCA REGISTRADA

50 QUILOS
Produtos Químicos «ELEKEIROZ» S.A.
SÃO PAULO
Desvio - ELEKEIROZ
VARZEA - E.F.S.J.

De completa solubilidade

Indispensável em todas as culturas.

Acondicionado em sacos de papel tipo "BATES"

Aceitamos pedidos de qualquer quantidade para pronta entrega

PRODUTOS QUÍMICOS «ELEKEIROZ» S. A

Rua S. Bento, 503 - Caixa Postal 255 - SÃO PAULO

MARCA P. A.
SELO DE GARANTIA

FAZENDAS REUNIDAS

ANTONIO DE

MUNICIPIO DE PARAIBA

ESCRITORIO DE VENDAS: Rua São José

OS NOSSOS PLANTEIS GIR E NELORE, FORMADOS POR RES E MELHORES

Ilustramos estas páginas com fotos dos produtores de Pirai, realizada em Agosto do corrente ano. Todos os animais registrados e selecionados sob rigoroso controle do Ministério da Agricultura e Campeã da raça Gir. — 2. — "BARREIRA", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Gir. — 3. — "PRINCIPE", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Gir. — 4. — "GAUCHO", 1.º prêmio na sua categoria. — 5. — "Conjunto", 1.º prêmio e campeã da raça Nelore. — 6. — "CHEQUE", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Nelore. — 7. — "GRANFINA", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Nelore. — 8. — "MELHORES", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Nelore. — 9. — "MELHORES", 1.º prêmio e reservado campeão da raça Nelore.

Ilustra a capa desta edição da "Revista dos Produtores"
honroso título de "Campeão"

DAS PACIENCIA

MARCA P. A.
SELO DE GARANTIA

LA AFONSO

— Est. do Rio de Janeiro

— Tel. 32-9987 — RIO DE JANEIRO

ANIMAIS REGISTRADOS, FIGURAM ENTRE OS MAIORES DO BRASIL.

apresentamos na 8.ª Exposição de Barra do
animais expostos são filhos de pai e mãe re-
anguinidade. — 1. - "GRAN-FINA", 1.º pre-
mio e reservada campeã da raça Gir. — 3
ra Gir. — 4. - "DITADOR", 1.º premio e cam-
peã campolina. — 6. - "DIAMANTINA", 1.º
campeão da raça. — 8 - "URCA", 1.º premio
entre os garrotes da raça Nelore. — 10 -
novilhas da raça Nelore.

"o nosso conjunto Gir, que conquistou o
campeão de raça."

O que se deve saber sobre a verminose

G. P.

I

Verminose é a infestação do organismo por vermes intestinais.

Para quase toda a gente, quando se fala em verme intestinal, vem logo à idéia a lombriga (*Ascaris lumbricoides*), que pelo seu tamanho e por sua frequência, sobretudo nas crianças, é o parasita intestinal mais conhecido, e é no comum chamado simplesmente verme. Entretanto, a lombriga não é o único verme que infesta o organismo humano nem é o mais perigoso.

Ha diversas especies de vermes que vivem nos intestinos das pessoas, e por uma das características da sua conformação, são divididos em dois grupos: vermes roliços ou cilindricos e vermes chatos. Dos roliços, são mais comuns o ancilóstomo e o necátor, causadores da opilação ou amarelão, as lombrigas, os oxiuros e os tricocefalos; dos vermes chatos, sodatrias (taenias e hymenolepis).

Os vermes se reproduzem por meio de ovos; mas são raras as especies em que a evolução toda do verme se dá dentro do organismo no qual ele vive na fase adulta, e que se denomina **hospedador definitivo**; geralmente

os ovos geram as larvas fora desse organismo: na agua, nas terras umidas, nas terras secas, etc., ou no corpo de outro animal, que se chama **hospedador transitório** ou **intermediário**. Esta noção, que é muito importante para que se compreenda bem a utilidade de certas medidas destinadas a evitar a infestação pelos vermes, será explicada particularmente para cada verme, nos topicos que vêm a seguir.

Amarelão

No quadro geral das verminoses, o amarelão ou opilação merece especial destaque, não só pela sua grande disseminação em nossas zonas rurais, mas sobretudo por sua notavel repercussão economica, reduzindo a quase nada a capacidade produtiva do opilado, tornando-o pelo acentuado enfraquecimento do seu organismo, facil vitima de varias outras doenças.

O amarelão é causado por duas especies de vermes, muito proximas uma da outra: o necátor e o ancilóstomo (ou uncinária). De ancilóstomo deriva ancilostomíase, que é a denominação técnica desta verminose.

O necátor e o ancilóstomo são muito semelhantes pela forma, pelo modo de viver, pela evolução e pela maneira por que exercem a ação malefica no organismo parasitado; diferenciam-se, porém, por alguns detalhes anatomicos e se distinguem pela sua distribuição geografica: o ancilóstomo é mais frequente na Europa, embora não seja raro no Brasil e em outros países da América; e o necátor é mais comum em nosso continente.

São eles vermes pequeninos, brancos ou rosa-palido, medindo mais ou menos um centimetro de comprimento; o necátor ligeiramente menor que o ancilóstomo. Vivem na parte superior do intestino delgado, a cujas paredes se fixam, nutrindo-se da mucosa que as reveste e tambem do

sangue que goteja das feridas. E como um opilado pode abrigar no intestino varias centenas ou alguns milhares de vermes, é fácil calcular o prejuizo que o organismo sofre. No entanto, essa grande expoliação não apresenta todo o mal que o verme do amarelão causa ao homem, nem é o mal pior. A medida que cortam e arrancam pedaços da mucosa do intestino, os vermes deramam no sangue um veneno — a ancilosina — que destrói os glóbulos vermelhos do sangue, o elemento util por excelencia para a nutrição do corpo, de modo que o sangue fica **aguado** e o organismo cada vez mais mal alimentado.

Vivendo no intestino do opilado em tão grande número, os vermes do amarelão põem uma quantidade fabulosa de ovos, que são eliminados com as fezes. Se o indivíduo faz as suas necessidades no chão, esses ovos, encontrando na terra as condições favoraveis de ar, calor e umidade, se desenvolvem, geram a larva, que ao fim de poucos dias se reveste de uma capa e resiste, viva, durante semanas e meses, até encontrar um indivíduo que pos-

SOLUBILIDADE quer dizer:

a parte do fosfato que alimenta a planta.

A SOLUBILIDADE do HIPERFOSFATO

é 60% maior do que a de outros fosfatos naturais.

VALE A PENA VACINAR CONTRA A AFTOSA?

Este é um problema que preocupa muitos fazendeiros. O "Boletim Procampo", que acabamos de publicar, responde esta pergunta, duma forma clara e honesta, explicando as vantagens da vacinação e os cuidados necessários. Peça, portanto, hoje mesmo seu exemplar "GRATIS" à Organização Veterinaria Procampo. — Rua Xavier de Toledo, 70 — Salas 508/9 — Tels.: 36-3780 e 34-1493. — Telegramas "Procampo" — São Paulo, ou "Inglast Ltd." — Caixa postal, 2.795 — Rio.

sa parasitar para viver sua vida de adulto. As larvas não ficam imobilizadas no lugar em que nascem: elas se movem e se espalham, mas o modo mais frequente e mais rapido de disseminação é por meio das enxurradas, que as levam a lugares bem distantes, contaminando vastas áreas de terreno.

O modo mais comum das larvas infestarem o homem é penetrando através da pele, sobretudo da pele dos pés das pessoas que pisam descalças a terra em que as larvas estão, e também pela pele das mãos ou de outra parte do corpo que se ponha em contacto com a terra contaminada. Mas podem, também, penetrar no organismo pela boca, levadas pelas verduras e frutas mal lavadas, ou mesmo pela água contaminada.

Do conhecimento da maneira pela qual se desenvolvem os vermes do amarelão, resultam as medidas que devem ser postas em pratica para evitar a disseminação da doença. Uma vez que o homem só contrai a doença porque as larvas dos vermes lhe penetraram no corpo através da pele em contacto com a terra contaminada ou ingerindo agua, verduras e frutas também contaminadas pela terra, e uma vez também que a larva nasce de um ovo que o homem doente eliminou e depositou no chão com as fezes, as medidas principais para evitar a disseminação do amarelão são: 1.º) só fazer as necessidades em privadas ou em fossas, e nunca no chão; 2.º) andar sempre calçado, para resguardar a parte do corpo que estaria em permanente contacto com a terra; 3.º) tratar os doentes para eliminar os focos de disseminação.

Lombrigas

A infestação pelas lombrigas é também muito prejudicial ao organismo. Prejudica pelos ferimentos que elas fazem no intestino do doente, facilitando, assim, a penetração de germes de outras doenças. Prejudica pelo numero, que às vezes é tão grande (varias centenas) que impede o transito do conteúdo intestinal. Mas prejudica sobretudo pela inoculação de substâncias venenosas que as lombrigas se-

GADO GYR

A CRIAÇÃO IDEAL PARA OS TRÓPICOS: ECONÔMICO, ROBUSTO, PRECOCE, SÓBRIO, MANSO E GRANDE PRODUTOR DE CARNE E LEITE.

RAMADÁ, JUREIA, URUBAMBA, e UBERLANDIA, marca

Eva

Aumente a soma de seus lucros utilizando bons reprodutores em seu rebanho. Para bem comprá-los, prefira-os da raça GYR, marca *Eva* da criação do Dr. Evaristo S. de Paula, cujo processo de seleção e melhoria obedece a um trabalho sistematizado e contínuo de quase meio século.

Detentor de inúmeros campeonatos e outros prêmios em Exposições Nacionais, Estaduais e Regionais.

Eva

A ostentação desta marca representa garantia de pureza racial e distingue animais de alto poder genético.

DR. EVARISTO S. DE PAULA

FAZENDA da CORTUME
CAIXA POSTAL, 19
CURVELO - MINAS

cretam. Essas substâncias venenosas destroem os glóbulos vermelhos do sangue, embora muito menos intensamente que a secreção do verme do amarelão, mas o bastante para produzir apreciável anemia nos doentes. Excitam as terminações nervosas, provocando cólicas, dores vagas, e também os centros nervosos, provocando convulsões, etc..

A lombriga é um verme roliço, medindo 15 a 17 centímetros o macho e a fêmea 20,25 e até 40 centímetros de comprimento. Cada fêmea pode pôr durante um ano algumas dezenas de milhões de ovos. Estes ovos, como os dos vermes do amarelão, não se de-

envolvem no intestino das pessoas; eles amadurecem no exterior, na água ou na terra úmida, depois de expelidos com as fezes, mas não dão a larva como o ovo do ancilóstomo ou do necátor, apenas se forma o embrião. E o ovo assim gerado, quando engulido com a água ou com as verduras e as frutas cruas e mal lavadas, dá nascimento a uma lombriga no intestino da vítima. O ovo da lombriga depois de maduro se conserva por muito tempo e resiste até ao dessecamento. Por isso a disseminação deles é muito fácil: são arrastados pelas enxurradas, transportados pelas águas de rega para as hor-

taliças e frutas de plantas rasteiras (morangos), e também são carregados pelo vento junto com as poeiras.

Os meios de evitar essa verminose e a sua propagação são parecidos com os empregados para o amarelão: usar privadas, latrinas, fossas, e nunca fazer as necessidades no chão, para não contaminar o solo com os ovos do verme; só comer verduras e frutas cruas que sejam bem lavadas; só beber água fervida ou filtrada.

OXIUROS

A infestação pelos oxiuros é também das mais frequentes. O sintoma capital nesta verminose é acoceira do anus,coceira insuportável, principalmente à noite, e que deixa o doente, geralmente criança, inquieto, agitado, sem poder dormir. A oxiurose prejudica, em parte por essacoceira irritante, que pode determinar varias manifestações nervosas, em parte pelos ferimentos que os vermes produzem nos intestinos, facilitando a penetração de germes de outras doenças.

Os oxiuros são vermes pequenos, como diminutos pedaços de linha, o macho medindo cerca de meio centimetro, e a fema mais ou menos um centimetro. Ao contrario da lombriga e dos vermes do amarelão, os ovos dos oxiuros se desenvolvem dentro do intestino do doente, dentro do modo que os ovos, se são ex-

O "ROYAL SHOW" DE BELFAST

O "Royal Show" de 1953 da Sociedade Real de Agricultura de Londres foi realizado em Stanley Park, Blackpool, atraindo compradores estrangeiros, criadores de gado e fazendeiros da Commonwealth e de muitos países estrangeiros, assim como fazendeiros de todas as partes da Grã-Bretanha.

A Rainha Elizabeth II acompanhada pelo Duque de Edimburgo, foi vivamente aclamada pelos habitantes de Belfast, quando visitou a cidade, durante seus três dias de viagem da Coroação ao Norte da Irlanda. No clichê acima (B.N.S.) vemos um aspecto do julgamento dos carneiros da classe Oxford Down Ram. Vem-se o Prefeito de Belfast, sr. Alderman Percival Brow, C.B.E., e o Town Clerk, sr. Dunlop.

pelidos, já têm o embrião formado. O doente, ao se coçar, carrega nas unhas e nos sulcos dos dedos ovos que depois levará à boca com os alimentos, reinfestando-se, portanto. E se o ovo é eliminado e cai em terreno seco, resiste muito tempo e pode ser transportado pelo vento, com as poeiras, indo disseminar a doença. A circunstância de ser o ovo eliminado do doente já com o embrião formado, espalhando-se pelas roupas da cama, facilita a

propagação desta verminose entre as pessoas da casa, momentaneamente nas aglomerações: internatos, quartéis, etc.. O ovo do oxiuro não resiste, porém, à umidade, e muito menos à água.

As medidas a tomar para se evitar a infestação pelo oxiuro, são: evacuar sómente em privada, para não espalhar os ovos; trocar frequentemente a roupa de cama e a roupa interna; lavar as mãos com frequência e muito cuidadosamente.

SUA TERRA É FRACA?

Dê-lhe

HIPERFOSFATO

que contém
27% de fósforo.

SUA TERRA É ÁCIDA?

Dê-lhe

HIPERFOSFATO

que contém
45% de cal.

Reprodutor da raça Mangalarga, 1.º premio em sua categoria e CAMPEÃO ABSOLUTO DA RAÇA na Exposição de Animais, realizada em Cordeiro, Estado do Rio, em Maio deste ano. É o chefe do plantel da Fazenda Vale do Sol, de propriedade do Sr. Carlos de Freitas Quintela, em Macaé, Est. do Rio.

☆

SÔRO ANTI-TETÂNICO VETERINÁRIO "Pinheiros"

☆

O TÊTANO tanto pode atingir o homem como a maioria dos animais que lhe são úteis. Estes, especialmente os muare e cavaleares, estão mais sujeitos ao contágio, porque nos seus escrementos ou fezes é que se encontram os bacilos e esporos.

Qualquer ferimento nestes animais é porta aberta para a infecção, quase sempre difícil de ser combatida. O recurso seguro para se evitar o tétano é o de injetar 1 ampola de SÔRO ANTI-TETÂNICO VETERINÁRIO do "Instituto Pinheiros" sempre que se verifique qualquer ferimento no corpo dos animais e 2 ampolas, quando houver lesão no casco.

Este sôro, aplicado em tempo oportuno, evita o mal e garante uma imunidade temporária.

O INSTITUTO PINHEIROS fabrica o Sôro Anti-Tetânico Veterinário em ampolas de 20 cm.³, com 1.500 unidades americanas, equivalentes a 3.000 unidades internacionais.

• • •

Nota: - Para garantia dos empregados e pessoas que trabalham no meio agrícola e muito especialmente os que cuidam do trato de animais, é aconselhável, a imunização ativa contra o tétano, por meio do ANATOX TETÂNICO "Pinheiros", para uso humano, com uma série de 2 - 3 injeções, com intervalo de 4 semanas cada uma.

Qualquer

ARTIGO DESTA PAGINA
EM SUA CIDADE
PELO REEMBOLSO POSTAL

PULVERIZADOR MANUAL DETEFON

Tipo "Sprayer"

Muito pratico, torna facil a tarefa de pulverizar. Qualquer crianca pode maneja-lo sem dificuldade.

Serve para pulverizar plantas, arvores, galinheiros, cocheiras, estabulos, mangueirões, banhar animais, etc.

Rapido — Eficiente — Economico.
Cada — Cr\$ 280,00.

ANTUFON

O MAIS PODEROSO RATICIDA
Não tem cheiro nem gosto para os ratos, os quais, portanto, não o rejeitam, à base de Alfa-Naftil-Ticurea, mata os ratos e ratazanas por sufocação.

O animal envenenado procura o ar livre.

Em tubos de 100 gramas.
Cada Tubo — Cr\$ 25,00.

CANULA MAMARIA

Para desobstrução do canal da teta quando não permite a saída do leite.
Cada — Cr\$ 15,00.

VACINA CONTRA A BOUBA AVIARIA

Frascos de 60 doses.
Cada Frasco — Cr\$ 16,00.

ARGOLINHAS PARA FUCINHO DE PORCOS

Evita os estragos causados pelos porcos fuçadores. Colocadas nas narinas dos porcos evita que os mesmos fuçam.

Caixa com 100 argolinhas — Cr\$ 20,00. Alicates proprio para a colocação das mesmas — Cr\$ 25,00.
Jogo completo — Cr\$ 45,00.

PENICILINA SODICA VETERINARIA

Para combate ao Garrotinho e nas infecções em geral.

Vidro de 100 mil Unidades — \$ 7,00.
Vidro de 200 mil Unidades — \$ 12,00.

Vidro de 500 mil Unidades — \$ 15,00.

RETENTOL — Soluvel para misturar com a penicilina sódica, para obter o efeito retardado (24 horas).
Ampola de dose — Cr\$ 10,00.

CHUMBEADOR PARA CASTRAÇÃO DE PORCAS E LEITOAS SEM OPERAÇÃO

Evita os inumeros prejuizos causados pelo antigo sistema de castração à faca. Com esta processo NAO HA MORTES.

Chumbeador completo, acompanhado das instruções — Cr\$ 60,00.

PENICILINA INTRAMAMARIA

Para aplicação local. Diretamente no teto da vaca no combate às inflamações do ubere.

Caixa com 12 bisnagas de 20 mil Unidades — \$70,00.

Caixa com 12 bisnagas de 50 mil Unidades — \$ 98,00.

FERROS PARA MARCAÇÃO A FOGO

Jogo de numeros de zero a nove, no tamanho de 4 ou 5 cms. de altura.
Jogo — Cr\$ 350,00.

SERINGAS VETERINARIAS: C. H.

De vidro e metal. Artigo Superior. Capacidade: 25 cm3.

Acompanha cada seringa: 2 agulhas, 2 embolos, 2 arruelas e um tubo de vidro Pyrex sobresalente.

Cada — Cr\$ 160,00.

MARCA FRIA

Moderno sistema de marcação dos animais SEM FOGO. Não maltrata os animais.

Lata de 1/2 quilo — Cr\$ 45,00.

FRIEIRAS, Calos, Feridas e Esponjas, desaparecem quando tratadas com: FRIGOL.

Cada vidro de FRIGOL — Cr\$ 25,00.

NEOCIDOL P.

O TERROR DOS CARRAPATOS
Combinação de B.H.C. com D.D.T. soluvel em agua. De grande poder molhante e aderente. Garante efeito duradouro.

Ideal no combate aos carrapatos, piolhos e sarnas dos ovinos, bovinos, equinos e suínos.

Pacote de 1 quilo — Cr\$ 50,00.

Pacote de 5 quilos — Cr\$ 240,00.

TORCEDURAS, INFLAMAÇÕES, dores reumaticas, picadas de insetos e traumatismos, são eficientemente tratados com:

LINIMENTO CALOA.

Cada Vidro — Cr\$ 15,00.

FLUID-BAYER — vd. Cr\$ 21,50

SANADOR — vd. Cr\$ 18,00

NIGERCIDA

As diarréias em geral, Curso Branco e Preto (Pneumo Enterite dos bezerros), Diarréias de sangue, Sapinho, Feridas da lingua e da pele, Lombriças e todas infecções gastro intestinais dos bezerros e outros animais desaparecem com:

NIGERCIDA.

PEDIDOS!

Associação dos Criadores

Rua Senador Feijó, 30 - 5/10ja - S. Paulo

Criação de cabritos

Coriolano Caldas Filho

Departamento da Prod. Animal

As cabras parem um ou dois cabritos, variando a importância da sua criação segundo o objetivo da exploração.

Na exploração leiteira, a criação não é lucrativa, pois o valor do leite consumido supera o preço que a carne pode alcançar mais tarde; neste caso, a desmama se impõe depois de mamado o colostro, isto é, após uma semana.

Os cabritos destinados ao corte devem ser desmamados depois de completarem um mês e, a fim de aproveitarem melhor os alimentos e produzirem carne mais saborosa, mais tenra e sem odor desagradável, serão castrados entre o 10º e 30º dia.

Na criação de reprodutores, o bom aleitamento é indispensável, recomendando-se a desmama depois de três meses.

Em todos os casos, os cabritos devem mamar o primeiro leite, chamado colostro, porque este produto, além de impróprio para o consumo, é indispensável à cria; possuindo propriedades laxativas, promove a expulsão do meconio, ou seja, do conteúdo intestinal acumulado durante a vida intra-uterina.

Depois dos primeiros quinze dias, os cabritos, naturalmente, começam a morder as ervas mais tenras e paulatinamente vão se habituando a pastar.

Na criação de animais finos destinados à reprodução, o desenvolvimento dos cabritos não deve ser prejudicado, requerendo a desmama certos cuidados. A substituição do leite materno pelos alimentos sólidos deve ser gradual; completada a idade de três meses, a fim de reduzir as mamadas, a cria deve ser separada da mãe; durante a primeira semana do quarto mês, são recomendadas duas mamadas diárias, uma única mamada durante a semana seguinte, e depois, até completa desmama, uma mamada cada dois dias.

Ao mesmo tempo que a desmama se vai processando, aumenta-se a ração de compensação, que pode constar de três partes de fubá ou quíleria de milho e uma parte de farelo; cada cabrito deve receber por dia a quantidade que queira comer, contanto que não passe de 250 gramas, devendo-se retirar os restos a fim de que, no dia seguinte, a ração não seja recusada.

Acostumada a comer, impõe-se a separação definitiva da cabra.

A cria que tenha perdido a mãe pode ser dada a outra lactante que, facilmente, a adotará, restando, quando recusada, o recurso da alimentação artificial.

O GADO ZEBU NA ARGENTINA

A acolhida que as grandes regiões pecuárias do mundo estão dispensando ao Zebu não data de longo tempo. Os primeiros exemplares da raça penetraram no Continente americano cerca de cinquenta anos depois do descobrimento, e a data em que teriam surgido no Brasil é muito discutida. Se alguns historiadores afirmam que o primeiro gado vacum chegou ao Brasil foi desembarcado na Bahia, em 1550,

e procedia da Ilha do Cabo Verde, outros sustentam que a primeira leva foi colocada em São Vicente, donde se distribuiu pelas demais capitânicas. Com a chegada de outros exemplares portugueses, formou-se o que se convencionou chamar gado crioulo do Brasil, que deu origem a muitas raças ditas brasileiras.

Em princípios do século dezanove, um navio inglês ancorado em Salvador, na Bahia, teve a

MAIS LEITE MAIS CARNE

com

GADOVITA o melhor alimento para o gado!

GADOVITA é uma ração balanceada e prensada do Moinho Fluminense, preparada cientificamente segundo as mais modernas descobertas da técnica alimentar e controlada em laboratório especializado.

GADOVITA fornece, em dosagem certa: proteínas (aminoácidos essenciais), carboidratos, vitaminas, sais minerais e demais elementos nutritivos necessários à alimentação eficiente do gado.

Administrando-se metódicamente GADOVITA, obtém-se com economia: um rebanho saudável e máxima produção!

Existem 7 tipos de GADOVITA especialmente dosados para:

- bezerras de 2 a 5 meses
- bezerras de 6 a 9 meses
- novilhos em engorda
- vacas produzindo até 10 litros de leite por dia
- vacas produzindo mais de 10 litros de leite por dia
- reprodutores
- gado em repouso

Peça folheto explicativo

**MOINHO
FLUMINENSE S. A.**

RIO DE JANEIRO:
Seção Rações Balanceadas
Av. Presidente Vargas, 463-A
Caixa Postal: 1.350
Tel. 43-7398

Div. Litér

sua carga vendida em leilão para pagamento de dívidas. Figurava na carga um casal de Zebus, e afirma-se terem sido esses os primeiros exemplares da raça surgidos em nosso País. A importação desse gado foi crescendo com os anos. Mas nos Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Chile e Argentina ergueram-se obstáculos à importação do Zebu, alegando-se a má qualidade da sua carne, e dando-se preferência às raças europeias. Nos Estados Unidos, o primeiro casal de Zebu apareceu em 1849, na Carolina do Sul. Mais tarde, no Texas, fizeram-se cruzamentos para obter-se um produto de alta resistência às molestias. Esses cruzamentos amudaram-se, e daí a grande quantidade, nos Estados Unidos, de híbridos de Zebus com raças européias, bem como a grande difusão do Zebu no Sul do país.

Na Argentina, somente há pouco tempo se aceitou o Zebu. "Desde 1941 — diz uma revista agrícola argentina — se vêm executando em alguns estabelecimentos de criação do Norte da Argentina interessantes trabalhos zootécnicos tanto puros como em cruzamento com as raças britânicas "Shorthorn", "Hereford", "Aberdeen-Angus" e "Sussex-Red Polled". O objetivo é conseguir êxito igual ao observado nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil e outros países de clima tropical e subtropical. Como é sabido, em certas condições, somente o gado muito rústico é capaz de suportar temperaturas altas, doenças infecciosas e parasitárias, especialmente o carrapato e moscas, e se é certo que em determinados campos, os mestiços de gado britânico, melhorados, às vezes progridem, existe já formada a consciência de que, à medida que se eleva a qualidade desses rebanhos mediante cruzamentos, declina sensivelmente a vitalidade dos animais, perigando o êxito das explorações pelas elevadas mortalidades verificadas sobretudo nos bezerros, ao nascer. Já se provou agora, inclusive na Argentina, que a infusão de sangue

do Zebu nos rebanhos nacionais não prejudica sua qualidade ou capacidade produtiva de carne, e até mesmo lhe confere "vigor híbrido" ou "heterosis", de modo que os animais cruzados são tão resistentes quanto o Zebu às características do meio ambiente. Os trabalhos estão sendo supervisionados por técnicos do "Ministerio de Agricultura y Ganaderia" e tudo indica que um grande futuro aguarda os esforços e sacrifícios econômicos que realizam os criadores progressistas."

Agora, uma das melhores es-

tâncias argentinas, "La Calera", do sr. Celedonio Pereda, importou da fazenda norte-americana Hudgins, situada em Hungeford, no Texas, três touros Zebus, netos do touro "Aristocrata" e considerados notáveis reprodutores. Pretende o criador argentino cruzar o Zebu com o gado "Shorthorn" e "Durham" e assim obter um gado semelhante ao "Santa Gertrudes", tão famoso nos Estados Unidos. O Zebu transpõe assim as fronteiras de um dos países que maiores obstáculos ergueram à sua entrada.

FAZENDA

"BELA VISTA"

ALBERTO FERRAZ

RESENDE, R. J.

**GADO PURO DE ORIGEM
IMPORTADO DIRETAMENTE
GUERNSEY — SCHWYZ — JERSEY**

"COLDSPRINGS NOBLE LABEL" — Nascida a 29 de agosto de 1950 — Criador Sam C. Price, Hazleton, Pennsylvania e importada para a nossa Fazenda. Filha de "Coldspring's Romulus Noble". Com nove filhas em Registro Avançado, com produções acima de 6.300 quilos de leite e 300 quilos de gordura. Sua mãe, "Coldspring's Lillian", tem: Sr.-3-365 dias — 6.137,9 quilos de leite e 33,6 quilos de gordura.

ADUBAÇÃO DA LARANJEIRA

Herculano de Godoy Passos — Agrônomo

A cultura da laranja, que ha vinte anos se destacava em diversas zonas do Brasil e representou grande valor entre os nossos produtos agrícolas exportáveis, infelizmente, dizimada pela 'Tristeza' perdeu sua expressão economica. Retorna agora em ritmo acelerado, para ocupar lugar de destaque em alguns municípios paulistas, como Limeira, que já conta com 1.400.000 arvores.

Brevemente, com a nova expansão, voltaremos à exportação de citrus, que passará a ser novamente uma fonte de divisas para nosso País.

Nos Estados Unidos, a cultura da laranja tem grande projeção na California e Flórida com plantações orientadas dentro dos princípios técnicos mais aperfeiçoados. Disse o dr. Silvio Moreira, chefe da Seção de Citricultura do Instituto Agrônomico de Campinas, em sua palestra sobre a adubação, proferida dia 11 de Maio de 53, na Associação Rural de Limeira, na "3.ª Festa da Laranja", que "a adubação é o principal fator da produção de laranja nos Estados Unidos, onde, em média, se obtém tres caixas por arvore".

Na California o azoto é o elemento que rege as adubações e, em grandes doses, é incorporado ao sólo. Em laranjeiras adultas, a dose aplicada atinge a um quilo e meio, que corresponde a dez quilos de salitre por arvore. Essa aplicação é feita em tres parcelas.

Em experiencias levadas a termo, os técnicos constatarem a eficiencia dessa adubação em pulverizações nas folhas, para melhor aproveitamento.

Tambem já se faz a incorporação de elementos "vitais" ou "menores", como zinco, manganês, magnésio, molibdenio etc., pois ocorreram sintomas de deficiência desses sais nas árvores e nos frutos. A produção é função exclusiva da adubação química em doses elevadas de azoto, fósforo e potassa e pequenas aplicações dos elementos "vitais".

Em poucas zonas se usa a adubação organica e em maior escala em fórmula de adubos verdes, cujo fito principal é evitar a erosão.

Para demonstrar o efeito dos adubos minerais, em varias estações experimentais, onde labutam dezenas de técnicos e centenas de estudantes e estagiários de outros países, são feitas culturas em meio líquido, no qual são adicionados os sais minerais. Essas experiencias já contam vinte anos e as laranjeiras estão em franca produção, sem nunca terem tido contacto com o solo e o humus.

Existem na California e Flórida cerca de . . . 60.000.000 de laranjeiras, que consomem adubos minerais em derredor de 900.000 toneladas por anos, isto é, uma média de quinze quilos por pé, com uma produção de 180.000.000 de caixas. Para evitar o mal da superprodução, os nortes-americanos estão recorrendo à industrialização da laranja, pro-

curando diversas modalidades para apresentar o produto.

Enquanto nos Estados Unidos, se dão os fatos relatados, aqui estamos instalando novos pomares, porém, nas mesmas terras que outras culturas e outros pomares já exploraram e sem cuidarmos de adicionar uma adubação equilibrada ao sólo.

E' natural que as zonas velhas sejam as mais importantes para os citrus, por estarem próximas dos centros de consumo. Mas, em solos esgotados, não podemos obter produção vantajosa por arvore, se não recorrermos à adubação, para sanar as deficiencias de elementos exportados com as colheitas anteriores e também para suprir os elementos naturalmente faltantes que influem na produção compensadora.

Como o fósforo é o que menos se encontra em nossos solos, é natural que, a adubação seja feita com formulas de teor mais elevado de fósforo, porém, sempre em formula completa de azoto, fósforo e potassa. Calcula-se que uma caixa de laranja exporta em média dois quilos de uma formula de 8-6-8 de azoto, fósforo e potássio.

Aconselhamos, de acordo com as exigencias da planta e a deficiência de nossos sólos, a seguinte formula:

Adubos	Quilos	Azoto	Fosf.	Potas.
Salitre Duplo Potassico	400	6%		4%
Sulfato de Potassio	48% 100			4,8
Farinha de Ossos	500		12%	
	1000	6%	12%	8,8

Vacina c/aftosa LEIVAS LEITE CR\$ 3,80. Motores. Conjunto geradores. Dinamos. Alternadores. Wincharger. Bombas para irrigação, para poço, para pulverizar com ou sem motor. Polvilhadeiras. Maquinas para picar cana, verduro, polho, capim. Para triturar raizes. Desintegradores. Moinho para fubá dinamarquês, inglês e nacional. Lanternas "Aladin", "Petromox", "Sonambulo", "Tupan". Latões para leite. Coadores. Coalho. Brometo de metila. Formicida "Blemco", "Tatú", "MM 33". Aplicadores para brometo de metila. B.H.C. a 12%. D.D.T. Deenate. Lexone. Gamerial. Gamexone. Sablavita (Vit. B-12). Sablavina (comp. B). Sabacina (antibiotico). Oleo de figado de bacalhau e cação. Delsterol. Sulfato de manganês. Sulphamezatine. Sulfamerazina. Sulfanilamida. Sulfatiazol. Sulfaguanidina. Sulfadiazina. Fenotox. Cuprosan. Perenox. Parzate. Calda sufocálica Dupont. Enxofre. Talco. Pratt's. Termômetros para chocadeiras e animais. Criadeiras Brower. Debulhadores de milho. Lança chamas. Sementes. Tesouras para pado. Torquexa "Burdizzo" e "Hauptner". Seringas "Hauptner" e outras. Agulhas.

Todos os produtos veterinarios e agrícolas nacionais e estrangeiros
VENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL

LOJA: Rua Direita, 191, 6.º

MULTIFARMA
SÃO PAULO

A farinha de ossos pode ser substituída por fosfatos naturais.

Deve-se aplicar na razão de 500 gramas por ano de idade, até a cinco quilos por árvore de dez anos.

A adubação intensiva dos laranjais colocaria o Brasil em condições de ter uma cultura capaz de concorrer com os preços de outras nos mercados externos, apresentando melhores frutas e em maior quantidade nos mercados internos, influenciando para seu maior consumo a preços menores, sem que a cultura se torne anti-econômica para os produtos e gravosa para o País.

BIBLIOGRAFIA

ARBORICULTURA FRUTIFERA — Biblioteca Agronômica Melhoramento, n.º 4 — Heitor Pinto Cesar

Nenhum melhor índice dos méritos de um volume especializado do que suas sucessivas reedições. É o caso deste **Arboricultura Frutífera**, de Heitor Pinto Cesar, escrito para a Biblioteca Agronômica Melhoramentos, dentro da qual tomou o número 4. Aliando sua experiência e dedicação à capacidade advinda do magistério, pois, é professor da Escola Luiz de Queiroz, de Piracicaba, o autor produziu um livro de alta valia para todos quantos no País, cuidam da arboricultura frutífera.

Seis preciosos capítulos, desenvolvidos em linguagem comedida, acessível a todo público, sem com isso prejudicar a exata exposição da matéria, tratam de todos os assuntos, em minúcias, que podem conduzir a completo êxito uma cultura daqueles moldes.

As ilustrações são profusas, preparadas em função do ambiente nacional, com o que ganham oportunidade e atualidade. Gráficos e croquis marcam também um ponto alto no volume, destinado a agradar aos técnicos e aos que se estão iniciando no momentoso assunto.

INCUBAÇÃO — José Reis — Bibl. "Criação e Lavoura" n.º 2

O volume "Incubação" que o dr. José Reis acaba de publicar na coleção "Criação e Lavoura" das Edições Melhoramentos constitui absoluta novidade e um precioso guia para aqueles que se dedicam aos trabalhos avícolas. Entre os seus capítulos destacamos os seguintes: Objetivo da incubação; Estudo do ovo; Formação do ovo; Exame dos ovos; Defeito dos ovos; Fatores que influem sobre a incubação; Prática da incubação; Processos de incubar; Incubação artificial; Incubação natural; Primeiros cuidados com os pintos; Incubação dos ovos de outras aves, etc.

Este livro resolverá todas as dificuldades das grandes e pequenas empresas, que lançam mão de processos artificiais ou que fazem a incubação natural, dando-lhes uma segura orientação e proporcionando-lhes ensinamentos para conseguirem uma margem de lucro bem mais compensadora.

o Caruncho pode roubar até 75% de sua colheita

Evite esse prejuízo com polvilhamentos de

Gesarol 33

Uma única aplicação garante a proteção eficiente e econômica dos grãos armazenados — milho, feijão, arroz, etc. — contra o ataque de carunchos, gorgulhos e traças (mariposinhas, barboletinhas).

- AÇÃO SEGURA
- CONSERVAÇÃO PERFEITA
- INOFENSIVO AO HOMEM E AOS ANIMAIS
- NÃO DEIXA CHEIRO NOS PRODUTOS TRATADOS

CUIDADO COM AS IMITAÇÕES! GESAROL 33 encontra-se à venda somente em embalagens originais. Recusem embalagens abertas ou pacotes que não trouxerem impressa a marca registrada de GESAROL 33.

Solicitem folhetos e amostras!

GEIGY DO BRASIL S. A.
Produtos Químicos

Matriz
RIO DE JANEIRO
C. P. 1329

Filial
SÃO PAULO
C. P. 2544

FABRICAÇÃO DE EMBUTIDOS

RECEITAS PARA 100 QUILOS DE PRODUTO

(Do folheto Notas sobre a elaboração de produtos de salchicharia, do dr. José Bifone (médico-veterinário), publicado pelo Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura)

FORMULAS DE PREPARO DE MORTADELAS E SALAMES

MORTADELAS — Carne de bovino (magra), 82 quilos; toucinho, 18 quilos. Temperos: sal, 3 quilos e 300 gramas; salitre, 80 gramas; pimenta preta moída, 30 gramas; alho moído, 80 gramas; canela em pó, 80 gramas; cominho, 80 gramas; noz moscada, 60 gramas; cravo, 50 gramas.

A carne é finamente picada (disco 2/16); juntam-se os temperos. Quando a homogeneização está quase perfeita, a massa volta para a máquina de picar, ao 5 minutos, ao mesmo tempo que se junta trabalho da qual é submetida por 4 a 6% na proporção de 4 a 6%. Transportada para a máquina de misturar, acrescenta-se otocinho e em 5 minutos a mistura deve estar completa. Câmara fria por 12 a 24 horas ou enchimento imediato em bexigas; no primeiro caso, antes do enchimento, a massa será de novo misturada por 3 a 4 minutos.

O produto é colocado na estufa e acende-se o fogo, que lentamente deve atingir 48°C, temperatura a ser mantida por uma hora; 60°C, na segunda hora; finalmente, 71°C na terceira hora e 10 a 12 horas a 90°C.

Carne de bovino (magra), 75 quilos; toucinho, 25 quilos. Temperos: sal, 3 quilos; salitre, 100 gramas; pimenta preta em grãos, 200 gramas; noz moscada, 50 gramas; cravo, 50 gramas; canela, 50 gramas; licor de anís, 250 gramas; licor de hortelã, 250 gramas; alho moído, 10 cabeças. Proceda-se a seguir como ficou dito.

Carne de bovino (magra), 75 quilos; toucinho, 25 quilos. Temperos: sal, 3 quilos e 200 gramas salitre, 200 gramas; açúcar, 200 gramas; pimenta branca moída 100 gramas; pimenta preta em grãos, 100 gramas; noz moscada, 100 gramas; infusão de cardamomo, 100 gramas; alho moído, 8 cabeças; vinho branco, meia garrafa. Proceda-se a seguir como foi dito.

Carne de porco, 83 quilos, toucinho, 17 quilos. Temperos: sal, 4 quilos e 500 gramas; pimenta branca moída, 300 gramas; alho moído, 10 cabeças; conhaque, 1 a 1 1/2 litro. O preparo é idêntico aos anteriores; porém, a cura se faz por dessecação.

SALAMES — (tipo Rio Grande) Carne suína de 1.ª, 70 quilos; carne bovina, 10 quilos; toucinho de 1.ª, 20 quilos. Temperos: sal, 4 quilos; salitre, 50 gramas; açúcar, 100 gramas; noz moscada, 50 gramas; pimenta branca moída 100 gramas; pimenta preta em grãos, 200 gramas; alho moído, 10 cabeças; vinho tinto, 1 garrafa.

A carne de porco é picada (disco de 1,27 cm); a carne bovina é também finamente picada (primeiramente em disco de 1,27 cm e de novo em disco de 5/32) enquanto o toucinho será cortado em pequenos cubos. Misturados esses três elementos, são a seguir juntados os temperos, deixando-se para juntar um últi-

mo lugar o alho e o vinho. Pronta a perfeita mistura de todos os componentes, a massa será mantida em câmara fria por 24 horas. São usadas tripas grossas de bovino, atadas em pedaços de 30 a 40 cm de comprimento. O produto é colocado na estufa e acende-se o fogo, que lentamente deve atingir 42° a 43°C, temperatura a ser mantida por 10 a 12 horas, quando o produto mostra uma tonalidade avermelhada. A seguir o produto é dessecado e o salame está pronto em 50 ou 60 dias.

Tipo Crespone — Carne bovina de 1.ª, 45 quilos; carne suína de 1.ª, 25 quilos; toucinho especial, 30 quilos. Temperos: sal fino, 3 quilos e 300 gramas; salitre,

80 gramas; pimenta preta moída, 200 gramas; pimenta preta em grãos, 250 gramas; noz moscada, 60 gramas; alho moído, 10 cabeças; vinho tinto ou branco, 1 litro. A carne é picada finamente e o toucinho cortado em pequenos cubos; são misturados. Juntam-se à massa o sal e a pimenta; quando a mistura val em melo, adicionam-se os temperos restantes, continuando-se a homogeneização por mais 20 minutos. Câmara fria, procedendo-se a seguir como ficou dito acima ou simples cura por dessecação.

Tipo Milão — Carne de suíno (magra), 40 quilos; carne bovina (magra), 30 quilos; toucinho, 30 quilos. Temperos: sal, 3 quilos e 300 gramas; salitre, 80

De fato, MUSFARINA, fabricado com warfarin, é um raticida ideal, porque:

- 1 - mata ratos e camundongos sem lhes causar dor, nem desconfinça aos animais sobreviventes;
- 2 - não possui gosto, cor, nem cheiro especiais, conservando, apenas, os que são próprios aos cereais de que se compõe;
- 3 - é totalmente inócua aos demais animais domésticos e seres humanos.

À VENDA NAS CASAS FORNECEDORAS DE MATERIAL AGRÍCOLA E NAS COOPERATIVAS.

Atendemos pela Reembolso Postal - Embalagens de 800 e de 150 g.
Lic. D. N. P. A. N.º 147 - 52

Fabricado pelo DEPARTAMENTO DE VETERINÁRIA DE **VENZA** PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS, LTDA.
Labor.: RUA JOÃO RODRIGUES, 12 - Esc.: AV. RIO BRANCO, 100 - A. - S. 404/6 - TEL. 42-4736 - RIO DE JANEIRO

gramas; pimenta preta moída, 300 gramas; noz moscada, 5 gramas; açúcar, 100 gramas; dextrose, 10 gramas; alho moído, 1000 gramas; vinho, 1 litro.

Carnes e toucinho, em pedaços, são mantidos de véspera em câmara fria a 7°C abaixo de zero, para que possam ser picados extremamente finos, imediatamente depois que são tirados do frio.

Técnica usual e cura só por dessecação.

Tipo Comum — Carne bovina (magra), 50 quilos; carne de porco, 20 quilos; toucinho, 30 quilos. Temperos: sal, 3 quilos e 300 gramas; salitre, 80 gramas; alho, 80 gramas; canela em pó, 80 gramas; cominho, 80 gramas; cravo 50 gramas; noz moscada, 60 gramas; vinho, 1 litro. Picada a carne e o toucinho são misturados juntando-se à massa os temperos; quando ela está uniformizada vai para câmara fria por 12 a 14 horas. Enchimento de tripas finas de bovino. Cura pelo calor e depois dessecação ou ou unicamente por dessecação.

Salame de carne bovina — Carne bovina (magra), 90 quilos; toucinho 10 quilos. Temperos: sal, 3 quilos e 300 gramas; salitre, 200 gramas; pimenta preta moída, 100 gramas; alho moído, 200 gramas. A técnica de preparo é idêntica àquela descrita para as mortadelas. São usadas fundas de bovino.

Salame americano — Carne bovina (magra), 30 quilos; carne suína (magra), 50 quilos; toucinho especial, 20 quilos. Temperos: sal, 3 quilos; salitre, 100 gramas; açúcar, 10 gramas; dextrose, 1000 gramas; pimenta branca mida, 200 gramas; pimenta branca em grãos, 220 gramas; alho moído, 90 gramas.

Durante a picada da carne juntam-se aos temperos. Feita a misutra, a massa é colocada com uma espessura de 5 cm em bandejas e mantida por 48 horas em câmara fria numa temperatura máxima de 5°C; depois desse tempo é mantida por 4 a 6 seis semanas num ambiente rigorosamente seco a 15°-18°C, seguindo-se depois a técnica usual da fabricação e cura por dessecação.

Os mais rigorosos cuidados higiênicos devem ser tomados desde o início do preparo desse salame, para que nenhuma fermentação imprópria ocorra na carne. Exige-se que ela seja trabalhada por operários com mãos rigorosamente lavadas e escovadas com água e sabão, unhas cortadas e escrupulosamente limpas, ao passo que toda a aparelhagem pouco antes da utilização deve ser lavada com uma solução de bicarbonato de sódio a 25% (vinte e cinco por mil).

Exposição Agro-Pecuária de Lagoa Vermelha

De 4 a 6 de Dezembro próximo, em Lagoa Vermelha, (Rio Grande do Sul) realizar-se-á a 1.ª Exposição Agropecuária e Industrial da Zona promovida pela Secretaria da Agricultura do Estado, abrangendo aquele município e os de Vacaria e Bom Jesus. Está à frente do empreendimento a Associação Rural de Lagoa Vermelha que tem como presidente o dr. Erico Lourenço de Lima, com ela cooperando as Associações Rurais do Planalto do Nordeste.

VI Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária

De 19 a 24 de Novembro deste ano, em Curitiba, será realizado o VI Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, o qual deverá constituir um grande acontecimento social e científico. De todos os Estados da Federação estão sendo recebidas manifestações de solidariedade e apoio, o mesmo sucedendo quanto aos órgãos oficiais do Ministério de Agricultura.

A Comissão Organizadora do VI Congresso já recebeu comunicação de que se acham em plena

atividade, as seguintes comissões estaduais:

ESPIRITO SANTO — Drs. Carlos Braz Cola, Tufy Nader e Antonio Maria Godoy.

SANTA CATARINA — Drs. Moahir Tomé de Oliveira, Luiz Irapuan Campello Bessa, Jorge José de Souza, Thomaz Madeiras e José de Oliveira Malta.

MINAS GERAIS — Drs. Eduy Catão, Joaquim Rodrigues Mourão e João Batista Lapertosa.

PARAIBA — Drs. Humberto Regis, Hugo Ramalho e Aluizio Araujo.

Dê a seu gado uma alimentação sadia composta de elementos realmente nutritivos, fazendo uso das Rações Balanceadas PAGADOR. Produzidas sob os mais rigorosos princípios científicos em máquinas moderníssimas, as Rações Balanceadas PAGADOR têm a dosagem correta dos elementos próprios para a alimentação do gado, e os benefícios do seu emprego logo se notam na saúde dos animais e na sua produção de leite. Obtenha maior lucro da pecuária usando Rações Balanceadas PAGADOR.

UM PRODUTO DA **ANDERSON, CLAYTON & CIA.**
LIMITADA

SALVE O GADO

contra

- BICHEIRAS
 - AFTAS
 - CORTES
 - ULCERAS
 - FERIDAS
 - FRIEIRAS
 - PISADURAS
- PODEROSO CICATRIZANTE**

- FRAQUEZA • DIARRÉA POR
 - VERMES • MAGREZA • ABA-
 - TIMENTO • POUCA RESIS-
 - TENCIA ÀS DOENÇAS
- PODEROSO FORTIFICANTE**

E' surpreendente o Benzocreol. Com as mesmas notáveis qualidades antigas, enriquecido de novos valores terapeuticos graças à sua formula aperfeiçoada, Benzocreol está impressionando os criadores. Efeitos rapidos, ação perfeita. Conheça o Benzocreol, licenciado para **USO EXTERNO E INTERNO**. Peça gratis o interessante livro: "O Guia do Criador", à Caixa Postal, 1.002 — São Paulo.

uso externo e interno

- PARASITAS • SARNA • PIOLHO • TINHA
- CARRAPATOS • VERME • MICUIM • MOS-
- CAS • BERNES • GERMENS

PODEROSO GERMICIDA

BENZOCREOL

Industrias J. B. Duarte S/A. — Caixa Postal 1002 — São Paulo
 Fones: 36-3176 - 36-0471 - 3-0362

Influencia do meio ambiente na vida dos animais

Martim L. Calvo - Veterinário

Ecologia — Esta palavra deriva do grego: "oikos" que quer dizer casa e "logos", tratado. É a parte da biologia que estuda o comportamento dos animais e das plantas em relação aos agentes do meio externo. Do ponto de vista zootécnico, se refere às reações dos animais domésticos submetidos à exploração econômica. A ecologia abrange noções básicas na exploração animal, capazes de determinar o êxito ou o fracasso da criação. Seu estudo focaliza fatores distintos como o clima, a posição geográfica, a alimentação, doenças infecciosas ou parasitárias, manejo, ginástica funcional, regime criatório, etc.

Climatologia — Considera-se climatologia a ciência que estuda os climas. A extensão deste conceito nos leva a aceitar o grande numero de fatores que participam da formação do clima. Os elementos principais que caracterizam o clima são: temperatura, umidade, precipitações atmosféricas, ventos, pureza do ar, electricidade, pressão (altitude), intensidade de luz (radiação solar), etc., provenientes da atmosfera. O solo e sua composição, as elevações do terreno, a latitude, a flora, a fauna natural ou artificial e, por fim, a atuação do homem sobre alguns destes fatores, ora derrubando densas florestas, ora plantando-as, ora irrigando artificialmente o solo, canalizando rio ou bombeando água; ora enxugando-o por meio de drenagem e, por fim, o preparo de grande areas incultas com plantações próprias para a alimentação animal, são elementos que influem no clima de uma região.

De conformidade com este critério, temos que juntar a estes outros fatores de igual valia, como a higiene e o manejo dos animais domésticos, a fim de se conseguir o maximo rendimento economico.

Classificação primária dos climas — O fator mais incisivo de um clima é a temperatura ambiente, a qual serve de base da classificação em: quentes, temperados e frios. No conjunto, tem-se de considerar a umidade atmosférica. Temperatura e umidade constituem o binomio essencial na definição do clima.

A) Considera-se clima quente e úmido o de temperatura de 20 a 25°C, com alta porcentagem de umidade relativa no ar, dando em consequencia uma flora exuberante. Os animais deste clima são corpulentos, de pele grossa com pelo espesso e temperamento linfático.

B) Clima quente e seco é o que apresenta temperatura de 20 a 25°C, com diminuto grau higrometrico do ar. A vegetação natural é pequena e pobre. Os animais são de talhe médio, com musculos e ossos compactos; grande circulação periferica, digestão lenta, respiração pouco profunda e hematose imperfeita pela rarefação do ar; são animais nervosos e ariscos; quando fazem muito exercicio, a sudoração é intensa, debilitando-os.

C) Frio e seco: a temperatura média anual se mantem entre 5 e 10°C. O terreno geralmente é argiloso, com vegetação abundante e dura. Os animais são de pequeno porte, têm temperamento sanguineo, funções ativas, bom apetite e grande vigor físico; são longevos, porém pouco fecundos. São animais rústicos, sobretudo os que vivem na montanha, em terreno árido.

D) Frio e úmido é o clima de temperatura que medeia entre -5 e mais 5° C., em terreno argiloso e matas grandes. Animais de talhe médio, linfáticos, de pelo abundante, pele grossa, pelagem geralmente clara. Considera-se que a pele, nos climas frios, é três vezes mais grossa que nos temperados. Da mesma maneira, o pelo é mais forte, grosso e basto. A razão disso está na atuação dos sistemas nervoso e circulatório sobre a pele, determinando irrigação sanguinea mais intensa nas camadas mais profundas da derma.

E) Temperado e úmido: a temperatura dominante oscila entre 15 e 20°C. Solo geralmente rico, sobretudo nos vales. Vegetação abundante e alta, tanto nas pastagens naturais como artificiais. Os animais, principalmente bovinos (de engorda ou leiteiros) encontram aqui condições favoráveis de saúde e de desenvolvimento economico, ostentando porte e conformação proporcionados. O temperamento é sanguineo-linfático, apresentando os animais pele fina e solta e pelo fino e luzidio. O desenvolvimento não é tão rapido como nos climas quentes nem tão lento como nos frios. São animais mansos e de grande rendimento nos seleccionados.

Causas que modificam o clima

1. **Estações do ano** — Nos climas frios e úmidos, a queda da temperatura é mais intensa no inverno, e, em consequência, a vida vegetal e animal (se os animais não forem bem alimentados e mantidos em estabulo) diminui com redução das funções organicas, provocando queda nos rendimentos, por falta de pastagens. Inversamente, nos climas quentes e secos, o verão chega a se assemelhar aos climas tórridos, com todas as consequencias aos animais e às plantas. São, nos climas extremos, a primavera e o outono, o termo medio de condições mais viáveis para os animais, porque, havendo mais alimentos, ha estímulo a todas as funções organicas, especialmente as geneticas.

2 - **Composição do solo** — Exerce poderosa influencia sobre a vegetação, na qualidade das aguas e na saúde dos animais, participando nisso micro-elementos quimicos indispensaveis. Assim, os solos arenosos (silícios) são pobres em sua composição para o reino vegetal, como se observa nos desertos: muito frios no inverno e quentes no verão. Os argilosos em demasia em clima chuvoso são frios e se encharcam. Os terrenos calcareos também não são ideais, não obstante a cal seja indispensavel na formação dos ossos. Preponderando qualquer dos elementos constituintes do solo: silícia, argila, calcareo ou humus, será um solo defeituoso para a produção vegetal, elemento sem o qual os animais não terão desenvolvimento normal. Solo vegetal por excelencia é ótimo para agricultura, e este é justamente o que tem bem proporcionados os quatro fatores referidos, constituintes das terras de cultura.

3 - **Umidade atmosférica** — No ar ha sempre vapor d'agua proveniente de rios, lagos e mares. Este vapor exerce influencia boa ou má sobre a vida animal. Se a umidade é moderada, favorece a respiração e a função normal da pele; se excessiva e fria, impede a evaporação do suor, opondo-se à livre eliminação de produtos de excreção; dificultando a respiração pulmonar, empobrece o sangue. A diminuição anormal da umidade atmosférica resseca os tegumentos, modifica a circulação sanguinea; o organismo será mais excitavel, mais nervoso e mais suarento.

4 - **Altitude** — Este fator exerce grande influencia. Além da queda da temperatura, que as altas elevações apresentam, diminui a pressão atmosférica, chegando a ser incompatível com as funções normais, especialmente dos aparelhos respira-

PARA SUAS PLANTAÇÕES DE LEGUMINOSAS

SEMENTES DIERBERGER

Feijão guandú

Feijão porco

Feijão soja

Feijão Mucuno Anão e Trepadeira

Lupinus ou Tremoço

Crotolarias

Cow-Pear (ervilhas) etc.

Produtos escolhidos

Elevado teor germinativo

Peça qualquer quantidade à

DIERBERGER — Agro-Comercial Ltda.

Rua Libero Baduró, 499 - Tel. 36-5471 - Cx. 458
Av. Anhangabaú, 392/394 - SÃO PAULO

torio e circulatório. Lotes de galinhas poedeiras ao nível do mar elevaram a postura quando mantidos a 400 m de altitude. Entretanto, a altitude de 600 m, a postura voltou a diminuir. Quase o mesmo se verifica com o gado leiteiro, que produz menos à medida que aumenta a altitude onde seja explorado. A 3 ou 4 mil metros de altitude, os animais em geral modificam a respiração, dada a baixa porcentagem de oxigênio na atmosfera rarefeita, provocando aumento considerável dos glóbulos vermelhos (hiperglobulia) com a finalidade vital de compensar a pequena captação de oxigênio, aumentando o numero dos elementos coletores e transportadores, sem o que a vida não seria possível. Os animais nascidos e criados em montanhas têm menor talhe, pele mais grossa, e geralmente são peludos e rusticos; são de mais fácil adaptação que os de vales, onde a vida em melhores condições diminui a capacidade de adaptação em ambientes inferiores.

5 — Luz — A luz exerce decisiva influencia na vida vegetal e animal. O vegetal elabora e sintetiza em alimentos, mediante a função clorofílica, os elementos sámples existentes na atmosfera. No organismo animal, de modo direto, posto que não muito manifesto, a luz exerce poderoso estímulo sobre a pele: aumenta suas atividades circulatórias, dando além do mais, uma colaboração característica. Também aumenta a hematóse, a quantidade de hemoglobina das hemácias, provocando um tonus nervoso não encontrável nos animais de clima de pouca luz (predominância de céu nublado ou nevoento). Da mesma forma, o metabolismo aumenta com a influencia benéfica da luz, sobretudo dos raios ultra-violetas. A experiência tem mostrado que animais mantidos sob ação da luz perdem mais peso que os mantidos na obscuridade, embora sob o mesmo regime de alimentação. Assim fica provado que a luz aumenta o metabolismo, e portanto, o consumo de alimento, tornando-se fator capaz de aumentar a produção. Sem luz, diz Lavoisier, a natureza estaria morta.

6 — Area geográfica — A extensão territorial influe, até certo ponto, nos animais. Assim, considera-se que os animais nascidos e criados em ilhas tendem a se tornar de menor corpulência que os de continente. A razão é clara. Os animais terão que ser menores, por terem que viver — se não houver intervenção do homem — em areas muito reduzidas e com alimentação limitada em quantidade e em variedade, dado o pequeno numero de especies forrageiras cultiváveis. Em épocas de grandes secas, os animais de continentes podem emigrar para regiões menos desfavorecidas. Nas ilhas, isso não se verifica.

7 — Influencia do homem sobre o clima — O homem, com sua intelligencia e vontade de trabalhar, tem feito continuas modificações no clima, explorando grandes extensões de terras que durante séculos não tiveram outra missão que a de produzir plantas naturais e animais selvagens. Como exemplo, sobretudo ultimamente, veja-se, na América, na Africa, na Oceania, etc. como a abertura de canais, a construção de açudes, a drenagem, o desbravamento de florestas, têm modificado a fisionomia do clima. E' preciso notar, todavia, que a devastação de matas, a queima de campos, a erosão da terra têm piorado sensivelmente as condições climáticas de muitas regiões, tornando-as menos propicias à exploração economica.

Para manter no clima a umidade e a temperatura desejáveis, tem-se que proibir, como elemento básico, o corte de arvores. O respeito às matas deve ser ainda mais rigoroso quando esta cobrir faldas de montanhas de muito acíve, onde, por isso, o cultivo é impossível. O desolador aspecto de tantas montanhas desnudas é cada vez pior por ocasião das chuvas: ali a erosão manifesta seus maléficis efeitos. A melhor solução para regiões já assoladas é o reflorestamento. As arvores, além de madeira, podem servir como forrageiras para o gado, cultivando-se tipos próprios. Evitam a erosão, protegem as terras baixas, oxigenam a atmosfera, dão beleza à paisagem e proporcionam permanente riqueza.

Aclimação, Aclimatação e Naturalização

Estes termos, para muitos são sinonimos. Todavia, diferem na extensão do significado. Em zootecnia, considera-se *aclimação* a acomodação espontanea e natural de animais a novas condições climáticas, sem intervenção do homem. *Aclimatação* seria esta acomodação mediante artificios aplicados pelo homem aos animais. A *aclimatação* é uma propriedade fisiológica dependente da capacidade do animal não se adaptar a climas diferentes dos da região de origem. A *aclimação* seria a adaptação mediante artificios, a fim de conservar as qualidades nobres do animal. Também não se confunde com *naturalização*, que abrange tudo quanto constitui a *aclimatação*, inclusive a aptidão de os animais reproduzirem tão bem como na origem.

Assim, diz-se que macacos e papagaios se aclimatam na Espanha; entretanto, não se naturalizam porque não se propagam. Em troca, o cavalo arabe se naturalizou na Espanha, por ter-se adaptado a este país, nele reproduzindo-se normalmente. Tal como se observa com o galo da India, com o pato da Berberia e outros, bem como com o zebú no Brasil.

Causas que favorecem ou dificultam a aclimação

Em primeiro lugar, a raça dos animais. Em geral, as raças melhoradas têm menor capacidade de adaptação. A idade do animal: os adultos não se aclimatam tão bem como os jovens. Na passagem de um clima temperado para um frio, o animal sofre mais do que si fosse do frio ao temperado. O mesmo se observa quando o animal é levado de um clima propicio, rico em alimentos, a um inferior, escasso em provisões, mórmente em pastagem. Quando forem muito diferentes as condições climáticas entre as em que o animal é mantido e as da nova região, o melhor é fazer a transferencia gradativa, procurando a estação do ano mais semelhante. Como complemento importantíssimo, figuram os cuidados com que o novo proprietário irá tratar os animais. A habitação, a alimentação, o manejo deverão ser tanto quanto possíveis, iguais ou melhores que os adotados no país de origem. A premunicação contra doenças, mórmente parasitarias, existentes no novo país é fator decisivo. Qualquer ser vivo que mude para região diferente da em que está habituado, tem que ser preparado para isso. O mesmo se verifica, no mais elevado gráu, com os animais que tenham que manter, no novo ambiente, funções economicas. O tempo necessario para a adaptação varia. Será sempre mais rapido e perfeito quando se levar em consideração os fatores citados. Com isso se evitarão enfermidades, perda de resistencia, diminuição de produção, menor fecundidade, etc. A adaptação a novas condições é um característico essencial de defesa. O organismo que não tiver ou que não adquirir esta facultade em tempo natural, se não morrer, levará uma vida improduttiva, em permanente conflito com o meio natural, não servindo, portanto, para fins economicos.

"Ganaderia" Ano XI — Março de 1953 — N. 17 — Madrid. (Tradução e adaptação de J. Assis Ribeiro)

Dá gosto ver como sara uma criação atacada de diarréia e tratada com Ultradina Vet. Na fazenda, o Anti-Disentérico Ultradina Vet. facilita o trabalho de todos, curando logo e salvando tempo para outros serviços. Se aplica tanto em leitão como em galinha, tanto em bezerro como gado grande. Facil de dar por boca, nunca faz mal, sai barato e, além de curar, desinfeta as fezes, evitando novos contagios.

● O Anti-Disentérico Ultradina Vet. é dado por boca, em qualquer estado, idade ou especie de animal — não tem contra-indicações; pode ser guardado muito tempo, nunca se estraga. ● Prefira o Concentrado para um litro, que sai ainda mais barato. ● Os maiores criadores do Brasil afirmam as vantagens do Ultradina Vet.

PRODUTOS DE PRATA QUE VALEM OURO!
Ultradina Veterinaria é irmã do afamado pó Dinocargem à base de prata esponjosa.

Pedidos à A.P.C.B., rua Senador Feijó, 30 ou à Multifarma, à rua Direita, 191, 6.º andar
SÃO PAULO

PECUARIA DO MÊS

COMBATE A EROSAO

Os relatórios dos agrônomos regionais da Secretaria da Agricultura de São Paulo revelam, no setor do combate à erosão, irrigação e drenagem, dados que vêm confirmar que cada vez mais os lavradores se interessam por métodos mais racionais de cultura.

Em São Carlos, na fazenda Irapiru, foi feita a locação para plantio de 3.000 pés de café em curva de nível.

Em Avaré, apesar da colheita, varios lavradores estão exercitando o combate à erosão em cafezais; os resultados alcançados com a plantação em curva de nível, têm sido excelentes.

Em Bragança Paulista, continuam os trabalhos de construção de cordões de contorno nos cafezais, plantio de cafeeiros em curvas de nível. Varias culturas de batatinha já estão sendo irrigadas.

Em Sorocaba, está sendo instalada, na fazenda Cajuru, uma cultura de cebola em área de 7 alqueires, mais ou menos, toda terraceada, devendo ser montados modernos aparelhos de irrigação. Esses serviços estão sendo feitos de acordo com os técnicos do Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura.

Em Taquaritinga, foi iniciado um estudo de irrigação, na propriedade da sra. d. Maria Antonia Campos Sales Franchini, destinado a irrigar 5.000 pés de laranjas e 5.000 pés de café. A barragem deverá ser construída pelo Posto de Mecanização do D.E.M.A. com sede em Araraquara.

Em Guaratinguetá, estão sendo terraceados 20 alqueires para o plantio da mandioca e construídos cordões de contorno em 4.500 cafeeiros, já em segundo ano de produção.

* * *

PALHAS, CAPINS, TUDO SERVE PARA FAZER O COMPOSTO

Comunica o Serviço de Informação Agrícola do Ministerio da Agricultura:

O composto não constitui um adubo de composição definida, nem no seu emprego entram substancias de composição definida. No caso, servem quaisquer residuos organicos que existam na fazenda, como palhas, capins, etc., excluidas as ervas más, cujas sementes possam resistir à fermentação e infestar os terrenos cultivados.

Para bem preparar o "composto", pode-se construir uma estrumeira simples, descoberta e mesmo sobre o proprio chão. Neste ultimo caso, deve-se colocar em baixo uma camada da turfa ou de terra argilosa. O importante é uma substancia capaz de reter eventual infiltração.

Os residuos organicos devem ser picados, recobertos de cinzas ou de um pouco de cal virgem, para acelerar a decomposição e, em cima, outra camada de terra argilosa, até atingir mais ou menos um metro. Para se regular a fermentação, deve-se irrigar, moderadamente, o monte do composto com sumo de esterqueira. Depois de dois a

tres meses de fermentação, corta-se o monte e mistura-se novamente; deixa-se a fermentação continuar até que, depois de certo tempo, se obtenha um terriço rico em materia organica e de grande aplicação nas hortas, jardins e lavouras.

A composição deste adubo varia com a natureza do material que entrou na formação do composto.

* * *

ESCOLA DE TRATORISTAS DE PIRAÇUNUNGA

A Divisão de Mecanização Agrícola, do Departamento de Engenharia e Mecanização Agrícola, em colaboração com a Diretoria do Ensino Agrícola, iniciará a 1.º de Setembro os cursos da Escola de Tratoristas de Piraçununga, instalada na Escola Prática de Agricultura "Dr. Fernando Costa". Dotado de amplo internato para alojamento dos candidatos e vastas áreas para os trabalhos práticos, esse estabelecimento oferece aos interessados provindos da zona rural, acomodação gratuita e local adequado para as operações com máquinas.

Esse curso visa o preparo de operadores especializados no manejo de tratores e dos diversos implementos utilizados na moderna agricultura; durará tres meses, compreendendo estudos teóricos e práticos de mecanica agricola, tratores de rodas e de esteiras, implementos montados e atrelados, trabalhos de aração, gradeação, plantio, cultivo, colheita, etc., e conservação do solo, particularmente processos mais racionais de combate à erosão.

RAÇÕES FARELADAS OU GRANULADAS PARA GADO - EQUINOS - SUINOS E AVES

CONTEMPLADO COM CR\$ 855.000.00!

Dentre os grandes portadores de nossos títulos destacamos o nome do Sr. João Adhemar de Almeida Prado. Comissário de café na cidade de Santos, Estado de São Paulo.

Grande entusiasta da Capitalização, vem esse cliente aumentando continuamente o negócio primitivamente feito, que se eleva atualmente a cifra superior a

Cr\$ 25.000.000,00

Dado o grande número de títulos, de que é portador, tem sido o Sr. João Adhemar de Almeida Prado, contemplado em sorteios, por diversas vezes, recebendo assim de Novembro de 1945 a Março de 1952, a importância de Cr\$ 885.000,00, conforme discriminação abaixo:

SORTEADO EM	Combinação	Valor Nominal
Novembro de 1945.....	V N S	Cr\$ 10.000,00
Fevereiro de 1946.....	V N T	Cr\$ 10.000,00
Janeiro de 1949.....	P A Q	Cr\$ 25.000,00
Julho de 1949.....	N V T	Cr\$ 10.000,00
Novembro de 1949.....	U Q E	Cr\$ 120.000,00
Dezembro de 1949.....	N V K	Cr\$ 10.000,00
Junho de 1950.....	N V P	Cr\$ 120.000,00
Agosto de 1950.....	U U F	Cr\$ 240.000,00
Setembro de 1950.....	Y Z T	Cr\$ 120.000,00
Maio de 1951.....	V N W	Cr\$ 100.000,00
Março de 1952.....	V N N	Cr\$ 90.000,00
TOTAL.....		Cr\$ 855.000,00

O resultado supra não constitui - como se poderia supor - um fato inédito, que pudesse ser atribuído à obra do acaso.

Com efeito, é garantido a cada título uma probabilidade matemática de ser liquidado antecipadamente pelo sorteio, de 1 para 2.197.

Assim, o portador de um único título pode ser contemplado em sorteio desde o mês de sua emissão, como deixar de sê-lo, mesmo que mantenha em vigor até o prazo de liquidação, estabelecido. Nesse caso, o sorteio é uma vantagem aleatória, com a qual não deve contar, o seu portador.

Mantendo em vigor o seu título, caso não receba antecipadamente pelo sorteio o capital a constituir, receberá o seu portador, ao fim do prazo de liquidação estabelecido, a quantia desembolsada, aumentada dos juros capitalizados.

Quanto maior, porém for o número de títulos adquiridos por um mesmo portador, a frequência com que será contemplado, mais próximo estará da probabilidade matemática referida.

Admitamos assim que um portador adquira, por exemplo 5.000 títulos de Cr\$ 8.000,00 (mensalidade de Cr\$ 100.000,00) e que seja contemplado vinte e oito vezes ao ano. Verificada esta previsão, terá sido reembolsado exatamente segundo a probabilidade prevista, desaparecendo assim a idéia de que a Capitalização seja um "jogo", como supõem alguns moralistas improvisados, o que não ocorre, mesmo no caso da subscrição de um único título uma vez que em qualquer jogo há probabilidades contra ambas as partes, com evidente perda de um para outro lado. Na Capitalização só há probabilidades a favor do portador, pois não há perda do dinheiro desembolsado. Aqueles, portanto, que dispoem de maiores recursos, prescindem de um incentivo para a constituição de uma reserva para o futuro, têm na Capitalização - pela subscrição de grande número de títulos - o meio mais prático e cômodo de atingir seu objetivo.

Essa a razão pela qual, não somente firmas comerciais, sociedades anônimas, associações recreativas, clubes, etc., mas também grande número de pessoas físicas, vêm realizando em Kosmos, negócios de vulto, como é o caso do Sr. João Adhemar de Almeida Prado.

KOSMOS CAPITALIZAÇÃO S.A.

Sede Social: Edifício Kosmocup - Rua do Carmo esq. de 7 de Setembro - Rio de Janeiro

CAPITAL: CR\$ 2.000.000,00

REALIZADO: CR\$ 1.200.000,00

RESERVAS EM 31/12/52:

MAIS DE CR\$ 246.000.000,00

Registro Genealógico das Raças Suínas

Importante iniciativa do Governo de São Paulo

Pelo decreto n. 22.529, o sr. prof. Lucas Nogueira Garcez, governador do Estado de S. Paulo, aprovou, no dia 30 de julho do corrente ano, o Regulamento para o Registro Genealógico das Raças Suínas, assinado pelo dr. João Pacheco e Chaves, então secretário da Agricultura.

E' o seguinte o inteiro teor desse regulamento:

CAPÍTULO I — Da Organização

Artigo 1.º — Fica instituído, no Departamento da Produção Animal, da Secretaria da Agricultura, o Registro Genealógico para os animais das raças suínas.

Artigo 2.º — O Registro Genealógico ficará a cargo da Seção de Controle da Produção Animal da Divisão de Fomento da Produção Animal, e será dirigido por uma Comissão de Registro, composta de um Presidente, de um Inspetor e de três Técnicos designados para tal fim, dentre os funcionários lotados no Departamento da Produção Animal.

Parágrafo 1.º — O cargo de Presidente será exercido pelo Chefe da Seção de Controle da Produção Animal.

Parágrafo 2.º — O Inspetor e os três Técnicos serão designados pelo Diretor do Departamento da Produção Animal, mediante indicação do Presidente da Comissão.

Artigo 3.º — Compete à Comissão de Registro:

a — autorizar, denegar ou anular inscrições nos termos deste Regulamento;

b — determinar a inspeção e fiscalização dos animais inscritos;

c — proceder ao julgamento e identificação dos animais para os quais for requerido registro definitivo;

d — aprovar os modelos de livros, certificados, fichas, formulários e demais impressos necessários à organização do Registro Genealógico;

e — decidir sobre as sanções a serem aplicadas aos infratores deste Regulamento.

Artigo 4.º — Compete ao Presidente:

a — indicar o Inspetor e os Técnicos que, juntamente com ele, deverão compor a Comissão de Registro, sendo que o primeiro deverá pertencer ao corpo técnico da Seção de Controle da Produção Animal;

b — presidir os trabalhos da Comissão;

c — aprovar e assinar os documentos referentes ao Registro Genealógico.

Artigo 5.º — Compete ao Inspetor:

a — proceder à seleção dos animais para registro inicial, auxiliado, quando necessário, pelos demais técnicos da Comissão;

b — substituir o Presidente em seus impedimentos;

c — examinar os documentos comprobatórios recebidos e expedidos;

d — fiscalizar os registros a fim de que sejam exatos e regulares;

e — assinar, com o Presidente, os certificados de origem e transferência dos animais;

f — apresentar ao Presidente, mensal e anualmente, relatórios dos serviços executados.

Artigo 6.º — O Registro Genealógico será fiscalizado por um Conselho Técnico, do qual farão parte o Diretor da Divisão de Fomento da Produção Animal, o Chefe da Sub-Seção de Suínos e outro técnico designado pelo Diretor Geral do Departamento da Produção Animal.

Artigo 7.º — Para o Conselho Técnico caberá recurso das decisões do Presidente da Comissão de Registro, competindo-lhe ainda resolver sobre os casos omissos no presente regulamento.

CAPÍTULO II — Dos Livros de Registro

Artigo 8.º — Para fins de registro os animais de raças nacionais ou estrangeiras, serão agrupados em 3 (três) categorias, a saber:

a — Categoria "A": constituída pelos animais puros de origem, importados ou nascidos no país;

b — Categoria "B": constituída pelos animais puros por cruzamento;

c — Categoria "C": constituída por fêmeas mestiças.

Artigo 9.º — O Serviço de Registro Genealógico manterá para cada categoria 2 (dois) tipos de registro:

a — um provisório para as ninhadas de leitões recém-nascidos;

b — um definitivo para os animais adultos que tenham sido julgados e aprovados pela Comissão de Registro.

Artigo 10.º — Serão considerados puros por cruzamento os animais que:

a — fêmeas: quando, atingindo 60 pontos no julgamento, sejam filhas de pai puro de origem ou puro por cruzamento, e de mãe registrada com o mínimo de 7/8 de grau de sangue;

b — machos: quando filhos de pai puro de origem ou puro por cruzamento e de mãe pura por cruzamento.

Artigo 11.º — Serão consideradas mestiças registráveis, as fêmeas que forem julgadas e aceitas pelos técnicos da Comissão de Registro, baposa ser apresentada, sendo classificadas na documentação que máximo 7,8. Esta categoria estende-se até os 15-16 de grau de sangue.

Artigo 12.º — No registro dos animais puros de origem serão instituídos ainda o "Livro Fechado" e o "Livro Aberto", que serão:

a — o "Livro Fechado", aos animais de origem comprovada no ato da inscrição;

b — o "Livro Aberto", aos animais que, não tendo sua genealogia comprovada no ato da inscrição, venham no entanto, a ser julgados puros pela Comissão de Registro, com a aprovação do Conselho Técnico.

Artigo 13.º — Os animais registrados de acordo com a alínea "b" do artigo anterior, permanecerão no "Livro Aberto", até a 4.ª (quarta) geração).

Artigo 14.º — Da 4.ª (quarta) geração em diante, os animais

julgados aptos pela Comissão de Registro, de acordo com o Conselho Técnico, serão registrados no registro definitivo.

Artigo 15.º — No caso de encerramento do "Livro Aberto", seu funcionamento limitar-se-á, tão somente aos animais que estiverem nas condições previstas no artigo anterior.

Artigo 16.º — Em caso de cancelamento de registro de animal registrado no "Livro Aberto", em virtude de não apresentar sinais ou provas suficientes que possam assegurar a sua pureza, a medida poderá tornar-se extensiva aos seus ascendentes e colaterais.

CAPÍTULO III — Das Inscrições

Artigo 17.º — As inscrições de animais serão gratuitas, bastando, para isso, que os respectivos proprietários estejam inscritos no Registro de Criadores do Departamento da Produção Animal.

Artigo 18.º — Os pedidos para registro de animais das raças suínas serão feitos através de formulários especiais que serão fornecidos em tempo oportuno.

Artigo 19.º — Cada criador, com animais inscritos no Registro Genealógico, deverá manter em sua propriedade, devidamente atualizado, o livro de registro de padrações e nascimentos, cujo modelo deverá ser fornecido pelo Serviço de Registro Genealógico. Os lançamentos deverão ser feitos à tinta, sem rasuras, e sempre em ordem cronológica.

Artigo 20.º — Poderão ser inscritos no Registro Definitivo:

a — os animais puros de origem, importados ou nascidos no país, que aceitos pela Comissão de Registro tenham genealogia comprovada;

b — os animais puros por cruzamento previstos no artigo 10 e suas alíneas, podendo ser incluídos nesta categoria, a juízo da Comissão de Registro, os animais criados em fazendas experimentais do Governo, quando sua origem for comprovada por documentação constante dos livros apropriados;

c — as fêmeas mestiças que satisfaçam as condições previstas no artigo 11.

Artigo 21.º — Os produtos filhos de pais registrados, qualquer que seja a sua categoria, só poderão candidatar-se a registro definitivo, quando o nascimento e marcação da ninhada a que pertencem, tenham sido comunicados em seu devido tempo e obedecido às condições prescritas no presente Regulamento.

Parágrafo único — A critério da Comissão de Registro, poderá ser exigida, na época do nascimento e por ocasião da desmama, a pesagem das ninhadas de leitões que se destinam ao Registro Genealógico. Para isso, a Comissão resolverá oportunamente sobre as condições e normas a serem adotadas e as instruções que se fizerem necessárias.

Artigo 22.º — Para inscrição de ninhadas no Registro Genealógico devem ser observadas as seguintes exigências:

a — que os pais sejam registrados;

b — que os criadores enviem mensalmente ao Registro Genealógico, a relação das coberturas efetuadas em suas propriedades, mediante o preenchimento e assinatura dos questionários fornecidos para esse fim;

c — que o nascimento e marcação das ninhadas obedeam as condições exigidas pela Comissão de Registro.

Artigo 23.º — Quando as padrações individuais não puderem ser anotadas pelo fato de serem realizadas a campo, o criador deve comunicar:

a — raça, nome e número de registro do varrão encarregado da cobertura;

b — raça, nome e respectivo número de registro das fêmeas soltas com o varrão;

c — os dias em que o varrão permaneceu solto com as fêmeas.

Artigo 24.º — Qualquer substituição de um varrão por outro, deverá ser comunicada ao Registro Genealógico, devendo decorrer entre a atuação do reprodutor retirado e a de seu substituto um intervalo mínimo de 20 (vinte) dias.

Artigo 25.º — Para a inscrição das ninhadas de leitões no Registro Provisório, é preciso que o criador proceda à sua marcação logo nos primeiros dias de vida e comunique o seu nascimento através dos questionários especiais, fornecidos para esse fim, os quais deverão ser devidamente preenchidos e assinados e em seguida encaminhados pelo criador ao Registro Genealógico, dentro do prazo máximo de 15 dias após o nascimento.

Artigo 26.º — No caso de fêmeas padreadas, importadas ou adquiridas de outrem, o certificado de origem deverá ser acompanhado do certificado de padreação, legalizado pelo respectivo Registro Genealógico, para a inscrição dos produtos em seu devido tempo.

Artigo 27.º — A marcação dos leitões recém-nascidos será feita de acordo com instruções especiais da Comissão de Registro.

Parágrafo único — Quando se tratar de animais pertencentes a criação de propriedade do Estado ou da União, ou ainda que estejam submetidos a estudos ou trabalhos experimentais, a Comissão de Registro poderá autorizar alterações nos seus métodos padrões de marcação.

Artigo 28.º — A juízo da Comissão de Registro poderá ser negada inscrição:

a — aos animais procedentes de ninhadas que não satisfaçam os limites mínimos de peso e número de leitões estabelecidos para a raça a que pertencerem;

b — aos animais filhos de porcas que na época da partição não tenham completado um ano de idade.

Parágrafo único — Os limites a que se refere a letra "a" poderão ser alterados, bem como poderão ser afixadas outras exigências à medida que melhorarem os padrões de cada raça.

Artigo 29.º — A inscrição para registro definitivo será permitida somente aos animais que tiverem completado 6 meses de idade.

Artigo 30 — Só será inscrito animal importado ou nascido no país, mediante apresentação de atestado de propriedade pelos interessados.

CAPITULO IV — Do Julgamento

Artigo 31 — Os animais para os quais for solicitado registro definitivo, desde que satisfaçam as exigências deste Regulamento, depois de identificados, serão submetidos a julgamento pela Comissão de Registro que decidirá sobre o pedido.

Artigo 32 — Serão aprovados os animais que alcançarem o mínimo de 60 pontos nas tabelas de julgamento elaboradas pela Comissão de Registro.

Artigo 33 — Os animais a que se refere o art. 31, serão definitivamente marcados pelos técnicos encarregados do julgamento, segundo instruções da Comissão de Registro e observando as seguintes disposições:

a — a marcação será feita sempre na orelha esquerda e somente pelos processos adotados pela Comissão de Registro, salvo os animais referidos no parágrafo único do art. 27;

b — na identificação dos animais serão usadas tantas séries de números quantas forem as raças inscritas;

c — a numeração de cada série deverá começar sempre pelo n.º e ser cronológica em relação à ordem de inscrição;

d — a Comissão de Registro resolverá ainda sobre quaisquer símbolos ou letras que se tornem necessários à perfeita identificação dos animais registrados e suas respectivas categorias;

e — quando um animal não estiver identificado ou deixar dúvida quanto à marcação, desde que as causas determinantes de qualquer desses fatos sejam acidentais, poderá ser negado ou cancelado o registro;

f — se ficar provada a responsabilidade do criador por qualquer irregularidade constatada, poderão ser cancelados os registros de todos os outros animais de sua propriedade, descendentes do registrado ou seus colaterais.

Artigo 34 — Das decisões da Comissão de Registro caberá recurso ao Conselho Técnico nos termos do art. 7.º deste Regulamento.

Artigo 35 — No caso de dúvidas para identificação de animais já registrados, serão eles submetidos a novo julgamento a fim de serem validados os seus registros.

CAPITULO V — Dos Certificados e Transferências

Artigo 36 — O Serviço de Registro Genealógico fornecerá aos respectivos proprietários certificados de registro dos seus animais, dos quais constarão os elementos indispensáveis à identificação como raça, nome, número e data de registro, piques ou marcas particulares, categoria, sexo, pelagem, data do nascimento, ascendentes, etc.

Parágrafo único — Sendo o animal puro de origem, o certificado declarará em qual dos livros a que se refere o art. 12 deste Regulamento, foi feito o registro.

Artigo 37 — Todas as vendas e transferências de animais registrados serão imediatamente comunicadas ao Serviço de Registro Genealógico para os devidos assentamentos nos livros respectivos.

Artigo 38 — Para transferir direitos que possua sobre um animal registrado, o proprietário deve apresentar ao Serviço de Registro Genealógico o certificado respectivo, com a declaração de transferência devidamente preenchida e assinada, a fim de que sejam feitas as devidas anotações nos livros competentes.

Parágrafo único — A apresentação do certificado poderá ser substituída por uma comunicação preenchida e assinada pelo vencedor conforme modelo fornecido pelo Serviço de Registro Genealógico.

Artigo 39 — Em caso de transferência de fêmea padreada, seu proprietário deverá juntar ao certificado de origem, o certificado de padreadura, assinado pelo proprietário do varrão que realizou a cobertura.

Artigo 40 — Os criadores devem comunicar ao Registro Genealógico a morte de qualquer animal registrado, remetendo, na mesma ocasião, o respectivo certificado de registro, o qual será devolvido, devidamente anotado, aos interessados que o solicitarem.

CAPITULO VI — Disposições Gerais

Artigo 41 — O Serviço de Registro Genealógico fornecerá, aos criadores interessados, todos os modelos de formulários e dos demais impressos necessários assim como qualquer outro esclarecimento relativo à inscrição e registro de animais.

Artigo 42 — Aos proprietários de animais registrados, poderão ser fornecidas segundas vias dos certificados de registro.

Artigo 43 — Quando por ocasião das inscrições de animais, forem verificados nomes iguais, serão os mesmos acrescidos das designações I, II e III etc., ou será proposta a troca de nomes, levando-se o fato ao conhecimento dos interessados.

Artigo 44 — Nos Livros de Registro Genealógico, a juízo da Comissão, poderá ser facultada a inclusão de dados sobre a vida do animal e seus ascendentes mais diretos, que permitam aquilatar das qualidades do animal registrado.

Artigo 45 — No caso de serem organizados serviços de controle de produção, os dados obtidos relativos a cada animal registrado, poderão ser transcritos nos respectivos certificados de registro.

Artigo 46 — Qualquer associação de criadores de suínos, que venha a formar-se no Estado, poderá, mediante acordo com a Secretaria da Agricultura, encarregar-se da continuação do Registro Genealógico das respectivas raças, sempre que se enquadre na legislação sobre a matéria.

Artigo 47 — É proibido aos criadores fazer qualquer anotação nos certificados de registro, além das previstas no presente regulamento.

Artigo 48 — O criador que cometer fraude nas inscrições ou transferências, ou que, de qualquer forma prejudicar a exatidão dos registros genealógicos, poderá ter cancelado todos os registros de seus animais a ser excluído do Registro Genealógico, a juízo do Conselho Técnico.

Artigo 49 — Os casos omissos neste Regulamento ou as dúvidas que surgirem sobre sua aplicação, serão resolvidos pelo Conselho Técnico por maioria de votos e constarão de um livro de atas.

Artigo 50 — Qualquer alteração ao presente Regulamento será proposta ao Secretário da Agricultura, pelo Conselho Técnico.

Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, aos 30 de julho de 1953. João Pacheco e Chaves.

PROTEÇÃO PARA SEUS TRABALHADORES

CAPAS AGRO-PASTORIS

2 tipos — SOBRETUDO com mangas, e PONCHE sem mangas. Ótimo acabamento e com proteção dupla nas costas

EM LONA 10

De 1 metro 20 cms. Cada Cr\$ 250,00
De 1 metro 30 cms. Cada Cr\$ 250,00
Capuz Cada Cr\$ 25,00

PONCHES PARA ORDENHADORES

Deixa os braços completamente livres para a ordenha.

Tipo unico — n.º 90 cada a Cr\$ 190,00

PALETOTS

Tipo Unico — n.º 90 cada a Cr\$ 190,00

CALÇAS

Especiais contra a humidade, para serviços em capinas, canaviais, etc. Indispensável para serviços de cargas e descargas de mercadorias, pessoal de Estradas de Ferro, etc.

Tipo Unico — Cada a Cr\$ 200,00

Aceitamos pedidos pelo Reembolso Postal

Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO

INSTANTANEOS RURAIS

A DRENAGEM DOS ESTABULOS

Um técnico da Worthington Corporation chamou a atenção para os produtores de leite, no sentido de que a drenagem dos estábulos constitui um dos pontos mais importantes do cuidado com as vacas. É necessário — salientou ele — dispor de água em abundância na criação de gado leiteiro, pois a limpeza é essencial para manter a saúde dos animais, da qual depende a farta produção de leite saudável.

O sr. S. Rileey Williams, vice presidente da Worthington e encarregado dos assuntos internacionais daquela companhia, que regressou recentemente de uma viagem à Colombia, declarou, em entrevista à imprensa que a irrigação adequada, em várias regiões daquele país, está permitindo três colheitas por ano, em vez de uma só, como anteriormente.

Com a ampliação dos seus sistemas de irrigação, previu o sr. Williams, a Colombia poderá produzir gêneros alimentícios, suspendendo, portanto, parte para o seu consumo, suspendendo, portanto, a onerosa importação de viveres a que hoje está obrigado.

MELADO COMO ALIMENTO

No "State College" de Washington, estado situado na Região Nordeste dos Estados Unidos, os criadores estão fazendo experiências com o uso de melado de cana como alimento do gado, para aumentar a produção de leite e de carne. A idéia não é inteiramente nova e apresenta muitas dificuldades. A principal delas consiste em se descobrir um meio de introduzir nos silos aquele material viscoso e pegajoso. A diluição e reaquecimento do melado de maneira que possa ser manejado por meio de bombas centrifugas comuns, não satisfazem porque o calor e a umidade afetam a propria natureza da forragem.

Os engenheiros de Worthington, chamados a resolver o difícil problema, apresentaram uma solução que faz o melado circular de novo para o reservatório.

COMBATE ÀS PLANTAS DANINHAS

No combate às plantas daninhas nos Estados Unidos, o Departamento da Agricultura aconselha que se espalhe 2,4-D nas plantações, pouco antes e pouco depois de nascerem os pés de milho, que facilita consideravelmente a cultura e aumenta a produtividade.

HOTEL PARA ANIMAIS

O único hotel no mundo para animais foi inaugurado recentemente no Aeroporto de Londres, pela Associação Britânica de Proteção aos Animais. Aí se hospedam milhares de animais, desde peixes tropicais a gorilas e chimpanzés, que chegam do estrangeiro para a Grã-Bretanha. Em uma semana chegaram 600 macacos, 200 periquitos, 50 canários, tres cachorros e um gato.

Para os doentes ha uma clinica e mesa de operação; uma ambulancia com oxigênio e equipamento de primeiros socorros vai ao encontro do avião e transporta rapidamente os animais doentes para a clinica.

O enjôo é a doença mais comum, mas muitos animais estranham a rapida mudança de temperatura, quando passam de um clima para outro. Os macacos principalmente estranham o clima frio; dois deles chegaram recentemente à terra com pneumonia; foi preciso aplicar-lhes penicilina e colocá-los em dieta de pão, manteiga e glucose. O regime de cada "hospede" é também cuidadosamente estudado.

ANTIGOS INSTRUMENTOS EGÍPCIOS AUXILIAM OS LAVRADORES

Novos tipos de instrumentos de agricultura especialmente desenhados para camponeses do Oriente Médio, e apropriados para outras áreas sub-desenvolvidas, foram idealizados por um industrial britânico, em cooperação com as autoridades egípcias. Nesses instrumentos procuram-se combinar simplicidade e economia com a alta qualidade e eficiencia que as técnicas modernas permitem.

O mais curioso é que se aplicam desenhos usados no Egito antigo ao material moderno. Numa viagem de seis meses pelo Oriente Médio, o desenhista J. P. Shorthouse visitou os museus egípcios, estudando o equipamento agrícola usado pelos antigos.

As ferramentas não são apenas simples no desenho, mas também apropriadas para serem puxadas por bois. Seu preço está ao alcance dos pequenos lavradores.

ELETRICIDADE NA AVICULTURA

Está sendo usado nos Estados Unidos, um aparelho elétrico para cortar frangos: Acionado por uma corrente normal ou por pilhas secas, transforma um frango em capão, sem arrancar ou torcer qualquer parte delicada do corpo do animal.

OS LEITÕES GOSTAM DE AÇUCAR

Segundo pesquisas realizadas recentemente, os leitões gostam muito de doce. E um meio de conseguir fortificá-las é ministrar-lhes pílulas açucaradas contendo vitaminas, antibioticas, etc. O especialista em nutrição de porcos do Colegio do Estado de Iowa chegou à conclusão de que, ministrando tais pílulas aos leitõeszinhos obtêm-se os seguintes resultados: 1) desenvolvimento mais rápido; 2) diminuição apreciavel das enfermidades; 3) possibilidade de desmamar as crias mais rapidamente; 4) produção de mais carne, com menos despesas.

Na edição de Julho, publicamos o artigo A BRUCELOSE E SUA INCIDENCIA NO REBANHO ZEBUINO EM S. PAULO o qual, por um engano, saiu com o nome do autor truncado: em vez de Roberto Alves Santiago, o autor é Alberto Alves Santiago.

... toneladas de Cálcio, Fósforo e Iodo dos seus pastos !

O Cálcio, o Fósforo e o Iodo são indispensáveis, como o próprio ar que o animal respira. O Iodo, reunido na glândula tiroide, defende contra doenças. O Cálcio e os Fosfatos formam os ossos e a carne. Uma rês contém em seu peso cerca de duas arrobas de Cálcio e Fosfatos e 200 miligramas de Iodo. Assim, cada boiada vendida leva de nossos pastos — reconhecidamente fracos — toneladas dessas preciosas substâncias, empobrecendo-os cada vez mais para as futuras gerações.

Portanto, se deseja um gado forte e sadio, se quer um lucro maior em carne, leite, ovos, lã e tração, complete o alimento de sua criação com a MISTURA IODO CÁLCIO FOSFATADA

Econômico no custo	
	Cr\$
Sacos de 40 quilos	350,00
" " 10 "	100,00
" " 2 "	28,00
" " 1 "	15,00

- generoso nos resultados !

PEDIDOS A
**FEDERAÇÃO
 DE CRIADORES**
 Rua Senador Feijó, 30
 São Paulo

VIVEIROS DE CAFÉ

Condições para a boa localização

Um bom viveiro de café deve obedecer às seguintes condições:

a) estar próximo à casa do administrador, para ser visitado quase diariamente;

b) ter água em quantidade suficiente, principalmente no período da seca, e ser francamente acessível, para evitar toda e qualquer desculpa de falta da irrigação necessária;

c) topografia adequada à chegada e à saída de veículos, para trazer esterco e levar jacázinhos para o cafezal. (Esta última operação deve sempre ser feita na estação chuvosa. Evitar, portanto, subidas íngremes e escorregadias).

Tipos de viveiro

Usualmente são de dois tipos os viveiros, cada um deles com suas vantagens mais acentuadas pelas circunstâncias de ambiente, localização, etc.

Um dos tipos aproveita um dos bosques ou capão de mato, cuja sombra ofereça condições adequadas de sombreamento. Indiscutivelmente é o mais barato, mas oferece também algumas desvantagens, tais como:

a) a intensidade da sombra, a qual, sendo fixa, torna impraticável o aumento gradativo da luz solar;

b) a concorrência que as raízes das árvores oferecem às mudinhas de café.

O segundo tipo de viveiro é o de sombreamento artificial, feito com o auxílio de um ripado. Este ripado pode ser estilizado ou mais modesto. Este é o mais recomendável, por ser mais econômico e por dar às mudinhas de café as condições de amparo que necessitam. É feito com mourões de eucaliptos e rachas de bambu. A armação é apoiada sobre mourões de eucaliptos baixos, não precisando ir além de 60 a 70 cm de altura. O ponto alto aqui é a orientação N-S do bambu, para se obter meia sombra durante o dia todo. As rachas de bambu serão espaçadas em distância igual à sua largura, pa-

ra que sua distribuição de sol e sombra seja equilibrada.

Dimensões dos canteiros do viveiro

A largura ideal dos canteiros, visando oferecer maior comodidade a quem deles cuida, é de dois metros; o comprimento obedecerá as condições do terreno, cortando sempre as águas e tendo em mente a orientação N-S.

Entre os canteiros, deve haver um carreadorzinho de 50 a 60 cm e, ainda de acordo com as condições do terreno, de espaço em espaço, um corredor de três metros, para facilitar a saída dos jacázinhos com as mudas e favorecer os serviços de irrigação.

Preparo do terreno

a) *Em capão de mato* — Fazer um revolvimento severo com enxadão, quebrando muito bem os torrões e nivelando o terreno com ancinho. Se a terra for fértil, não é preciso mais que capricho na escavação e nivelamento, estando assim os canteiros, já então feitos, em condições de receber as sementes.

b) *Em viveiro sob ripado* — Escavar a terra, quebrar os torrões e proceder à seguinte adubação, por metro quadrado de canteiro:

Esterco de curral bem curtido... 5 quilos

Hiperfosfato ou farinha de ossos... 200 grs.

Salitre do Chile... 100 grs.

Cloreto de potássio 100 grs.

Esparramando o esterco e os demais fertilizantes sobre o terreno de antemão cavocado e nivelado, faz-se nova cava com pá direita ou enxada, para que a mistura daqueles fertilizantes seja bem uniforme. Pronto assim o canteiro, passa-se à sementeação.

Sementeação

As sementes de café destinadas à planta, geralmente são despolpadas e, assim, desvencilhadas da casca, têm uma germinação mais rápida e mais uniforme.

Pronta a superfície do canteiro para receber as sementes, riscam-se, com o auxílio de uma regua tosca e de um pausinho de ponta ligeiramente aguçada, pequenos sulcos paralelos, espaçados de 15 centímetros, no sentido da largura do canteiro. Nesses sulcos, depositam-se as sementes com a parte chata voltada para baixo e espaçadas de 5 centímetros. Feita esta operação, cobrem-se ligeiramente as sementes e está terminada a sementeação.

Com esse espaçamento, cada metro quadrado comportará cerca de 133 sementes. Descontando-se as eventuais falhas de germinação e da eliminação das mudinhas raquiticas, pode-se, para

ARAME QUE CERCA...

("NON NOVA SED NOVE") — Não é novidade mas é de nova forma

... a criação e véda, resistindo à investida da rês sem machucá-la. Não arrebeta: aço ovalado, extra-resistente "Catieland Wire", regula 40 centavos o metro.

... com balancim do próprio arame, economizando: mourões, tempo, dinheiro e perdura como cerca definitiva. Únicos distribuidores dessa marca. Só atendemos consumidores. Firma de Fazendeiros para Fazendeiros. — SOCIEDADE COMERCIAL S. PAULO-MATO GROSSO. — Rua São Bento, 484 - sala, 11 - Fone: 33-4035. Em Araçatuba: Rua O. Cruz, 42. Em Campo Grande, (Est. Mato Grosso): Rua 14 de Julho, 668

efeito de calculo da area do viveiro, admitir 100 mudinhas por metro quadrado, ou seja mudinhas para 25 covas de café, com quatro mudas. Com estes dados, pode-se determinar, com boa aproximação, a area do viveiro a ser construido.

Época da sementeira

Se houver agua abundante e facilidade absoluta de irrigação, pode-se semear desde julho. Em caso contrario, somente depois de iniciada francamente a estação chuvosa.

Transplantação

Com 5 a 6 meses de idade, ou mesmo antes de bem desenvolvidas, as mudinhas podem ser transplantadas para os jacazinhos de sapé, taquara ou madeira laminada. Esta é a mais recomendavel, pela facilidade de obtenção, preço e uniformidade. Para as laminas serem mais manejaveis, é conveniente, mergulha-las em agua durante duas horas mais ou menos, antes de se transformarem em jacazinhos. Nesta ocasião, e para permanecerem firmes, são amarradas com arame ou presas com grampos adequados. Para maior duração, as laminas de madeira devem ser mergulhadas numa solução de sulfato de cobre a 5%.

As casas fornecedoras dos laminados tem tambem o complemento necessario, grampos e arame.

A terra para o enchimento dos

laminados ou jacazinhos, deve ser bem misturada com esterco bem curtido.

Na transplantação, é absolutamente indispensavel o maximo cuidado para não torcer o pião da raiz da mudinha, evitando-se enovelamento futuro das raízes e prejudicando o desenvolvimento normal do futuro pé de café.

Os jacazinhos, uma vez prontos, são colocados no lugar dos canteiros, bem apoiados uns nos outros, chegando-se terra com a enxada nas fileiras externas ou, mesmo, guarnecendo os bordos do canteiro com tabuas ou paus.

Os jacazinhos permanecerão no viveiro até a época do plantio definitivo. Cerca de um mez antes, começa-se a dar mais sol, removendo aos poucos os bambus que cobrem o viveiro, até que as mudinhas se acostumem com pleno sol. Vão então para as covas adrede preparadas, ganhando então sua individualidade: passam em grupo de quatro, a constituir um pé de café.

Sementeira direta nos jacazinhos

Feito o ripado, deve-se dar preferencia a postes de eucaliptos de 2 m de altura; depois de fincados no chão, nivela-se bem o terreiro, para que possa receber os jacazinhos, dispostos em filas, nas dimensões preconizadas para o canteiro. Os jacazinhos serão cheios com terra fértil de mato ou com terra e esterco bem curtido e muito bem mis-

turado com a terra. Maneira pratica de se fazer a mistura é esparramar a terra numa camada de 20 centímetros de espessura e sobre ela colocar o esterco de curral bem curtido, com os fertilizantes complementares na proporção já preconizada, por metro quadrado:

Esterco bem curtido	5 kg
Farinha de ossos ou hiperfosfato	200 gr
Cloreto de potassio	100 gr
Salitre do Chile	100 gr

Com esta terra assim preparada, enchem-se os jacazinhos. Irrigar durante 4 ou 5 dias, para a terra firmar bem no jacazinho e, então, semear duas sementes em cada um. Depois de germinada a semente, deixa-se a mudinha mais bonita e viçosa e arranca-se a outra. Ficará assim cada jacazinho, com uma só muda, plantada em lugar definitivo e sem o perigo de ofender o pião da raiz, uma vez que não há transplantação. Esses jacazinhos podem permanecer por um ano no viveiro, onde todo o cuidado e fiscalização devem ser dispensados. Este constitui, indiscutivelmente, o processo mais indicado, mais seguro e mais economico para a obtenção de mudas para replanta e para formação de cafeeiros, exceção feita dos casos de formação de lavoura em matas virgens, onde então a sementeira mais indicada é a direta nas covas. — A. C.

CAIAÇÃO DAS PLANTAS

Em muitos casos é necessário fazer-se a limpeza dos troncos das arvores para se prevenirem as pragas e para curá-los de infecções já contraidas.

Nos casos em que se tenha que eliminar liquens, musgos e parasitas, limpam-se primeiro os troncos com uma palha de aço e depois pinta-se-os, assim, como os ramos principais, com algum composto ou leite de cal.

Uma formula utilizada para proteger as plantações e especialmente os pomares é a seguinte:

Alcatrão da Noruega	2 quilos
Naftalina comercial	6 quilos
Cal viva	12 quilos
Agua	25 litros

Dissolve-se primeiramente a naftalina no alcatrão e logo joga-se esta mistura numa lata de cal que deve ser preparada antes.

Uma formula conveniente para a preparação de leite de cal é a seguinte:

Cal viva em pedra	10 quilos
Sal comum	1 quilo
Agua	25 litros

Para se fixar permanentemente a cal sobre os troncos e ramos das plantas convem utilizar algumas das substâncias adesivas que já mencionamos. Nesse caso convém utilizar

uma mistura com leite desnatado, barato nos lugares onde existam industrias de leite, o que concede à mistura uma boa condição adesiva.

Uma formula muito boa é esta:

Cascina em pó	110 grs.
Leite desnatado	950 grs.
Cal viva	1.800 grs.

Deixa-se de molho a cascina varias horas em um pouco de agua quente; num outro recipiente dissolve-se a cal lentamente com três litros de agua e deixa-se esfriar por duas horas. Mistura-se a cascina com a cal, mexendo-se sempre durante cinco ou dez minutos e depois junta-se-lhe o leite desnatado. Esta mistura pode ser empregada imediatamente para a caiação.

Compre com poucos cruzeiros...

...NOSSA EXPERIENCIA DE MUITOS ANOS.

Planos PRÁTICOS, CÔMODO e ECONÔMICOS cuidadosamente estudados para você adotar em suas CONSTRUÇÕES RURAIS.

PLANTAS	Cr\$	PLANTAS	Cr\$
Abrigo Misto	20,00	Instalações Econômi- cas para Suínos	40,00
Abrigo para Touros ..	40,00	Instalações para Orde- nha	40,00
Aparelhos de Contenção para Estabulos — 5 Modelos	40,00	Instalações para Banho Carrapaticida	20,00
Aprisco p/ 70 Carneiros	20,00	Maternidade para Sui- nos	40,00
Banheiro Carrapaticida	40,00	Palol	20,00
Banheiro para Suínos	20,00	Pequena Poclga	20,00
Camara de Fermenta- ção de Esterco	20,00	Posto de Resfriamen- to de Latões por Cir- culação — Capacida- de 200 litros	60,00
Cavalaria Mista	40,00	Posto de Resfriamen- to — Capacidade pe- ra 200 litros diarios	60,00
Cocheira	60,00	Posto de Resfriamen- to — Capacidade pa- ra 500 litros diarios	60,00
Cocho coberto para dar sal ao Gado	20,00	Posto de Resfriamen- to — Capacidade pa- ra 200 litros diarios	60,00
Curral	40,00	Posto de Resfriamen- to e Engarrafamen- to — Capacidade pa- ra 500 litros diarios	60,00
Curral Circular	60,00	Rolo de Faca	20,00
Currais com Apartação e Tronco para Orde- nha	40,00	Silo Elevado Aereo ...	40,00
Estabulo com Baías In- dividuais e Galpão para Ordenha	40,00	Silo Economico	40,00
Estabulo Economico ..	40,00	Silo de Encosta — Cap. 50 Toneladas	40,00
Estabulo de Madeira para 12 Vacas	40,00	Silo de Encosta — Cap. 100 Toneladas	40,00
Estabulo Modelo	40,00	Silo Subterraneo	20,00
Estabulo para 60 Vacas	40,00	Silo de 130 Toneladas	40,00
Estabulo tipo Vila Brandina	40,00	Tronco para Apartação	20,00
Estrumeira	20,00	Tronco para Cobertura	20,00
Fabrica de Manteiga ..	40,00	Tronco para Contenção de Bovinos	40,00
Fabrica de Manteiga — Capacidade 100 litros diarios	60,00	Tronco para Ordenha	20,00
Fabrica de Manteiga — Capacidade 300 litros diarios	60,00		
Fabrica de Manteiga — Capacidade 500 litros diarios	60,00		
Galpão Esterqueira ...	40,00

Atendemos pedidos pelo REEMBOLSO POSTAL

PEDIDOS: ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES
Rua Senador Feljó, 30 - S/loja - São Paulo

COTAÇÕES DO MERCADO DE CARNES E DERIVADOS

Periodo de 15 a 30 de Setembro

	Por cabeça
	Cr\$
Bovinos para engorda (gado magro)	2.100,00 a 2.500,00
Mercado: firme, frouxo, estavel, calmo, etc.	
Bovinos para abate (gordos)	Por arroba
	Cr\$
Novilhos especiais	169,00
Novilhos tipo consumo	163,00
Carreiros e marrucos	154,00
Conservas	154,00
Vacas	—
Vitelos	—
Mercado: firme, frouxo, estavel, calmo, etc.	
Suinos magros (média 6 arrobas) a 80,00	Por cabeça
	Cr\$
Mercado: firme, frouxo, estavel, calmo, etc.	480,00
Suinos gordos	Por arroba
	Cr\$
Enxutos	220,00
Gordos	240,00
Especiais	250,00
Mercado: firme, frouxo, estavel, calmo, etc.	

FRIGORIFICO ARMOUR DO BRASIL S. A.

	Posto Frigorifico
	em 26-8-53
	Cr\$
Preços de compra:	
Bois consumo	175,00 por arroba
Carreiros gordos	160,00 " "
Vacas e torunos gordos	160,00 " "
Gado tipo conserva	100,00 " "
Vitelos gordos	10,00 por quilo
Suinos gordos, média 80 quilos	255/260,00 p/arroba
Preços de Venda:	Cr\$
Couros de boi	8,60 por quilo
Couros de vaca	8,60 " "
Banha em rama	24,00 " "
Banha em latas 3/20	1.500,00 por caixa

FRIGORIFICO WILSON DO BRASIL S. A.

	Posto Frigorifico
	em 25-8-53
	Cr\$
Preços de Compra:	
Novilhos gordos	175,00 por arroba
Carreiros gordos	160,00 " "
Vacas e torunos gordos	160,00 " "
Gado tipo conserva	105,00 " "
Vitelos gordos	10,00 por quilo
Suinos gordos, 80 quilos média	260,00 por arroba
Preços de Venda:	Cr\$
Couro de boi	8,80 por quilo
Couro de vaca	8,80 " "
Banha em latas 30/2	1.500,00 por caixa

ALIMENTOS PARA AVES E ANIMAIS

Criadores e avicultores, peçam cotações à Casa Especializada em Forragens.

GUILHERME D'AMICO

Deposito permanente de alfafa, milho, aveia, cevada, farela, linhaço, trigoilho, farinha de carne, ossos, refinazil, ostras, etc.

Rua Brigadeiro Galvão, 996

Fone 52-6770 — SÃO PAULO

HIPERFOSFATO

O ADUBO FOSFATADO MAIS BARATO

porque é 60% mais solúvel (aproveitado pelas plantas) do que outros fosfatos naturais.

CARBOLINEUM

Protege e imuniza toda a classe de madeira contra a podridão e cupim, principalmente as madeiras brancas de pequena resistencia.

OTTO BAUMGART

ENGENHEIRO
RUA FLORENCIO DE ABREU, 352
CAIXA POSTAL, 3492
SÃO PAULO

ADUBAÇÃO DE PASTAGENS Os criadores progressistas têm a preocupação de dar fosfatos de calcio ao gado para aumentar a sua "caixa óssea", visando o seu rapido desenvolvimento; mas, é sabido que a maior assimilação é fornecida pelas forragens. A aplicação de fosfato nas pastagens tem a dupla vantagem: da adubação das plantas (o fosfato aprofunda as raizes) e o enriquecimento das forragens em fosforo, calcio etc.

A dose é de 200 a 300ks. de Fosfato, a "lanço", por hectares em pastagens e o dobro em "piquetes" e capineiras, por ano, e aplicando-se mais tarde doses iguais de Salitre do Chile, em uma ou duas vezes por ano, na estação das chuvas.

O seu preço varia de Cr\$ 800,00 a Cr\$ 1.000,00 por tonelada, conforme a quantidade.

O Fosfato de Calcio Americano é distribuido por Arthur Vianna Companhia de Materiais Agrícolas — R. Florêncio de Abreu, 270 — Telefone 32-7101 — São Paulo.

O REGISTRO GENEALÓGICO

e

o seu indispensável
complemento

o CONTROLE LEITEIRO *mantidos pela*

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS

exaltam as seguintes qualidades:

do Touro -

- 1 - seu tipo, indicado pela relação de pontos obtidos na classificação e sua ascendência
- 2 - a produção de leite e gordura das suas filhas
- 3 - a indicação das próximas linhagens de seus descendentes

da Vaca -

- 1 - seu tipo, revelado pelo certificado de origem.
- 2 - os registros de todas suas produções.
- 3 - informações completas sobre a frequência e volume das suas lactações
- 4 - produção de sua progenie

As informações de cada animal dadas pelos Serviços de Registro Genealógico e Controle Leiteiro da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS esclarecem ao comprador o verdadeiro valor do animal e facilitam ao vendedor a obtenção de comprovantes concisos e completos dos animais que está vendendo. Registre, pois, seus animais no Serviço de Registro Genealógico e comprove a produção de suas vacas inscrevendo-as no Serviço de Controle Leiteiro. O Registro Genealógico por animal custa Cr\$ 50,00. Os controles, além de uma taxa anual de inscrição da propriedade no valor de Cr\$ 300,00, são cobrados Cr\$ 6,00 por vaca controlada.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS

Rua Senador Feijó, 30 — São Paulo

MERCADO DE LATICINIOS EM JUNHO

Está frouxo o mercado de laticínios em nossa praça, com nitidos sinais de dias pouco favoráveis. Os industriais estão duplamente alarmados: de um lado se avoluma a perspectiva de aumento de preço do leite, que vem sendo pleiteado insistentemente pelos produtores; de outro lado, coloca-se a Coap mantendo tabelamento rígido para a manteiga e se propõe a abastecer a Capital com manteiga a Cr\$ 35,00 o kg. O atual tabelamento, baixado há mais de dois anos, prevê um tipo de manteiga que não mais existe, o de segunda qualidade. Determinando preços impossíveis para produtos de alta qualidade, o que se vê desde há muito é o mercado paulista desprovido de manteiga boa. Todo o produto de boa qualidade, que, por isso, alcança melhores preços nas praças onde não haja tabelamento, é remetido para estas. Para S. Paulo os industriais guardam o pior produto — e disso todos os consumidores têm conhecimento.

Diante da possibilidade de retenção de estoques, foi determinado o levantamento das disponibilidades de manteiga, apurando-se o total de 603 toneladas, "quantidade bastante grande em relação à existente no fim da última entressafra".

Se temos estoque de manteiga razoável, se os preços vigentes são relativamente baixos para o produto de qualidade, por que motivo a Coap se propõe a trazer manteiga, não se sabe de onde, para ser vendida em S. Paulo a Cr\$ 35,00, como está anunciado?

Por falta de elementos mais precisos, os técnicos incumbidos de estudar o custo do beneficiamento do leite em nossa Capital, a pedido da Coap, não puderam concluir sua tarefa. Todavia, dos trabalhos já realizados, pode-se concluir que as despesas por litro de leite montam, aproximadamente, a Cr\$ 1.20.599 entre o posto de recebimento, no Interior, até a distribuição ao consumo. Sabendo-se o preço de aquisição do leite nas fontes de produção (Cr\$ 2,20 nas Águas e Cr\$ 2,40 na seca) e sabendo-se que, no preço do tabelamento (Cr\$ 3,70 e Cr\$ 3,90 respectivamente), já está incluído o lucro do distribuidor ou do varejista, facilmente se deduz que a situação das nossas usinas não pode deixar de ser periclitante.

Uma das coisas que mais impressionavam ao estudioso dos assuntos de beneficiamento de leite, em nossa Capital, era o aspecto de pujança revelado por nossas usinas há uns 10 ou 15 anos. Tinha-se prazer em visitar qualquer usina de beneficiamento de leite em S. Paulo, pois sabia-se estar entrando num estabelecimento com as mais modernas instalações, mantido dentro dos mais rigorosos preceitos tecnológicos e higienicos. Naquela época, não havia, ou era diminuta a interferência oficial em assuntos de preços de leite, e os então vigentes sempre estiveram ao alcance das bolsas pobres. Atualmente a coisa é a mesma para os consumidores, mas muito outra para as usinas. Onde aquelas usinas mantidas rigorosamente em higiene quase impecável, com operários muito bem uniformizados, trabalhando no meio de imenso maquinário luzidio, cuidadosamente mantido em perfeito funcionamento? Onde aquela imensa frota de caminhões, muito bem pintados e sempre reformados, mostrando um esmero só comparável aos atuais carros de distribuição de refrigerantes, bebidas alcoólicas ou maços de cigarro?

Numa coisa os paulistas devem insistir em assunto de leite: é em não permitir que a nossa produção, o nosso beneficiamento e a nossa distribuição de leite se degradem tanto a ponto de se nivelarem com os de muitas capitais do País, mesmo com os da Capital Federal. Para se evitar isso, o primeiro passo será a revelação exata da situação econômica das nossas usinas, cujo custo de trabalho tem de ser mais elevado que o das congêneres de outras cidades. Positivo que fique o alto grau da tecnologia adotada em nossas usinas, comprovado pela alta qualidade do produto obtido, será lógico exigir para um leite bom um preço melhor.

COTAÇÃO DE LATICINIOS NA PRAÇA DE SÃO PAULO

QUEIJO MINAS	Para o atacadista Cr\$	Para o varejista Cr\$	Para o consumidor Cr\$
Comum	17 — 18	20 — 21	28 — 30
Pasteurizado (Vituzzo e Boa)	—	22 — 23	32 — 33
Duro (Araxá)	20 — 22	22 — 25	30 — 32
Requeijão Catupiri	—	12	15
QUEIJO			
Prato e variedades Cabocó, Bola e Lanche de 1.a	28 — 30	30 — 32	38 — 40
Idem de 2.a	22 — 24	24 — 26	30 — 32
QUEIJO TIPO PARMESÃO			
Fresco (Montanhês)	28 — 30	32 — 35	40 — 42
Curado ("Dolar" e "Vigor")	38 — 40	42 — 44	50 — 60
PROVOLONE			
Fresco	—	20 — 24	30 — 32
Mussarela	—	25 — 28	32 — 33
Curado	—	32 — 36	40 — 45
Polenghi	—	42 — 44	52 — 60
MANTEIGA			
Tabelada			
Extra	—	40 — 42	49,00
1.a Qualidade	—	38 — 40	42 — 45
2.a Qualidade	—	29 — 32	38
LEITE CONDENSADO			
Caixa de 48 latas	—	295,00	—
LEITE EM PÓ INTEGRAL			
Caixa de 24 latas de 1 libra	—	347,00	—
LEITE			
CREME	P/produtor	P/consumidor	
Leite "C" (São Paulo, Santos, Campinas) — tabelado	2,40	3,90	
Leite "B"	3,70	60	
Leite "A"	—	8 a 10,00	
Leite cru — Capital	—	5,00	
Leite cru — Interior	—	3,00 — 4,00	
LEITE PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		P/produtor	
Zona abastecedora de São Paulo, Santos e Campinas, excesso de quota	—	Cr\$	
Nas demais zonas	—	mínimo 2,00	a 2,20
Sul de Minas — Para queijo	—	2,20	a 2,50
Por litro de leite que foi desnatado na Fazenda	—	1,50	a 1,80
Por kg de gordura butirométrica de 1.a	—	—	36 — 38
Por kg de gordura butirométrica (creme de 2.a)	—	—	28 — 33
CASEINA	—	8	a 12
LACTOSE — bruto	—	—	22

AVISO

AOS SENHORES LAVRADORES...

Industrias J. B. Duarte S/A., que há mais de 1/4 de século vêm fornecendo o melhor saucida até hoje conhecido — SULFURETO DE CARBONO — lembram que durante tão longo período apareceram sempre novos produtos de relativa eficiência e todos falharam por diversas causas que só o tempo demonstrou.

Isso porque:

O SULFURETO DE CARBONO é 100% eficiente na extinção da sauva, o que está positivamente provado durante quase meio século de uso contínuo.

É muito menos perigoso para quem o usa e de fácil aplicação não necessitando de aparelhos, até agora imperfeitos e caros.

O SULFURETO DE CARBONO tem sido e será sempre um ótimo saucida, 100% eficiente, quando aplicado normalmente.

Infelizmente a sauva continua e continuará atormentando o lavrador que, com muita razão, vê sempre em novos produtos dos quais introdutores inteligentes afirmam coisas maravilhosas, a solução para esse eterno pesadelo que é a sauva!

O BISULFURETO DE CARBONO "V8" tem as garantias acima citadas e já estamos aceitando pedidos para extinção de sauvas no corrente ano.

Aproveitamos para comunicar que também aceitamos pedidos de brometo de Metila em latas de 1/2 libra e aparelhos de aplicação por preços de reclame. Temos também um tipo composto "BROMETILA DUARTE" para ser usado sem aparelhos.

INDUSTRIAS

J. B. DUARTE S/A.

Pedidos a Cx. Postal 1002

São Paulo

Fone 36-3176

SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO
da
Associação Paulista de Criadores de Bovinos
Agosto de 1953

DESTAQUES — Sobressaem no presente relatório as lactações das seguintes vacas: Lira Sentinel 9461, Duquesa U.M.A. 13622, Aruca 11927.

Lira Sentinel 9461, completando sua lactação, iniciada aos 6 anos e 6 meses, registrou, em 365 dias, 8.793 kg de leite com 326,1 kg de gordura, classificando-se desta maneira entre as dez maiores produtoras de leite e gordura. Passou a ocupar, no Quadro de Honra do S.C.L., respectivamente, o 9.º e 7.º lugares, como produtora de leite e gordura.

Lira Sentinel 9461 é de propriedade e criação do Colégio Adventista Brasileiro.

Duquesa U.M.A. 13622, em sua lactação, iniciada aos 5 anos e 7 meses, registrou, em 305 dias, 7.808 kg de leite com 287,3 kg de gordura, passando a ocupar o 8.º e 9.º lugares entre as dez maiores produtoras do Quadro de Honra do S.C.L., respectivamente em gordura e leite.

Duquesa U.M.A. 13622 é de propriedade e criação da Refinadora Paulista S/A.

Aruca 11927, encerrando sua lactação, iniciada aos 6 anos 5 meses, completou, em 305 dias, em regime de duas ordenhas, 282,7 kg de gordura, passando a ocupar o 10.º lugar entre as maiores produtoras de gordura do S.C.L., nesse período. É a segunda vaca que, em regime de duas ordenhas, logra inscrever-se no Quadro de Honra.

Aruca 11927 é de propriedade da Fazenda e Granja Irohy. Aos proprietários destas novas recordistas apresentamos os cumprimentos do S.C.L.

LACTAÇÕES TERMINADAS

Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos meses	N.º SCL	Dias de lactação	Produção			Proprietário
					Leite kg	Gordura kg	%	
RAÇA HOLANDESA — variedade preta e branca								
Lactações de mais de 305 e até 365 dias (II Divisão)								
Três ordenhas								
Classe B — 3 a 4 anos								
Amazonas Iuasca 985 — LM	PC	3-1	1843	341	4618,0	157,9	3,41	João de Moraes Barros
Classe C — 4 a 5 anos								
Balinha Sentinel — LM	PC	4-1	1386	365	6535,0	236,4	3,61	Col. Adventista Brasileiro
Classe D — 5 anos e mais								
Lira Sentinel — LM	PC	6-6	1114	365	8793,0	326,1	3,70	Col. Adventista Brasileiro
Esperança Sentinel — LM	PC	7-2	1526	365	6076,0	224,1	3,68	Col. Adventista Brasileiro
Amazonas Favorita 834	PC	5-0	1377	365	4943,0	171,5	3,47	João de Moraes Barros
Duas ordenhas								
Classe B — 3 a 4 anos								
Suíssa de Paraíba — LM	PC	3-10	1931	365	3831,0	149,2	3,89	Olivo Gomes
Classe C — 4 a 5 anos								
Bela Vista Sata Prilly III 873 - L MPC	PC	4-1	1535	365	6060,0	207,9	3,43	Faz. e Granja Irohy
Daria São Martinho 533	PC	4-6	1898	365	5679,0	204,5	3,60	Dário F. Meirelles
Bela Vista Barreira Ceres VI 871 — LM	7/8	4-1	1550	365	5004,0	181,4	3,62	Faz. e Granja Irohy
Datura U.M.A. — LM	PC	4-10	1914	362	3875,0	180,6	4,63	Refinadora Paulista S/A
Classe D — 5 anos e mais								
Silene 603 — LM	NR	-	1938	365	7145,0	243,4	3,40	Faz. e Granja Irohy
Amarelux Y 535 — LM	PC	6-7	1537	365	5924,0	209,3	3,53	Faz. e Granja Irohy
Aspásia Y 644 — LM	PC	5-10	1468	346	4858,0	165,3	3,40	Faz. e Granja Irohy
Codorna U.M.A. — LM	PC	6-4	1910	365	4664,0	174,0	3,72	Refinadora Paulista S/A
Lactações de 305 dias e menos (I Divisão)								
Três ordenhas								
Classe A — até 3 anos								
Maaiké V (Petrea) — LM	PO	2-7	1994	305	4702,0	174,6	3,73	A. Antony Assumpção
Classe B — 3 a 4 anos								
Brindada Sentinel — LM	PC	3-8	1967	305	4508,0	169,4	3,75	Col. Adventista Brasileiro
Favorita Sentinel	PC	3-10	1968	305	4107,0	141,7	3,44	Col. Adventista Brasileiro
Jonge XVI (Berta)	PO	3-8	1631	305	3855,0	146,9	3,81	A. Antony Assumpção
Boa Vista Harmonia 907	PC	3-5	1973	305	3315,0	129,1	3,89	João de Moraes Barros
Classe C — 4 a 5 anos								
Argentina Maria 845	PC	4-11	2032	251	3424,0	127,5	3,72	João de Moraes de Barros
Classe D — 5 anos e mais								
Duquesa U.M.A. — LM	PC	5-7	2016	305	7808,0	287,3	3,68	Refinadora Paulista S/A
Veneza Sentinel — LM	PC	7-7	947	305	7143,0	252,3	3,53	Col. Adventista Brasileiro
Firmeza Sentinel — LM	PC	10-7	812	305	6262,0	210,8	3,36	Col. Adventista Brasileiro
Fortaleza	PC	8-1	45	305	4524,0	146,7	3,24	Col. Adventista Brasileiro
Boa Vista Joréca 768	PC	5-3	1373	305	3445,0	146,1	4,24	João de Moraes Barros
Amazonas Fogliona	PC	5-4	1620	116	1086,0	35,2	3,24	João de Moraes Barros

Nome da vaca	Grau de sangue	Idade em anos e meses	N.º SCL	Dias de lactação	Produção			Proprietário
					Leite kg	Gordura kg	%	
D u a s o r d e n h a s								
Classe A — até 3 anos								
Amazonas Madja 8824 — LM	PC	2-3	2004	305	4038,0	138,7	3,43	Faz. e Granja Irohy
Grisália U.M.A. — LM	7/8	2-5	1990	305	3099,0	117,9	3,80	Refinadora Paulista S/A
Gaviola U.M.A. — LM	7/8	2-7	2013	305	3010,0	126,9	4,21	Refinadora Paulista S/A
Classe B — 3 a 4 anos								
B. V. Lorena 7772 I Ceres — LM	PC	3-11	1443	305	5184,0	174,8	3,37	Faz. e Granja Irohy
Fanfarrá U.M.A.	7/8	3-9	2012	305	4218,0	165,9	3,93	Refinadora Paulista S/A
Vila Brandina Irani Cezar (1)	PC	3-8	2062	247	2653,0	135,8	3,71	Lafayette A. S. Camargo
Délia	PC	3-3	2046	231	1981,0	82,9	4,18	João Pacheco Chaves
Classe C — 4 a 5 anos								
Amazonas Milk Master Garrika	PC	4-2	1518	305	4711,0	154,6	3,28	Faz. e Granja Irohy
5704 LM	PC	4-9	2005	305	4524,0	158,6	3,50	Faz. e Granja Irohy
Cachoeira 829 — LM	PC	4-9	1982	292	2689,0	114,0	4,23	João Pacheco Chaves
Balsa	PC	6-5	1582	305	6501,0	282,7	4,34	Faz. e Granja Irohy
Classe D — 5 anos e mais								
Aruca 76485 — LM	NR	-	2006	305	5531,0	185,7	3,35	Faz. e Granja Irohy
Fermosa 848 — LM	PC	7-6	1555	305	5066,0	187,1	3,69	Faz. e Granja Irohy
Angai Y 789	NR	-	2007	295	5060,0	182,0	3,59	Faz. e Granja Irohy
Andalusia 827 — LM	PC	8-3	1606	305	4850,0	171,9	3,54	Lafayette A. S. Camargo
Vila Brandina Palmilha — LM	PC	5-3	1627	305	4688,0	162,0	3,45	Faz. e Granja Irohy
B.V. Quaresma Ceres II 870 — LM	7/8	7-8	1556	305	4509,0	154,8	3,43	Faz. e Granja Irohy
Zorra Y 263 — LM	7/8	7-0	1580	305	4268,0	158,4	3,71	Faz. e Granja Irohy
Bela Vista Fada 9044 I Ceres 868 LM	7/8	7-4	1957	305	4068,0	155,5	3,82	Olivo Gomes
Captura — LM	PC	8-0	2063	241	3932,0	146,4	3,72	Lafayette A. S. Camargo
Vila Brandina Xaxá — LM (1)								
Ferua — LM	PC	10-2	2001	305	3909,0	144,5	3,69	Olivo Gomes
Vila Brandina Salada (1)	PC	7-5	1544	212	3396,0	97,9	2,88	Lafayette A. S. Camargo
Vila Brandina Salva (1)	PC	9-6	1635	211	3285,0	102,9	3,13	Lafayette A. S. Camargo

RAÇA HOLANDESA — Variedade vermelha e branca

Lactações de 305 dias e menos								
D u a s o r d e n h a s								
Classe C — 4 a 5 anos								
Rika II	PO	4-2	2010	274	3572,0	126,9	3,55	Coop. Agro-Pec. Holambra
Classe D — 5 anos e mais								
Annie 35	PO	5-2	2029	238	3353,0	127,2	3,79	Coop. Agro-Pec. Holambra

RAÇA JERSEY

Lactações de 305 dias e menos (I Divisão)								
D u a s o r d e n h a s								
Classe A — até 3 anos								
Sant'Ana Heroína	PO	2-5	2118	150	1421,0	63,0	4,43	Olivo Gomes
Classe B — 3 a 4 anos								
Sant'Ana Rosita Bollhayes (1)	PO	3-11	2120	169	1871,0	89,2	4,71	Olivo Gomes
Classe C — 4 a 5 anos								
Sant'Ana Hera Magnética	PO	4-6	2003	305	3577,0	176,0	4,92	Olivo Gomes
Classe D — 5 anos e mais								
Índia V	PO	8-2	2002	303	3954,0	175,0	4,42	Olivo Gomes
Rolinha	NR	6-0	1877	305	3335,0	147,8	4,43	Marcus R. Alves de Lima
Buckhurst Paddy (1)	PO	7-10	2121	195	2374,0	109,2	4,59	Olivo Gomes

RAÇA SCHWYZ

Lactações de 305 dias e menos (I Divisão)								
D u a s o r d e n h a s								
Classe D — 5 anos e mais								
Riquessa	3/4	-	1987	305	5453,0	213,2	3,90	Alberto Ferraz

(1) = Retirada

LM = Livro de Mérito

RESULTADOS PARCIAIS DE CONTROLE

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Controle	Dias de Lactação	Produção		%
						Leite	Gordura	
Cooperativa Agro Pecuária Holambra. Mogi Mirim. Controle em 3-8-53.								
Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca e vermelha e branca								
P. B.								
1.849	Antje 22	PO	6-5	1º	15	17,480	0,680	3,89
2.237	Diva V	PO	5-11	3º	101	13,350	0,446	3,34
2.282	Antje 21	PO	6-4	2º	49	15,430	0,591	3,83
2.284	Julia XI	PO	4-1	2º	32	21,170	0,801	3,78
2.285	Marie	PO	6-3	2º	47	16,040	0,505	3,15
2.341	Gonda	PO	4-5	1º	8	20,600	0,673	3,26
2.352	Marie XI	PO	4-9	1º	7	21,590	0,967	4,48
V. B.								
1.783	Léa 14	PO	5-3	2º	52	22,400	0,805	3,89
1.789	Koosje 3	PO	5-2	5º	144	12,490	0,442	3,54
1.845	Roosje II	PO	5-2	3º	81	18,490	0,582	3,15
2.092	Jana 5	PO	10-0	7º	202	12,890	0,475	3,68
2.093	Marie 2	PO	4-10	7º	207	10,970	0,421	3,84
2.095	Marie IV	PO	3-11	7º	190	10,210	0,406	3,97
2.141	Naatje II	PO	4-7	6º	188	10,320	0,398	3,88
2.283	Clementina 4	PO	4-2	2º	52	15,950	0,489	3,06

Olivo Gomes. Jacarei. Controle em 3-8-53.

Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca e Jersey.

Jersey

2.257	Barke Dairy Mistress	PO	-	3º	61	12,220	0,815	6,67
2.260	Harwick Quick Silven	PO	-	3º	52	13,090	0,850	6,49
2.275	Sant'Ana Delta Bolhayes	PO	-	2º	31	12,880	0,744	5,78
2.276	Sant'Ana Cristal II Magnet	PO	-	2º	29	16,730	0,965	5,77

Hol. p. b.

1.825	Europa de Parahyba	PCOD	7-2	2º	38	21,220	0,756	3,56
1.828	Clarinetta	7/8	9-1	3º	57	13,350	0,482	3,61
1.872	Annie 17	PO	5-2	2º	38	16,760	0,580	3,45
1.887	Aida de Parahyba	PCOC	3-4	2º	31	12,560	0,509	4,05
2.053	Aturuoca de Parahyba	PCOD	5-8	8º	214	12,680	0,466	3,67
2.113	Jafa de Parahyba	PCOD	11-10	7º	209	12,420	0,467	3,76
2.150	Javaneza de Parahyba	PCOD	10-8	6º	159	10,660	0,372	3,49
2.180	Carola	3/4	10-0	5º	139	12,570	0,451	3,59
2.181	Sertaneja de Parahyba	PCOD	3-8	5º	116	17,540	0,633	3,61
2.229	Liene	PCOD	4-8	3º	104	15,640	0,594	3,80
2.230	Javas de Parahyba	PCOC	2-9	3º	69	14,260	0,535	3,75
2.231	Araras	PCOD	6-0	3º	57	10,650	0,390	3,66
2.232	Cravina I de Parahyba	7/8	8-2	3º	76	17,290	0,670	3,87
2.274	Delta de Parahyba	PCOD	5-2	2º	41	20,620	0,742	3,69

Alberto Ferraz. Agulhas Negras. Controle em 7-8-53.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas. Raças: Hol. preta e branca, Jersey, Schwyz e Guernsey.

1.462	Patruiha — Schwyz	N R	7-0	3º	81	20,510	0,748	3,65
1.549	Xenia Misty Sybill (Beleza) — Jersey	PO	7-11	1º	23	11,980	0,536	4,48
1.770	Lee's Hill Ranger's Swimsy (Joa) Schwyz	PO	-	1º	16	20,600	0,711	3,45
1.987	Riqueza — Schwyz	N R	-	11º	318	12,820	0,584	4,55
2.047	Irma — Guernsey	PO	2-6	8º	240	8,740	0,479	5,59
2.183	Amizade das Agulhas Negras	PCOD	3-4	5º	118	17,460	0,558	3,20
2.184	Africana das Agulhas Negras — Hol. pb	PCOD	3-4	5º	124	13,520	0,429	3,17
2.242	Alga das Agulhas Negras — Hol. p b	PCOD	2-6	3º	60	16,580	0,512	3,08
2.277	Alva das Agulhas Negras — Hol. pb	PCOD	3-1	2º	53	12,700	0,527	4,10
2.278	Argola das Agulhas Negras — Hol. p b	PCOD	3-1	2º	57	17,170	0,483	2,81
2.279	Ada das Agulhas Negras — Hol. p b	PCOD	3-3	2º	38	16,000	0,548	3,43
2.280	Aliança das Agulhas Negras — Hol. p b	PCOD	3-7	2º	46	17,160	0,677	3,94
2.329	Ameixa das Agulhas Negras	PCOD	3-4	1º	17	12,550	-	-
2.330	Arte das Agulhas Negras — Hol. pb	N R	-	1º	13	15,420	0,558	3,63

N. ^o SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Controle	Dias de Lactação	Produção Leite	Gordura	%
Dario Freire Meirelles, Campinas. Controle em 10-8-53								
Regime de campo com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.								
3 ordenhas								
952	S.Martinho Colanthus	PO	7-9	3 ^o	89	27,310	0,554	2,02
1.353	Vigo Burke Marika	PO	5-8	11 ^o	312	17,210	0,597	3,46
2 ordenhas								
1.073	S.Martinho Bozumer Bessie	PO	6-10	4 ^o	108	19,370	0,570	2,94
1.129	S.Martinho Dhalla Creamele	PO	7-2	2 ^o	44	26,210	0,813	3,10
1.149	Prisia S.Martinho	PCOD	10-0	3 ^o	65	20,400	0,651	3,19
1.187	M.Mudcura Carmem	PCOD	8-0	5 ^o	135	14,300	0,462	3,23
1.191	M.Marathom Comparada	PCOD	8-3	2 ^o	46	26,420	0,725	2,74
1.209	M.Champion Collalta	PCOD	5-11	10 ^o	282	13,130	0,683	5,20
1.292	Enesta	PCOD	5-11	1 ^o	27	23,630	0,755	3,19
1.338	Olguina S.Martinho	PCOD	9-9	3 ^o	86	21,030	0,668	3,18
1.358	M.Creator Drina	PCOD	12-3	2 ^o	48	26,680	0,617	2,31
1.496	Emberrada	PCOD	5-9	1 ^o	26	21,070	0,770	3,65
1.498	Vigo Burke Homestead	PO	5-10	9 ^o	249	11,290	0,375	3,32
1.602	Educada S.Martinho	PCOD	4-1	5 ^o	139	16,260	0,390	2,40
1.733	Rosa S.Martinho	PCOD	8-11	3 ^o	65	30,100	0,934	3,10
1.811	S.Martinho Governess Van Der Meer	PO	4-4	1 ^o	3	21,130	0,769	3,64
1.898	Daria S.Martinho	PCOD	4-6	13 ^o	370	12,680	0,487	3,84
2.033	Cinderella S.Martinho	7/8	6-6	9 ^o	255	13,260	0,484	3,65
2.037	Etolla	PCOD	5-6	9 ^o	287	10,500	0,390	3,71
2.038	Escolta S.Martinho	PCOD	3-4	9 ^o	260	13,640	0,468	3,43
2.040	Energica	PCOD	3-1	9 ^o	267	11,110	0,362	3,26
2.043	Cristie S.Martinho	PCOD	5-7	9 ^o	274	10,920	0,401	3,67
2.044	Feijoa S.Martinho	RP	2-6	9 ^o	263	14,940	0,501	3,35
2.076	Exaltada S.Martinho	PCOD	3-3	8 ^o	233	12,650	0,428	3,38
2.077	Evidencia S.Martinho	PCOD	3-4	8 ^o	232	11,750	0,389	3,31
2.078	Extase S.Martinho	PCOD	3-2	8 ^o	219	10,720	0,391	3,64
2.079	Emacula S.Martinho	PCOD	3-1	8 ^o	231	11,810	0,456	3,86
2.080	Exuberante S.Martinho	PCOD	3-0	8 ^o	221	11,370	0,407	3,58
2.082	Andorinha S.Martinho	N R	-	8 ^o	-	11,810	0,479	4,05
2.083	Fagote S.Martinho	RP	2-6	8 ^o	239	15,310	0,539	3,52
2.084	Fufofa S.Martinho	RP	2-9	8 ^o	217	10,700	0,356	3,33
2.085	Gelatina	PCOD	3-4	8 ^o	221	10,960	0,326	2,97
2.165	Esperada	PCOD	4-5	6 ^o	168	16,670	0,372	2,23
2.166	Gironda	PCOD	7-0	6 ^o	163	14,450	0,431	2,98
2.241	Eletiva	PCOD	5-11	3 ^o	86	19,800	0,720	3,63
2.300	S.Martinho Imkje Top Burke	PO	3-4	2 ^o	35	18,050	0,564	3,18
2.349	Elala	PCOD	6-1	1 ^o	5	21,060	1,020	4,84

Drs. João Pacheco Chaves e Cassio Lanari do Val. Piracicaba. Controle em 11-8-53

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.

2.160	Arteniza	PCOD	5-10	6 ^o	158	11,800	0,405	3,43
2.255	Cachoupa	PCOD	-	3 ^o	-	14,250	0,462	3,24
2.319	Dalva	PCOD	3-11	2 ^o	52	12,350	0,422	3,41
2.254	Anzuka Carioca	PCOD	3-1	1 ^o	11	14,350	0,505	3,52
2.355	Sabiá	PCOD	3-2	1 ^o	26	10,450	0,329	3,15
2.253	Franzeza Paul (Paula)	PCOD	3-1	3 ^o	85	11,850	0,383	3,23

Francis Souza Dantas Forbes. Campinas. Controle em 8-8-53.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.

2.293	Sylvia Nittanyvale Xanguim	PCOD	3-2	2 ^o	70	16,780	0,544	3,24
2.294	G.S. Fobes Spofford Dalry	PO	2-5	2 ^o	67	12,680	0,349	2,75
2.295	Burke Edelweiss Prince Nora	PCOD	2-9	2 ^o	48	24,210	0,645	2,66
2.296	Greenlodge Rag Apple Fobes Harriet	PO	2-7	2 ^o	67	16,560	0,459	2,77
2.298	Fana Lochinvar Toillila	PO	2-8	2 ^o	63	18,310	0,413	2,25
2.299	Casmac Tristana Fiderne	PCOD	4-9	2 ^o	49	20,800	0,592	2,84
2.337	Forsgate H.R.A. Ona	PCOD	3-2	1 ^o	17	24,020	0,720	3,00
2.338	J.Gay Blade K.	N R	-	1 ^o	15	19,440	0,509	2,61
2.339	V. B. Cuica	N R	-	1 ^o	14	20,960	0,814	3,88
2.340	M. Alluvialdale D.	N R	-	1 ^o	21	18,650	0,528	3,83

Dr. João de Moraes Barros. Campinas. Controle em 13-8-53.

Regime de campo com ração suplementar, 3 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.

304	Vitoriosa	PCOC	3-11	1 ^o	10	16,870	0,580	3,44
598	Duvidosa	PCOC	3-11	4 ^o	91	15,580	0,537	3,45
1.376	Amazonas Forjadora	PCOD	6-0	1 ^o	22	21,810	0,569	2,61
1.501	Amazonas Groota	PCOD	3-10	8 ^o	255	10,740	0,385	3,58
1.593	Amazonas Guinada	PCOD	4-1	4 ^o	118	11,160	0,347	3,11
1.594	Amazonas Golondrina	PCOD	3-3	6 ^o	166	12,180	0,428	3,51

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Controle	Dias de Lactação	Produção		%
						Leite	Gordura	
1.615	Amazonas Iliriani	PCOD	4-2	4º	97	11,990	0,365	3,04
1.621	Singapura Maria	7/8	5-2	2º	50	11,660	0,376	3,23
1.622	Boa Vista Editora	PCOC	4-3	6º	155	13,670	0,565	4,13
1.624	Amazonas Guanasa	PCOD	4-5	1º	16	16,370	0,566	3,46
1.625	Amazonas Gusmana	PCOD	3-11	4º	127	13,090	0,339	2,59
1.626	Amazonas Guiwannaita	PCOD	3-9	5º	147	13,200	0,331	2,50
1.665	Amazonas Iaque	PCOD	4-1	4º	107	14,470	0,467	3,23
1.685	Marina Maria	1/2	4-4	2º	57	10,290	0,406	3,95
1.687	Boa Vista Turmalina	PO	4-2	2º	53	16,990	0,638	3,75
1.688	Amazonas Gondra	PCOD	4-6	1º	2	12,100	0,304	2,52
1.691	Amazonas Iumbold	PCOD	4-1	4º	116	10,490	0,414	3,95
1.692	Amazonas Ionorina	PCOD	4-3	3º	62	14,680	0,460	3,13
1.717	Amazonas Iomofonia	PCOD	3-10	6º	158	10,990	0,296	2,69
1.718	Amazonas Iegeda	PCOD	4-0	4º	112	14,830	0,465	3,13
1.738	Amazonas Iomofilia	PCOD	3-10	3º	86	13,930	0,448	3,21
1.756	Cravina Maria	PCOD	5-1	1º	15	14,010	0,637	4,55
1.758	Diva Maria	PCOD	4-1	4º	101	15,550	0,515	3,31
1.844	Boa Vista Jojóca	PCOD	6-0	1º	14	14,220	0,520	3,65
1.885	Sinhá Maria	7/8	3-8	1º	5	12,960	0,511	3,94
2.087	Amazonas Iunteriana	PCOD	3-9	8º	219	13,200	0,459	3,47
2.132	Amazonas Iuguenota	PCOD	3-11	6º	192	12,360	0,349	2,82
2.222	Amazonas Iog Kong	PCOD	3-11	4º	120	10,790	0,344	3,19
2.240	Boa Vista Esperta	PCOC	3-11	3º	78	13,590	0,528	3,89
2.346	Amazonas Iuroniana	PCOD	4-4	1º	25	22,640	0,816	3,60
2.347	Amazonas Iomofonana	PCOD	4-0	1º	22	17,820	0,577	3,24
2.348	Boa Vista Gaita	7/8	2-11	1º	24	16,620	0,654	3,93

Colégio Adventista Brasileiro. Santo Amaro. Controle em 12-8-53.

Regime de semi-estabulação, 3 ordenhas. Raça Holandêsa, variedade preta e branca.

45	Fortaleza							
812	Firmeza Sentinel	PCOC	10-7	10º	305	11,880	0,410	3,45
925	Flora Sentinel	PCOC	8-1	10º	293	18,180	0,612	3,36
947	Veneza Sentinel	PO	8-10	3º	79	26,580	0,783	2,94
948	Garça Sentinel	PCOC	7-7	11º	311	18,110	0,701	3,87
1.112	Julipa Sentinel	PCOC	7-7	6º	167	23,300	0,749	3,21
1.114	Lira Sentinel	PCOC	6-9	6º	179	21,460	0,721	3,36
1.117	Martona	PCOC	6-6	13º	368	18,370	0,668	3,63
1.202	Roseira Sentinel	PCOD	7-11	6º	159	14,880	0,494	3,32
1.386	Belinha Sentinel	PCOC	7-7	6º	275	24,070	0,498	2,06
1.432	Faroleza Sentinel	PCOC	4-1	12º	346	12,370	0,518	4,19
1.459	Catita	PCOC	4-11	5º	126	29,590	0,840	2,84
1.479	Clarita	PCOD	4-5	6º	188	15,770	0,407	2,58
1.561	Prata	PCOD	4-8	3º	83	21,700	0,730	3,36
1.735	Surpreza Sentinel	PCOD	4-10	7º	202	20,800	0,630	3,03
1.937	Belgreta Sentinel	PCOC	3-10	3º	92	20,740	0,715	3,44
1.967	Brindada Sentinel	PCOC	2-7	12º	354	12,270	0,462	3,76
2.130	Magnolia Sentinel	PCOC	3-8	11º	312	10,240	0,415	4,05
2.155	Garota Sentinel	PCOC	2-8	6º	206	15,600	0,541	3,47
2.156	Florinha Sentinel	PCOC	2-8	6º	169	17,440	0,596	3,41
2.157	Famosa Sentinel	PO	2-10	6º	171	17,190	0,620	3,60
2.158	Gaucha	PCOC	2-3	6º	174	19,130	0,405	2,11
2.185	Matilija	PCOC	2-8	6º	162	14,580	0,518	3,58
2.186	Rolinha Sentinel	PCOC	2-9	5º	144	18,060	0,623	3,45
2.187	Skaylark Fany	PCOC	2-10	5º	142	16,960	0,548	3,23
		PO	2-7	5º	140	18,260	0,728	3,99

Refinadora Paulista S/A. Piracicaba. Controle em 15-8-53.

Regime de estabulação permanente, 3 e 2 ordenhas. Raça Holandêsa, variedade preta e branca.

3 ordenhas								
2.015	Dádiva U.M.A.	PCOD	5-4	10º	269	17,170	0,587	3,42
2.016	Duqueza U.M.A.	PCOD	5-7	10º	290	17,440	0,706	4,05
2.064	Eleita U.M.A.	7/8	4-6	9º	256	12,830	0,468	3,65
2.065	Fragata U.M.A.	PO	3-11	9º	252	13,050	0,373	2,86
2.356	Prince Inka Homestead Mercedes	PO	8-7	1º	36	37,690	1,197	3,17
2 ordenhas								
1.840	Dama U.M.A.							
1.860	Ormsby Aaggie Daisy Fobes	7/8	6-5	1º	16	23,940	0,756	3,16
2.014	Gardenia U.M.A.	PO	-	3º	70	18,260	0,482	2,64
2.066	Pavina U.M.A.	PCOD	2-7	10º	278	12,140	0,385	3,17
2.188	Giada U.M.A.	PO	3-9	9º	261	10,350	0,434	4,20
2.189	Gloria Inka U.M.A.	PCOD	2-5	5º	152	11,450	0,377	3,30
2.203	Esquadra U.M.A.	PCOD	2-7	5º	151	13,920	0,530	3,81
2.204	Fidalga U.M.A.	PCOD	5-0	4º	130	11,640	0,542	4,76
2.205	Garrucha U.M.A.	PCOD	4-1	4º	127	14,870	0,573	3,85
2.207	Filipina U.M.A.	PCOD	2-5	4º	115	13,150	0,447	3,40
2.208	Campinas U.M.A.	PO	4-2	4º	104	12,320	0,458	3,72
2.243	Piebe Inka Ormsby Aaggie	PCOD	6-11	4º	110	17,180	0,560	3,26
		PO	8-6	3º	101	16,750	0,524	3,13

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Controle	Dias de Lactação	Produção		%
						Leite	Gorduro	
2244	Pavela	3/4	4-2	3º	89	10,160	0,333	3,28
2245	Galhofa	N R	3-3	3º	91	11,730	0,390	3,32
2246	Esponja	PCOD	5-0	3º	87	14,270	0,451	3,16
2247	Gruta	7/8	2-9	3º	78	12,470	0,460	3,69
2248	Demerara	PO	5-10	3º	83	11,000	0,389	3,53
2250	Geladeira U.M.A.	PCOD	2-8	2º	53	11,270	0,395	3,50
2252	Palência U.M.A.	PCOD	4-4	2º	59	15,250	0,461	3,02
2297	Gruta Daisy	N R	2-7	1º	14	12,750	0,366	2,87
2298	Guatemala Mardale	PO	2-8	1º	13	10,530	0,367	3,49
2300	Gitana	PCOD	2-11	1º	23	13,510	0,426	3,15

Olivo Gomes, Jacarei. Controle em 18-8-53.

Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Jersey.

2203	Sant'Ana Hera Magnet	PO	4-6	10º	300	7,040	0,400	5,68
2201	H.H. Coronation	PO	5-11	9º	279	8,600	0,534	6,21
2202	B.S. Memento	PO	3-8	9º	273	8,780	0,456	5,19
2204	Sant'Ana Estrela	PO	4-0	8º	226	7,850	0,465	5,93
2200	Sant'Ana Olinda	PO	2-7	8º	125	8,830	0,452	5,12
2216	Sant'Ana Catita Magnet	PO	5-4	7º	205	8,400	0,393	4,68
2217	Meadow's Magnet's Xmas	PO	8-7	7º	203	8,650	0,490	5,67
2247	Sant'Ana Ermida Bollhayes	PO	4-7	7º	179	7,300	0,452	6,20
2276	Sant'Ana Gironda II	PO	-	5º	-	7,020	0,441	6,28
2217	(Regina) Sant'Ana Regina							
	Bollhayes	PO	-	4º	125	7,260	0,325	4,48
2218	Regencia	PO	-	4º	117	7,080	0,426	6,02
2219	Buckhurst Coral	PO	-	4º	111	10,020	0,487	4,86
2220	Hauville Designing Belle	PO	-	4º	112	7,860	0,502	6,39
2250	Agatha Christie	PO	-	3º	68	12,270	0,654	5,33
2258	Sant'Ana Itamar	PO	-	3º	74	12,480	0,649	5,20
2261	Placeful of Brokvale	PO	-	3º	71	10,600	0,463	4,37
2262	Sant'Ana Malta	PO	-	1º	27	13,060	0,565	4,68
2261	Calcutá Magicol 20	PO	-	1º	2	14,260	0,655	4,59

Fazenda Monte D'Este Ltda. Campinas. Controle em 18-8-53

Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.

2209	Amaz. L. Mabilhacional	PCOD	2-2	4º	230	11,780	0,428	3,64
2210	Amaz. L. Maltera	PCOD	2-7	4º	221	10,020	0,320	3,20
2211	Amaz. L. Macera	PCOD	2-4	4º	159	11,370	0,400	3,51
2212	Amaz. L. Mabilhadora	PCOD	2-5	4º	153	15,010	0,372	2,48
2213	Amaz. L. Malográfica	PCOD	2-10	4º	153	12,260	0,415	3,38
2214	Amaz. L. Microcera	PCOD	2-6	4º	108	10,860	0,266	2,45
2215	Amaz. L. Miuva	PCOD	2-10	4º	104	14,130	0,407	2,88
2202	Amaz. Majadacéa	PCOD	2-6	3º	89	14,680	0,453	3,09
2203	Amaz. Narrativa	PCOD	2-7	3º	91	19,310	0,632	3,27
2204	Amaz. Napeva	PCOD	2-7	3º	93	18,200	0,471	2,58
2209	Amaz. Morfológica	PCOD	2-1	2º	54	13,700	0,456	3,33
2220	Amaz. L. Malométrica	PCOD	3-1	2º	51	11,670	0,326	2,79
2291	Amaz. L. Malita	PCOD	2-9	2º	60	15,910	0,489	3,07
2292	Amaz. Nove	PCOD	2-9	2º	77	17,880	0,502	2,80
2342	Amaz. Magnetica	PCOD	2-9	1º	38	16,340	0,505	3,09
2342	Amaz. L. Mafalgesia	PCOD	2-10	1º	69	14,460	0,476	3,29
2344	Amaz. Malografica	PCOD	3-2	1º	41	15,120	0,372	2,46
2345	Amaz. L. Mabilhada	PCOD	2-9	1º	53	11,120	0,460	4,14

Dr. Luciano Vasconcellos Carvalho. Vinhedo. Contrôl em 21-8-53

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade vermelha e branca.

2213	Prima de Marambaia	1/2	5-1	2º	69	14,090	0,530	3,76
2214	Florista I	3/4	8-3	2º	126	12,070	0,423	3,50
2215	Barra Mansa	3/4	7-3	2º	167	11,290	0,383	3,39
2216	Chumbada 1.º	PCOD	4-7	2º	64	15,170	0,532	3,51
2217	Amoreira	N R	-	2º	93	11,490	0,331	2,88
2218	Geitosa	7/8	6-10	2º	83	10,400	0,458	4,40
2205	Alida	PO	-	1º	31	17,190	0,890	5,18
2206	Caçamba de Marambaia	PCOD	-	1º	44	16,220	0,579	3,57

Dr. Lafayette Alvaro de Souza Camargo. Campinas. Contrôl em 28-8-53.

Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca.

1506	Vila Brandina Flôr do Campo	PCOC	6-10	7º	187	14,870	0,460	3,10
1506	Vila Brandina Fidalga	PCOD	7-0	9º	258	11,110		
1530	Vila Brandina Campana	7/8	6-7	9º	250	18,240	0,749	4,11
1538	Vila Brandina Simonete	PCOC	7-1	8º	230	10,890	0,395	3,63
1542	Vila Brandina Flora	PCOD	8-6	7º	199	13,940	0,491	3,52

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Controlo	Dias de Lactação	Produção		%
						Leite	Gordura	
1.702	Vila Brandina Tarracha	PCOD	7-11	6º	181	12,370	0,445	3,60
1.720	Vila Brandina Sula	PCOC	6-0	5º	161	11,480	0,434	3,78
1.769	Vila Brandina Chibata	PCOC	9-6	3º	110	18,770	0,559	2,97
1.796	Vila Brandina Marilú	PCOC	4-9	3º	110	12,160	0,433	3,56
2.098	Vila Brandina Tigelada	PCOC	6-7	8º	255	12,110	0,502	4,14
2.193	Vila Brandina Festiva	PCOC	7-1	5º	176	11,860	0,415	3,50
2.227	Vila Brandina Corina	PCOC	4-2	4º	97	10,020	0,358	3,57
2.228	Vila Brandina Pandora	PCOC	4-4	4º	104	15,050	0,539	3,58
2.271	Vila Brandina Ana Ruga	PCOD	8-2	3º	108	15,340	0,397	2,58

Dr. A. Antony Assumpção. Mogy Mirim. Contrôlo em 25-8-53.

Regime de campo com ração suplementar. 3 ordenhas. Raça Holandêsa, variedade preta e branca.

1.750	Saakje XXV (Kátia)	PO	4-5	5º	124	16,320	0,666	4,08
1.780	Ijtske VI (Albertina)	PO	4-2	3º	82	21,130	0,758	3,58
1.855	Vlekje III (Karenine)	PO	3-8	2º	47	22,280	0,887	3,98
2.136	Antje III (Francisca)	PO	3-11	7º	207	11,460	0,457	3,98

Fazenda e Granja Irohy. Mogy das Cruzes. Contrôlo em 29-8-53.

Regime de campo com ração suplementar. 2 ordenhas. Raça Holandêsa, variedade preta e branca.

849	B. Vista Graciosa 7767 I.ª								
	Ceres (866)	PCOC	-	1º	15	24,170	0,979	4,05	
1.139	Diana (574)	PCOC	6-3	9º	270	10,590	0,457	4,31	
1.347	Arapanema Y (75310)	PCOD	6-11	9º	287	16,420	0,639	3,89	
1.402	Fidalga (797)	N R	-	2º	23	24,540	0,906	3,69	
1.418	Amaz. Marathon Gabriela (8114)	PCOD	5-1	4º	159	10,830	0,421	3,88	
		N R	-	2º	55	20,500	0,646	3,15	
1.427	Marilia (676)								
1.433	B.Vista Gorita Ceres I (874)	PCOC	3-8	2º	37	25,800	0,903	3,50	
1.466	Alemoa Y (542)	PCOD	6-5	3º	78	23,150	0,844	3,64	
1.475	Alzira (798)	N R	-	1º	19	17,170	0,609	3,54	
1.514	Alteza Y (2579)	PCOD	5-10	3º	63	29,120	1,003	3,44	
1.519	Correia (837)	N R	-	8º	254	16,710	0,584	3,49	
1.522	Realeza (748)	N R	-	7º	272	14,950	0,553	3,70	
1.539	Carioca (747)	N R	-	7º	-	16,950	0,644	3,80	
1.551	B.Vista Unica Ceres V	PCOC	5-1	4º	153	24,180	0,874	3,61	
1.577	Argola Y (590)	PCOD	7-9	7º	360	17,470	0,670	3,83	
1.581	Amaz. Dómino Gordina (9617)								
	Aruca (76485)	PCOD	4-11	4º	151	24,700	0,902	3,65	
1.614	Fortuninha (408)	PCOD	6-5	10º	308	11,640	0,552	4,74	
1.659	Antilha Y (530)	N R	-	2º	51	26,580	0,916	3,44	
1.674	Amaz. Interlandia (10238)	PCOD	7-2	5º	169	21,430	0,729	3,40	
1.707	Amaz. Posch Garonne (9666)	PCOD	3-5	5º	178	15,990	0,519	3,24	
1.708	Botija (600)	PCOD	4-11	2º	56	22,480	0,708	3,15	
1.773	Amaz. Tiroleza (10158)	N R	-	4º	155	15,200	0,500	3,88	
1.774	Amaz. Ispiridina (10101)	PCOD	3-9	3º	65	25,040	0,749	2,99	
2.004	Amaz. Madja (8824)	N R	-	5º	139	15,840	0,536	3,38	
2.006	Formosa (848)	PCOD	2-3	11º	321	10,200	0,387	3,79	
2.008	Amaz. Lahore (10277)	N R	-	10º	309	14,120	0,502	3,56	
2.023	Amaz. Maciça (5202)	N R	-	11º	314	11,880	0,264	2,22	
2.024	Amaz. Garbarina (19794)	PCOD	2-1	10º	283	15,190	0,486	3,20	
2.048	Alida (212)	N R	-	10º	312	16,510	0,544	3,29	
2.049	Cornelia (5057)	N R	-	9º	258	10,750	0,455	4,24	
2.050	Catarina (5038)	N R	-	9º	257	12,960	0,557	4,30	
2.052	Araçatuba Y (555)	N R	-	9º	358	12,710	0,502	3,95	
2.074	Baroneza (836)	PCOD	6-11	9º	251	13,610	0,531	3,90	
2.091	Amaz. L. Maré (10518)	PCOD	4-11	9º	251	13,130	0,498	3,79	
2.100	Bolivia (390)	PCOD	-	8º	236	19,420	0,690	3,55	
2.134	Amaz. Manganosa (5320)	NR	2-4	7º	249	18,010	0,630	3,49	
2.170	Amaz. Guinazusa (82314)	PCOD	-	6º	194	18,790	0,686	3,65	
2.171	Despedida (857)	N R	-	-	6	181	20,020	0,559	2,79
2.172	Amaz. Minguim (22194)	N R	-	6º	170	13,790	0,441	3,20	
2.196	Amaz. Ilarodia (10184)	PCOD	2-5	6º	175	17,130	0,513	2,99	
2.197	Inula (808)	PCOD	3-10	5º	140	20,290	0,622	3,06	
2.198	Amaz. Monograma (83758)	NR	3-0	5º	147	20,570	0,636	3,09	
2.199	Helminthia (805)	PCOD	-	5º	194	13,780	0,501	3,64	
2.200	Amaz. Imperiala (10005)	N R	-	5º	136	18,140	0,602	3,31	
2.201	Helvetia (499)	N R	-	5º	138	23,270	0,675	3,90	
2.223	Amaz. Margem (5226)	PCOD	8-1	5º	151	18,570	0,696	3,75	
2.224	Amaz. Multiplicada (84394)	PCOD	2-7	4º	100	16,800	0,553	3,29	
2.225	Amaz. Igala (9827)	PCOD	2-7	4º	101	15,800	0,474	3,00	
2.226	Amaz. Posch Galeza (9627)	N R	-	4º	94	15,300	0,499	3,26	
2.266	Amaz. L. Macanéia (5948)	PCOD	4-8	4º	115	17,620	0,572	3,24	
2.267	Amaz. Ipnótica (10269)	PCOD	3-3	3º	65	14,130	0,458	3,24	
2.268	Caprichosa Y (5042)	PCOD	4-2	3º	69	23,810	0,773	3,24	
2.269	Cearença Y (5013)	N R	3-1	3º	68	19,270	0,646	3,35	
2.302	Elolda (858)	N R	2-6	3º	75	23,660	0,909	3,84	
		N R	-	2º	46	27,510	0,946	3,44	

N. ^o SCL	Nome da vaca	Grau do sangue	Idade anos e meses	Controle	Dias de Lactação	Produção		%
						Leite	Gordura	
2.303	Convoluta (855)	N R	-	2 ^o	44	21,890	0,777	3,55
2.304	I. Cachoura (5021)	N R	-	2 ^o	53	19,160	0,775	4,04
2.305	Amaz. Guamenina (8224)	N R	-	2 ^o	39	23,020	0,713	3,10
2.306	I. Adema's Yetje (5008)	PO	-	2 ^o	57	16,770	0,494	2,94
2.307	Amaz. Malotecnica (10643)	PCOD	3-1	2 ^o	56	16,930	0,577	3,41
2.308	Amaz. Ipalage (10239)	PCOD	3-9	2 ^o	43	27,880	0,878	3,15
2.309	Augusta Y (2130)	PCOD	6-11	2 ^o	47	22,700	0,966	4,25
2.307	I. Camomila (5003)	N R	-	1 ^o	15	22,190	0,718	3,23
2.308	I. Argentina (5018)	N R	-	1 ^o	4	13,520	0,440	3,25
2.309	I. Imp. Elvira's Conchita (5079)	N R	-	1 ^o	4	14,880	0,550	3,69
2.370	Amaz. Monopodia (83762)	N R	-	1 ^o	24	27,640	0,760	2,75
2.371	Amaz. Latria (10466)	N R	-	1 ^o	9	26,530	0,781	2,94

Cia. Agrícola Maristela, Tremembé, Contrôles em 26-8-53.

Regime de campo com ração suplementar, 2 ordenhas. Raça Holandesa, variedade preta e branca

2.235	Yale	PCOD	10-4	1 ^o	24	19,130	0,672	3,51
2.267	Esperia	N R	-	6 ^o	202	15,090	0,563	3,73
2.143	Bedonia	N R	-	7 ^o	187	16,800	0,609	3,62
2.144	Guastala	N R	-	7 ^o	212	14,900	0,465	3,12
2.145	Amazonas Etica	N R	-	7 ^o	200	15,520	0,464	3,43
2.146	Amazonas Edwige	N R	-	7 ^o	213	13,630	0,444	3,26
2.194	Avelaneda	N R	-	5 ^o	139	15,800	0,580	3,67
2.195	Tenerife	N R	-	5 ^o	136	13,100	0,455	3,47
2.265	Quinhentos e sessenta e Cinco	N R	-	3 ^o	87	16,620	0,530	3,19
2.320	Romana	N R	-	2 ^o	70	15,430	0,575	3,72
2.321	Açucena	N R	-	2 ^o	-	11,320	0,414	3,65
2.322	Arabinha	N R	-	2 ^o	-	14,920	0,550	3,68
2.323	Gibraltar	N R	-	2 ^o	59	15,250	0,580	3,80
2.324	Amazonas Eleita	N R	-	2 ^o	-	18,050	0,536	2,96
2.325	Amazonas Espinha	N R	-	2 ^o	31	15,270	0,544	3,56
2.326	Rira	N R	-	2 ^o	37	15,100	0,554	3,67
2.327	Amazonas Erica	N R	-	2 ^o	64	15,350	0,503	3,28
2.372	Junnin	N R	-	1 ^o	-	17720	0,524	2,95

Observações: — Hol. = Holandesa; v b — vermelha e branca; p b = preta e branca; N R = não registrada; PCOC = pura por cruz de origem conhecida; PCOD = pura por cruz de origem desconhecida; P O = pura de origem; R P = registro provisório.

São Paulo, Agosto de 1953

Trigêmeos na Bahia

O nosso amigo e assinante da Revista dos Criadores, dr. José Nogueira Junior, da Capital Baiana, nos mandou a fotografia acima, da vaca mestiça holandesa e seus trigêmeos nascidos na fazenda...

Embora não se trate de fenômeno, fica registrado o acontecimento como prova da fertilidade do gado da "boa terra". Entretanto, convém ficar notado que em partos múltiplos, geralmente as fêmeas são estereis, mormente quando um dos filhos for macho.

HIPERFOSFATO
ADUBO IDEAL
PARA A CANA

porque age sobre a
cana-planta e sobre
as sócas.

**EVITE O ABORTO
INFECCIOSO EM
SEUS REBANHOS**

Brucelose do bovino significa aborto infeccioso, o aborto infeccioso alastra-se rapidamente no rebanho e impede a reprodução, a falta de reprodução do rebanho representará um tremendo prejuízo na sua economia de criador. Sendo moléstia incurável, só lhe resta uma solução: EVITÁ-LA. E, felizmente, você o pode fazer, aplicando uma vacina de alta confiança e resultados seguros:

VACINA CONTRA A BRUCELOSE "VITAPEC" (AMOSTRA) B-19

Peça literatura completa para:

PRODUTOS VETERINARIOS VITAPEC LTDA.

Rua Pamplona, 817 - Tels.: 3-4139 e 3-4130 - S. Paulo

SOLUBILIDADE quer dizer: a parte do fosfato que alimenta a planta. **A SOLUBILIDADE do HIPERFOSFATO** é 60% maior do que a de outros fosfatos naturais.

OFERTAS E PROCURAS

SUINOS

REPRODUTORES DUROC — Machos e fêmeas — Reprodutores Duroc-Hampshire. De ótima seleção. Vendem-se. — Fazenda S. Jorge — Caixa Postal, 84 — Atibaia — Est. de São Paulo.

MOUROES

MOUROES DE CANDEIA — a melhor madeira para mourão de cerca. Dura dezenas de anos. Colocamos qualquer quantidade na estação de Queluz, E. F. C. B., Est. S. Paulo. Preço de Cr\$ 120,00 a duzia. Cartas a esta redação.

TOURINHOS SCHWYZ — Temos sempre à venda tourinhos registrados na A.P.C.B.. Criação de Dulce Vergueiro Vilas Boas, Fazenda Santo Antonio, Pinhal, Fone 152, Cia. Mogiana — Estado de S. Paulo. (3x)

COALHO FRISIA

EM LIQUIDO E EM PÓ

1.ª FABRICA DE COALHO NO BRASIL unico premiado com 10 medalhas de ouro — fabricado por: KINGMA & CIA. LTDA. Mantiqueira - E.F.C.B. — Minas Gerais

CAIXA POSTAL, 26
Santos Dumont - E.F.C.B.
Minas Gerais
Representantes:
CAIXA POSTAL, 342
Rio de Janeiro

CAIXA POSTAL, 3.191
São Paulo

CAIXA POSTAL, 397
Porto Alegre
Rio Grande do Sul

À venda em toda parte. — Peçam amostras grátis aos representantes ou diretamente aos fabricantes

Criadores de bovinos da raça holandesa

Vendemos ótimos animais puros de pedigree, puros por cruzo, etc.

REFINAZIL

O AMIGO DA CRIAÇÃO

FARELO COM 28%

DE PROTEINA

A BASE DAS BOAS

RAÇÕES

BALANCEADAS

CARBOLINEUM — O protetor da madeira

O maior inimigo conhecido do cupim, carrapatos, pulgões, percevejos, piolhos etc. Especialmente indicado em estobulos, moirões, cercas, esteios, galinheiros e congêneres. Não só imuniza a madeira contra a podridão, como extermina os piolhos, inimigos numero um dos criadores.

Maximo rendimento com minima despesa.

Cotações e prospectos diretamente com os fabricantes:

USINA CHAVANTES LTDA. - Caixa Postal, 6359 - Tel. 9-3911 - São Paulo

EXIJA OS SAIS MINERAIS IODADOS

Sivam TIPO EXTRA

OS SAIS MINERAIS IODADOS SIVAM — TIPO EXTRA

são fabricados nos seguintes diferentes Tipos:

TIPO EXTRA B — para Bovinos e Ovinos — **TIPO EXTRA G** — para Aves
TIPO EXTRA M — para Suínos — **TIPO EXTRA E** — para Equinos

e contêm todos os elementos minerais indispensáveis e necessários aos animais, inclusive os metais oligodinâmicos raros, de modo a assegurar, pela sua adequada composição, uma completa e econômica mineralização das rações **sem necessidade de se adicionar mais agentes minerais.**

São usados há mais de vinte anos em diversos Países pelos melhores criadores que muito apreciam os notáveis resultados econômicos obtidos com despesa mínima.

OS PRODUTOS SIVAM TÊM UM QUARTO DE SÉCULO DE EXPERIÊNCIA!!

SIVAM

CIA. DE PRODUTOS PARA FOMENTO AGRO-PECUARIO
MILÃO - SÃO PAULO - MADRID

SÃO PAULO

RUA 7 DE ABRIL, 105 - 2º ANDAR - SALAS 207/9
CAIXA POSTAL, 9054 - FONE 35-0921

Filial no Rio Grande do Sul:
PORTO ALEGRE

RUA PINTO BANDEIRA, 357, 2.º and
FONES: 4645 - 5414 - interna 27.
CAIXA POSTAL N.º 2521.

"de olho" no futuro

UMA RAÇÃO **SOCIL** PARA CADA FIM

BEZERRIL
bezerros fortes

LEITIL
mais leite

TOURIL
tours férteis

SOCIL PRO-PECUARIA S/A. - Industria e Comercio de Forragens
R. DO CURTUME, 196 - TELS. 5-0211 E 5-0298 - CX. POSTAL 7211 - S. PAULO