O plano de reerguimento das forças produtivas de São Paulo
JOSÉ BONIFACIO COUTINHO NOGUEIRA

Os criadores opinam sobre exposições

VII Leilão de Gado Leiteiro da A.P.C.B. — Mais de dois milhões e trezentos mil cruzeiros vendidos

REVISTA DOS CRIADORES

EDIÇÃO
DEDICADA
À
AVICULTURA
1959

Preparada por
Henrique Francisco Raimo

- A avicultura em progresso
- Os nitrofuranos na avicultura
- Contrôles práticos do canibalismo e da bicagem em aves
- Gaiolas de postura: vantagens e desvantagens
- Luz artificial e rações umedecidas para estimular o desenvolvimento dos pintos nos meses quentes do ano
- Condições técnicas para manter sêcas as "camas" dos pinteiros e dos galinheiros
- Medidas das campânulas de aquecimento em relação à capacidade de criação dos pinteiros
- Frangos para consumo em baterias
- A fumigação das chocadeiras no combate à difusão de perigosas doenças das aves
- Pintos nascidos com reservas de vitaminas têm importância decisiva no êxito da criação inicial
- Os antibióticos não prejudicam os resultados da incubação dos ovos
- Como reconhecer a qualidade dos pintos pelo exame do exterior
- O valor nutritivo da carne de galinha
- A luz artificial nos galinheiros, como recurso para aumentar a postura das aves, no fim do verão, outono e inverno
- Valor nutritivo do ovo
- Estocagem de ovos em câmaras frias e o relativo equilíbrio dos preços
- Acrionização preserva a carne das aves abatidas
- Produção de ovos, no comêço e no fim do ano de postura, como previsão índice de postura anual
- Granjas de demonstração de avicultura
- Transmissão de leucose
- Seleção das aves
- Maior estímulo à expansão da avicultura

ANO XXX - 1959 - ABRIL - N.º 352

ÚTIL COMO O JEEP-WILLYS

ESPAÇOSA COMO FURGÃO

CONFORTÁVEL COMO AUTOMÓVEL

Grças a tração nas 4 rodas Rural-Willys assegura transporte útil e de confiança, com qualquer tempo e em qualquer estrada, seja na lama, no barro e no areião. Retirando-se o assento traseiro transporta grandes volumes e carga até 1/2 t., com seu potente motor de 90 HP - 6 cilindros.

Oferece também máximo conforto para 6 passageiros e espaço para mais bagagem e carga, com rodagem suave, facilidade de manepo e esplêndida visibilidade.

RURAL-WILLYS

camioneta brasileira

com tração nas **4** rodas

CONHEÇA O VEÍCULO IDEAL PARA O CAMPO E A CIDADE

NOS CONCESSIONÁRIOS DA **WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S.A.**

PLANTADORES DE CANA...
USINEIROS...

CAFEICULTORES...

FAZENDEIROS...

AGRICULTORES...

PECUARISTAS!

AUMENTEM SEUS LUCROS

— utilizando em rações
ou plantações

TORTA DE AMENDOIM

é o caminho econômico para resolver os seus velhos problemas de criações e lavoura. V. a encontra disponível, para pronta entrega.

Como alimento — é dos mais ricos e importantes componentes. Possuindo grande teor de proteínas (48/50%), é recomendável na alimentação do gado leiteiro e do gado em geral, criação e engorda de suínos e demais criações. Por suas excepcionais qualidades, é indispensável na maioria das rações.

Como adubo — pela sua grande percentagem de azoto (7,5%), oferece os melhores resultados na melhoria da produção agrícola. Particularmente indicada na adubação de cafézais e canaviais. Por sua comprovada eficiência, foi licenciada pelo Depto. de Produção Animal, sob o n.º 2299/49.

Para maiores informações, escreva à

CIA. SWIFT DO BRASIL, R. Formosa, 367—S. Paulo—Tel. 35-6121

Rua Abolição, 2013 — Tel. 3921 — Campinas

Av. Vitória Régia, s/nº — Tel. 1711, 2750 — São José do Rio Preto

A.P.C.B.

PRODUTOS Á VENDA

Rua Jaguaribe, 634

Tels. 51-6963 e 51-6380

S. Paulo

OS PEDIDOS DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS DA RESPECTIVA IMPORTÂNCIA — AS REMESSAS DE DINHEIRO PODERÃO SER FEITAS EM CHEQUE, VALE POSTAL OU REGISTRADO COM VALOR E EM NOME DA ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS — ACEITAMOS PEDIDOS PELO REEMBOLSO POSTAL — VENDEMOS A PRAZO SOMENTE AOS ASSOCIADOS — OS PREÇOS DA PRESENTE LISTA PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

SEMENTES DE CAPIM PARA PASTO

SEMENTES LIMPAS DE ALTO PODER GERMINATIVO — SAFRA 1958

PARA PASTO	PARA CORTE E FENAÇÃO	PARA ADUBAÇÃO VERDE
Catingueiro Roxo Cr\$ 18,00	Capim Colônião (	Feijão de Porco (
Jaraguá do chão Cr\$ 12,00	Alfafa (	Feijão mucuna (
Cabelo de negro Cr\$ 19,00	Rodes (Cloris) (preços	Feijão Soja (preços
AZEVEMa consultar	Soja Ototan (a consultar	Labe labe (a consultar
	Sorço (	Crotolaria Juncea (
	Guandú (	Crotolaria Paullna (
		Gramma Batatais (
		Festuca (americana) (

SOJA PERENE — KG CRS 200,00

FAZENDEIROS, CRIADORES E INVERNISTAS, NÃO SE ESQUEÇAM DE QUE A NOSSA EXPERIÊNCIA DE 32 ANOS NESTE RAMO NOS PERMITE SELECIONAR O QUE HÁ DE MELHOR EM SEMENTES.

SEMENTES PARA REFLORESTAMENTO

Sementes de eucalipto, variedades:

Saligna (	(a consultar
Teriticornis (	(
Alba (	(

SERINGAS C.H. 20 CC — toda de vidro e metal, contendo além da seringa, um vidro sobressalente, duas agulhas, e um jogo de êmbolo e arruela. — Preço: - Cr\$ 460,00.

★

SEMPER AMERICANAS RANFAC

Preços:	—	Cr\$ 350,00
10 CC	—	Cr\$ 450,00
20 CC	—	Cr\$ 500,00
40 CC	—	

INSETICIDAS E FUNGICIDAS

Extermine os inimigos de suas atividades, empregando os nossos selecionados ingredientes contra insetos, formigas, carrapatos e parasitas.

FORMICIDAS LÍQUIDOS

	Cr\$
Brometo de Metila Blemco	
caixa com 48 latas.....	5.000 00
I.A.P., caixa com 48 latas..	4.500,00
Brometo de Metila e Bi-sulfureto de Carbono — Formicida M.M. 33, caixa com 6 vidros de 1 litro.....	452,00
Bi-sulfureto de Carbono — Formicida Garrafão caixa com 2 garrafões de 3 1/2 litros cada um	190,00
Formicida V-8, idem, idem .	190,00

BASE DE ALDRIN

Shell, vidros 450 cc	85,00
Nitrosim, vidros 100 cc	93,00
Nitrosim, vidros 250 cc	210,00

EM PÓ

Garoa — Cianureto de Potássio, caixa com 60 latas de 200 gramas	a consultar
Arsenico Sueco, quilo	29,00
Enxofre americano, quilo ...	25,00
Shell, lata 450 gramas	71,50

GRANULADOS

Wolf, sacos de quilo	51,00
Isca-tox, lata 200 grs.	35,00

BERNICIDAS

Bibe-Tox, lata de 400 g.	90,00
Idem, lata de 1 quilo	198,00
Pearson, lata de 1 quilo	100,00
B.H.C. a 12 — alemão, para misturar em óleo queimado, quilo	55,00
Pó de fumo, lata de 2 quilos com 10%	140,00

REVISTA DOS CRIADORES

CARRAPATICIDAS

Ideal, Arsenical — lata de 1 litro	57,00
Ideal, Arsenical — lata de 5 litros	220,00
Ideal, Arsenical — lata de 10 litros	440,00
Gavião, Arsenical — lata de 10 litros	1.307,00
Tixol extra, Arsenical — lata de 1 litro	110,00
Tixol extra, Arsenical — lata de 10 litros	884,00
Cooper-Tox — tambor de 20 litros	5.365,00
Dip-Tox — tambor de 20 litros	8.700,00
Neocidol P — pacote de 1 quilo	113,00
Neocidol P — pacote de 5 quilos	551,00
Fenatox a 40% — pacote de 1 quilo	40,00
Quintox	450,00
Geigy, a base de Diazinon — lata de 1 litro	918,00
Geigy, a base de Diazinon — lata de 10 litros	8.450,00
Carrapatox — lata de 1 litro	175,00

PULVERIZADORES

Bombas para todos os fins manuais, para banhar animais com soluções de carrapaticidas, pulverizar árvores, regar jardins, desinfecção de galinheiros, chiqueiros, etc., para pulverizar gado, arvoredos, desinfetar estábulos e qualquer outro fim:

Excelsior Costal	4.850,00
Arimitsu, japonês	9.500,00
Bomba Excelsior	1.500,00
Bomba Chuva	350,00

FUNGICIDAS

Cupra-verde — Altamente concentrado, c/ 88% de oxiclreto de cobre, substitui perfeitamente e com vantagem a «Caldá Eordaleza». É muito econômico pois é necessária apenas a quantidade de 400 a 600 gramas para cada 100 litros de água. Essa dosagem varia com a espécie de cultura.
Preço — Quilo Cr\$ 90,00

Kumulus — Enxofre coloidal, molhável — 98% de enxofre. Efiiciente no combate a doenças e pragas da lavoura, como cinza, ferrugem, manchas e ácaros.
Preço — Quilo Cr\$ 50,00

Cuproxídul - Ultra — Cobre 80% — No combate às pragas que atacam as culturas de batata, tomate, café, cacau, fumo, videira, citrinos etc.
Preço — Lata com 1 quilo..... Cr\$ 160,00

TESOURAS PARA FINS DIVERSOS

Para podar, marca Corneta, curva	Cr\$ 205,00
Fujiboshi, japonesa	Cr\$ 250,00
Para tosar carneiros alemã N.º 42600	Cr\$ 1.000,00

ABRIL DE 1959

UTILIDADES PARA SUA FEZENDA

Seringa automática revolver Hoppner. Facilita a vacina em série. Capacidade de 30 cc, regulável de 1 a 5 cc. Eficiente, prática e durável; facilmente desmontáveis: suas peças podem ser substituídas. Acompanhada das seguintes peças sobressalentes: 1 tubo de vidro, 1 caixa com doze agulhas sortidas, 1 jogo completo de êmbolos e arruelas. Tudo acondicionado em esmerado estojo, por Cr\$ 2.350,00

POLVILHADEIRAS KIORITO JAPONESA

Para polvilhamento de jardins, hortas e pequenos pomares. Economia Cr\$ 500,00.

FERRO DE DESCORNAR

Fornecemos instruções sobre o modo de usá-lo Cr\$ 120,00

CANIVETES PARA ENXERTOS

N.º 8900	Cr\$ 110,00
N.º 8801	Cr\$ 130,00

PRESERVADORES DE MADEIRA

Carbolineum, lata de 20 quilos	Cr\$ 310,00
Palum, Pearson, preservativo de madeiras, tambor de 20 litros	Cr\$ 520,00

VASSOURÕES DE PIASSABA

Para terrelros de café, estábulos, etc. Cr\$ 45,00

CABRESTOS DE SOLA, COM CORRENTES

Para bezerro	Cr\$ 160,00
Para vaca	Cr\$ 230,00
Para touro	Cr\$ 260,00

BASTÕES PARA CONDUZIR TOUROS

Todo de ferro, preço Cr\$ 400,00

JOGO DE NÚMEROS

Para marcação a fogo. Coleção de 0 a 9, nos seguintes tamanhos:	
4 cm de alt.	Cr\$ 450,00
5 cm de alt.	Cr\$ 450,00

CAPAS IMPERMEÁVEIS COM CAPUZ

plástico. Sem emendas e sem costuras. Práticas, duráveis, não rasgam. Para uso no campo e na cidade. Cores: preta, marrom, cinza e azul. Tamanho: diversos — Capa com capuz Cr\$ 320,00

LIVRO DE REGISTRO DE GADO

Livro prático e eficiente e que não deve faltar na fazenda. Contém 200 páginas, sendo 4 destinadas ao controle geral e as outras 196 ao registro individual de cada res. Al ter-se-á linhagem do animal, dia, mês e ano em que nasceu e outras anotações. Se foi vacinado contra o carbunculo sintomático e hemático. Há ainda um retângulo para fotografia do animal — Cr\$ 350,00.

FERRAMENTA

Alfange sueco, sem cabo, tamanho 22 c/ 10%	Cr\$ 440,00
Alfange sueco, sem cabo, tamanho 24 c/ 10%	Cr\$ 760,00
Chumbeador, aparelho para castroção de porcas, s/ operação	Cr\$ 140,00

TORQUÊS PARA CASTRAR

Para bovinos de todas as idades. Processo simples, rápido, humano. Engorda rápida. Preços:

N.º 42 — sem bico —	Cr\$ 1.700,00
N.º 42 — com bico —	Cr\$ 1.900,00
N.º 52 — sem bico —	Cr\$ 2.030,00
N.º 52 — com bico —	Cr\$ 2.175,00

Com bico lateral evita-se a fuga dos tendões.

RAÇÕES

Aveia, linhaça e alfafa em fardos	a consultar
Farelo de Amendoim - saco de 50 quilos	a consultar
Farinha de Osso, impapável — A única assimilável pela criação — saco com 28 quilos	Cr\$ 395,00
Idem, idem - tonelada.....	Cr\$ 7.500,00
Farinha de Carne, 50% - saco de 50 quilos	(a consultar)
Sais minerais Sivam para Bovinos -saco com 30 quilos.....	Cr\$ 30,00
Sais minerais «Tortuga» para Bovinos — Kg	Cr\$ 24,00
Sais minerais «Tortuga» para suínos — Kg	Cr\$ 23,00
Sal mineral Universal p/ bovinos — Kg	30,00
Sal mineral Universal p/ suínos — Kg	26,00

DESINTEGRADORES

Torresan, para milho, cana verde, capim, produzindo até fubá	Cr\$ 14.000,00
Máquinas Moreira — Tôda de ferro	Cr\$ 16.500,00
Debuidador Marumby, adaptável em caixa de madeira, somente a máquina sem cavalete	Cr\$ 360,00

ENCERADOS

Lona de qualidade superior:	
Lona 8, verde m quadrado (consultar))	
Lona 10, verde m quadrado (consultar))	

BOTAS DE BORRACHA "CRIADOR"

Anti-derrapante. Tamanhos 37 a 44.	
Cano curto (1/2 canela) —	Cr\$ 440,00
Cano longo (até o Joelho) —	Cr\$ 522,50

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES

Garanta uma ração sadia!...

e adequada aos animais,
em qualquer época do ano.

A CORTADEIRA "PENHA"

Desfibra - mói - tritura - corta

sem exprimir o suco de todo e qualquer vegetal usado na alimentação de animais. — Ideal para o preparo do "SILO". Toda construída em ferro batido e aço, com mancais de rolamentos. — Produção horária: 5 toneladas!! — Superioridade absoluta sobre qualquer similar nacional ou estrangeira.

NOTA: Fornecemos informações detalhadas para construção de "silos" por processo simples, eficiente e ao alcance de todos.

Para maiores detalhes solicitem informações e folhetos e

R. HAMA

RUA FLORENCIO DE ABREU, 464 - FONES 33-1325 e 33-9654 - CAIXA POSTAL 1817 - S. PAULO

Jeep[®] WILLYS

TRAÇÃO NAS 4 RODAS

a serviço da lavoura
e pecuária

PAGA-SE POR SI MESMO - Proporcionando transporte rápido e seguro, reboque, força móvel e prestando muitos outros serviços, o Jeep-Willys substitui veículos de maior preço, graças à sua incomparável versatilidade.

p. a. nascimento-ocar

O PEÃO PARA TODO SERVIÇO - Nenhum veículo é tão prático e útil na fazenda, para o transporte de pessoas e carga. Ele vai a qualquer lugar, puxa carrêtas, aciona motores, opera implementos. É o braço direito do fazendeiro e do criador.

PASSA ONDE OUTROS FICAM - Em boas e más estradas e onde não há estradas, o Jeep-Willys segue em frente, haja sol, chuva, lama, barro ou areião. É um veículo em que V. pode confiar, para as mais rudes tarefas.

WILLYS - OVERLAND DO BRASIL S.A.

Somente Willys fabrica o veículo autorizado a usar as marcas Jeep[®] ou Jipe[®]

Compre com poucos cruzeiros...

...NOSSA EXPERIENCIA DE MUITOS ANOS.

Planos PRÁTICOS, CÔMODOS e ECONÔMICOS cuidadosamente estudados para você adotar em suas CONSTRUÇÕES RURAIS.

PLANTAS	Cr\$	PLANTAS	Cr\$
Abrigo Misto	30,00	Fabrica de Manteiga —	
Abrigo para Touros	50,00	Capacidade 500 litros	
Aparelhos de Contenção		diarios	70,00
para Estabulos — 5		Galpão Esterqueira	50,00
Modelos	70,00	Instalações Economicas	
Aprisco p/70 Carneiros .	30,00	para Suinos	50,00
Banheiro Carrapaticida	50,00	Instalação para Ordenha	50,00
Banheiro para Suinos ..	30,00	Instalações para Banho	
Banheiro parasiticide pa-		Carrapaticida	30,00
ra Suinos	50,00	Maternidade p/ Porcas,	
Bebedouro e comedouro		const. de madeira — Ti-	
automático	50,00	po B	50,00
Bebedouro e esponjadou-		Maternidade p/ Porcas	50,00
ro	50,00	Maternidade p/ Porcas,	
Brete e balança	30,00	construção de madeira	
Câmara de fermentação		c/ piso de concreto —	
de esterco	50,00	Tipo A	60,00
Cavalaria mista	50,00	Paioi	30,00
Cercado movediço (Ma-		Pequena Pocilga	30,00
ternidade)	50,00	Pocilga p/ Produção	
Cocheira	70,00	mensal de 5 porcos de	
Ceva com 10 Baias	50,00	100 quilos	40,00
Comedouros automáticos		Posto de Resfriamento	
p/leitões	50,00	— Capacidade para 200	
Cocho coberto para dar		litros diarios	70,00
sal ao Gado	30,00	Posto de Resfriamento	
Curral	50,00	e Engarrafamento —	
Curral Circular	70,00	Capacidade para 500 li-	
Currais com Apartação		tros diarios	70,00
e Tronco para Ordenha	50,00	Posto de Resfriamento	
Estabulo com Baias In-		— Capacidade para 500	
dividuais e Galpão pa-		litros diarios	70,00
ra Ordenha	50,00	Posto de Resfriamento	
Estabulo Cruzeiro	50,00	— Capacidade para 200	
Estabulo Economico	50,00	litros diarios	70,00
Estabulo Granja	50,00	Posto de Resfriamento	
Estabulo de Madeira para		de Latões por Circula-	
12 Vacas	50,00	ção — Capacidade 200	
Estabulo Modelo	50,00	litros diarios	70,00
Estabulo para 60 Vacas .	50,00	Pulverização e Pediluvio	20,00
Estabulo para 18 Vacas .	50,00	Rolo de Faca	30,00
Estabulo para Bezerros .	50,00	Silo Elevado (Aereo) ..	50,00
Estabulo Modelo com		Silo Economico	50,00
compartimentos para		Silo de Encosta — Cap.	
Bezerros	50,00	50 Toneladas	50,00
Estabulo tipo Vila Bran-		Silo de Encosta — Cap.	
dina	50,00	100 Toneladas	50,00
Estrumeira	30,00	Silo Subterraneo	30,00
Fabrica de Manteiga .	50,00	Silo de 130 Toneladas .	70,00
Fabrica de Manteiga —		Silo trincheira	50,00
Capacidade 100 litros		Tronco para Apartação	30,00
diarios	70,00	Tronco para Cobertura .	30,00
Fabrica de Manteiga —		Tronco para Contenção	
Capacidade 300 litros		de Bovinos	50,00
diarios	70,00	Tronco para Ordenha ..	30,00

Atendemos pedidos pelo REEMBOLSO POSTAL

PEDIDOS:

Associação dos Criadores
Rua Jaguaribe, 634 - São Paulo

— com transporte a tempo...

A safra foi entregue!

Enquanto, de sol a sol, labuta nos campos antes da colheita, o que mais preocupa ao lavrador é o transporte. Cada hora pode representar prejuízo irrecuperável e até a perda da safra!

Por isso, antes da colheita, é preciso providenciar transporte - rápido, seguro e econômico.

É preciso providenciar um caminhão MERCEDES-BENZ — seja o LP-331, para grandes cargas e longas distâncias, seja o LP-321, para chegar mais depressa!

O caminhão MERCEDES-BENZ proporciona o transporte mais rápido e mais econômico em qualquer estrada - porque o combustível é Diesel, o motor é possante, o chassi é robusto e a carroceria pode ser muito mais ampla. As peças genuínas são encontráveis em toda parte do país e - como já está provado - o custo de manutenção é o mais reduzido!

Para entregar em tempo a safra,
é preciso mais do que um simples caminhão -
é preciso um MERCEDES-BENZ

Sua boa estrela em
qualquer estrada

MERCEDES-BENZ
DO BRASIL S.A.

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SÃO PAULO

Fabricante do 1º caminhão com motor Diesel produzido no Brasil

40

ANOS DE SELEÇÃO E DE PROGRESSO

DE 1918 a 1939, com PEDRO MARQUES NUNES e
DE 1939 a 1959, com DURVAL GARCIA DE MENEZES.
O NELORE DA FAZENDA INDIANA é:

1.º O MAIS ANTIGO — 40 anos (1918 a 1958)

RAÇA

2.º O MAIS PURO — pela
origem das fêmeas e
dos touros importados
da ÍNDIA: MARAJÁ,
RAJÁ e SHEIK.

3.º DE ALTA PROLIFICIDADE — pelo emprêgo de touros acima de 90% e até 98% de
coeficiente de nascimentos;

4.º DE ALTO GANHO DE
PÊSO — pela seleção,
do melhor conformado,
de genealogias de alto
ganho de pêso e uso
de touros acima de 300
quilos com 1 ano e até
de 355 e 387 quilos;

CARNE

5.º DE BAIXA PERDA DE BEZERROS — 2,8% de mortes, até 9 meses (média de 7 anos);

6.º DE INCOMPARÁVEL RUSTICIDADE — pois desde o nascer são criados a campo, sem
o menor trato; do 6.º ao 9.º mês, submetidos a prova de ganho de pêso, apresentam-se
sadios, de rápido crescimento e fácil engorda.

VEIDA PERMANENTE DE MACHOS E FÊMEAS

Quilômetro 31 da Rodovia RIO - S. PAULO

Avenida Heitor Beltrão, 29 - Telefone 48-3125 - RIO DE JANEIRO

REVISTA DOS CRIADORES

DIRETOR-RESPONSÁVEL

Luiz A. Penna

REDATOR-CHEFE

Pedro Ferraz do Amaral

COLABORADORES ESPECIALIZADOS

Dr. Fidelis Alves Neto

Dr. José de Assis Ribeiro

Dr. Henrique Raimo

Dr. Rolando Lemos

Dr. Alberto Alves Santiago

Dr. Leovigildo P. Jordão

Dr. Osiris Tolaine

Dr. Brenno Ferraz do Amaral

Dr. Walter Battiston

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE

Aldo D'Angelo

Francisco de Almeida Penna

D. Dina Avela

REDAÇÃO:

RUA JAGUARIBE, 634

S. PAULO (BRASIL)

Tel. 51-9234

(Sede própria)

CAIXA POSTAL 9194

Endereço telegráfico: Criadores

ASSINATURA:

1 ano Cr\$ 300,00

1 ano sob registro postal Cr\$ 360,00

Semestre Cr\$ 160,00

Número avulso Cr\$ 30,00

Número atrasado Cr\$ 40,00

Revista dos Criadores

ORGÃO OFICIOSO DA ASSOCIAÇÃO

PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS

ANO XXX - S. PAULO, ABRIL - 1959 - N.º 352

SUMÁRIO

	Pág.	
O reprodutor provado	10	
A avicultura em progresso	11	
A ENTREVISTA DO MÊS — Diante da inflação em que vivemos, temos que rever constantemente o custo de produção — Luiz Emanuel Bianchi	12	
AVICULTURA		
Os nitrofuranos na avicultura — José Santivnez	17	
Contrôle prático do canibalismo e da bicagem em aves. Henrique F. Raimo	19	
Galolias de postura: vantagens e desvantagens	23	
Luz artificial e rações umedecidas para estimular o desenvolvimento dos pintos nos meses quentes do ano	26	
Condições técnicas para manter secas as "camas" dos pintos e dos galinheiros	28	
Medidas das câmpanulas de aquecimento em relação à capacidade de criação dos pinteiros	31	
Frangos para consumo em baterias	32	
A fumigação das chocadeiras no combate à difusão de perigosas doenças das aves	33	
Pintos nascidos com reservas de vitaminas têm importância decisiva no êxito da criação inicial	36	
Os antibióticos não prejudicam os resultados da incubação dos ovos	40	
Como reconhecer a qualidade dos pintos pelo exame do exterior	42	
O valor nutritivo da carne de galinha	44	
A luz artificial nos galinheiros, como recurso para aumentar a postura das aves, no fim do verão, outono e inverno	45	
Valor nutritivo do ovo	48	
Estocagem de ovos em câmara fria e o relativo equilíbrio dos preços	50	
Acronização preserva a carne das aves abatidas	53	
Produção de ovos, no começo e no fim do ano de postura, como previsão índice de postura anual	56	
Granjas de demonstração de avicultura	58	
Transmissão da leucose	58	
Seleção das aves	64	
Malor estímulo à expansão da avicultura	65	
Endereços de interesse para avicultores — Associações avícolas, órgãos oficiais, firmas comerciais e industriais, granjas, cooperativas, comissários e matadouros	67	
SECÇÃO JURÍDICA — A vigência do novo salário mínimo e sua aplicação aos trabalhadores rurais — Rolando Lemos		70
Pecuária leiteira e pecuária de corte	72	
Cooperativa de Produtores de Leite de Elói Mendes	73	
FALA O SECRETÁRIO DA AGRICULTURA — O plano de reerguimento das forças produtivas de São Paulo — José Bonifácio C. Nogueira		74
VII Leilão de Gado Leiteiro da A.P.C.B. — Mais de dois milhões e trezentos mil cruzelros vendidos	78	
A palavra das classes produtoras — Alimentação, dever primordial do Estado — Valter Henrique Zancaner	80	
Os criadores opinam sobre exposições	82	
Importância das provas de ganho de peso na seleção do gado de corte — L. P. Jordão	88	
Cercas elétricas	91	
Laticínios na Escandinávia — II — O "Iur" é o símbolo dinamarquês de qualidade	92	
Respondendo sobre zootecnia e veterinária	94	
ECONOMIA — O mito da "Braspool" — Brenno Ferraz do Amaral		96
Mercados de laticínios, carne e ovos	98	
O que vai pelo S.C.L.	99	
Relatório n.º 171 do Serviço de Contrôles Leiteiro da A.P.C.B.	191	

O REPRODUTOR PROVADO

De há muito, era desejo dos que trabalhamos na "Revista dos Criadores" oferecer aos leitores possibilidades de conhecerem o valor da contribuição de certos animais para a seleção de nossos rebanhos. Somente agora, porém, o Serviço de Controle da Associação Paulista de Criadores de Bovinos, que há quasi quinze anos se vem projetando mediante orientação certa e segura, proporcionou-nos os elementos necessários para essa demonstração, que nos foi dado fazer — e de mansira palpável — no numero de Janeiro, que dedicamos ao reprodutor leiteiro.

Por meio da leitura de artigos que a respeito publicamos, puderam os criadores ver como um bom reprodutor pode salientar-se na respectiva classificação e exhibir bons resultados na comparação de produções de mães e filhas. E, como já dispomos de resultados autenticos, não mais serão suficientes os elogios, as boas fotografias e mesmo as boas classificações em exposições, para que um reprodutor seja considerado bom; tudo isso será dispensável; para ter seu nome inscrito no rol dos bons reprodutores, o animal terá que ter transmitido boas qualidades leiteiras e essas qualidades deverão ter sido comprovadas por suas descendentes, no controle leiteiro.

Nessa edição, divulgamos também a notícia de que o Serviço de Controle Leiteiro da Associação Paulista de Criadores de Bovinos está habilitado para proceder aos testes de progenie de reprodutores. Noticia tão alvissareira para nós todos, que será uma lastima não seja levado a termo imediatamente — e em toda a sua extensão — esse utilissimo empreendimento. Em verdade, é de todo interesse dos criadores que conheçam eles a influencia dos reprodutores com mais de cinco filhas controladas e das quais tenha sido possível reunir pares de produção mães-filhas. Ainda que muitos outros fatores possam influir na determinação da influencia de um reprodutor e que o modo como as filhas foram tratadas, em relação às mães, deva ser considerado, mesmo assim, seria de máximo interesse que esse trabalho fosse completado tão depressa quanto possível e se passasse a publicar imediatamente os testes que fosse possível realizar mensalmente.

Além de tantas outras provas que têm sido registradas do valor do emprego do touro provado, a A.P.C.B. teve recentemente a visita de técnicos do E.E.U.U., os quais, tendo-nos proporcionado excelentes noticias da evolução da inseminação artificial com semen congelado, emprestaram sobretudo maior importancia ao semen obtido de reprodutores provados. Foi tal o sentimento de segurança, encontrado agora no emprego desses dois elementos novos na zootecnia — o congelamento do semen e semen de reprodutores provados — que se tornou possível a organização de grandes empresas, dedicadas à venda de semen, que hoje se faz para todo mundo. E, o que veio dar solidez e garantia a esse negócio foi, sem dúvida, o emprego de reprodutores provados possível com o congelamento do semen. Para assinalar a influencia do reprodutor provado bastará recordar que o rebanho de Beltsville, pertencente ao governo americano, saindo de uma situação de inferioridade diante dos rebanhos comuns, pôde, com o emprego exclusivo de reprodutores provados, alcançar posição de destaque no mundo criatório.

Agora que foi alcançado tão significativo resultado como fruto dos longos anos de trabalho, a continuidade do Controle Leiteiro em numero cada vez maior de vacas leiteiras registradas, permitirá sejam testados anualmente mais e mais reprodutores. Não importa que as previsões iniciais não sejam boas para este ou aquele animal; o que é preciso é que se completem os testes. Os criadores já estão cientes de como alcançar elementos para testar seus reprodutores. As possibilidades dos futuros mercados de reprodutores, com o desenvolvimento da inseminação artificial mediante o congelamento e que fatalmente nos alcançará, estão todas voltadas para o reprodutor. Eis, portanto, a razão pela qual doravante ninguém poderá descuidar do controle de todas as vacas de seu rebanho, procurando obter de suas novilhas os melhores registros, pois tudo isso constitui material indispensável para os testes de reprodutores.

Não era nosso desejo voltar tão cedo a este assunto, nem vir cantar em altos brados os nossos êxitos, mas fazemo-lo hoje porque os cumprimentos que recebemos pelo trabalho desenvolvido nos animam a prosseguir neste caminho.

III EXPOSIÇÃO - FEIRA

DE

GADO LEITEIRO

6 A 14

DE

JUNHO

PARQUE DA ÁGUA BRANCA

BOVINOS DAS

RAÇAS LEITEIRAS

E

MISTAS. EQUIDEOS.

ASININOS

6 A 14

DE

JUNHO

CASA DROGHETTI LTDA.

MALAS E ARREIOS DA MELHOR QUALIDADE
MIUDEZAS — FELTROS, LONAS E ENCERADOS — CHARRETES
CAPAS PARA CHUVA — BARRACAS

Armazém e escritório:

RUA SENADOR QUEIROZ, 295
SÃO PAULO

Caixa Postal, 114
End. Telegr.: "Droghetti"

Fones:
Armazém: 34-5854
Escritório: 34-5853

A AVICULTURA EM PROGRESSO

A ninguém poderá passar despercebido o desenvolvimento atingido pela Avicultura no País e em particular em São Paulo.

Passado o período da corrida em busca exclusiva do esterco para adubação dos cafesais, firma-se a criação de aves em moldes racionais, capazes de permitir o rendimento económico necessário para assegurar sua continuidade como verdadeira indústria agro-pecuária. Em verdade, explorada racionalmente e como atividade de rentabilidade média, pode-se estimar em 15 a 20% o lucro líquido do capital empatado nesse negócio. E esse lucro pode chegar a 35%, quando é o próprio avicultor quem executa os trabalhos técnicos.

Falando de rentabilidade, não se deve esquecer de que esta se relaciona com o número de aves em criação, tendo em vista o aproveitamento da mão de obra. Assim, nas nossas condições, o lote ideal gira em torno de 1.500 poedeiras para a exploração ovejuna comercial e 1.000 frangos mensais, no setor da produção de carne.

—0000—

A posição da avicultura no conjunto da produção agro-pecuária do Estado de São Paulo é de realce, figurando entre as dez primeiras atividades produtoras. Associando-se a produção de ovos à de carne de aves, estima-se o valor bruto da produção avícola paulista em quatro bilhões de cruzeiros, o que supera o da produção leiteira, de suínos e de batata. Acima da produção avícola, colocam-se os produtos de tradição: café, carne bovina, algodão, cana de açúcar, milho e arroz.

No conjunto da produção avícola do Brasil, segundo estatística do Ministério da Agricultura, o valor atual da produção de aves e ovos é de dez bilhões de cruzeiros, indicando para o nosso plantel cem milhões de poedeiras, setenta milhões de frangos e frangas, cinco milhões de palmípedes e dois e meio milhões de perús. Esta população avícola e sua produção conferem ao Brasil o sétimo lugar entre os países que cuidam de avicultura no mundo.

Apesar deste progresso, é preciso notar que longe estamos ainda de alcançar o nível desejado e muito teremos de fazer para chegar à meta almejada. Para nivelar a avicultura às indústrias mais capacitadas do País, tornando-a uma das principais fontes de riqueza do Brasil, cumpre fornecer ao povo conhecimentos seguros, baseados em dados científicos e conselhos decorrentes das observações feitas na prática por técnicos competentes.

—0000—

Na avicultura, o homem através de seu preparo técnico, representa pelo menos 80% do êxito económico. Por esse motivo, a "Revista dos Criadores", desejando cooperar de modo eficiente e patriótico no progresso de uma das atividades de maior expressão no conjunto da produção agro-pecuária do Brasil, resolveu juntar às suas edições especiais o presente número, que, dedicado à Avicultura Técnica e Prática, oferece aos leitores farta documentação prática. Para isso contribuíram decisivamente organizações avícolas de nosso Estado e outras de interesses afins, a todas as quais a redação da "Revista dos Criadores" apresenta aos seus melhores agradecimentos.

—0000—

Não podemos deixar de referir aqui uma circunstância que, por certo conhecida do leitor que há muitos nos acompanha, de outros talvez seja ignorada: não é de hoje que a "Revista dos Criadores" se interessa pela Avicultura, mas de há mais de quinze anos...

Incipiente a esse tempo a hoje adiantada agro-pecuária, a "Revista dos Criadores" procurou por todos os meios animá-la e, se hoje a vê preparada para empreendimentos mais amplos, não pode deixar de rejubilar-se, vendo nisso tudo — em que pese o vitupério — um pouco do seu esforço e devotamento.

Esse júbilo procuraremos, porém, transformá-lo em novas forças, a empregar em benefício da Avicultura, em São Paulo e no Brasil.

DIANTE DA INFLAÇÃO EM QUE VIVEMOS, TEMOS QUE REVER CONSTANTEMENTE O CUSTO DE PRODUÇÃO

Palavras do Sr. Luiz Emanuel Bianchi, presidente da Associação Paulista de Avicultura.

Este número da «Revista dos Criadores» é dedicado a assuntos de avicultura. A «Entrevista do mês» não poderia fugir a essa orientação. Procuramos, por isso, um dos nossos mais adiantados avicultores, a fim de que nos dissesse dos problemas que no momento preocupam a classe. O primeiro nome a nos ocorrer foi naturalmente o do sr. Luiz Emanuel Bianchi, presidente da Associação Paulista de Avicultura, verdadeiro líder dos avicultores, não apenas no que se refere a suas atividades de defesa dos comuns interesses, mas principalmente nas diretrizes técnicas que se traçou e que vem executando com eficiência.

Em verdade, o sr. Luiz Emanuel Bianchi, em sua fazenda de Itatiba, realizou uma das grandes experiências da moderna agricultura de São Paulo: consorciando avicultura e cafeicultura, soube demonstrar as imensas possibilidades que se oferecem ao fazendeiro quando mantém galinhas ao lado de cafezais, pois crescem éstes à custa do adubo que aquelas produzem. Seus trabalhos são amplamente conhecidos, constituindo mesmo ponto pacífico, entre os nossos cafeicultores, o acerto dessa orientação: não mais se discute o assunto. Por essa razão, quando o procuramos, levamos a intenção de desviar a entrevista desses aspectos técnicos da atividade rural, entretendo a conversa para outros ramos a estudar a situação do avicultor, em face da atual perigosa conjuntura econômica. E mais felizes ainda, pois nele encontramos também um produtor atento aos magnos interesses do País, a acompanhar de perto os erros e os acertos (principalmente os erros, que são tantos e tão graves!) que vão pontilhando a gestão financeira da atual administração federal.

— A moeda simplifica as trocas — começou por dizer-nos o sr. Luiz Emanuel Bianchi. — Se um avicultor cria dez frangos e deseja trocá-los por um sapato, vende os frangos a quem deles necessita e, com a moeda em mão, vai procurar quem tenha o sapato e pretenda trocá-lo, por intermédio da moeda, por outros produtos. A moeda é o meio inteligente de facilitar a venda do que produzimos e a compra do que os outros produzem. Essa é a descrição mais simples e mais realista da função da moeda.

Os homens, entretanto, possuem uma extraordinária vocação para deturpar as regras do jogo que eles mesmos criaram.

Principalmente, quando governam os outros. Com o poder nas mãos, passam a administrar violentamente, isto é, desrespeitam o que é direito, torcem o que é justo, desobedecem as regras que, para os outros, são codificadas.

EMISSOES RUINOSAS

— Quando o governo emite moeda, ele sabe que está enfiando a mão no bolso de cada cidadão. Quando a emite sem obediência às normas da lei, sem respeito às regras do jogo, como é usual numa sociedade civilizada, ele comete crime de roubo: rouba ao rico e, o que é pior, também ao pobre.

A emissão da moeda, afinal de contas, nada mais é do que trocar papel pintado por mercadorias ou serviços produzidos. É levar a nossa caixa de ovos de 30 dúzias, que pesa mais de 20 quilos de alimentos ricos, que representa uma série de esforços, de trabalho, de ações úteis, enfim, por uma nota impressa, feita a máquina, produzida aos milhares por hora e cujo único fim, trocar trabalho, falseia na primeira transação.

Este sistema indesejável de resolver problemas governamentais é altamente ruinoso para a coletividade, pois tende a destruir aos poucos, o seu bem-estar e a sua segurança.

OS PREJUIZOS NO BRASIL

— Em nosso País, a visão dos números que se alteiam já não ilude o povo, já não ilude os avicultores. É chegada a hora em que se verifica com facilidade que o custo da produção e de sua distribuição tende a superar o valor da renda apurada.

A troca de dezenas de bilhões de papel pintado, pelas mercadorias e serviços que o povo produz, começa a mostrar a cada um, qual a sua parte no prejuízo que tal processo provoca. Os números não enganam mais os avicultores e todos os que produzem no campo.

Nossa melhor atenção deve ser dirigida ao custo da produção, a fim de nos habilitarmos a suportar a difícil conjuntura.

SIMPLIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

— O mais importante fator do custo da produção é o alimento. É preciso economizá-lo, eliminando ao máximo as aves de baixo rendimento, os desperdícios que caem dos sacos de ração e dos comedouros, assim como as rações de baixa

eficiência. Reduzamos a mão de obra. O melhor caminho é aumentar o número de aves por tratador, estudando a simplificação dos serviços e a eliminação das tarefas dispensáveis. O «Culling» deve ser levado ao extremo de eliminar as poedeiras que não assegurem 40% de produção.

OPIO E INFLAÇÃO

— A inflação modifica os preços diariamente nas cidades. Nos campos, entretanto, as modificações se processam com grande atraso. Esse é um dos fatores do deficit da propriedade rural.

Os técnicos da ONU e os economistas consideram a inflação altamente ruínoza para a produção agrícola.

Os avicultores que não desejarem acabar suas atividades devem conservar-se atentos ao movimento dos preços, a fim de se orientarem, tanto no que se prende aos fatores de produção, como no que se refere à renda de ovos e carne.

A inflação é como o ópio. Quanto mais se fuma, mais se deseja fumar, até que um dia sobrevem a morte.

Evitemos que o vício governamental leve a ruína à avicultura paulista, cuja tarefa precisa prosseguir. Não devemos nos iludir com os números. Fixemos-nos nos resultados que podemos obter pelo trabalho eficiente, constante e organizado.

CARBOLINEUM

Protege e imuniza toda a classe de madeira contra a podridão e cupim, principalmente as madeiras brancas de pequena resistencia.

OTTO BAUMGART

IND. E COM. S. A.

Rua Carlos de Souza Nazareth, 53
Cx. Postal, 3492

Vista parcial dos galinheiros com capacidade par 60.000 aves, localizada no Bairro do Alvarenga em São Bernardo do Campo.

Iwao Itô examinando os controles de chocadeira "Buckeye" para 65.000 ovos. A Central de Incubação da Granja Itô com mais de 500.000 ovos de capacidade é das maiores da América Latina.

GRANJA ITÓ

Avenida Pereira Barreto, 450

— Caixa Postal, 273

— Telefone: 44-1985

— SANTO ANDRÉ

PINTOS DE UM DIA: LEGHORN BRANCA, NEW HAMPSHIRE E WHITE AMERICA

ABRIL DE 1959

— 13 —

GRAN

GRANJA YPÊ

Situada
na
estrada
do
Campo Limpo,
em
Santo Amaro
a mil
metros
da estrada
Santo
Amaro-
Itapeccerica
da Serra,
na
altura
do quilometro 19

**VENDA DE PINTOS NEW
HAMPSHIRE (ORIGEM
NEW-COMMER FARM
- U.S.A.) E CRUZADOS DE
CORNISH x NEW
HAMPSHIRE**

Caixa Postal, 12.707

(Santo Amaro)

TELEFONE: 61-2261

A Y P Ê

NOVO BENEFICIADOR!

BIFURAN

• marca registrada

**PARA A PREPARAÇÃO
DE RAÇÕES MEDICADAS
NA PREVENÇÃO
E TRATAMENTO DA
COCCIDIOSE
E PULOROSE**

contém 11% de **FURACIN**
marca do nitrofurazona
e 2,2% de **FUROXONE**
marca do furazolidona

O BIFURAN atua na COCCIDIOSE cecal e intestinal ao mesmo tempo que ajuda o desenvolvimento de sólida imunidade nos pintos.

Tratamento preventivo = 1/2 Kg. por tonelada de ração.

Tratamento curativo = 1 kg. por tonelada de ração.

O BIFURAN permite um lucro extra ao avicultor pois já foi comprovado que aves alimentadas com rações medicadas contendo BIFURAN, utilizaram menos alimentos para aumentarem de peso.

O BIFURAN é também eficiente no tratamento da ENTERITE NECROTICA dos suínos.

O BIFURAN não é tóxico. Pode ser usado em rações de pintos, poedeiras e "broilers".

FABRICADO NO BRASIL POR
**LABORATÓRIOS
EATON DO BRASIL LTDA.**
RUA FIGUEIRA DE MELO, 408 - D. F.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS:
COMPANHIA INDUSTRIAL FARMACEUTICA

CAIXA POSTAL 3786 - TEL. 28-6113
RIO DE JANEIRO - DISTRITO FEDERAL

VENDIDA EM SÃO PAULO, RECIFE E PORTO ALEGRE

OS NITROFURANOS NA AVICULTURA

JOSÉ SANTIVNEZ
Médico Veterinário

A avicultura é provavelmente a indústria em que, com mais ênfase se deve praticar a medicina preventiva. Como a natureza da exploração avícola, já por si, significa grandes aglomerações de animais em condições idênticas de alimentação, manejo, etc., qualquer transtorno ou qualquer doença dentro da granja muitas vezes significa perda total do negócio.

Por outro lado, se examinarmos ligeiramente a natureza das doenças que afetam as aves, observaremos que quase todas elas são de curso rápido, isto é, sua mortífera atividade se desenvolve em poucas horas ou em poucos dias. Muito poucas, como o complexo leucocócico, adquirem características de atividade prolongada.

O apogeu da indústria avícola nos últimos anos tem obrigado ao estudo e à cuidadosa investigação de substâncias que permitam principalmente prevenir as doenças e, em segundo termo, tratá-las com êxito. Neste ir e vir, o progresso científico nos tem proporcionado, em primeiro lugar, as sulfas, que realmente trouxeram algo de novo na luta contra as doenças do homem e dos animais e, apesar da era das sulfas já ter sido superada, todavia muitos avicultores fazem uso delas; não que as sulfas não sejam bons medicamentos, mas têm sido descobertos outros, que, com vantagens sobre elas, estão dando melhor resultado. A era das sulfas está cedendo lugar aos antibióticos, cujo aparecimento foi produto dos estudos de "Sir" Flemming, na Inglaterra. O mais conhecido, a Penicilina, já salvou milhares de vidas e seus efeitos também têm sido notados em medicina veterinária e na prática avícola. Estes antibióticos, a maioria dos quais são produtos de fermentação, produziram também outros benefícios, como o estímulo ao crescimento dos animais de engorda e dos pintos para corte. Esta última aplicação ainda se pratica hoje.

A efetividade dos antibióticos se refere a uma qualidade específica. Assim como a penicilina é o melhor antibiótico contra os estreptococcus, poderíamos ir enumerando a estreptomicina, a clor-tetraciclina, a oxi-tetraciclina ou cloranfenicol etc., cujo uso varia bastante e com resultados efetivos, que, no caso da avicultura, têm sido notados melhor no tratamento das doenças do tipo respiratório.

A era dos antibióticos continua, porém, no horizonte quimioterápico, já surge um novo grupo de substâncias, que não são sulfas nem antibióticos: trata-se dos nitrofuranos, nova classe de compostos antimicrobianos, cujo impacto na medicina humana já se tem feito sentir e que, na medicina veterinária e na prática avícola, permitem a solução cabal de problemas que até agora só haviam tido solução parcial ou permaneciam insolúveis. Ilustremos esta afirmação com exemplos.

Entre as doenças das aves, a mais grave, do ponto de vista econômico e sanitário, é a coccidiose, nas suas formas cecal e intestinal. As sulfas foram chamadas para resolver este problema e ainda hoje se empregam algumas delas; mas sua indicação sempre se acompanha de medidas de precaução, em virtude de sua influência sobre o desenvolvimento, a postura ou sua margem de segurança; os antibióticos, tanto os chamados de "pequeno espectro" como os de "amplo espectro", não exercem ação alguma sobre as coccídeas. Coube, então, aos nitrofuranos resolver o problema: hoje, o avicultor que se mantenha em dia com o progresso científico, está familiarizado com o NFZ-MIX e o BIFURAN, ambas substâncias de grande vantagem sobre qualquer outro coccidostático, pois possibilita o domínio da doença, permitindo o desenvolvimento da imunidade natural, facilitando melhor conversão alimentar e, além do mais, proporcionando proteção contra as bactérias. Em poucas palavras, o NFZ-MIX e o BIFURAN permitem-nos manter nossos plantéis livres deste grande flagelo que é a coccidiose e prevenir, entre outras, os danos causados pela diarreia bac-

lar branca, que, como sabemos, é produzida por uma bactéria (*Salmonella pullorum*). Já aqui temos uma das virtudes e vantagens do NFZ-MIX e BIFURAN ao oferecer, de uma vez, ação anticoccídica e antibacteriana, propriedade difícil de ser igualada por outros coccidostáticos.

Tomemos outro exemplo, o tifo aviário, doença encontrada nas granjas, em todos os climas e latitudes, resistente a todo tratamento quimioterápico anterior aos nitrofuranos. É certo que alguns antibióticos de "amplo espectro" e também a estreptomomicina têm atividade comprovada "in vitro" ou "in vivo" contra o germen produtor do tifo aviário, *Sal. gallinarum*, porém, sua aplicação na prática tem encontrado limitações, provavelmente devido à atividade bacteriostática deles. Na atualidade, o nf-180 é, fora de dúvida, o medicamento de maior eficácia para o combate ao tifo, doença que é possível prevenir somente com meso quilo do medicamento por tonelada de ração e de que se enfrenta um surto somente com um quilo. A atividade bactericida do nf-180 sobre os germes entéricos é, sem dúvida, uma vantagem sobre os antibióticos.

Estes dois exemplos nos permitem avaliar a significação dos nitrofuranos na avicultura. É indiscutível que, dado o valor do NFZ, que (diga-se de passagem) existe na forma de pré-mistura (NFZ-MIX) ou solúvel (NFZ-SOLUVEL), o BIFURAN e o nf-180 iniciaram uma nova era na avicultura. Graças a eles, torna-se possível prevenir maiores perdas na indústria avícola. A facilidade de sua administração, beneficia o pintinho, desde o nascimento até o momento em que vai para o mercado.

Entre as conquistas mais recentes, ocupam lugar privilegiado os nitrofuranos, resultado de árduo trabalho científico dos Laboratórios Eaton, divisão da Norwich Pharmacal Co. de, Norwich, New York. Quando se escrever sobre as contribuições mais importantes que a ciência tenha feito em benefício da avicultura, não resta dúvida que o NFZ, o BIFURAN e o nf-180 terão o realce devido.

Muitas vezes o avicultor só pensa nos medicamentos, quando já tem o mal na granja. Esta atitude é das mais nocivas para o negócio, porque, desde o momento em que o avicultor passa a "tratar", já está perdendo dinheiro. É certo também que, até há pouco tempo, somente havia elementos de tratamento mas hoje, com as enormes vantagens que oferecem o NFZ-MIX, NFZ-SOLUVEL, BIFURAN e nf-180, já se têm em mão poderosos auxiliares para fazer medicina preventiva eficaz. Somente com pequenas quantidades de nitrofuranos (1/2 kg por tonelada de ração) pode-se hoje, criar com êxito pintos para corte ou galinhas poedeiras. Realmente, não empregar estas magníficas substâncias, é voltar aos dias em que as granjas apareciam e desapareciam como resultado de doenças como a coccidiose e tifo aviário.

GRANJA CAMPO VERDE LTDA.

COMPRA — Frangos, frangos de leite e galinhas; patos e coelhos. Pagamento à vista.

VENDE — Pintos de 1 dia.

ABATE — Aceitam-se em nosso matadouro moderno, também para terceiros.

INCUBAÇÃO — Aceitam-se ovos em nossas chocadeiras "Buckeye".

Tratar: Fones 80-9831 e 80-1484. — Chamar:

GRANJA CAMPO VERDE LTDA.

R. Fradique Coutinho, 343 — S. PAULO — Capital

UM SÍMBOLO DE GARANTIA

PARA OS CRIADORES

CYANAMID

AUMENTE no verão

A PRODUÇÃO DE OVOS
EM SUA GRANJA OU SÍTIO

AUROFAC*

suplemento alimentar contendo Vitamina B12. e

AUREOMICINA*

AUROFAC* Contém o mais ativo antibiótico, a **AUREOMICINA***, clorotetraciclina e a eficiente vitamina B₁₂; aumentando em 20% a produção de aves nas granjas.

Com **AUROFAC*** as aves começam a postura mais cedo e têm a produção mais prolongada com uma média elevada no inverno e no verão.

PRODUTOS VETERINÁRIOS

que asseguram a defesa dos rebanhos bovinos, suínos, ovinos, equinos e aves

Aureomicina Unguento Tópico Veterinário*

Aureomicina Cápsulas*

Acromicina Intramuscular*

Aureomicina Pó Solúvel Corado*

Aureomicina Unguento Intra-Mamário*

Acromicina Endovenosa*

Aureomicina Tabletes Solúveis*

Sulmet em Solução e Tabletes*

SOLICITE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MAIORES INFORMAÇÕES À

CYANAMID QUÍMICA DO BRASIL S. A.
(DIVISÃO AGROPECUÁRIA)

AV. RIO BRANCO, 131-21.º ANDAR — CAIXA POSTAL 1039 — RIO DE JANEIRO — DISTRITO FEDERAL

* Marca Registrada
FILIAL EM SÃO PAULO: RUA LIBERO BADARÓ, 293-24.º ANDAR — TELS. 35-4577 E 37-4634 — CAIXA POSTAL 1750

2506

FILIAIS E DISTRIBUIDORES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CONTROLE PRÁTICO DO CANIBALISMO E DA BICAGEM EM AVES

COMO OPERAR COM A POMADA REPELENTE

A picagem ou canibalismo vem sendo observada nas granjas, principalmente nos «frangueiros» de corte. Queixam-se os avicultores de que a picagem dos dedos, mitra, cloaca, bicos e dorso, ocorre sem que haja infração na lotação dos abrigos e no espaço de comedouro, nem excesso de luminosidade nos pinteiros.

Este é um fato comprovado, porque nem sempre o canibalismo se desenvolve em consequência de falhas na criação. Aparece e com relativa frequência, em condições normais de criação, trato e manejo. Acredita-se que é um vício próprio das aves e que se desencadeia por causas ou acidentes decorrentes da própria avicultura.

Para atenuar os efeitos do canibalismo nos lotes em criação, indicam-se diversas medidas corretivas. Algumas, de valor comprovado, agem à distância, pelas modificações morfológicas e mecânicas do bico das aves, das condições técnicas dos abrigos e da alimentação, como seja o emprego do sal de cozinha na ração ou na água de beber.

A debicagem ou corte da parte superior do bico vem sendo, nos Estados Unidos, um dos principais recursos no combate do canibalismo. No entanto, a operação, realizada logo ao nascer ou quando frangos e frangas, exige mão de obra especializada e aparelhagem apropriada. Como sempre, os norte-americanos procuram sempre evitar o emprego de mão de obra de alto preço, tendo em vista o barateamento do custo de produção. Para dominar o canibalismo, estudaram um processo de borrifamento das aves novas e adultas, com um preparado líquido repelente, com que exploram o sentido do gosto das aves. Embora não o tenham apurado, capaz de selecionar exatamente os melhores sabores, as aves escolhem e preferem aqueles que melhor as satisfaçam e recusam ou refugam os de tipo repelente, amargos ou de chero ativo e desagradável. As aves dispõem de papilas gustativas

no dorso da língua, semelhante às papilas da língua dos mamíferos.

Existem nos Estados Unidos pomadas e líquidos de largo emprego na criação, para combater o canibalismo e a bicagem das penas. Nossa experiência pessoal e a de alguns avicultores dizem que as pomadas funcionam melhor do que os líquidos. As pomadas, dada a sua consistência, aderem às penas, empastando uma certa zona, que as aves bicam, recebendo, então, quantidade suficiente de massa repelente, para que não repitam as bicadas.

Pode-se observar, com frequência, que, muitas aves, ao passarem por outro com zona empastada, param e esfregam o bico no piso, como que se limpando de uma substância desagradável.

Todas as pomadas levam uma substância corante, geralmente vermelha, para atrair a atenção das aves. Daí, essa associação estreita entre a pomada e o efeito repulsivo.

UMA BOA FORMULA DE POMADA REPELENTE

Temos usado e aconselhado a seguinte fórmula:

Graxa amarela	250 gramas
Alóes em pó	30 "
Acido fênico	30 "
Carmin vegetal ou arilina vermelha lavavel	15 "

Misturar bem, á maneira do preparo de pomadas em geral.

O alóes em pó pode ser substituído por quinino, na base de 15 gramas. O ácido fênico deverá ser excluído, no caso do tratamento de frangos de corte, em idade próxima da matança. A graxa amarela poderá ser do tipo mais barato da praça, como a que se usa em eixos de carroça. As anilinas vermelhas, do tipo usado como corante de salsichas ou de queijos.

A rotina é o emprego da pomada repelente, antes do aparecimento dos casos de canibalismo ou de bicagem das penas. Assim, o avicultor deve observar os períodos considerados mais favoráveis ao desenvolvimento do canibalismo e entrar com a pomada repelente, logo que notar os primeiros sinais de picagem.

Podem ser considerados pontos favoráveis ao aparecimento do canibalismo, os seguintes períodos de criação:

1.º) logo após a retirada do calor dos pintos e sua passagem para: a) baterias ou criadeiras frias, em comedos bem iluminados (picagem dos dedos). b) comedos de recria, após a vacinação dos pintos, onde a ventilação e iluminação são mais intensas (picagem em geral);

2.º) ao redor da 6.ª semana, com o aparecimento dos canudos maiores das penas da cauda (picagem dos canudos e mitra) e empenamento do arco das asas nos frangos (picagem da asa);

3.º) transferência das frangas para os abrigos de postura, depois de 8 semanas (picagem da asa e mitra), devido à presença de canudos de penas em formação (muda de franga).

4.º) primeiro mês de postura (picagem da cloaca e do ouvido);

5.º) durante a postura (bicagem das penas e canibalismo acidental).

Como regra, 10% das aves do lote devem ser besuntadas com pomada e soltas novamente nos abrigos. Atraídas pela coloração vermelha da pomada, as aves bicam a zona tratada e não voltam a bicar. Esta é a razão fundamental do êxito da pomada repelente. As aves tratadas agem como verdadeiras «iscas».

A zona empastada deve ser acima da cauda, nos franguinhos de seis semanas e ao redor da cloaca nas frangas em postura (picagem do oviduto).

Nos casos de bicagem (vício de comer penas), geralmente nas frangas e nas aves em postura, a pomada deve ser esparramada sobre a cauda e dorso.

De qualquer maneira, cabe ao avicultor observar qual a região do corpo visada pelas aves, durante a picagem ou bicagem das penas e empastar zonas iguais nas aves tratadas para servir de «iscas». O tratamento deve ser repetido quando necessário, podendo ser efetuado à noite, para facilitar o trabalho de apanha das aves e evitar correrias nos abrigos. A pomada será esparramada por meio de espatula estreita ou qualquer outra lamina.

Este sistema de combate ao canibalismo poderá ser de extrema utilidade para os avicultores do Brasil, tendo em vista que não dispomos de aparelhagem para cortar o bico das aves. Aliás, convém lembrar que este sistema domina o canibalismo, mas não elimina os defeitos básicos, principalmente as rações de baixa qualidade nutritiva.

Ave com prolapso do oviduto, causa frequente do canibalismo. (Foto seg. Jakob)

Vista parcial de um conjunto de 24 baterias ALBAR para 1.000 pintos cada, da Granja Ype, fabricadas pelo Industrias ALBAR, com funcionamento perfeito e garantido, com controle automatico da temperatura.

INDÚSTRIAS ALBAR

Rua Coriolano, 125-127 — Telefone: 62-1843 — SÃO PAULO

Material Avícola de Eficiencia Comprovada nos maiores granjas do Brasil: — Chocadeiras para todas as capacidades; Baterias para criação de pintos; Recladeiras para frangos de corte; Câmpanulas a querosene, elétrica e a carvão. Gaiolas individuais de postura.

Cooperativa Central Agrícola de São Paulo

Agrupa a produção de 12 Cooperativas Mistas do Est. de S. Paulo

Mantem: — Central de Incubação (Marília e Mirandópolis) — Matadouro Avícola (Marília) — Câmaras Frigoríficas para ovos — Granja de Seleção Avícola (Bastos) — Fábrica de Rações — Ensino da Avicultura

SÉDE: — Praça João Mendes, 182 - 3.º — Telefone: 33-7830

1: - Vista parcial dos galinheiros para o controle individual das galinhas na Granja Experimental de Bastos.

2: - Vista do conjunto de chocadeiras "Buckeye" na Central de Incubação de Marília, com capacidade para 138.000 ovos.

3: - Abrigo-colônia com frangos reprodutores da raça Leghorn Branco. Estes machos, filhos de galinhas provadas, serão acasalados com poedeiras controladas no primeiro ano de postura, para abastecer as Centrais de Incubação da Cooperativa, para produzir pelo menos um milhão de pintos em 1959.

4: - Visitando o granjeiro Yamamoto no município de Mococa, os srs. dr. Francisco Antonio de Toledo Pisa, presidente da Cooperativa, dr. Mercio Prudente Corrêa, diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Banco do Estado de São Paulo e dr. Renato Azzi, assessor técnico da Cooperativa.

— os avicultores sabem:

OS PRODUTOS "AVISCO" REPRESENTAM LUCRO CERTO PARA O SEU NEGÓCIO!

Prestando ampla assistência ao avicultor, no incremento e melhoria de sua criação, a "Avisco" vende-lhe material avícola de primeira qualidade; dá-lhe assistência técnica permanente; fornece-lhe pintos de 1 dia com garantia total; abastece-o com rações adequadas e, finalmente, compra tôda a sua produção aos melhores preços da praça!

Faça seus pedidos à

"AVISCO" — AVICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.
Rua Artur de Azevedo, 1643/7 — Telefone, 80-2161
Caixa Postal, 6920 — End. Telegr., "Aviscosa" — São Paulo

"AVISCO" — uma organização de criadores

GAIOLAS DE POSTURA: VANTAGENS E DESVANTAGENS

A exploração de aves em postura, pelo sistema de gaiolas individuais, vem tendo desenvolvimento em nosso meio avícola. Muitos avicultores já perceberam que a gaiola de postura pode ser, em primeiro lugar, um seguro complemento dos galinheiros industriais, como teste definitivo para as poedeiras a serem refugadas para o corte. Depois, como ponto de partida para a escolha das melhores poedeiras, em um plano simplificado de melhoramento da produtividade das aves. Porque, a gaiola individual de postura nada mais é do que um ninho-alçapão equipado com bebedouro e comedouro.

Nessas condições, as gaiolas individuais de postura vêm-se incorporando à rotina das granjas, pela soma de elementos precisos e exatos que coloca à disposição dos avicultores, para melhorar o rendimento econômico da produção avícola.

VANTAGENS DAS GAIOLAS DE POSTURA

A exploração das poedeiras em gaiolas individuais apresenta nítida superioridade sobre a criação em lotes coletivos. Vejamos.

1º — *Indicação exata das poedeiras refugas.*

Sabendo que as poedeiras apresentam sinais externos que denotam queda de postura, sua eliminação dos galinheiros exige exame eficiente do lote. No entanto, mesmo que o avicultor tenha bastante prática, muitas galinhas boas são eliminadas e outras de baixa postura são mantidas nos lotes. São cousas da própria formação anatômica das poedeiras, a mascarar suas reais qualidades biológicas.

Os erros observados na escolha das poedeiras são maiores no caso da raça New Hampshire, do que no das Leghorn Branca.

Demorando a programação do exame das poedeiras, as que forem eliminadas já deram prejuízo pela baixa postura e são vendidas com peso inferior ao normal e com aspecto de refugo.

Muitos "frangueros" se recusam a comprar galinhas desse tipo, pois, quando abatidas, se apresentam muito mal, com carcaça vazia de músculos.

Tudo isto se previne quando se mantém poedeiras em gaiolas, seja na exploração total nesse sistema ou então, na proporção de 10% das poedeiras em criação, para o repasse periódico, antes da eliminação das aves refugas. Todavia os avicultores venderão sempre suas poedeiras refugas, na hora exata da queda da postura, ainda com bom peso do corpo e bom estado geral de carnes.

Aliás, esta é uma das vantagens fundamentais do sistema da exploração das poedeiras em gaiolas individuais. Mesmo quando mantidas 10% do total de poedeiras em criação, é uma arma segura nas mãos dos avicultores habéis.

2º — *Produção uniforme de ovos durante todo o ano avícola.*

Na exploração das poedeiras em gaiolas individuais, a produção pode ser mantida em altos níveis, se substituírem continuamente as galinhas refugas por outras frangas em início de postura, justamente na hora exata, para evitar a queda da porcentagem de produção.

Um programa de criação escalonada de frangas poderá manter um aviário equipado com gaiolas de postura, com produção de 68 a 70% durante o ano todo.

Na Califórnia — E.U.A., onde as gaiolas de postura dominam amplamente no meio avícola, em 1950, a média da postura das aves engaioladas foi de 241,8 ovos, em 14 lotes com 1.238 poedeiras em média. No mesmo ano, poedeiras

A exploração das poedeiras em gaiolas de postura ganha novos adeptos, principalmente na colônia japonesa. Vista de um galão da Estação Experimental da Cooperativa Central Agrícola Sul-Brasil, em Atibaia.

criadas por outros sistemas apresentaram a média de 207,2 ovos, em 6 lotes com 1.139 galinhas em média. Nesse mesmo ano, nos meses do outono quando os ovos alcançam preço máximo, as poedeiras engaioladas botaram em média 78,7 ovos, contra 62 ovos postos pelas galinhas criadas sobre "camas" ou piso ripado.

3º — *Eliminação de diversos vícios.*

As gaiolas de postura anulam completamente os vícios das aves, como canibalismo, picagem do ovóduto e bicagem das penas. Pelo dispositivo da canaleta de postura, as galinhas não podem comer os ovos que botam.

4º — *Elimina a escala social e a briga nos galinheiros.*

As chamadas galinhas prepotentes, as "donas" dos galinheiros provocam sérios distúrbios nos abrigos, atacando as galinhas mais fracas e tímidas. São uma das principais causas do aparecimento de galinhas refugas, em lote de aves em postura. Isoladas em gaiolas, dificilmente podem atacar as vizinhas e, com isso, constituem uma das razões da postura elevada das galinhas engaioladas.

5º — *Mortalidade diminuída.*

Devido à eliminação rápida das aves refugas, à ausência de vícios e ao isolamento do sólo, as poedeiras em gaiolas apresentam menos problemas de doenças, em relação às aves criadas no chão. Em muitos controles realizados nos E.U.A., durante um ano de produção, poedeiras criadas no chão acusaram 18% de mortalidade, ao passo que poedeiras engaioladas apenas 3,5%.

6º — *Redução do choco*

As gaiolas de postura naturalmente já são um "remédio" para curar o choco das poedeiras, o qual, em galinhas engaioladas, se reduz ao mínimo e, assim mesmo, de curta duração.

7º — Controle das verminoses e parasitas externos.

Pela própria construção das gaiolas, principalmente quando inteiramente em arame galvanizado, não há campo para o desenvolvimento de verminoses ou alojamento de piolhos e carrapatos.

8º — Eliminação das poedeiras de ovos deformados.

É um dos aspectos fundamentais que valorizam a gaiola de postura. As poedeiras de ovos de casca mole, quebradiça ou portadoras de manchas e defeitos internos, podem ser refugadas com a máxima facilidade.

9º — Ovos limpos.

Após a postura, o ovo rola imediatamente para a canaleta coletora. Assim, permanece fora do alcance das patas da galinha e com contato com o ar fresco. É um fator da valorização comercial dos ovos postos pelas poedeiras engaioladas.

10º — Controle simples da produção.

Cada gaiola fornece exatamente os dados necessários para o levantamento da escrita de todo o abrigo. Desse modo, o avicultor caminha sobre bases sólidas, podendo calcular diariamente seu rendimento real e efetivo.

11º — Menor consumo de ração.

Mantendo apenas as aves em plena postura, será menor o consumo de ração. Em controles realizados nos E.U.A., as poedeiras engaioladas têm produzido uma dúzia de ovos, com 20% menos de ração, comparado com as poedeiras criadas no chão: têm posto uma dúzia de ovos, consumindo 1.800 a 2.000 gramas de ração, contra 2.700 gramas por dúzia, das poedeiras criadas em outros sistemas.

12º — Maiores lucros por poedeiras.

Tomando por base controles norte-americanos de 1953, podem ser observadas estas diferenças:

poedeiras no chão: 2.50 a \$ 3.00 de lucro por poedeira, exclusão de mão de obra.

poedeiras engaioladas: 4.00 a \$ 5.00 de lucro por poedeira, menos a mão de obra.

PONTOS FRACOS DAS GAIOLAS

Como não há um sistema totalmente satisfatório para a exploração de poedeiras, as gaiolas também apresentam seus pontos fracos, como:

1º — Preço inicial elevado de instalação.

Entre nós, ao que se sabe, as gaiolas de postura têm sido fabricadas na base de Cr\$ 100,00 por cabeça. Juntando-se o custo dos galpões e demais anexos, pode-se estimar em Cr\$ 150,00 por poedeiras alojadas. Este é um preço julgado elevado, principalmente nos aviários das instalações de eucaliptos e cobertura de telhas.

De qualquer maneira, à custa de uma produção mais eficiente, a gaiola de postura pode ser amortizada no mesmo tempo que leva uma instalação de menor preço do tipo comum entre nós. Tudo depende de boa e eficiente gerência, a começar dos galpões.

Desde que as gaiolas são do tipo de um andar só, com esterco caindo diretamente sobre o terreno, o galpão pode ser do tipo rústico, fechado lateralmente por cortinas de aniação.

2º — Perigo das moscas.

Desde que o esterco se vai acumulando debaixo das gaiolas, as lavras encontram ambiente favorável ao seu desenvolvimento. No entanto, graças aos modernos inseticidas, as moscas podem ser combatidas com absoluta eficiência.

Este é um problema que exige atenção dos avicultores, porque sua própria residência pode ser praguejada pelo mosquito do aviário.

3º — Rações especializadas.

As poedeiras engaioladas exigem determinadas quantidades de nutrientes, em níveis acima do exigido pelas poedeiras criadas sobre "camas". Principalmente o cálcio deve ser fornecido em maiores proporções. Em nosso meio, os técnicos e as fábricas de ração estão preparados e capacitados para o preparo de rações eficientes.

Compete ao avicultor, o estudo de suas possibilidades técnicas e financeiras para o desenvolvimento de uma aviário, com poedeiras em gaiolas.

Queremos deixar bem claro que a conjugação das gaiolas de postura, na base mínima de 10% da lotação dos galinheiros, é um dos melhores caminhos a seguir para melhorar o rendimento econômico de um aviário que explore comercialmente a postura das aves.

GRANJA e INCUBAÇÃO DOURADO

PINTOS DE UM DIA "DOURADO" OS MELHORES

ENGENHEIRO AGRÔNOMO JOSÉ IGNÁCIO CAMARGO PENTEADO

DOURADO — Est. de São Paulo — C.P. — Telefone, 7

Escritório em SÃO PAULO — Rua Pinheiros, 732 — Telefone 80-4467

**Pintos de 1 dia da mais alta linhagem e postura
das raças NEW HAMPSHIRE-LEGHORN BRANCA**

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA

Senr. Criador

dê SAÚDE à sua criação administrando o mais eficiente e econômico dos suplementos

VI-PEN B12

QUATRO ITENS QUE GARANTEM QUALIDADE
VI-PEN B12 contém:

1-PENICILINA G — BENZATINA: O novo sál de Penicilina (ação imediata e ultra-prolongada) que melhores resultados apresenta na alimentação animal. **8 milhões de unid. por 1,5 kg.**

2-VITAMINA B12: Estimula o crescimento e permite melhor assimilação dos alimentos. **ALTA DOSE: 11 mg. por 1,5 kg.**

3-VITAMINA D3: Nos animais, favorece o crescimento ósseo, previne o raquitismo, a propensão às infecções, a tetania, o vício de lambar e a osteomalácia. Nas vacas prenhes, previne o nascimento de bezerras fracas, mal constituídas ou mortas. Nas aves, eleva a capacidade de postura, facilita a muda e atúa vantajosamente sôbre a qualidade dos ovos: maior pêso e casca mais resistente.

4-MISCELIO DE PENICILINA: Rico em substâncias de alto valôr nutritivo: gorduras, proteínas, sais minerais (cálcio-fosforo) vitaminas do complexo B, etc. Indispensáveis na alimentação animal.

AINDA MAIS: VI-PEN B12 é o mais indicado dos suplementos, porque além das vantagens apresentadas, o seu preço é REDUZIDO.

A adição de **VI-PEN B12** nas rações, **AUMENTA** em 35% o pêso dos animais de seu plantel, com **MENOR** consumo de alimentos; portanto, V.S., terá seus **LUCROS MULTIPLICADOS**.

EMBALAGENS: Latas de 1,5 kg. • Tambores de 22,5 kgs.

A PROCEDÊNCIA GARANTE A QUALIDADE
VI-PEN B12 é um produto **FONTOURA WYETH**

Indústrias Farmacêuticas

Fontoura-Wyeth S.A.

DIVISÃO AGRO-PECUÁRIA

Rua Caetano Pinto, 129 — São Paulo — Brasil
Indústria Brasileira

Luz artificial e rações umidecidas para estimular o desenvolvimento dos pintos nos meses quentes do ano

Não devem os criadores esquecer que ponto importante, na obtenção de lucros certos com frangos para o corte, é a regularidade da produção. Os "frangueiros" devem estar sempre lotados, respeitado apenas o intervalo para a entrada de outro lote de pintos; a produção em lotes seguidos e escalonados; a venda na idade de 10 a 14 semanas, de acordo com as exigências do mercado consumidor.

Segundo esse critério, absolutamente certo, os criadores devem promover a criação de pintos, durante o ano todo, mesmo nos sempre temidos meses quentes e chuvosos, quando se exigem certos cuidados, a fim de que o crescimento não seja prejudicado, devido ao calor e ao grau de umidade do ambiente.

Os criadores de frangos já puderam anotar que os pintos, criados nos meses mais frios e secos, se desenvolvem melhor do que os pintos criados durante os meses mais quentes e úmidos. Em alguns casos, pudemos anotar diferenças até de 300 gramas de peso médio, entre os frangos criados nos dois períodos. Isto representa menos Cr\$ 10,00 a Cr\$ 15,00 por frango, em relação aos frangos criados nos meses mais frios. Esse retardamento nos meses mais quentes do ano é devido a várias causas, ligadas entre si, sendo, porém, das mais importantes o baixo consumo de ração. Os pintos criados nos meses mais frios consomem mais farelada do que os pintos criados nos meses mais quentes. Nesta época, aumenta o consumo de água e baixa o consumo da ração. Além disso, o índice de mortalidade também se eleva, pela incidência de doenças próprias desses meses: coccidiose, enterites, etc. Como o crescimento está estreitamente associado ao consumo de ração, é lógico esperar que os pintos, comendo menos, tenham seu desenvolvimento prejudicado.

Nessas condições, podemos afirmar que fator importante na criação de pinto, nos meses quentes do ano, será o estímulo ao maior consumo de ração, por qualquer meio. Como promover esse estímulo?

Dois recursos podem ser aplicados na prática da criação, com extrema facilidade e ao alcance de qualquer tipo de avicultura: grande, média ou pequena. São eles a iluminação artificial e rações umidecidas.

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

A ação da luz sobre o crescimento dos pintos é aceita como função estimuladora, dentro de normas que ainda não foram totalmente esclarecidas. Assim é que o excesso de luz, em intensidade além da necessária, poderá produzir efeitos contrários e até provocar o canibalismo, deficiências no empenamento e na qualidade das penas, além de defeitos na vista e mesmo a cegueira parcial.

A luz nos pinteiros e casas-criadeiras, poderá, pois, ser fornecida a noite inteira, ou depois da meia noite, ou em períodos intermitentes. A intensidade será dosada em 40 watts para cada 18 metros quadrados de pinteiro, casa-criadeira ou sala-bateria. A cor poderá ser branca ou vermelha, que dão os raios luminosos, em comprimentos de onda que agem ativando a pituitária das aves.

Quanto ao valor biológico dos sistemas de iluminação artificial, as provas experimentais parecem confirmar a melhor associação dos períodos intermitentes de luz, com rações de alta energia.

Os períodos intermitentes de luz são programados na base de duas horas de luz e duas horas de escuridão, entre o cair do dia e o nascer do sol. Parece que os períodos alternados de repouso e de movimento para comer permitem melhor aproveitamento dos nutrientes, com menor gasto de energia para a movimentação e digestão em repouso, com a assimilação exata dos nutrientes. Quando se disponha de relógios de controle de tempo, não haverá dificuldade na programação da intermitência da iluminação dos pinteiros. Infelizmente, tais

A criação de pintos nos meses quentes exige maior cuidado dos criadores. A iluminação artificial e as rações umedecidas são fatores de importância para estimular o desenvolvimento dos pintos.

relógios são caros, podendo apenas ser instalados em criações industriais, capazes de amortizar rapidamente seu custo elevado. Nas granjas onde haja guarda-noturno, ou mesmo capacidade de trabalho da gerência, as luzes poderão ser acesas e apagadas a cada duas horas, em controle manual.

No entanto, a luz acesa depois da meia noite tem apresentado ótimos resultados, além de não exigir aparelhagem especial de controle.

Como cuidado especial, a luz deverá incidir sobre os comedouros, para facilitar o acesso dos pintos e frangos, permitindo maior consumo de ração.

Desde que o crescimento dos pintos é influenciado não somente pela ação própria da luz, mas também pela temperatura ambiente, melhores resultados são obtidos com a iluminação dos abrigos, pois, à noite, principalmente depois das 24 horas, ocorrem as temperaturas mais baixas do dia.

Porque não aproveitar essa parte da noite para iluminar os pinteiros e salas-baterias e, com isso, conseguir maior consumo de ração? Será uma vitória contra o calor, conseguindo-se pintos com desenvolvimento normal nos meses quentes do ano. Além disso, a mortalidade será sempre reduzida ao mínimo, pela maior vitalidade dos pintos, ao consumirem exatamente os nutrientes de que necessitam para rápido crescimento e melhor estado de saúde.

Como cuidado especial, os comedouros e bebedouros deverão estar sempre abastecidos, trocada a água ao cair da tarde.

Nas granjas onde não haja energia elétrica, a iluminação poderá ser feita com lâmpadas a querosene, dependuradas sobre os comedouros e acesas depois da meia noite.

RAÇÕES UMIDECIDAS

Um dos recursos mais práticos e economicos para estimular o apetite dos pintos e frangos, nos meses quentes do ano, é o fornecimento de rações umidecidas.

Para isso, umidece-se entre as 11 e as 15 horas do dia, apenas a quantidade de ração que possa ser consumida em 20 a 30 minutos. Essa quantidade varia de acordo com a idade dos pintos, podendo ser estimada entre 1½ a 3 quilos para cada lote de 100 pintos ou frangos.

Pode-se empregar água simples, na proporção de 3 kg de farelada para cada 2 litros de água, ou água com melaço, na proporção de 2 litros de melaço e 8 litros de água. O sabor da mistura ganha extraordinário valor e é apreciado pelos pintos e frangos.

A ração umidecida será distribuída sobre a farelada existente no comedouro. Alguns criadores adotam o umidimento no próprio comedouro, por meio de pulverizadores manuais ou regadores. Este é um sistema muito prático, pois a ração não precisa ser revolvida e poderá ser aplicado mais vezes, nas horas quentes do dia.

Os melhores resultados são obtidos, distribuindo-se nova ração às 11 horas, umidecida logo após, bem como às 13 e às 15 horas. Assim se estimulou o consumo de ração na parte mais quente do dia, ou melhor, onde se observam as temperaturas máximas.

A criação de frangos para o corte, nos meses quentes do ano, pode, pois, ser mantida em bases racionais de técnica e de rendimento economico, por meio da iluminação artificial e das rações umidecidas, em conjunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, observam-se temperaturas máximas de 33 a 36°, com muita frequência. No entanto, nesses mesmos dias de temperatura elevada, a temperatura mínima poderá ser de 20° e até menos, como mínima absoluta. Estas temperaturas mínimas são anotadas depois

das 24 horas, ou melhor, precisamente ao redor das 3 horas da madrugada. Assim sendo, a criação poderá usufruir os benefícios de uma temperatura ambiente, própria para atender ao melhor desenvolvimento do corpo, pelo consumo exato de ração e pela garantia de sua eficiência.

Por isso, a iluminação dos pintos, depois da meia noite, com lampadas de 40 watts, a cada 18 metros quadrados de abrigo e rações umidecidas, entre 11 e 15 horas do dia, são fatores decisivos para o sucesso da criação de frangos para o corte, nos meses quentes do ano ou nas ondas de calor, observadas em qualquer época do ano.

Pintos nascidos com...

Conclusão da página 36)

E, protegendo-os completamente contra a encefalomalácia. Na proporção de 1.800 U.I. por 100 kg de ração balanceada permite uma transferência para os ovos capaz de prevenir totalmente, tanto a mortalidade embrionária, como a encefalomalácia nos pintos, nas primeiras semanas. Uma suplementação 100% eficiente é obtida com 2 gramas de alfatocoferol para 100 kg de ração.

O conjunto de vitaminas analisado, representa a base em que se assenta a verdadeira indústria de pintos de um dia, com eficiência e honestidade profissional.

Fora disso, o que se observa é descontentamento entre os compradores e desânimo geral, pela elevada mortalidade entre os pintos nas quatro primeiras semanas de criação.

O preço pago atualmente pelos pintos de um dia, justifica amplamente uma bonificação das Centrais de Incubação aos seus fregueses; a venda de pintos com reservas de vitaminas básicas.

Afinal de contas, a suplementação com vitaminas básicas tanto aumenta a eficiência da produção de pintos como satisfaz à freguezia, pelos resultados colhidos na prática da criação inicial dos pintos.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA

Central de Incubação (São Paulo e Marília) — Granjas de Seleção Avícola (Moinho Velho e C.A.A.) — Matadouro Avícola - Fabrica de Rações - Entrepasto de Ovos - Departamentos Tecnicos de Avicultura - Câmaras Frigoríficas para Ovos.

Séde: — Rua Cardeal Arcoverde, 2539 - Fone: 8-2191 (R. int.) Central de Incubação: 8-5376

Quatro veterinários em moderno laboratório, examinam e diagnosticam moléstias nas granjas dos cooperados.

Poedeiras em controle individual por meio de ninho-alçapão, na Granja Experimental do Moinho Velho.

CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA MANTER SECAS AS "CAMAS" DOS PINTEIROS E DOS GALINHEIROS

POSTURA E CONDIÇÕES DAS «CAMAS»

Sabe-se que a intensidade da postura determina condições próprias da «cama». A postura intensa obriga a maior consumo de ração e de água, o que faz com que as poedeiras eliminem maior quantidade de umidade, pelos excrementos e pela respiração.

SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

A maneira de alimentar as aves determina maior ou menor consumo de água e, pois, a quantidade de umidade eliminada pelos excrementos. As rações granuladas, bem como a porcentagem de sal da ração, provocam maior consumo de água.

Excesso de verduras pode provocar até diarreias.

Porisso, ao analisar as condições técnicas das «camas», os avicultores devem levar em conta os fatores da ração empregada, a porcentagem de sal e as verduras. O sal entra com ½% na farelada total e 1% na farelada com milho à tarde; as verduras, 10 a 20 gramas por dia, por poedeira.

TIPO DE PISO

O tipo de piso empregado nos pinteiros, frangueiros e galinheiros, influi no umedecimento das «camas». Abrigos construídos em lugares deficientemente drenados ou nas baixadas devem ter o piso cimentado e, de preferência, impermeabilizado, para evitar que a umidade do terreno passe para as «camas».

Desde que a drenagem seja bem feita e os abrigos construídos no seco, o piso simplesmente atijolado, recoberto por «cama» de 10 a 15 cm, vem sendo o tipo que se generaliza em nosso meio.

A escolha do terreno para os abrigos deve pois, ser cuidadosa, para evitar depois, custosos trabalhos de impermeabilização dos pisos.

ALTURA DA CAMA

Entre nós, costuma-se fazer economia do material usado para forar os abrigos das aves. No entanto, a prática tem revelado que, principalmente na atual quadra do ano, fria e chuvosa, uma «cama» deve ter 15 a 20 cm de altura ou de espessura. Nos meses do verão, a altura deve ser de 10 a 15 cm.

Esse erro praticado com muita frequência, leva as «camas» a rápido umedecimento e emplastamento.

NUMERO DE AVES POR METRO QUADRADO DE ABRIGO

A superlotação dos abrigos é uma das principais causas do emplastamento das «camas», com todo o seu cortejo de complicações. Sabe-se que, além da produção dos excrementos, a própria respiração das aves contribui para elevar o grau higrométrico no interior dos abrigos. Portanto, no caso dos frangos de corte, a média para a criação, até os 100 dias, é de 10 a 15 frangos por metro quadrado de frangueiro. Para as poedeiras, recomenda-se até 5 frangas Leghorn ou 4 frangas New Hampshire por metro quadrado, em galinheiros providos de parques. Em confinamento, não deve ser ultrapassada a quota de 2½ aves por metro quadrado.

Nessas condições, serão obtidos frangos mais pesados e maior produção de ovos.

A avicultura industrial teve, no ano passado, um inverno chuvoso, como poucos até agora observados. Uma época normalmente seca e com temperatura relativamente baixa, apresentou-se quasi com as condições dos meses de janeiro e fevereiro: dias com temperatura acima de 30° e muita chuva. Esse conjunto de condições anormais, embaraçou seriamente os avicultores menos treinados, que empregam o sistema de criação de pintos e de poedeiras sobre «camas». Nesses casos, a própria umidade do ambiente já é capaz de afastar as «camas» das melhores condições técnicas pois a elevação do grau higrométrico do ambiente dificulta a eliminação da umidade do interior dos pinteiros e dos galinheiros.

Assim, se os abrigos das aves não se enquadravam em normas técnicas suficientemente razoáveis, surgiram fatalmente problemas, com a baixa de produtividade e elevada mortalidade, por complicações respiratórias e gastro-intestinais. A solução teria sido dotar os abrigos das condições técnicas mais próximas do ideal para o tipo de avicultura que se praticasse.

Já se conhecem com exatidão técnica os principais fatores que determinam as melhores condições das «camas» dos pinteiros e dos galinheiros. Procuraremos mostra-los.

TIPO DE CAMA

Cumpra que o piso dos pinteiros e dos galinheiros receba um fórrô ou «cama» de material, cujas principais qualidades deverão ser a capacidade de absorver umidade e certa leveza. Desse modo, quando movimentado pelas aves, será separado com facilidade e secará com rapidez. Pode-se empregar material mais grosseiro, desde que possa ser «ciscado» pelas aves. Uma boa «cama» não deve ser extremamente seca, com nuvens de pó, pela movimentação das aves. Entre nós, generaliza-se o emprego de raspas e cavacos de madeira e o sabugo de milho picado (poedeiras) e triturado (pintos e frangos). Ainda são dois bons tipos de «cama» para as aves.

OS PIORES MESES DO ANO

Os meses quentes e chuvoso, quando é elevado o grau higrométrico do ar, oferecem às aves alojadas em abrigo, as piores condições técnicas. Mas os meses de inverno com muita chuva são ainda piores, provocando sérios embaraços no desenvolvimento da criação, especialmente nos pinteiros. As janelas fechadas devido ao frio e a umidade ambiente, elevada pelas chuvas contínuas, diminuem as possibilidades de que sejam mantidas bem secas as «camas» dos pinteiros e nos frangueiros. O desprendimento amoniacal consequente poderá provocar a conhecida queimadura ocular dos pintos.

Vista interna de um "frangueiro", mostrando recursos para manutenção da secura das "camas": comedouros e bebedouros colocados sobre estrados de madeira. O aquecimento por lâmpadas de infra-vermelho contribui para manter secas as zonas aquecidas.

VENTILAÇÃO

A ventilação é um dos fatores mais importantes para manter as «camas» em boas condições técnicas. Além de eliminar o excesso de umidade, afasta os perigos do despreendimento amoniacal e é fator de maior produtividade, verificado no peso dos frangos ou na intensidade da postura das galinhas.

Nas condições climáticas de São Paulo, é preciso atentar sempre para a possibilidade do cruzamento das correntes de ar. Janelões na frente Norte e ventiladores secundários na frente que fecha o Sul. Em casos extremos, podem ser conjugados exaustores por gravidade, montados na cumieira; ou, nos grande pinheiros e frangueiros, exaustores elétricos, de acordo com a cubagem de ar das salas de criação.

De qualquer maneira, para cada tipo e capacidade de abrigo, há uma dosagem exata de ar fresco, necessária tanto para manter as melhores condições técnicas das «camas», como para aumentar a produtividade das aves abrigadas.

TIPOS DE BEBEDOURO

O fornecimento de água às aves é sempre um problema. Semente agora estão aparecendo no mercado tipos de bebedouro, capazes de abastecer os abri-

Corte de um abrigo para aves, vendo-se recursos para manter sêcas as «camas»: — 1: - exaustor fixo (tipo manilha); 2: - lanternim retangular; 3: - ventilador contínuo de cumieira; 4: - ventiladores secundários e 5: - janelões para ventilação cruzada.

gos automaticamente, de forma a evitar as temidas zonas de umidade.

A montagem do bebedouro sobre ripados elevados do chão, telados ou ripados, de acordo com a idade das aves e a espessura da «cama», é medida decisiva para o controle das «zonas úmidas». Entre nós, é prática que se generaliza e demonstra melhor aproveitamento dos trabalhos técnicos realizados pelas organizações cooperativistas, por particulares e pelos serviços oficiais de ensino e de fomento da avicultura.

ESTRADOS DORMITORIOS

Muitos avicultores montam, nos abrigos de postura, estrados ripados para o repouso noturno das poedeiras. Os ripados podem receber até 20 poedeiras por metro quadrado, como dormitório. Sua elevação depende da altura da «cama», não devendo ser inferior a 40 cm.

Como a maior parte do esterco é produzido à noite, no caso do estrado-dor-

mitório, os excrementos são recolhidos fóra das «camas», tornando possível melhor estado físico e maior duração das mesmas.

Os estrados devem ser moveis e em partes, para facilitar a retirada do esterco, e colocados no centro ou no fundo dos galinheiros.

TRATAMENTO COM CAL HIDRATADA

No tratamento das «camas» dos pinheiros, frangueiros e galinheiros de postura, a cal hidratada é um dos melhores e mais eficiente recursos ao alcance dos avicultores, pois desinfeta as «camas», mantendo-as sêcas e fôfas.

Devem-se empregar, no mínimo, 300 gramas de cal hidratada por metro quadrado de abrigo, sobre a «cama», revirando bem depois desse tratamento. Renova-se o tratamento quando as «camas» mostrarem sinais de emplacamento.

Pintos de um dia NEW HAMPSHIRE, para ovos e carne.

NEW HAMPSHIRE SANTO ONOFRE: a mais famosa do Brasil

GRANJA SANTO ONOFRE

Estrada de São Miguel, 1.081 — Caixa Postal, 4.913

Telefone: 9-0293 — SÃO PAULO

Senhor Avicultor:

Sòmente a vacinação **preventiva** pode evitar que a Doença de New Castle acabe com as suas aves.

Vacine já!

VACINA NEWCASTLE RHODIA

- 1.º) Máxima facilidade na vacinação: emprega-se, simplesmente, na água de beber. Pode ser utilizada, também, em injeções intramusculares.
- 2.º) Liofilizada (sêca).
- 3.º) De eficiência comprovada (testada rigorosamente antes de ser posta à venda).
- 4.º) Não contamina.

...e lembre-se: **QUALIDADE TAMBÉM É ECONOMIA!**

PEÇA MAIORES INFORMAÇÕES À

Companhia Química Rhodia Brasileira

DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Rua Líbero Badaró, 119 - 4.º andar

Tel. 37-3141 - Rede Interna

Caixa Postal 1329

SÃO PAULO - SP

A marca de confiança

Também a serviço da avicultura

Medidas das campânulas de aquecimento em relação à capacidade de criação dos pinteiros

Os sistemas de aquecimento empregados na criação se desenvolvem mediante esquemas diversos, com o principal objetivo de fornecer aos pintos a quantidade de calor de que necessitem para o consequente desenvolvimento do corpo.

O aquecimento por meio de campânulas é dos mais usados na avicultura industrial, apresentando variações apenas quanto à fonte de calor. As provas experimentais têm revelado que as fontes de calor se equivalem quanto à eficiência na criação dos pintos, cabendo ao avicultor a escolha da campânula, de acordo com as condições técnicas de suas instalações.

Vejam as principais características técnicas das campânulas mais usadas em nosso meio.

CAMPANULAS ELÉTRICAS

O aquecimento pode ser fornecido por meio de resistências, lâmpadas de filamento e lâmpadas de infra-vermelho. As campânulas elétricas podem ser apresentadas nas formas circulares, retangulares, quadradas ou de qualquer outra forma geométrica.

As campânulas elétricas com resistência devem ter as seguintes medidas:

0,90 x 1,00 m — 150 pintos ou 50 perusinhos

1,20 x 1,20 m — 250-300 pintos ou 100 perusinhos

1,20 x 1,80 m — 350-400 pintos ou 150 perusinhos

Nestas medidas, os pintos se acomodam debaixo da campânula, devendo ser evitada a super-lotação.

O aquecimento por meio de lâmpadas de filamento ou lâmpadas comuns é também adotado, principalmente na criação de pequenos lotes até 150 pintos. Nesse caso, emprega-se uma lâmpada de 60 watts para cada 25 pintos. De preferência, lâmpadas de côr ou recobertas de pano grosso, colado com mistura simples de água e polvilho. Desse modo, previne-se a iluminação excessiva e o perigo de se queimarem os pintos em contato com as lâmpadas. Muitos preferem aumentar o número de lâmpadas,

passando para 15 watts para 6 a 8 pintos.

Interessante é notar que, neste sistema, os pintos formam verdadeiros "cachos ou colônias" debaixo de cada lâmpada. Previne-se assim o amontoamento tão prejudicial à criação nova.

Os soquetes para as lâmpadas comuns devem ser montados em requadros de 0,90 x 0,90 para 150 pintos, suficientemente espaçados para que se aproveitem os requadros e possam os pintos formar "colônias" sem amontoamento.

No aquecimento com lâmpadas de infra-vermelho, uma lâmpada de 250 watts basta para cada grupo de 80 a 100 pintos. Podem ser usadas individualmente, providas ou não de refletor ou montadas sobre "chassis", de tamanho adequado ao número de pintos a criador, o qual não deve ultrapassar 500 para cada "chassis". (Para obter literatura de "infra-vermelho" consulte-se o "Cinturão Verde" ou o Departamento da Produção Animal — Rua Germaine Buchard — 515 — Capital.)

Em todos os tipos de aquecimento, o emprego de reguladores de temperatura ou termostatos é de grande utilidade, pois economiza o consumo de energia e permite a regulação da temperatura, ideal para os pintos.

CAMPANULAS DE CARVÃO VEGETAL

Muito usadas em nosso meio, mesmo em lugares onde há energia elétrica, as campânulas de carvão vegetal são garantia de aquecimento contínuo, sem o perigo de interrupções prejudiciais à criação nova. Têm diferentes tamanhos, com o "defletor" circular de chapa galvanizada.

Apresentamos um esquema, que atende tanto à capacidade das campânulas, quanto às medidas do pinteiro e número de pintos em criação.

Medidas do pinteiro	Diâmetro da campânula	N.º de pintos
3 x 3 m	1,00 m	360
3 x 3,60 m	1,20 m	450
3,60 x 3,60 m	1,20 m	540
4,20 x 4,20 m	1,40 m	610
4,20 x 4,80 m	1,40 m	810
4,80 x 4,80 m	1,50 m	1.000

Campânula a querosene, tipo "chama azul", que se vem firmando nos meios avícolas, principalmente entre os criadores de frangos de corte. (Gentileza de Indústrias Albar).

Como se poderá notar, as campânulas a carvão podem aquecer até mil pintos. Pelo manejo da estufa, o avicultor poderá "deslanchar" maior dose de calor, aquecendo o próprio pinteiro. Daí, o maior número de pintos que pode ser criados, dispostos ao redor da borda da campânula, formando verdadeiros círculos concêntricos, com todo o conforto e sem amontoamento.

As estufas a carvão geralmente são providas de termostato para regulação automática da temperatura. Todavia os avicultores treinados deixam-no de lado, trabalhando apenas com a entrada e saída de ar, em controle manual. Em qualquer caso, é indispensável a chaminé de tiragem, saindo acima do telhado do pinteiro.

Corte de um pinteiro com campânula a carvão, mostrando o contorno formado pela zona de aquecimento e a chaminé de tiragem acima do telhado. (Gentileza de Indústrias Lucato).

O emprego de carvão de boa qualidade e picado em pequenos pedaços garante o bom funcionamento da estufa.

Este é um excelente sistema de aquecimento para os pintos, em zona não eletrificada ou de energia elétrica deficiente. É mais eficiente nos meses frios do ano. No verão, o avicultor deverá "diluir" a temperatura do pinteiro, por meio da ventilação cruzada.

CAMPANULAS DE QUEROZENE OU OLEO COMBUSTIVEL

Agora, com o aparecimento de lâmpadas de aquecimento tipo «carburador», com maior energia calorífica, tem surgido tipos eficientes de campânulas que queimam querosene, como fonte de aquecimento.

Recomenda-se não ultrapassar o total de 500 pintos por lote, ou melhor, criar em lotes de 350 pintos por campânula, em pinteiro de 3 x 3 m nos meses mais frios do ano.

Podemos apresentar duas medidas: Pinteiro de 3 x 3 m — 360 pintos — campânula de 1,35 m de diâmetro. Pinteiro de 3,60 x 3,60 — 540 pintos — campânula de 1,40 m de diâmetro.

O lampião tipo «carburador» tem sido a chave para o êxito deste tipo de campânula, pois, queimando o querosene «gazeificado», um quasi nada de fumaça se pode notar nos pinteiros. Havendo cui-

(Conclusão na página 50)

FRANGOS PARA CONSUMO

CRIAÇÃO EM BATERIAS

A criação de frangos vai ganhando, a cada dia que passa, novos animadores. Haja visto o preço dos frangos durante as festas. É que se enraiza o hábito de intercalar o consumo de carne de bovinos, com a de frango ou de galinha, e com isso a demanda de frangos cresce, num volume que não é acompanhado pela produção nas granjas. Todavia, esperamos para breve a estabilização da criação de frangos para o corte, como uma verdadeira indústria, em nosso meio.

Ponto importante, na obtenção de lucros certos com os frangos para o corte, é a regularidade de produção, em lotes semanais, como numa verdadeira "linha de montagem". O sistema mais indicado para tal criação é o confinamento dos frangos em baterias metálicas, desde um dia até 8 ou 12 semanas de idade.

O sistema de criação de frangos em baterias, apresenta as seguintes vantagens: 1.º) as baterias permitem a criação em "linha de montagem", com número exato de pintos a entrar por semana e outro tanto "engordado", pronto para o corte, todas as semanas; 2.º) a coccidiose e outras doenças, transmitidas pelos excrementos, são perfeitamente domináveis, sendo mínima a mortalidade, e maior o rendimento em peso e menor o tempo; 3.º) até 10 a 12 semanas de idade, os pintos criados em baterias se desenvolvem mais rapidamente do que os pintos criados no chão, com piso de cavacos de madeira ou outra qualquer "cama"; 4.º) os frangos criados em baterias apresentam maior uniformidade no peso e no aspecto exterior, além de car-

ne mais tenra, apropriada para «assar» ou «churrasquear»; 5.º) os frangos criados em baterias convertem a ração em peso mais eficientemente do que os frangos criados em «cama», o que se traduz em produção mais econômica de carne; 6.º) a criação de frangos em baterias permite o aproveitamento máximo de instalação coberta, ou seja, tres vezes mais por área, do que os frangos criados em «cama».

Assim, pode-se concluir que o sistema de criação de frangos em baterias, é indicado; 1) para a produção de frangos leves, próprios para «assar» ou «churrasquear»; 2) para as zonas próximas dos grandes centros consumidores, onde a demanda de frangos «tenros» é contínua e semanal; 3) nas regiões onde o preço dos terrenos exija o aproveitamento máximo das instalações.

EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA A CRIAÇÃO DE FRANGOS EM BATERIAS

O comércio de frangos para o corte é feito a partir dos chamados: "frangos de leite", com 45 dias de idade aproximadamente e com limite máximo de 10 ou 12 semanas de idade. Por isso, o equipamento necessário à criação de frangos para o corte, abrange: 1) baterias de equipamento ou iniciais, para a criação até quatro semanas de idade; 2) baterias de crescimento sem calor, para a criação de 4 a 8 semanas; 3) baterias de acabamento ou de "engorda" para a criação depois de oito semanas.

A lotação das baterias, será desenvolvida na seguinte proporção: 1) inicial — até 4 semanas — 50 pintos por metro²; 2) crescimento — de 4 a 8 semanas — 30 pintos por m²; 3) engorda — de 8 a 12 semanas — 25 frangos por m².

ALOJAMENTO DAS BATERIAS

As baterias serão alojadas em cômodos apropriados ou então, aproveitam-se instalações fóra de uso.

O conjunto ideal para a criação de frangos em bateria, exige: 1) sala inicial — baterias de aquecimento até 4 semanas; 2) sala de crescimento de 4 a 8 semanas; 3) sala de engorda de 8 a 12 semanas.

Dentro desse esquema a criação se desenvolverá tecnicamente, de acordo com as condições do meio, mais indicadas para cada idade dos pintos e frangos.

A temperatura ambiente poderá ser estabelecida da seguinte forma: 1) sala inicial — 19 a 22° C; 2) sala de crescimento — 16 a 19° C; 3) sala de engorda — 13 a 16° C.

A indicação mais acertada é criar os

Bateria quente para 1.000 pintos, até 15 dias. Aquecimento elétrico e controle automático da temperatura permitem o desenvolvimento seguro e eficiente dos pintos. Gentileza de Indústrias Albar.

pintos com o mínimo de temperatura que possam suportar e a maior quantidade de ar fresco.

A iluminação das salas deve ser abundante, dada a importância de luminosidade no desenvolvimento dos pintos. A iluminação artificial também se deve recorrer para estimular o consumo de ração, à noite.

O espaço necessário para o alojamento das baterias deve proporcionar certo conforto para o manejo das bandejas, pisos e outros serviços de limpeza.

Recomenda-se que o forro da sala inicial seja colocado a 2,30 metros do piso da sala, provido de uma abertura de 60 x 60 cm, com porta regulável, para a extração do ar viciado. As demais salas não serão forradas.

Nas criações até 100 frangos por semana, as baterias poderão ser alojadas em um só compartimento, tendo-se o cuidado de colocar a bateria inicial no canto mais protegido da sala.

MANEJO EM GERAL

Os aquecedores das baterias deverão proporcionar as seguintes temperaturas de criação: 1a. semana — 35°; 2a. semana — 32° C; 3a. semana — 29° C. c finalmente — 4a. semana — 26° C.

Os pintos fornecem indicações sobre a temperatura: se houver excesso de calor, ficam à distância dos aquecedores; se houver deficiência de aquecimento, formam bolos e plam seguidamente.

A limpeza das baterias deverá ser diária. As bandejas coletoras de esterco poderão receber leve camada de serragem ou folhas de jornal. Assim, a limpeza será facilitada.

Os pintos devem ser colocados durante o dia, nas baterias com aquecimento, depois de regulada a temperatura; sobre o piso telado, será colocada uma folha de papel grosso ou de papelão, onde se espalha um punhado de ração ou quirera fina de milho. Isto durante dois dias, aproximadamente.

ALIMENTAÇÃO

A alimentação dos pintos em bateria deve ser cuidadosamente balanceada. Po-

Bateria metálica fria para 200 frangos, até 90 dias de idade. Gentileza da Companhia Avícola São Paulo.

demos apontar a seguinte mistura: fubá de milho — 45 kg; farelo grosso de trigo — 10 kg; farelino de trigo — 17 kg; farinha de carne — 50% — 10 kg; farelo de amendoim — 12 kg; farinha de sangue — 2 kg; farinha de ossos — 1 kg; ostra fina — 1½ kg; sal fino — ½ kg. Juntar um bom concentrado de vitaminas e sais minerais da praça.

Os comedouros deverão receber ração pela manhã, ao meio dia e à tarde, sempre pela metade. Nunca encher os comedouros.

A ração será a mesma, até o fim da engorda. Porém, de 8 a 12 semanas, poderá ser fornecida uma ração suplementar de quirera de milho, de 25% da mistura fornecida. Verdes picados, leite desnatado ou outros alimentos acessórios poderão ser dados, pois favorecem a criação.

CUIDADOS GERAIS

A vacinação contra a boubá e difteria aviária deverá ser feita com 21 dias de idade, ainda nas baterias com aquecimento.

O canibalismo aparece somente quando há super-lotação das baterias ou excesso de calor. Isolar os pintos picados,

pincelando com solução de azul de metileno (2%) e fenicado a 5%. Um grande recurso contra o canibalismo é a aveia moída com casca, na proporção de 5% em mistura com a farelada. O escurecimento das salas também dá bons resultados.

Para estimular o consumo de ração, melhor resultados é conseguido, quando se iluminam as salas de três em três horas.

A limpeza geral é conseguida entre os períodos de criação, pela lavagem ou escaldamento das baterias e secagem ao sol. Pintura anual com tinta de alumínio. Calafiação das paredes com cal e sódica cáustica a 3%.

No caso de surto de moléstia do aparelho respiratório, fumigar as salas com permanganato de potássio e formol comercial, na proporção de 12 cc de formol e 6 gramas de permanganato de potássio, por metro cúbico de sala. Molhar o piso e fechar a sala durante 10 minutos, pelos menos.

A umidade do ambiente também é importante: pintos criados com ar muito seco apresentam aspecto tristonho, com deficiência de empenamento e crescimento desigual.

A umidade pode ser mantida na seguinte base: 1) sala inicial — 70%; 2) salas de crescimento e de engorda — 60%.

A "Revista dos Criadores", contribuindo para o desenvolvimento da criação de frangos para o corte, em baterias, lança três planos especiais, a saber:

Plano A ou "Chácara" — na base de 10 frangos por mês, que exige apenas um cômodo de 3 x 4 metros, para alojar uma criadeira para 100 pintos, uma bateria de crescimento para 150 frangos e uma bateria de engorda para 120 frangos.

Plano B ou "Granja" — na base de 100 frangos por semana, exigindo uma sala de 12 x 6 metros, para alojar uma bateria inicial para 500 pintos, 3 baterias de aquecimento para 150 frangos cada e 4 baterias de engorda para 120 frangos cada.

(Um cômodo de ração anexo de 2 x 6 metros, será muito útil para o manejo da farelada.)

Plano C — "Industrial" — na base de 500 frangos por semana, exigindo um galpão de 30 x 8 metros, com 3 divisões de 5-10 e 15 x 18 metros cada, para alojar 5 baterias iniciais de 500 pintos cada, 10 baterias de crescimento para 150 frangos cada e 15 baterias de engorda para 120 frangos cada.

Um anexo de 3 x 8 metros, como quarto de ração e de material de uso, é necessário para facilitar as operações de trato e manejo.

A fumigação das chocadeiras no combate à difusão de perigosas doenças das aves

A importância prática do combate à difusão das doenças das aves, por meio da desinfecção das chocadeiras, vem sendo salientada em todos os países de avicultura organizada e progressista. Porque, em algumas doenças, os ovos postos pelas aves podem vir contaminados pelos agentes causadores dessas mesmas doenças, em extensão variável. Os pintos nascidos de ovos contaminados poderão infectar os pintos nascidos de ovos sadios, nas câmaras de eclosão.

As doenças conhecidas como «transmitidas pelos ovos» ainda representam sério embaraço ao desenvolvimento da avicultura em nosso País. A pulrose, o tifo e o paratifo são temidos pelos que produzem pintos de um dia nas Centrais de Incubação. Aliás, outras doenças, igualmente temidas, podem ser transmitidas pelas câmaras de eclosão, como a bronquite infecciosa, a laringo-traquite, a onfalite, a doença de Newcastle e a moléstia crônica respiratória. Os agentes causadores dessas doenças circulam nos nascedouros, pela movimentação do ar, forçado pelos ventiladores, carregados pela penugem dos pintos nascidos, que secam rapidamente, logo após a saída da casca. Em verdade, a penugem dos pintos é um dos grandes responsáveis pela disseminação das doenças transmitidas pelos ovos, nas câmaras de eclosão, figurando no rol com outros detritos e resíduos da incubação, como cascas de ovos, embriões mortos, etc, igualmente perigosos na difusão de doenças nas Centrais de Incubação.

Diante de fatos comprovadamente decisivos na difusão de doenças de alta capacidade infecciosa e mortalidade elevada, cresce de importância a gerência dos serviços de incubação artificial, nas chamadas Centrais de Incubação, quer se trate de incubações pequenas, quer de produção industrial de pintos.

A DIFUSÃO DAS DOENÇAS NAS CHOCADERIAS

A disseminação de doenças nas chocadeiras deve ser combatida em ampla assistência técnica. A fumigação das chocadeiras não mata os germes dentro dos ovos ou nos órgãos dos pintos. É apenas parte de um programa básico, que compreende as seguintes providências: 1.º) exame das aves-reprodutoras para pesquisa de portadores de doenças e estado geral de saúde, o que é decisivo no caso de pulrose, tifo e lesões visíveis de neuroinfomatose; 2.º) limpeza e remoção rápida de todos os detritos das salas de incubação; 3.º) higienização dos nascedouros e gavetas de eclosão.

A execução honesta e eficiente deste programa, torna possível a produção de pintos, com a máxima garantia de sanidade.

BASES PARA A FUMIGAÇÃO DAS CHOCADERIAS

A fumigação das chocadeiras é realizada pela ação oxidante do permanganato

de potássio sobre o formol, que provoca o desprendimento ativo de vapores de formaldeído. A ação destes vapores foi estudada por diversos pesquisadores, que chegaram às dosagens mais indicadas para os diversos programas de fumigação. As proporções de permanganato de potássio e de formol devem ser exatamente as recomendadas, afim de que realmente se obtenha um resultado eficiente da fumigação. Uma concentração deficiente de gás pouca ação terá sobre os agentes causadores de doenças, assim como uma dosagem excessiva poderá prejudicar a capacidade de eclosão dos ovos e o estado geral dos pintos no nascedouro.

As dosagens de permanganato de potássio e de formol aprovadas para eficiente fumigação, são as seguintes, por metro cúbico de câmara de incubação ou de nascedouro:

Câmaras de incubação e nascedouros vastos — gavetas:
 Permanganato de Potássio .. 27 g
 Formol Comercial 54 cc

Ovos nas câmaras de incubação e nos nascedouros:
 Permanganato de Potássio .. 18 g
 Formol Comercial 36 cc
 Pintos nascendo:
 Permanganato de Potássio .. 9 g
 Formol Comercial 18 cc

A cubagem das chocadeiras é obtida pela multiplicação do comprimento pela largura e pela altura.

QUANDO PROCEDER A FUMIGAÇÃO

A fumigação das chocadeiras poderá obedecer ao seguinte esquema:

1.º) ovos nas câmaras de incubação: uma fumigação a cada 15 dias, tendo o cuidado de evitar o tratamento de ovos com menos de 8 dias de incubação, podendo, assim, as câmaras de incubação ser mantidas desinfetadas e baixar a contaminação da casca dos ovos, das gavetas, paredes e anexos da chocadeira; 2.º) nascedouros vasios, com gavetas: antes de cada transferência dos ovos ou depois de cada eclosão, após rigorosa lavagem do nascedouro e das gavetas, uma fumigação; 3.º) ovos transferidos para o nascedouro; 4.º) pintos nascendo, isto é, quando 5 a 10% estiverem fóra da casca, uma fumigação; quando se tratar de Centrais de Incubação, que trabalhem com ovos de cooperadores ou por compra, nova fumigação dos pintos, 6 a 12 horas da primeira.

CONDIÇÕES TÉCNICAS DAS CHOCADEIRAS

As chocadeiras (câmaras de incubação e de eclosão) devem enquadrar-se nas seguintes bases:

Temperatura 100° F.

Umidade 90° F. direta ou 68% relativa.

Terminada a fumigação, voltar ao controle normal.

DURAÇÃO DA FUMIGAÇÃO

Chocadeiras e nascedouros, vasios e com gavetas — Mínimo de uma hora, ou melhor, tres horas.

Ovos no nascedouro ou na câmara de incubação — 30 minutos.

Pintos nascendo — 10 minutos.

As fumigações serão feitas com os ventiladores fechados. Depois do tempo indicado, abrir os ventiladores na abertura normal. As portas serão abertas, quando necessário, decorridas tres horas da fumigação.

A fumigação das chocadeiras e das salas de incubação, com vapores de formol, é decisiva para o controle das salmoneloses das aves. Vista da Central de Incubação da Cooperativa Central Agrícola Sul-Brasil, nesta Capital.

AVICULTURA

Material Avícola
"SÃO PAULO"

MODERNO E EFICIENTE

Compre na

FABRICA

Seus lucros SERÃO MAIORES

• INCUBADORAS elétricas tipo cápsula para 1.050, 2.400, 3.600, 5.400 e 9.500 ovos.

• CHOCADEIRAS com viragem mecânica para 100, 200, 300, 400 e 600 ovos.

• BATERIAS metálicas "inicial" para 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800 e 1.000 pintos até 1 mês.

• BATERIAS metálicas "crescimento" para 120 e 200 aves até 3 meses.

• CRIADEIRAS semi metálicas para 50 e 100 pintos.

• "GRANJINHA PAULISTA" - interessante novidade para a criação caseira de frangos para consumo.

• CAM. ANULAS para 500 e 1.000 pintos, a carvão, eletricidade, querosene e gas engarrafado.

• ENGRADADOS para ovos "amparo" para 10, 15, 20 e 30 dias de ovos.

• CLASSIFICADORES para ovos. Separa os tipos especial, A, B, e D.

Consulte-nos sem compromisso.

UNICOS FABRICANTES

COMPANHIA AVÍCOLA SÃO PAULO

RUA 25 DE JANEIRO, 233 - SÃO PAULO

NOSSOS 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA AVÍCOLA SÃO A SUA GARANTIA.

COMO PROCEDER A FUMIGAÇÃO

Alguns cuidados devem ser tomados para uma fumigação eficiente:

1.º) Calcular o volume da chocadeira e do nascedouro.

2.º) Colocar a temperatura a 100° F.

e a umidade direta a 90° F. ou 68% relativa.

3.º) Colocar o permanganato de potássio em recipiente, com capacidade dez vezes superior ao total a ser usado. O recipiente pode ser de chapa ou melhor de vidro «Pyrex», como bordas altas.

4.º) O recipiente deve ser colocado no centro da câmara de incubação e do nascedouro, na direção dos ventiladores, nas chocadeiras grandes, podem ser colocados dois recipientes ou mais.

5.º) Derramar o formol sobre o permanganato de potássio e fechar rapidamente a porta. O gás formaldeído desprende-se instantaneamente.

6.º) Não abrir as portas antes de passadas tres horas da fumigação.

7.º) Não fumigar os ovos nas câmaras de incubação, antes de 96 horas após o carregamento.

8.º) Fumigar os pintos somente 48 horas depois de nascidos.

Nas condições previstas, a fumigação das chocadeiras e o poderoso auxiliar na luta contra perigosas doenças das aves, principalmente agora, quando novas doenças são identificadas entre nós, como a doença de Newcastle, a moléstia crônica respiratória e a própria bronquite infecciosa.

Este aspecto sanitário da produção industrial de pintos define a posição e a responsabilidade das Centrais de Incubação, no combate às doenças transmitidas pelos ovos galados.

REVISTA DOS CRIADORES

Quatro dos fatores que aumentam decisivamente os lucros na avicultura são: menor consumo de ração, menor mortalidade das aves, melhor pêso das aves, maior postura, e todos êles são proporcionados por AVEVITA, que obtém das aves o máximo rendimento.

TRABALHE COM SEGURANÇA EM AVICULTURA

**Moinho
Fluminense S.A.**
Fundado em 1887

Rio: Rua Uruguaiana, 118 - Loja - C. P. 1350 — Tel. 43-3906
S. Paulo: Rua Boa Vista, 314 - 4.º - C. P. 260 — Tel. 33-3164
B. Horizonte: Av. dos Andradas, 841 - C. P. 143 — Tel. 2-2622

Credenciada pela Associação Paulista de Avicultura

Pintos nascidos com reservas de vitaminas têm importância decisiva no êxito da criação inicial

Na criação racional de aves a produção de pintos de um dia é a base da renovação e multiplicação dos lotes em exploração e do abastecimento contínuo dos "frangueiros" para a produção industrial de frangos de corte.

Apesar da expansão das Centrais de Incubação em nosso meio, pouca gente medita na grande responsabilidade dessa atividade, produtora da "semente-avícola" que é o pinto de um dia.

Naturalmente, todos quantos se dedicam à produção ovela comercial ou à criação de frangos de corte desejam obter o máximo rendimento econômico de sua granja. Ninguém se dedica à avicultura para perder dinheiro. No entanto, a mortalidade entre os pintos, desanimada, em muitas regiões avícolas do País.

Pouco de lado diversos fatores da própria criação, o Instituto Biológico de São Paulo tem diagnosticado, com grande frequência, a fraqueza geral ou mesmo a inviabilidade inicial, como causadora da mortalidade entre os pintos. Isto, após exame de laboratório não ter revelado origem infecciosa nas mortes. A expressão "pinto fraco" está praticamente incorporada ao vocabulário dos avicultores. Morrem nos primeiros quinze dias de vida ou, quando sobrevivem, apresentam crescimento retardado e empimento deficiente.

Em muitas regiões avícolas, os criadores compram o dobro dos pintos necessários para obter o número desejado de frangos destinadas à renovação dos lotes.

COMO ENFRENTAR ESSE ASPECTO NEGATIVO DA CRIAÇÃO DOS PINTOS?

Sabe-se que a mortalidade inicial entre os pintos decorre de uma série de fatores da própria criação, tais como alojamento, aquecimento, alimentação, trato e manejo, em associação estreita com o valor próprio de cada pinto. Portanto, o problema da mortalidade inicial deverá ser enfrentado com base no melhoramento das condições de criação e do valor biológico dos pintos. O melhoramento das condições deve ser promovido pelos próprios avicultores, porém, o do valor biológico é da alçada exclusiva das Centrais de Incubação. Isto porque, praticamente 90% dos avicultores se abastecem nas Centrais de Incubação, comprando pintos de um dia para suas criações.

O melhoramento das condições biológicas

próprias de cada pinto é obtido através das seguintes medidas: a) inter-cruzamento da linhagens dentro da mesma raça ou pelo cruzamento simples entre duas raças diferentes; b) administração de vitaminas básicas, em altos níveis, na ração das reprodutoras.

VITAMINAS BÁSICAS E VITALIDADE DOS PINTOS

A alimentação das poedeiras-reprodutoras deve ser encarada pelas Centrais de Incubação como agente dos mais importantes para melhorar a vitalidade dos pintos, porque, depois de nascidos estes somente contarão com os fatores próprios da criação inicial, em muitos casos atuando de maneira depressiva. Nessa fase da criação, podem ser considerados como fatores depressivos: excesso de calor nas fontes de aquecimento; debilidade; doenças; vacinações diversas; superlotação dos pinteiros, deficiências no trato e no manejo dos pintos. Se estes não possuírem uma reserva de vitaminas para suportar a ação adversa de tais agentes, a mortalidade será proporcional ao valor biológico de cada pinto. Na prática, a verificação desse fato leva ao desespero centenas de compradores de pintos de um dia. Daí, a responsabilidade das Centrais de Incubação na venda de pintos de um dia, nascidos de ovos de reprodutoras, alimentadas com rações deficientes em vitaminas básicas.

QUAL O FUNDAMENTO BIOLÓGICO QUE RESPONDE PELA RESERVA DE VITAMINAS NOS PINTOS DE UM DIA?

Durante os 21 dias de incubação, os embriões se desenvolvem exclusivamente à custa do próprio ovo. A clara é utilizada totalmente na formação dos pintos, ao passo que 25 a 35% da gema deixam de ser aproveitados. Sabendo-se que uma gema pesa 20 g haverá uma sobra de 5 a 7 g, na forma de um pequeno saco. Fato de larga expressão biológica é a passagem desse pequeno saco de gema para a cavidade abdominal dos pintos, no 18.º dia de incubação.

Quais as conclusões práticas dessas constatações biológicas?

Primeiramente, devemos salientar que, uma vez posto o ovo, nada resta fazer. Os embriões aproveitarão exatamente o que existe no ovo. Em segundo lugar, o saco de gema, com 5 a 7 g de material, funciona como reserva nutritiva durante a primeira semana de vida dos pintos. Pois, esse saco liga-se ao intestino e o seu conteúdo é absorvido, passando diretamente para a corrente sanguínea e desaparece depois de seis dias.

COMO SE PROCESSA A RESERVA DE VITAMINAS NO CORPO DOS PINTOS?

Sabe-se que os ovos são formados à custa dos alimentos consumidos pelas poedeiras. Portanto, grande parte dos nutrientes se transferem da ração para os ovos, enquanto outra parcela se incorpora ao organismo das poedeiras, para suprir suas necessidades vitais.

As vitaminas básicas, ou aquelas cujo potencial elevado determina maior produtividade das aves, desempenham papel decisivo na vitalidade dos embriões e dos pintos de um dia.

Provas experimentais têm revelado amplamente dois fatos biológicos importantes: a) as vitaminas se transferem da ração para o organismo das aves e para os ovos postos; b) a quantidade de vitaminas armazenada pelos ovos varia de acordo com o total das mesmas na ração.

(Conclui na página 27)

A suplementação das rações, com vitaminas em níveis elevados, garante o nascimento de pintos com reservas dessas vitaminas e é fundamental para a produção de pintos fortes e saudáveis.

Sendo os pintos formados do conteúdo dos ovos, é fácil compreender que a reserva de vitaminas no corpo dos pintos depende da quantidade destas nos ovos.

As reservas vitamínicas dos pintos se localizam no fígado e no saco de gema. No entanto, o aproveitamento das diversas vitaminas durante o desenvolvimento do embrião, difere de uma para outra. A vitamina B1 e o ácido pantotênico, que parecem ligados á formação da hemoglobina, mantêm-se nos mesmos níveis até o final da incubação. O mesmo sucede com a vitamina B2 ou riboflavina e a biotina.

Particularidade interessante verificada durante o desenvolvimento embrionário, é a capacidade do embrião sintetizar o inositol e o ácido nicotínico.

As vitaminas lipo-solúveis têm sido pouco estudadas em seu metabolismo durante o desenvolvimento embrionário. Sabe-se que o embrião de 14 dias contém 6,3% do total de vitamina A do ovo e que o conteúdo de vitamina A da gema baixa de 45%, na segunda e terceira semanas de incubação.

Desde que o embrião pode sintetizar vitaminas, o interesse prático do avicultor está nas provas experimentais, que revelam a passagem das vitaminas para o embrião e suas consequências imediatas no período inicial da criação.

Sob este aspecto, não há dúvida quanto ao valor da reserva de vitaminas no corpo dos pintos, como fator decisivo para o êxito da criação inicial.

A VITAMINA A DA RAÇÃO DAS POEDEIRAS-REPRODUTORAS E O RESULTADO DA CRIAÇÃO INICIAL DOS PINTOS

O departamento de Ciência Avícola do

Colégio do Estado de Washington, E.U.A., alimentou poedeiras-reprodutoras com rações contendo diversos níveis de vitamina A, a partir de zero unidades, e criou os pintos delas nascidos, com ra-

O U.I. de vit. A p/k de ração	0% de eclosão
1.750 U.I. de vit A p/k de ração	7,3 dias de sobrevida
3.300 " " " 2 "	8,3 " "
7.000 " " " " "	19,2 " "
14.000 " " " " "	44,7 " "

As conclusões são claras e evidentes. As poedeiras-reprodutoras precisam receber níveis mais elevados de vitamina A para aumentar as reservas nos pintos e, com isso, determinar maior vitalidade e resistência destes fatores depressivos.

Dados obtidos na prática indicam que uma ração de poedeiras-reprodutoras deverá conter no mínimo 10.000 U.I. de vitamina A por quilo de farelada, ou seja um milhão de U.I. para 100 quilos de ração.

De um modo geral 32% do total de vitamina A de uma ração se transferem para a gema dos ovos. Nessa dosagem, será possível obter, tanto os melhores resultados da incubação, como o nascimento de pintos com ótimas reservas de vitamina A.

VITAMINA D E CALCIFICAÇÃO DOS PINTOS

As provas experimentais revelam que os pintos, durante os dez primeiros dias de vida, necessitam mais da vitamina D de suas reservas do que da mesma vitamina presente na ração inicial.

É sabido que, após 14 dias, os pintos devem dobrar o peso que tinham ao nascer. Esta prova biológica atesta a importância da reserva de vitamina D nos

ções deficientes de vitaminas A. O controle da idade em que os pintos morriam dava o índice de vitalidade ou sobrevida. Os resultados obtidos foram os seguintes.

pintos, depois de eclosão, para atender ao crescimento e á calcificação.

Pesquisadores do Colégio Estadual da Pensilvania, E.U.A., alimentaram poedeiras-reprodutoras com diversos níveis de vitamina D e analisaram os ossos dos pintos nascidos, com uma semana de criação, registrando os seguintes resultados:

U.I. de vit. D p/ 100 g de ração	U.I. vit. D p/ gr. de gema	Porcentagem de cinzas de ossos
19	0,32	39,2
39	0,54	39,2
58	0,68	42,1
78	0,68	43,1
310	5,40	47,2

Tomando por base esses resultados, verifica-se que as poedeiras-reprodutoras devem receber um mínimo de 200 U.I. por 100 gramas de ração ou 200.000 U.I. por 100 kg de farelada. Este é um nível de alta expressão biológica e, ao mesmo tempo, económico.

De qualquer maneira, a vitamina D apresenta maior capacidade de transferência da ração para os ovos. Assim sendo, se necessário, o nível de vitamina D poderá ser elevado para possibilitar a produção de ovos ricos dessa vitamina.

REGISTRO NO DEP. DE ASSISTÊNCIA AO COOPERATIVISMO EM 1/9/1939 - Carta N. 76

REGISTRO NO SERVIÇO DE ECONOMIA RURAL SOB N.º 629 EM 28/7/1939

Cooperativa Agrícola Mista de Mogi das Cruzes

Sede: RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 34 — CAIXA POSTAL, 5 — TEL. 366

MOGI DAS CRUZES — E. F. C. B. — ESTADO DE SÃO PAULO

ENTREPOSTOS

SÃO PAULO

Rua Senador Queiroz, 537 — Tel. 33-7614
Mercado Municipal - Rua N. 42 - Tel. 32-9886

SUZANO

R. Pinheiro Fróes, 331 - Tel. 16

RIO DE JANEIRO

Pavilhão 4 — Lado Externo Ns. 176/180
Merc. Municipal — Tels.: 52-5168 e 42-0222

DEPÓSITOS

OURINHOS — Rua Duque de Coxias, 429 — Telefone 114 — MALU — P. R. RUA ARARUNA 5

Fábrica de Rações para Aves

COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA SUL-BRASIL

CENTRAL DE INCUBAÇÃO — FABRICA DE RAÇÕES — ENTREPOSTO DE OVOS — CAMARAS FRIGORÍFICAS PARA OVOS — GRANJA DE SELEÇÃO AVICOLA — DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AVICULTURA

**SÉDE: Rua Américo Brasiliense, 419 — Telefone: 37-1556
SÃO PAULO**

VITAMINA B2 OU RIBOFLAVINA EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E VITALIDADE DOS PINTOS

A vitamina B2 ou riboflavina tem influência decisiva no desenvolvimento dos embriões e no crescimento dos pintos, nos primeiros 14 dias de vida. A capacidade de transferência dessa vitamina para os ovos é menor do que a das vitaminas A e D. Por isso, o seu total existente no ovo se mantém estável no período de incubação, ativando o metabolismo celular e prevenindo o amolecimento dos tecidos nervosos.

Experiências provaram que a melhor dosagem de vitamina B2 na ração das poedeiras-reprodutoras varia entre $\frac{1}{2}$ a 1 grama por 100 kg de ração.

Quando se emprega uma grama de vitamina B2 em 100 kg de ração, obtém-se a transferência máxima para os ovos, concentrando-se na clara cerca de 58% do total. Nessa base, consegue-se: a) concentração máxima de vitamina B2 nos ovos, acima de 40% do total conhecidos; b) reserva, no fígado e no saco de gema, capaz de prevenir anormalidades nervosas e a paralisia do dedo torcido, mesmo com aquecimento por lampadas de infra-vermelho; c) reserva em quantidade suficiente para garantir o desenvolvimento máximo dos pintos até o fim da 4a. semana; d) eclosão dos ovos nas porcentagens mais elevadas, com resultados contínuos e uniformes, devida a reserva que se forma no corpo das poedeiras-reprodutoras; e) diminuição

da mortalidade embrionária e ausência de pintos defeituosos.

No entanto, é interessante salientar que, embora uma suplementação média de vitamina B2 possa determinar uma boa decisão, este resultado não significa que os pintos disponham de reserva dessa vitamina.

Dada a menor capacidade de transferência da ração para os ovos, as reservas mais eficientes são obtidas a partir de meia grama de vitamina B2 por 100 kg de ração.

VITAMINA B12 EM RELAÇÃO AOS RESULTADOS DA INCUBAÇÃO E AO CRESCIMENTO DOS PINTOS

A vitamina B12, em rações pobres de proteína de origem animal ou livres desse elemento, estimula o crescimento dos pintos e melhora os resultados da incubação.

A vitamina B12, também passa da ração para os ovos, concorrendo para o nascimento de pintos com reservas vitamínicas. Em experiências, foram obtidos melhores resultados de incubação e maior desenvolvimento dos pintos, a partir de 5 miligramas de vitamina B12 por tonelada de ração. Com 10 miligramas por tonelada de ração alcançaram-se resultados ainda mais expressivos. Finalmente, um alto nível de 20 miligramas para mil quilos de ração proporcionou a eclosão máxima dos ovos embrionados e reservas suficientes para os pintos suportarem rações iniciais defi-

cientes de vitamina B12 e os fatores depressivos.

Portanto, tendo por base essas provas, a ração para poedeiras-reprodutoras deve conter no mínimo 1 miligrama B12 por 100 kg de ração ou 10 miligramas por tonelada de farelada.

ÁCIDO PANTOTÊNICO E VITAMINA E NA RAÇÃO DAS POEDEIRAS- REPRODUTORAS

O ácido pantotênico é necessário para melhorar os resultados da incubação; além disso passa para os pintos, como reserva para atender às deficiências das rações iniciais.

Uma dosagem de 1,5 gramas de ácido pantotênico por 100 kg de ração permite uma reserva de 13 microgramas dessa vitamina, por grama de pinto nascido. Na prática, uma ração para poedeiras-reprodutoras deverá conter 2 gramas de Pantotenato de Cálcio, como reforço capaz de proporcionar os melhores resultados da incubação e permitir a reserva máxima no corpo dos pintos de um dia.

A vitamina E, conhecida também como complexo anti-esterilidade e anti-encefalomalácia, a par de sua função como vitamina lipossolúvel, atua como antioxidante biológico, sendo absorvida pela parede do intestino e depositada na gordura do corpo das aves. Sua transferência para os ovos garante o nascimento de pintos com reservas de vitamina

fatôres de
- CRESCIMENTO -
- ENGORDA -
- POSTURA -
- REPRODUÇÃO -
 reunidos em

SABLAMIX

SUPERCONCENTRADO à base de
VITAMINAS • ANTIBIÓTICOS • SAIS MINERAIS
AMINOÁCIDOS • ANTIOXIDANTE
para completar o balanceamento das rações avícolas

SABLAMIX 100
 Para pintos e frangos até 120 dias. Crescimento rápido e uniforme. Conversão recorde e máxima economia de ração.

SABLAMIX 200
 Para poedeiras. Postura precoce e mais persistente. Aves com melhor saúde e ovos mais nutritivos.

SABLAMIX 222
 Para reprodução. Maior fertilidade e melhor índice de eclosão, com pintos vigorosos e mais viáveis.

Imp. e Exp. Indust. e Com.
SABLA LTDA.

R. 15 de Novembro, 228 - sl 405 - Tels. 35-6025 e 35-6438
 End. Tel. "SABLALIMIT" - SÃO PAULO

"A RIQUEZA DA FAZENDA"

SR. AVICULTOR

Faça ainda hoje o seu pedido de SABLAMIX, na sua cooperativa, Assoc. Rural, nos revendedores no interior ou solicite-nos informações diretamente.

R. 15 de Novembro, 228 - sl 405 - Tels. 35-6025 e 35-6438 End. Tel. "SABLALIMIT" SÃO PAULO

Name.....
 Endereço.....
 Cidade..... Est.....

Os antibióticos não prejudicam os resultados da incubação dos ovos

Acreditam muitos avicultores que o emprego de antibióticos na ração das aves reprodutoras possa prejudicar os resultados obtidos na incubação artificial dos ovos das aves. Isso porque há tendência para admitir que os antibióticos quebram em parte as defesas das poedeiras e, com isso, enfraquecendo os embriões, fazem baixar o número de pintos nascidos.

No entanto, inúmeras provas experimentais e os resultados obtidos por diversos avicultores têm demonstrado exatamente o contrário.

Os controles têm revelado que mesmo quando se empregam antibióticos em al-

Níveis de aureomicina na ração	Total de aves controladas
0	202
50 g/tonelada	217
100 g/tonelada	78

Pelo exame do quadro pode se chegar à conclusão de que, mesmo em altos níveis, a aureomicina não prejudicou os resultados da incubação. Muito ao contrário, embora a diferença observada não seja significativa, as reprodutoras que receberam aureomicina em altos níveis apresentaram porcentagem mais elevada de pintos nascidos perfeitos.

Essa prova experimental é decisiva para demonstrar a eficiência dos antibióticos, em relação ao desenvolvimento embrionário.

Em resumo, os antibióticos contribuem para diminuir a mortalidade dos embriões dentro da casca dos ovos incubados.

Quanto ao emprego de antibióticos em níveis de nutrição, na ração das poedeiras reprodutoras, pudemos realizar uma prova prática no aviário do Parque da Água Branca, nesta capital. Constituímos dois lotes de 40 galinhas da raça New Hampshire cada um, com a idade de 12 meses e com seis meses de postura, com os respectivos galos. As poedeiras reprodutoras foram mantidas em galinheiros com «cama» e providos de parque gramados com grama «paulista».

A ração do tipo farelada total foi suplementada com 2½ kg de Aurofac (aureomicina) por tonelada de mistura ou seja 10 gramas de Aureomicina por 1.000

tos níveis, por períodos mais ou menos extensos, como cem dias por exemplo, os resultados da incubação não são prejudicados.

Podemos citar as provas experimentais realizadas pelo Departamento de Agricultura, dos Estados Unidos, na Estação Experimental de Glendale, no Arizona. Em plantéis de reprodução da raça Leghorn Branca, foram incubados ovos produzidos nos meses quentes do ano, com rações suplementadas com aureomicina, em níveis de 50 e 100 gramas por tonelada de ração. O quadro dá conta dos resultados obtidos.

Total de ovos incubados	Total de ovos férteis	Porcentagem de pintos nascidos
2.399	2.883	80,5%
987		83,0%
		86,0%

kg de ração. Essa farelada era fornecida a um dos lotes, ficando outro como testemunha, recebendo ração sem antibiótico. O consumo de ração foi controlado durante 60 dias da prova.

Do mesmo modo, a postura foi controlada durante 60 dias, nos meses de outubro e novembro de 1957. Os ovos foram incubados semanalmente, depois de selecionados previamente,

Vista do galinheiro de reprodução da Granja Tupy, pioneira no uso de antibióticos na ração das aves reprodutoras, que sempre obteve os melhores resultados na incubação, com essa prática. Nada foi observado que pudesse contraíndicar o seu uso nas rações de reprodução.

Os resultados obtidos, em sessenta dias de postura, foram os seguintes:

Lote Testemunha: 1.176 ovos ou 49% de postura.

Lote Aurofac: 1.353 ovos ou 56,5% de postura.

Quanto a incubação:

Lote testemunha	1.058
Ovos incubados	87,3%
% de fertilidade	75,6%
Ecloração s/total colocado	800
Total de pintos nascidos	

Lote Aurofac	1.247
Ovos incubados	87,6%
% de fertilidade	76,2%
Ecloração s/total colocado	950
Total de pintos nascidos	

Quanto ao consumo de ração, apuraram-se os seguintes dados:

Lote Testemunha 326 kg em 60 dias

Lote Aurofac 324 kg em 60 dias

Concluiu-se que o emprego da Aureomicina em níveis de nutrição, para aves reprodutoras se traduziu em maior eficiência na produção de pintos, tendo em vista uma postura 15,3% superior à das aves que não recebiam Aureomicina como suplemento na ração.

Como não alterou os resultados da incubação, foi maior o número de pintos, ou seja, mais uma fonte de lucros para os produtores de pintos de um dia.

Vejamos o que revela uma rápida demonstração econômica, com base nos resultados obtidos e os preços vigentes na praça.

O custo da suplementação com Aurofac (2½ kg por 1.000 kg de ração) ficou em Cr\$ 0,23 por kg de ração.

Como o lote Aurofac consumiu, em 60 dias da prova, 324 kg. de ração, teremos o custo extra de Cr\$ 74,52.

Todavia, o lote Aurofac produziu 150 pintos mais, que, ao preço de Cr\$ 10,00 por pinto, nos dão Cr\$ 1.500,00 mais.

Assim, com esses elementos, o balanço

(Continua na página 50)

A Furazolidona (na praça nf-180) constitui medicação segura contra surtos de pulrose em peruzinhos. — (Gentileza dos Laboratórios ISA).

COMO RECONHECER A QUALIDADE DOS PINTOS

livre de doenças...
maior
rendimento!

agora com BIFURAN, Rações SSB para pintos e frangos!

O alto rendimento de uma granja só pode ser garantido se os pintos e frangos estão a salvo das doenças que, frequentemente, os dizimam: coccidiose e pulorose.

As novas rações SSB aliam o seu reconhecido valor nutritivo, à poderosa proteção contra essas doenças.

Para pintos até um mês de idade, peça INICIAL com BIFURAN Para frangos de mais de um mês, peça CRESCIMENTO com BIFURAN.

Preparado por técnicos especializados e matéria prima selecionada.

Um
produto
da

SOCIÉTÉ DE SUCRERIES BRÉSILIANNES
Indústrias Anexas

Caixa Postal 97 — Telefones: 4475 e 4476
Piracicaba — Estado de São Paulo

COMO RECONHECER A QUALIDADE DOS PINTOS PELO EXAME DO EXTERIOR

Estamos em plena safra de pintos de um dia e por certo o nosso avicultor já tem sua encomenda feita em uma boa granja ou casa de incubação de reconhecido valor. Ademais, muitos principiantes tentam a avicultura, modestamente, mas com grande vontade de progredir.

É preciso começar bem — e isto representa nada mais, nada menos, do que começar com uma boa semente, como na agricultura. Na criação de galinhas, uma boa semente pode ser representada por pintos de um dia de qualidade.

Poderão os criadores, industriais ou principiantes, reconhecer, até certo ponto, pintos de boa qualidade, pelo seu aspecto exterior?

Respondemos que sim, desde que conheçam algumas características exteriores dos pintos.

PINTOS DE UM DIA

Ao receber sua caixa, ou caixas, com pintos de um dia, proceda da seguinte maneira:

1.º — Abra as caixas em um cômodo bem iluminado, sem correntes de vento. Poderá ser em mesa ou outro qualquer suporte, colocado dentro do pinteiro, casa-criadaira ou sala-bateria.

2.º — Se tiver uma balança, pese as caixas com os pintos e, depois de os retirar, desconte do peso obtido, o peso da caixa e sua tampa. Assim, terá obtido o peso dos pintos que recebeu e um primeiro índice de qualidade: cada lote de 100 pintos deverá pesar 3.600 gramas ou, no caso, 36 gramas por pinto. Aqueles que exploram a criação de frangos para o corte, poderão receber pintos de 34 gramas de peso ou 3.400 gramas cada 100 pintos.

3.º — Depois de pesados, transfira os pintos para a instalação onde vão ser criados. Examine-os um por um, com cuidado e atenção, procurando observar, cabeça e olhos, pernas e dedos, penugem, umbigo e cloaca.

a) Os pintos saudáveis têm cabeça bem desenvolvida e olhos salientes, grandes, brilhantes e bem redondos. Olhos com defeito: grudados ou pisados; olho saltado ou falta de um olho e finalmente, olhos muito pequenos. As vezes, podem apresentar deformações graves, como torcimento e cruzamento do bico.

b) Colocados de pé, os pintos devem permanecer direitos sobre as pernas, as quais devem ser fortes, de cor amarelada. Podem apresentar pernas e dedos torcidos, canelas finas e esbranquiçadas, tudo denotando falta de vigor.

c) A penugem deve apresentar-se solta, fofo e macia, em todo o corpo. A penugem grudada no corpo, ou aspera, e pouco abundante, revela, entre outras coisas, incubação imperfeita e reprodutores mal alimentados. A coloração da penugem obedece ao padrão da raça: Leghorn Branca, cremosa ou branca-amerlada, com a cor amarelada mais carregada, forma de manchas nos pescoço, coxas e na parte traseira da barriga dos pintos; New-Hampshire, castanho-avermelhada, variando da tonalidade bem clara à bem escura. Alguns pintos apresentam manchas escuras na cabeça e listas escuras nas costas, manchas próprias dos pintos fêmeas, em mais de 80% dos casos. Os pintos dessas duas raças têm bico, canelas e dedos de cor amarela, em diferentes tonalidades.

O orifício que se observa na parte traseira da barriga dos pintos, por onde passava o cordão umbilical que os alimentava dentro do ovo, recebe o nome de umbigo. Este, quando os pintos são saudáveis, deve estar bem cicatrizado e seco, quase como um ponto. Para observar bem, assopra-se a penugem da região. O umbigo avermelhado, úmido e saliente, quase como um botão, denota defeitos nos reprodutores e na incubação; além disso, é porta aberta aos microbios, que podem matar os pintos. E um dos mais graves defeitos dos pintos de um dia. A cloaca deve ser levemente

Classificando os pintos, pelo exame exterior e separando o sexo, na Central de Incubação da Cooperativa Central Sul-Brasil, esta Capital.

úmida; quando molhada, empastando a penugem ao redor, significa incubação irregular e, mesmo, falta de qualidade dos pintos.

Outros defeitos podem ser notados pelos mais experimentados, como penas nos dedos e canelas, brotos na crista e outras deformações.

Resumindo, diremos que os pintos, quando retirados da caixa, ao chegar, devem apresentar-se ágeis e vigorosos, olhos brilhantes e grandes, penugem e tamanho uniformes.

avevita

rações balanceadas e prensadas

F Moinho
Fluminense S.A.
Fundado em 1889

Rio: Rua Uruguiana, 118 - Loja - C. P. 1350 - Tel. 43-3906
S. Paulo: Rua Boa Vista, 314 - 4.º - C. P. 260 - Tel. 33-3164
Belo Horizonte: Av. dos Andradas, 841 - C. P. 143 e 463

Dir. Úber F. de

PESQUISA

E

PRODUÇÃO

*para
melhor saúde
dos animais*

AGORA um grande concentrado de VITAMINAS para ração:

MISTURA DE VITAMINAS FM-331

COM A MESMA GARANTIA DE QUALIDADE DOS SEGUINTE PRODUTOS VETERINÁRIOS:

NICRAZIN 12,5% — O melhor e o mais poderoso preventivo da coccidiose.

SULFAQUINOXALINA — Para adição à água ou à ração. Curativo e preventivo da coccidiose, cólera aguda e tifo.

DIHIDRO-ESTREPTOMICINA — No tratamento da coriza das aves e outras doenças dos animais em geral.

SUPLEMENTO DE VITAMINA B12 "44" MGS —
RIBOFLAVINA (Vitamina B2) —

{ Suplementos vitamínicos indispensáveis aos criadores para adição às rações de aves e suínos.

DÊ O MELHOR ÀS SUAS AVES E OUTROS ANIMAIS. INSISTA NOS PRODUTOS DE FAMA INTERNACIONAL DO DEPARTAMENTO VETERINÁRIO DA

MERCK SHARP & DOHME S.A.
INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA

Filial: RIO — Rua Clarisse Índio do Brasil n.º 15 — Tel.: 46-4187
LARGO PADRE PÉRICLES, 11

Caixa Postal 8734 — Telefones: 51-0104 - 51-0101 - 51-9119 - 51-9110 - 51-9141
SÃO PAULO

O VALOR NUTRITIVO DA CARNE DE GALINHA

A carne das aves, especialmente a da galinha doméstica, tem grande aceitação, devido ao seu excelente sabor, quando preparada convenientemente, segundo as diversas maneiras de tempêro e cozimento.

A escassez periódica de proteínas de origem animal, principalmente de carne bovina, faz voltar para as aves domésticas o interesse dos matadouros avícolas, frigoríficos e comerciantes, que buscam a ampliação dos seus negócios e preços remuneradores. Entre nós, o consumo de carne de galinha, que já representa um volume alentador, estimulando a produção intensiva de aves para corte, por certo se elevará ainda mais, graças ao aumento do poder aquisitivo do povo e à necessidade de variar o cardápio de nossas mesas. Por isso, será de interesse a divulgação de alguns aspectos do valor nutritivo da carne de galinha.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

A composição química da carne de galinha varia, segundo a idade da ave, além das variações naturais de analista para analista. No entanto, segundo as análises de vários pesquisadores, poderemos incluir a carne de galinha na categoria das carnes magras. O quadro anexo apresenta a carne de galinha em comparação com a de coelho, boi semi-gordo e porco magro.

A equivalência dessas carnes é patenteada pelas análises citadas no quadro apresentado.

PRINCIPIOS NUTRITIVOS DIGESTÍVEIS

Quanto à digestibilidade, a carne de galinha, em confronto com as diversas fontes de proteínas de origem animal

na alimentação do homem, se coloca em posição de inferioridade, embora seja empregada largamente na dieta dos doentes e convalescentes. Vejamos a porcentagem de princípios nutritivos digestíveis da carne de galinha, em confronto com a de outros animais:

Coelho	83,00 %
Porco	75,00
Carneiro	68,00
Boi	55,00
Galinha	50,00

VITAMINAS

A presença das diferentes vitaminas na carne de galinha vem sendo estudada por vários pesquisadores. Assim, na carne do peito, foi revelada a presença de 40 a 90 microgramas de Riboflavina (vitamina B2); nos músculos da perna, 70 a 740 microgramas de Riboflavina (vitamina B2); nos músculos em geral, 51 a 120 miligramas de Tiamina (vitamina B1) e 4 miligramas de Acido Ascórbico (vitamina C).

O fígado de galinha revelou-se excelente fonte de vitaminas: em cada 100 gramas de fígado, foi revelada a presença de 40.300 unidades internacionais de Vitamina A, 28 a 43,3 miligramas de vitamina C e 980 a 4.260 microgramas de Riboflavina (vitamina B2).

Elementos

Elementos	Coelho	Boi semi-gordo	Porco magro	Galinha
Água	67,96 %	72,20 %	71,00 %	69,40 %
Proteína	25,50	21,00	20,50	21,90
Gordura	4,01	5,50	7,50	5,00
Ext. não azotados	0,50	0,30	0,40	1,27
Sais	2,13	1,00	1,10	1,10

GRANJA TUPY

ITAPECERICA DA SERRA

PINTOS NEW HAMPSHIRE TUPY (CARNE E OVOS) E NICHOL'S TUPY (PARA CORTE) **PRODUTIVIDADE GARANTIDA E ALTA VITALIDADE**

A carne de galinha, pelo baixo teor de gordura e de colesterol, é recomendado para os dias de intensa atividade humana. Vive-se mais, comendo carne de galinha.

Convem ressaltar, no entanto, as extensas variações que tais análises revelam, pois, a presença de vitaminas de proporções varia segundo o teor das mesmas vitaminas nos alimentos ingeridos pelas aves.

VALOR ENERGÉTICO

O número de calorias, expresso pela energia produzida por 100 gramas de alimento, é um índice de valor, empregado no cálculo do balanceamento das rações

padrões. Dada a composição química das carnes de coelho, boi semi-gordo, porco magro e galinha, 100 gramas dessas carnes produzem calorias que se expressam nos seguintes valores:

Coelho	144,75
Galinha	142,62
Porco magro	142,35
Boi semi-gordo	140,00

Esses valores não representam índices absolutos, pois a composição química das

carnes varia segundo a idade do animal, o estado de carnes e a especialização zootécnica.

Todavia, podemos observar a equivalência dessas fontes de proteínas de origem animal, no que se refere ao valor energético.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Examinada do ponto de vista do valor nutritivo, a carne de galinha, em muitos pontos, equivale às diversas carnes de animais, empregadas pelo homem em sua alimentação diária.

Tendo em vista sua composição química, deduz-se que a carne de galinha é excelente fonte de proteína, além de fonte moderada de Riboflavina (vitamina B2), Tiamina (vitamina B1) e Ácido Ascórbico (vitamina C).

Justifica-se, portanto, seu largo emprego na cozinha, em pratos variados, grandemente apreciados pelo público consumidor. E assim chegamos às extensas cifras apresentadas pelo consumo de carne de galinha, em países de avicultura progressista e racionalizada, onde a produção em condições econômicas e a venda a retalho proporcionam, mesmo aos menos aquinhoados, o prazer de saborear uma boa porção dessa saborosa carne.

A luz artificial nos galinheiros, como recurso para aumentar a postura das aves, no fim do verão, outono e inverno

A iluminação artificial dos galinheiros, nas regiões situadas em latitude acima dos trópicos, com dias de pouca luminosidade, no outono e no inverno, é prática corrente e indispensável, para ativar a postura das poedeiras.

Acredita-se que o primeiro avicultor a iluminar os abrigos de postura, para aumentar a produção de ovos, nos meses do outono e do inverno, foi E. C. Waldorf, um médico dos arredores de Buffalo, no Estado de New York — E.U.A., em 1889. As primeiras provas experimentais, comprovando a ação da luz artificial no aumento da postura, devemos-las a J.G. Halpin, do Colégio Estadual do Michigan — E.U.A. em 1906. Daí para cá, as provas experimentais se sucederam naquele país, onde os galinheiros luzem nas noites longas e frias.

Em nosso meio, no fim do verão, no outono e no inverno, quando os dias se tornam mais curtos, com luminosidade inferior a dez horas por dia, o emprego da luz nos galinheiros de postura, ganha continuamente novos seguidores, ante os resultados positivos do aumento da postura.

Assim, é de interesse dos avicultores, o conhecimento de alguns pormenores sobre o estímulo biológico da luz à postura das aves.

COMO AGE A LUZ NA ATIVAÇÃO DA POSTURA

Admite-se hoje que o fotoperiodismo explique o mecanismo da ativação da postura das aves. O fotoperiodismo, descoberto em 1920 por Garner e Allard e nada mais é do que o fenômeno de resposta do desenvolvimento e da reprodução, relativo à duração dos períodos alternados de luz e de escuridão. A princípio parecia aplicar-se apenas ao desenvolvimento das plantas, mas logo se verificou também que aumenta a postura das aves. É que a luz ativa a pituitária, que pelo seu lobo anterior, secreta um hormônio gonadotrófico, responsável pelo estímulo aos órgãos de reprodução.

Recentes provas experimentais comprovaram que o estímulo à pituitária está associado aos períodos de luz e não à intensidade da iluminação e que a ativação hormonal está ligada à ação dos nervos que absorvem os raios visuais em cores.

TOTAL DE HORAS DE LUZ PARA ESTIMULAR A POSTURA

Aceita-se, como base ótima, o total de 14 horas de luminosidade por dia, para a ativação da postura das aves nos dias menos longos e de 16 horas, nos mais curtos do ano.

Parece ponto pacífico que a intensidade da luz não tem ligação direta com o estímulo da pituitária. A luz age apenas como fator físico ao impressionar os nervos sensoriais da visão, que levam os estímulos luminosos à pituitária, cujo lobo anterior secreta o hormônio gonadotrófico, ativador da ovulação das aves.

As provas experimentais têm comprovado a eficiência estimuladora da luz, nas seguintes intensidades; em períodos controlados de luz:

Luz branca — 60 watts cada 20 m² de abrigo.

Luz branca — 60 watts cada 20 m² de watts, sobre estrado-dormitório de 5 x 1 m, para 100 poedeiras, para um período de 8 horas de iluminação.

Quando a luz fica acesa a noite inteira, sua eficiência estimuladora se revela nas seguintes intensidades.

Luz branca — 15 watts cada 36 m² de abrigo.

Luz vermelha — 4 lampadas de 10 watts, sobre estrado-dormitório de 5 x 1 m, para 100 poedeiras.

São, pois, os raios longos de luz que agem estimulando a pituitária. Por outro lado, a luz azul ou verde, de ondas luminosas curtas, tem efeito depressivo sobre a postura das aves.

MONTAGEM DAS LAMPADAS OU CONJUNTO DE LAMPADAS

Luz branca — Quando se usam lampadas de 40 a 60 watts, luz branca, para cada 20 m² de galinheiro, devem-se suspender as lampadas à altura de 1,80 m sobre o piso, no meio do abrigo, em linha escalonada. Um refletor para cada lampada, de 40 cm de diâmetro e 10 cm de altura, ajuda a difusão da luz sobre os comedouros e bebedouros.

Assim, um galinheiro de 12 x 4 m, poderá ser equipado com 2 lampadas de 60 watts ou 3 lampadas de 40 watts, para iluminação em períodos controlados. Para iluminação à noite inteira, 2 lampadas de 15 watts, para as mesmas medidas do galinheiro.

Luz vermelha — Lampadas vermelhas de 15 watts cada uma, quando se ilumina o galinheiro das 20 horas às 4 horas da madrugada e lampadas de 10 watts, para iluminação à noite inteira. Lampadas colocadas sobre os poleiros, estrados-dormitórios ou ripados, obedecendo aos seguintes dados: a) altura sobre as aves — 45 cm; b) afastamento entre lampadas — 1,20 m; c) distancia máxima entre uma lampada e a extremidade dos poleiros, estrados-dormitórios ou ripados — 90 cm

Assim, um estrado-dormitório de 5 x 1 m com 4 lampadas, comportará 100 poedeiras.

PERIODOS DE LUZ

A iluminação dos abrigos de postura poderá ser realizada em diversos períodos controlados, a saber:

a) no começo da noite; b) de madrugada; c) no começo e no fim da noite, conjugados; d) em períodos intermitentes de luz e escuridão; fotoperíodos de 10 minutos, cada 90 minutos, por exemplo, desde o escurecer até o começo do dia; e) à noite toda.

QUANDO ILUMINAR OS GALINHEIROS

Os avicultores têm dois pontos de referência, como base para iniciar a temporada de luz nos abrigos: preço dos ovos e a queda ou estacionamento da postura. Depois de dezembro de cada ano. No entanto, as duas causas ou condições quase se superpõem, a partir do 1.º de fevereiro, quando podem ser notados elevação do preço dos ovos, e queda da postura. É chegada a hora de ativar a produção de ovos.

COMO PROCEDER PARA CONSEGUIR O MAXIMO DE RESULTADOS COM A LUZ ARTIFICIAL

As provas experimentais têm mostrado que a ação estimuladora da luz sobre a pituitária é instantânea, isto é, logo que se acendam as luzes. Mas, desde que o ovário já esteja na fase de «atresia folicular» ou seja com a parada evidente da postura, nada adiantará o estímulo da luz.

Básica são as providências seguintes: 1º) «limpa» dos galinheiros, afastadas todas as poedeiras com sinais evidentes de «fóra de postura» ou com sintomas de resfriados, coriza, etc.; 2º) verificação dos circuitos de iluminação e retirada da pó das lampadas; 3º) fazer que, no caso da iluminação de luz branca, as lampadas de 60 watts, a cada 20 m² de abrigo, ilustra claramente a equivalência dos sistemas de iluminação.

minem por cima dos comedouros e bebedouros; 4º) continuidade dos períodos de iluminação, pois, uma vez iniciada a temporada de iluminação, sua continuidade e regularidade assumem extrema importância, para se conseguir a maior porcentagem de postura; 5º) retirada da luz no fim da temporada de iluminação, reduzindo-se diariamente os períodos de luz, até nivelar os dias, com a maior porcentagem de postura das aves; 6º) quando se usam sistemas de iluminação, com luz branca e vermelha de baixa wattagem ou em fotoperíodos intermitentes, dar uma ração de quirera ou de rações prensadas, na proporção de 20 g por galinha, bem ao cair da tarde.

Em nosso meio, os galinheiros são iluminados até o fim de setembro, quando a primavera, com dias mais longos e luminosos, ativa naturalmente a postura.

QUAL O MELHOR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

A pituitária, em seu mecanismo de se-

MESES POSTURA EM %	POSTURA E LUZ ARTIFICIAL			
	SEM LUZ	LUZ VERMELHA — 10 WATTS		LUZ BRANCA — 60 WATTS
		30-34 (19%)	18-26 (12%)	3-11 (14%)
SET	59,0	64,3	61,9	63,3
OUT	61,7	60,3	69,6	74,8
NOV	53,2	66,6	72,4	68,8
DEZ	50,2	63,3	73,3	70,7
JAN	39,2	54,5	67,5	57,8
FEV	34,3	53,7	64,8	58,3
				59,4

A luz artificial nos galinheiros de postura é, para a nossa avicultura ovejira, um dos melhores e mais eficientes recursos para elevar a produtividade nos meses de fim de verão, no outono e no inverno.

O gráfico ilustra e apresenta os resultados obtidos, com realce evidente e inquestionável do valor da luz artificial, na ativação da postura das aves.

Baseados na atividade imediata da pituitária, reagindo à luz vermelha, principalmente quando de baixa intensidade, os avicultores que usam lâmpadas de querosene tipo «Sonambulo», de vidro vermelho, obtêm resultados de alta eficiência, em granjas desprovidas de luz elétrica. Os lâmpadas são dependurados meio metro acima das poedeiras, nos estrados-dormitórios, com afastamento de 1,20 m entre eles, num total de quatro lâmpadas para 200 poedeiras.

Em nosso meio, porém, costuma-se completar o número de horas de luminosidade do dia, com um suplemento de 2 a 4 horas de luz branca, na proporção de 40 a 60 watts para cada 20 m² de galinheiro, pela madrugada, até encontrar a luz do dia.

É muito comum concentrar-se a ligação da luz dos galinheiros em chave ins-

creção gonadotrófica, é extremamente sensível aos raios luminosos longos. Por isso, aos primeiros raios luminosos, ela se sensibiliza e é ativada a secreção do hormônio gonadotrófico. Esta atividade, excitada pela luz, ainda se prolonga por algum tempo, mesmo depois de apagada a luz, como um efeito residual.

Partindo desta extraordinária comprovação biológica, podemos concluir que todos os sistemas de iluminação são eficientes. Cabe ao avicultor escolher o que melhor conforto e economia puder proporcionar-lhe.

Convém realçar que, nos sistemas de luz difusa de baixa wattagem, as aves não se movimentam em direção aos comedouros ou bebedouros: ficam no mesmo lugar e a luz age apenas como «estimulante». Por isso, nestes casos, obtêm-se melhores resultados com uma ração de quirera ao cair da tarde.

O estudo realizado por C. S. Platt, na Universidade Rutgers, do Estado de New Jersey — E.U.A. em 1952 demons-

talada na cabeceira do encarregado do serviço, sendo o controle feito por despertador, que acorda o encarregado, o qual aciona a chave, acendendo as luzes dos galinheiros.

Finalmente, convém acentuar que o preço dos ovos, no fim do verão, no outono e no inverno, compensa largamente, qualquer despesa com a iluminação dos galinheiros. É o que a prática vem demonstrando como o mais acertado para ativar a postura das poedeiras.

RAÇÕES GRANJEIRO

Cx. Postal 7725
Fone: 37-6348
São Paulo

**-MUDE
PARA
MELHOR!**

**-MUDE
PARA**

Rações
SANTISTA

alimento racional e perfeito para
aves - bovinos - equinos - suínos

A RAÇÃO SANTISTA, AP 3 granulada, garante maior postura porque reúne em perfeito equilíbrio proteínas de origem animal e vegetal, hidratos de carbono, sais minerais, anti-bióticos e todas as vitaminas essenciais a uma alimentação perfeita. Usar RAÇÃO SANTISTA é mudar para melhor!

S.A. MOINHO SANTISTA INDUSTRIAS GERAIS

São Paulo: Largo do Café, 11 - Caixa Postal, 507 - Telefone: 33-6111
Depósitos: Santos - Campinas - Mogi das Cruzes - São Roque - Baurú

VALOR NUTRITIVO DO OVO

O progresso de uma nação, o padrão de vida de seus habitantes e suas realizações no campo da ciência, indústria, comércio e agricultura, representam exatamente o reflexo do valor nutritivo dos alimentos que compõem os cardápios nacionais.

Tratando da avicultura e do que esta fonte de produção de elementos nutritivos pode fornecer ao homem, lembramos aqui as palavras do secretário da Agricultura dos Estados Unidos da América do Norte, sr. Claude R. Wickard, no seu relatório anual de 1942: "O relativo bem estar das rações, do ponto de vista da alimentação, pode ser medido em grande parte pela produção de sua avicultura".

De fato, o conjunto de propriedades biológicas do ovo consagra-o com um dos principais alimentos para o homem, incluindo-se entre os denominados "protetores".

O OVO COMO FONTE DE ENERGIAS

Fornece o ovo cerca de 2 a 2,5% das calorias exigidas diariamente por um homem de porte médio, em seu trabalho cotidiano. Parecerá insignificante essa contribuição, mas é preciso levar em conta que a principal característica do ovo é proteger o organismo humano contra possíveis deficiências nutritivas. O valor energético total de que o homem precisa é conseguido, com relativa facilidade, pela ingestão de outros alimentos.

O OVO COMO FONTE DE PROTEINAS

Consumido diariamente, o ovo fornece 7 a 13% do total de proteína exigido pelo organismo humano para uma alimentação equilibrada. A proteína animal é indispensável à alimentação racional do homem e dos animais. Elas devem figurar em proporções adequadas, segundo a idade e a modalidade de trabalho dos seres humanos.

Um ovo pode fornecer 13 a 23% do total de proteína de origem animal necessária a nutrição perfeita ou pelo menos satisfatória.

O OVO COMO FONTE DE HIDRATOS DE CARBONO

Em sua composição química, o ovo apresenta somente traços de hidratos de carbono. No entanto, o homem consegue, com facilidade, equilibrar suas necessidades de hidratos de

carbono, pelo emprego de outros elementos de sua dieta. O pão, alimento da população de todo o globo terrestre, atende ao suprimento das exigências do organismo qual a hidratos de carbono.

O OVO COMO FONTE DE GORDURAS

As substâncias gordurosas que fornecem maior quantidade de energia ao organismo humano estão presentes no ovo. Cada unidade concorre com cerca de 5 a 10% da gordura necessária ao gasto de um homem em seu trabalho. Por isso, o homem tem de recorrer a outras fontes para completar a quantidade de substâncias gordurosas exigidas por seu gasto diário. O suprimento integral de gorduras, por via dos ovos, acarretaria o encarecimento considerável da alimentação cotidiana.

O OVO COMO FONTE DE MINERAIS

O ovo é excelente fornecedor de minerais ao organismo humano, especialmente no período de crescimento.

Relativamente pobre de cálcio, é rico de fósforo e apresenta alguma riqueza de ferro. Um ovo fornece 6 a 16% do total de ferro de que o nosso organismo carece, em um dia de atividade.

O OVO COMO FONTE DE VITAMINAS

O ovo apresenta grande quantidade de vitamina A. Cem gramas da porção comestível dos ovos podem conter até 3.079 Unidades Internacionais de Vitamina A. O suprimento diário dessa importante vitamina é conseguido pelo consumo de um ovo por dia.

A vitamina B₁ (Tiamina) é encontrada no ovo em proporção relativamente grande. A contribuição do ovo é de 4 a 11% do nível exigido pela alimentação diária do homem.

A Vitamina G (Riboflavina) é encontrada em grandes proporções nos ovos. Consumindo um ovo diariamente, o homem ingere cerca de 20% do total de vitamina G exigido em suas refeições diárias.

GRANJA CENTRAL

PINTOS DE 1 DIA. SÓ LEGHORN

TOYOJI — SHIBATA

Av. Fernando Costa, 230 — Fone 723

Caixa Postal, 92 — Mogi das Cruzes

SÃO PAULO

Possui o ovo somente traços de vitamina C. Por isso, o homem deve suprir essa carência com vegetais frescos e frutas.

E o ovo uma das mais importantes fontes de vitamina D. Na conformidade de total dessa vitamina contida nas rações ministradas às aves em postura, o ovo pode fornecer 2,5 até 25% das unidades necessárias a uma alimentação equilibrada.

Apresenta-se ainda o ovo como excelente fonte de outras vitaminas e substâncias, cujo complexo químico equivale ao das vitaminas. Assim, temos a Niacina, a Colina, a Avidina e outras do complexo B presentes em grandes quantidades no ovo. Seu comportamento no organismo humano, porém, ainda está em fase de estudos experimentais.

O OVO COMO ALIMENTO PROTETOR

Pelas propriedades de seus componentes, pode o ovo proporcionar ao homem elementos nutritivos essenciais à manutenção de um estado hígido perfeito.

A proteína do ovo é de grande valor biológico, apresentando na análise 22 amino-ácidos, 11 dos quais são essenciais ao organismo humano e indispensáveis à manutenção de um perfeito estado de saúde.

A gordura do ovo é elemento de grande valor nutritivo, pois contém os ácidos graxos não saturados, entre os quais o ácido linoleico.

Os componentes dos ovos, principalmente os que formam a gema têm elevada porcentagem de digestibilidade. A gordura, por exemplo, se encontra no estado de fina dispersão, o que permite sua rápida assimilação.

Dado o seu elevado teor de ferro e sua relativa riqueza de vitamina D (anti-raquitica), o ovo é um excelente suple-

mento do leite na dieta das crianças, na ocasião do desmame e no período de crescimento.

Pelas mesmas razões, é alimento valioso para os tuberculosos e convalescentes anêmicos.

A experiência mostra que o ovo é de grande valor na dieta das crianças, dos adolescentes, das gestantes e das mães no período de aleitamento. As crianças que recebem uma alimentação simples, em que um terço das calorias é obtido do leite, beneficiam-se quando comem um ovo, diariamente, apresentando um teor de hemoglobina muito superior ao dos demais. Isto se explica pela assimilação das combinações orgânicas ferruginosas existentes na gema do ovo.

Muitos pediatras aconselham, na alimentação das crianças, o aproveitamento da gema somente, dada sua riqueza de cálcio, fósforo, compostos orgânicos ferruginosos e vitamina D. O Dr. Dafoe, médico das quintuplas Dionne, depois que elas completaram onze meses de idade, fez incluir um ovo, diariamente, na dieta das crianças mais famosas do mundo.

Na alimentação dos adultos, o ovo pode equilibrar as refeições diárias, com um mínimo de despesa. A racionalização dos nossos métodos de alimentação, introduzindo-se o hábito do consumo diário de um ovo, por certo trará múltiplas vantagens: 1) estimulará a organização de novas granjas avícolas e os núcleos de criação de aves; 2) intensificará a produção de ovos de boa qualidade; e 3) permitirá a formação de indivíduos sadios, capazes de suportar as mais variadas atribuições impostas no labor cotidiano.

Bem orientada companhia em favor de um maior consumo de alimentos protetores, abrirá a verdadeira trilha para se formar um povo sadio, capaz de grandes realizações, em qualquer setor da atividade humana.

“MOINHO PRIMOR”

Moagem de cereais
e fábrica de rações

FARINHA DE CENTEIO E OUTRAS, PRODUTOS DE MILHO
— E CEREAIS EM GERAL — FORRAGENS —

MANUEL DIAS

Rações balanceadas — Ingredientes para rações:
Fubá, quirera, farinha de carne, amendoim, alfafa, etc.

RUA PINHEIROS, 1559

Fone 8-4405

SÃO PAULO

Estocagem de ovos em câmaras frias e o relativo equilíbrio dos preços

Descarregando ovos da câmara fria da Cooperativa Central Agrícola Sul-Brasil, que tem capacidade para 160.000 dúzias de ovos

A produtividade das aves em postura é maior no fim do inverno, na primavera e no começo do verão, diminuindo progressivamente no final do verão, no outono e no inverno. Assim, a produção de ovos é bem distinta, de janeiro a dezembro de cada ano. No primeiro semestre, a postura é baixa e no segundo atinge o seu valor máximo.

Tomando por base a distribuição da postura de uma poedeira com 150 ovos em 12 meses de produção, verifica-se que 48 ovos, representando 32% do total são postos no primeiro semestre, e 102, ou 68%, no segundo semestre.

Essa variação na curva de produção anual individual reflete-se imediatamente no mercado de ovos. No primeiro semestre, com baixa produção, diminui a oferta e, conseqüentemente, sobem os preços. Ao contrário, nos últimos seis meses do ano, com o aumento da postura, a oferta é maior, determinando a baixa dos preços.

Tomando por base os preços médios mensais por dúzia, obtidos pela Cooperativa Agrícola de Cotia, durante o ano de 1956, observa-se que, entre os preços máximos e mínimos, há uma diferença de 58,3% em cruzeiros. Isto quer dizer que, em nosso meio, o mercado acompanha quase exatamente os fenômenos biológicos que determinam a produção de ovos.

A falta de ovos na época de escassez natural vem desafiando a gerência das organizações avícolas e os serviços oficiais de abastecimento pretendem resolver-lo por mero tabelamento dos preços.

No entanto, o homem pode lançar mão de vários recursos para equilibrar, até certo ponto, o fornecimento de ovos, durante o ano e, com isso, permitir relativa estabilidade nos preços. Tais recursos são a seleção das aves reprodutoras, a iluminação artificial dos galinheiros, o estabelecimento de planos escalonados de produção, conservação e industrialização de ovos. Dentre estes, a conservação dos ovos pelo frio, em armazéns frigoríficos, ocupa lugar de destaque e constitui de fato, um fator de equilíbrio de preços, no decurso do ano. A avicultura norte-americana é pioneira na frigorificação dos ovos.

Em Nova York, no decênio de 1880 a 1890, a diferença entre os preços máximos e mínimos, por dúzia, era de 75%. Conservados os ovos em câmaras frias, essa diferença se reduziu 20,3%, no período de 1900 a 1910.

As conclusões são evidentes: a frigorificação dos ovos foi fator decisivo do progresso da avicultura nos Estados Unidos, tendo contribuído para a relativa estabilização dos preços, permitiu o fornecimento regular e proporcional, do produto durante os meses do ano.

Entre nós, pouco se fez ainda quanto a frigorificação dos ovos. A diferença média entre os preços máximos e mínimos por dúzia de ovos, foi de 62,2%, no período 1936-1948, e de 58,3%, em 1956. Portanto, no mercado paulista a frigorificação e a industrialização dos ovos, pouco influíram no equilíbrio dos preços.

Agora, o problema está sendo agitado pelas organizações avícolas e associações de classe, que, pleiteando o financiamento dos ovos a associações de classe, que, pleiteando o financiamento dos ovos a armazenar, esperam garantir os meios para a sua estocagem no período da safra. Sem dúvida, isso será um passo decisivo na instalação do armazenamento dos ovos em câmaras frigoríficas, em escala in-

dustrial, com grandes possibilidades de expansão dessa atividade.

A produção de ovos no Estado de São Paulo, é estimada em 130 milhões de dúzias, neste ano. Considerando que 80% são produzidos no segundo semestre, teremos um total de 91 milhões de dúzias de ovos, de julho a dezembro. A estocagem deverá ser de 20% do total produzido na safra, para produzir efeito positivo no equilíbrio da oferta e da procura. Nessa base, as câmaras frias devem ter capacidade para armazenar no mínimo 18 milhões de dúzias de ovos.

Como a capacidade total das câmaras frias apropriadas ao armazenamento de ovos, registradas no Departamento da Produção Animal, não chega a cinco milhões de dúzias de ovos, é fácil concluir que há muito campo para o emprego de capital na indústria frigorífica. O ponto crucial do problema é o financiamento dos ovos a estocar nas câmaras frias durante o período da safra. Desde que o Conselho Coordenador de Abastecimento acaba de liberar cem milhões de cruzeiros, em empréstimos para a avicultura, através do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, o caminho está aberto à estabilidade econômica da produção ovelra comercial em nosso meio.

MEDIDAS DAS...

(Conclusão da pág. 31)

dado no início, sem forçar o aquecimento, gradualmente será obtida a conhecida "chama azul", praticamente livre de impurezas tóxicas.

As campânulas a querosene, com essas características técnicas funcionam melhor nos meses mais quentes do ano, podendo com eficiência criar lotes de 500 pintos

O aquecimento dos pintos, por meio dos diversos tipos de campânulas existentes na praça, pode ser conseguido com regularidade, tanto pela condição técnica do aquecedor, como pela gerência do encarregado dos pinteiros.

OS ANTIBIÓTICOS...

(Conclusão da pág. 40)

final é simples e definitivamente conclusivo:

Lucro extra com os pintos	Cr\$ 1.500,00
Despesa com a suplementação	Cr\$ 76,52
Lucro extra final	Cr\$ 1.423,48

Quer dizer que, pondo de lado a economia de 2 kg de ração em 60 dias, o lote Aurofac proporcionou um lucro extra de Cr\$ 1.423,48, para um grupo de 40 poedeiras-reprodutoras, em 60 dias de postura e incubação.

Como se vê, os resultados obtidos na prática da criação demonstram amplamente a importância do emprego de antibióticos na ração das poedeiras-reprodutoras, contribuindo para a produção econômica de pintos.

Compramos tôda a sua produção de ovos

durante a safra

A CIA. HARKSON
INDÚSTRIA E COMÉRCIO KIBON,
que compra a maior
quantidade de ovos do País,
está interessada também
em tôda a produção
de sua granja.

Peça a visita de um representante, dirigindo-se a

CIA. HARKSON, INDÚSTRIA E COMÉRCIO KIBON

58.150

Rua Pres. Soares Brandão, 237 — São Paulo — Capital

COOPERATIVISMO EM FOCO

"Defendendo os interesses dos produtores e dos consumidores, o cooperativismo sadio é um movimento econômico em busca do bem estar, criando um ambiente de paz social."

* * *

A União das Cooperativas do Estado de São Paulo ou abreviadamente UCESP, é uma entidade moral e social, sem intuídos lucrativos, que congrega as cooperativas do Estado de São Paulo, como órgão representativo da classe e propagador e defensor do verdadeiro cooperativismo.

* * *

A UCESP estimula as relações inter-cooperativas, colabora com os poderes públicos e prestigia as associações de classe.

* * *

DOS FINS E OBJETO DA UCESP

A UCESP tem por principal objetivo propugnar pela expansão do verdadeiro cooperativismo e defender os interesses das cooperativas associadas, legalmente constituídas e em funcionamento no Estado de São Paulo.

No desempenho de seu programa, a UCESP se propõe:

a) — congregar todas as cooperativas em funcionamento, de modo a estabelecer uma comunhão entre todos quantos trabalham pelo fortalecimento do regime cooperativo;

b) — colaborar com os poderes públicos, no sentido de que a prática do cooperativismo não seja desvirtuada e assegure o bem estar geral;

c) — sugerir aos poderes competentes, medidas que se tornem necessárias para amparar o desenvolvimento cooperativista em todas as classes sociais;

d) — pleitear os direitos e defender os interesses das cooperativas e de seus associados;

e) — fomentar as relações inter-cooperativas;

f) — fomentar a constituição de cooperativas do 2.º grau (federações e cooperativas centrais), de modo a agrupar racionalmente as cooperativas que têm os mesmos objetivos;

g) — promover convenções, concentrações e congressos entre as cooperativas associadas e participar de idênticos movimentos, não só no País, como no estrangeiro;

h) — criar ou sugerir a criação de serviços que se tornem necessárias para a defesa dos interesses das cooperativas;

i) — estimular o desenvolvimento do ensino em todos os seus graus e fomentar, nas cooperativas ou inter-cooperativas, a organização de obras sociais, assistenciais e culturais;

j) — constituir-se centro de coordenação das atividades das cooperativas suas associadas e de ligação com terceiros, de informações, estudos e pesquisas;

k) — procurar traçar normas para a padronização e uniformização da produção e sua distribuição, contabilidade e mais atividades comuns de suas associadas;

l) — procurar melhor entrosamento e entendimento entre as cooperativas suas associadas e servir de árbitro nas pendências entre elas.

A União das Cooperativas do Estado de São Paulo tem se manifestado e colaborado em todos os problemas do abastecimento dos centros urbanos, do fomento do maior consumo de ovos e outros produtos, do fornecimento de rações e resíduos de trigo aos avicultores, contra o tabelamento dos produtos agrícolas, estabelecimento de preços mínimos e o financiamento da pequena agricultura.

ACRONIZAÇÃO PRESERVA A CARNE DAS AVES ABATIDAS

O problema da conservação das carcaças das aves abatidas, entre a embalagem e a entrega ao mercado consumidor, foi sempre um entrave ao desenvolvimento do comércio das chamadas "aves frescas", sem congelamento ou mesmo resfriamento. Ou seriam entregues no mesmo dia da matança ou então deveriam entrar para as câmaras frias. Se o armazenamento se prolonga além de dez dias, nas temperaturas de 0 a 3°, haverá o perigo da perda dos estoques.

Também o transporte das aves abatidas nos matadouros do Interior, para o mercado da Capital, efetuado em caixas térmicas, sempre criou problemas para os distribuidores, pela contaminação das carcaças e sua perda devido ao mau cheiro e decomposição.

Dêse modo, um produto que pudesse controlar a contaminação das carcaças e atenuar seus efeitos prejudiciais em temperaturas frigoríficas, apenas de conservação e, mesmo de ambiente, para o comércio de carcaças frescas, por certo, representaria um passo seguro para a solução prática do problema do armazenamento, transporte e venda de aves abatidas.

Como a contaminação das carcaças se processa pela ação bacteriana na pele das aves abatidas, o problema deveria ser atacado pelo emprego de um produto solúvel em água, na qual pudessem ser mergulhadas as carcaças para o tratamento inibidor da ação bacteriana, prolongando dêse modo o tempo útil entre a matança e a entrega nos centros consumidores.

Foi pensando nisso que W. G. Shannon e W. J. Stadelman, de Purdue — Indiana (E.U.A.) estudaram a ação da cloroteraciclina (na praça — Aureomicina) no controle da ação bacteriana em carcaças de aves evisceradas e divididas ao meio. Tomaram frangos pesados (aproximadamente 1.800 gramas de peso vivo), escaldaram-nos durante 40 segundos, em água na temperatura de 60° e os depenaram em depenadeira mecânica, passando a resfriá-las em água fria. Eviscerados e divididos ao meio, foram depois resfriados com gelo pirado.

Foram feitos dois tratamentos pela imersão das carcaças em água fria, durante 15 minutos, na base de 10 litros de água para cada 6 metades de frango, mas num deles foram dissolvidos 100 miligramas de Aureomicina, em cada 10 litros de água, uma hora antes do tratamento.

Depois do tratamento, cada metade de frango foi embalada em saco plástico e conservada nas temperaturas de 0; 2,75°; 5,55°; 8,3° e 20°. Diariamente foram feitas observações em cada metade de carcaça para o controle da ação bacteriana: o processo usado era o esfregaço, obtido com alça de platina, passada debaixo da asa dos frngos. O evme microscópico dos esfregos dava conta da contaminação das carcaças. Lado a lado, eram feitos controles de cheiro e presença de nódulos de putrefação.

No quadro apresentamos os resultados obtidos por meio do esfregaço.

Temperatura de armazenamento	Controle	Aureomicina
	Média de dias até a contaminação	Média de dias até a contaminação
0°	13,83	28,58
2,75°	9,66	15,15
5,55°	6,16	12,16
8,30°	4,08	7,16
20°	2	3

Pelo exame do quadro, nota-se que os frangos tratados com

Vista de um balcão frigorífico de um super-mercado nos Estados Unidos. As aves "acronizadas" estão à frente da vendagem de aves abatidas.

Aureomicina resistiram mais à invasão bacteriana, em todas as temperaturas de armazenamento.

Na temperatura de 0°, a Aureomicina permite que dure 30 dias praticamente o armazenamento, ao passo que as carcaças não tratadas não passam dos 14 dias. Na temperatura de frio normal ou seja a das geladeiras domésticas, na base de 5°, os frangos tratados com Aureomicina duram perfeitamente 13 dias. Na temperatura de 20° ou seja, praticamente a do ambiente, as carcaças tratadas resistem até três dias, ao passo que as aves não tratadas não vão além de dois dias.

Esta ordem de provas experimentais foi igualmente realizada pelo Departamento de Indústria, Inspeção e Conservação de Produtos Alimentícios de Origem Animal da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, sob a direção do professor Pascoal Mucio. Aliás este Departamento tem sido, no Brasil, o pioneiro no estudo da preservação e conservação dos alimentos pelo emprego de antibióticos. E convém salientar que, nas provas realizadas pelo prof. Pascoal Mucio, as aves tratadas com Aureomicina e mantidas na temperatura de 4 a 5°, se conservaram perfeitas e íntegras, por vinte dias.

Portanto, os resultados são animadores: pelo tratamento das carcaças com Aureomicina, ficam solucionados os problemas do mercado de "aves frescas" livre do congelamento e o transporte das aves abatidas nos matadouros do Interior, para a Capital. As caixas térmicas resolvem integralmente o problema, desde que as carcaças recebam o tratamento pela Aureomicina.

Os avicultores devem aproveitar ao máximo esta conquista, que anula os efeitos da ação bacteriana nas carcaças dos frangos e das galinhas.

Sómente no Estado de São Paulo, existem, registrados no Departamento da Produção Animal, 52 matadouros avícolas, na maioria instalados em granjas, na conformidade da resolução da Comissão Mista de Abastecimento da Capital, em julho de 1952, por indicação da Secção de Avicultura, do Departamento da Produção Animal. Esta orientação benéfica tem evitado a ação dominadora dos intermediários e permitido a apresentação de carcaças de aves, com ótimo aspecto e sanidade garantida. Isto porque o tratamento das aves abatidas com Acronize, ou seja a Aureomicina comercial para os matadouros avícolas, rapidamente se introduziu em nossos abatedouros, com extraordinário sucesso técnico e prático.

O mercado consumidor aprecia carcaças desprovidas de manchas escuras, causadas pela ação do frio ou de ação bacteriana inicial, além de um aspecto de sanidade evidente. A acronização das aves abatidas protege a pele das aves contra a ação bacteriana específica e lhe dá um aspecto de frescura inconfundível.

A acronização das aves ganha maior eficiência quando os matadouros avícolas seguem uma linha de matança e evisceração vertical, em perfeitas condições de higiene.

Como a acronização fica apenas em cerca de Cr\$ 0,40 por kg de ave tratada, não há outro caminho a seguir pelas organizações que abastecem de aves abatidas os grandes centros consumidores. No entanto, o Acronize deve ser aplicado em matadouros devidamente licenciados, com matança, depenação e evisceração das aves, dentro de normas técnicas mais indicadas: sangria com ave dependurada pelos pés ou em funis de matança; depenação em depenadeira mecânica e evisceração vertical, com a máxima higiene nas mesas de trabalho. A acronização se seguirá então, de acordo com as instruções dos fabricantes do Acronize.

Com isso, serão obtidos resultados positivos e práticos na preservação da carne das aves abatidas, em benefício do abastecimento dos grandes centros consumidores.

ouça as últimas notícias!

V. que mora no campo, poderá estar sempre bem informado com um rádio receptor.

Saiba o que se passa no Brasil e no Mundo, equipando seu rádio com a

Bateria para Rádio EVEREADY MINI-MAX N.º 759

- mínimo tamanho
- máximo rendimento
- recupera entre usos

SUPER BLINDADA!
SUPER PROTEGIDA!

Rende 40% mais, porque tem pilhas planas!

"Eveready", "Mini-Max" e "Nine Lives" com o Símbolo do Gato são marcas registradas da Union Carbide Corporation.

Produto NATIONAL CARBON

Agora no Brasil —

MISCÉLIO DE PENICILINA

— não é antibiótico

Aumenta o poder nutritivo da ração.

Que é o **MISCÉLIO DE PENICILINA (MP)**?

Miscélio de Penicilina (MP) é o organismo que produz a penicilina. O Miscélio, depois de convenientemente beneficiado (centrifugação e secagem), é utilizado ao natural. É um alimento de ótimas qualidades, uma das melhores fontes de fatores de crescimento, atualmente conhecidos. Sua utilização nas rações modernas, de "alta conversão" é imprescindível na criação de pintos, frangos, poedeiras e reprodutoras.

O MP é riquíssimo em vitaminas, proteínas e minerais, em estado orgânico, altamente assimiláveis.

Estes são as vantagens do **MISCÉLIO DE PENICILINA (MP)**

- não é antibiótico
- aumenta a vitalidade e o rendimento
- diminui a mortalidade
- estimula o crescimento
- aumenta a postura
- aumenta o índice de eclosão
- tem baixo índice de umidade
- ótima conservação.

Dosagem do MISCÉLIO DE PENICILINA (MP)

Recomendada em relação à ração total

pintos — de um dia até o corte 3%

frangos — até o início da postura 2 a 3%

poedeiras 3%

reprodutoras e poedeiras — durante a muda 3 a 4%

reprodutoras — durante a muda 4 a 5%

3%

2 a 3%

3%

3 a 4%

4 a 5%

Composição do MISCÉLIO DE PENICILINA (MP)

(análise efetuada na American Home Products Corp.)

Proteínas

Gorduras

Minerais

Açúcares

Nitrogênio

Cálcio

Fósforo

Colina

Tiamina (B1)

Riboflavina (B2)

Ácido pantotênico

Piridoxina (B6)

Inositol

Biotina

Niacina

B12

O Miscélio de Penicilina (MP) é apresentado em sacos de papel multifolhado, de 25 kgs.

DISTRIBUIDORES

IND. PRO-AGRICOLA IPACO LTDA. - Tel. 80-3605

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AVICULTURA

BENEFICIADORA PAULISTA LTDA.

RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 157 - 7.º - c/706

TELEFONE: 37-1639

SÃO PAULO

NOVO COMEDOURO AUTOMÁTICO

FÁBRICA DE MISTURADORES

LYNCE

O MELHOR EQUIPAMENTO
PARA AVICULTURA

Rua José Pires, 487 — Caixa Postal, 45 — Telefone 112 — ATIBAIA — SÃO PAULO

O controle periódico das aves reprodutoras pelo ninho-alcapão é muito indicado na formação de linhagem produtiva.

O controle da postura das aves durante o ano todo, pelo ninho-alcapão, embora laborioso, ainda é o melhor caminho a seguir pelo avicultor que deseje selecionar suas aves, pelas indicações que tal controle proporciona. No entanto, de-

PRODUÇÃO DE OVOS, NO COMEÇO E NO FIM DO ANO DE POSTURA, COMO PREVISÃO INDICE DA POSTURA ANUAL

vemos considerar que os avicultores que se dedicam à produção industrial de pintos de um dia, pelos acasalamentos coletivos, podem limitar o emprego do ninho-alcapão, adotando o controle periódico da postura de suas aves.

O prof. João Soares Veiga e o dr. Henrique R. Raimo, respectivamente da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo e do Departamento da Produção Animal, estudaram as possibilidades técnicas do emprego do ninho-alcapão, nos controles periódicos da postura, em poedeiras do I Concurso de Postura de São Paulo.

Foram estudados dois períodos de postura, em poedeiras da raça Leghorn Branca, a saber: os primeiros 120 dias, a partir do primeiro ovo posto pelas aves e, os últimos 50 dias de postura, até completar 365 dias de produção.

Os resultados obtidos foram os seguintes:

1.º) Para que uma galinha bote 200 ovos em 365 dias, deverá botar 48 ovos nos primeiros quatro meses de postura e 13 ovos nos últimos 50 dias de produção.

2.º) Para uma galinha botar 200 ovos em 365 dias, deverá botar 36 ovos nos primeiros tres meses de postura.

Para uma aplicação pratica, dentro de um programa de seleção mais economico, muitos avicultores fazem o controle dos tres primeiros meses e dos últimos dois meses de postura, conjugados. Os resultados obtidos são de alta expressão biológica e técnica, possibilitando a formação de linhagens realmente produtivas e eficientes. Além do mais, serão economizados sete meses de controle trabalhoso e de alto custo.

"...e o cimento-amianto não enferruja nem apodrece!"

Para maior rendimento e economia na avicultura, empregue comedouros e bebedouros "Brasilit" que são mais higiênicos e duráveis.

S. A. TUBOS BRASILIT

Sede: Marconi, 131 - 7º - 34-4127 - S. PAULO
Fábricas: S. Paulo - Recife - P. Alegre

Distribuidores em todo o Brasil

outros produtos:
chapas onduladas e lisas, tubos, caixas d'água, etc.

INCUBADORA "LUCATO"

Obtenha o máximo com um produto nacional, de rendimento igual ao estrangeiro.

Qualidade, perfeição funcional, esmerado acabamento, rigorosa adaptação para o nosso clima, funcionamento muito mais fácil, ASSISTENCIA PERMANENTE, e o principal, CUSTANDO A METADE DO PREÇO.

Modelos com capacidade para 2.500, 5.000, 10.000, 17.280 e 20.000 ovos. Orçamentos, para tamanhos especiais, fora de nossa linha normal de produção, bem ainda de câmaras de incubação ou eclosão, separadas. Para maiores detalhes, peça folhetos ou visite os fabricantes.

IRMÃOS LUCATO

RUA TIRADENTES, 1315 — FONES: 1-400 E 1-500
CAIXA POSTAL 61 — LIMEIRA — EST. S. PAULO

EXPOSIÇÃO E VENDAS:

RUA SENADOR QUEIROZ, 649 — FONE: 33-7949
— SÃO PAULO —

Granjas de demonstração de avicultura

Com a instalação da granja de demonstração avícola na Fazenda de Ressacada, Florianópolis, são quatro os Estados onde o Projeto - 42 do Escritório Técnico de Agricultura mantém estabelecimentos experimentais de avicultura. Os outros Estados são Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais (neste último em duas regiões: Viçosa e Sete Lagoas). Estão sendo examinadas sugestões para localização de granjas de demonstração em São Paulo e Espírito Santo. Os técnicos do ETA (Projeto - 42) percorreram agora o Norte e o Nordeste, onde examinaram as condições regionais para um programa de desenvolvimento avícola, havendo possibilidade de instalação de granjas nos Estados da Bahia e Pernambuco. Além da cooperação já prestada ao Estado de Minas Gerais, está em estudos, com o apoio do ETA, um grande estabelecimento para reprodução.

O primeiro município do País a ter uma granja de demonstração avícola foi Carazinho, no Rio Grande do Sul.

NOVA RAÇÃO ECONOMIZA Cr\$ 600,00 POR TONELADA

Concentrado "D-RAÇA" elimina o farelo de trigo nas fórmulas que acabam de ser lançadas

FÓRMULA ESPECIAL ENERGÉTICA

(relação Proteína/Energia)

590 kg de fubá

400 kg de Concentrado "D-Raça"

10 kg de Vig-O-Mix

O Concentrado "D-Raça" (com Vig-O-Mix), além de fazer descer o preço da ração em Cr\$ 600,00 por tonelada, oferece mais estas vantagens extraordinárias:

- Resume em uma as várias operações de aquisição e manipulação. Basta juntar Fubá; dispensa resíduos de trigo.
- Não exige estoque de mercadorias caras; portanto, não há o desembolso de maiores quantias para compras.
- O avicultor não se ausenta de sua granja, gastando em viagens e estadias, para correr atrás de inúmeros produtos caros e incertos.
- Sômente em Frete economizam-se 60%, porque bastam 8 sacos de Concentrado "D-Raça" para fazer 20 de ração.

Há um tipo de Concentrado "D-Raça" para cada finalidade:

POSTURA — CRESCIMENTO — INICIAL — SUINOS

AVICULTURA, LAVOURA E PECUÁRIA — A.L.P. — S. A.

R. Pinheiros, 913 — Fones: 8-8693 e 8-5688 — S. PAULO

Vista geral da Granja Experimental de Bastos, com capacidade para 12.000 poedeiras, controladas em ninho-alcaçôo. A produção de galos para reprodução é de 3.000 por ano, ao custo aproximado de Cr\$ 500,00 cada um. A Granja Experimental foi instalada nos arredores de Bastos, em área de 5 alqueires.

COOPERATIVA AGRICOLA BANDEIRANTE

Central de Incubação — Granja de Seleção Avícola (Bastos) — Alimentos para Aves.
Sede: Rua Barão de Duprat, 545 — Telefone: 36-1585 — SÃO PAULO.

Noticiário Tortuga

EDIÇÃO ESPECIAL DEDICADA AO
SIST. DAS GAIOLAS INDIVIDUAIS EM AVICULTURA

AKIRA SUZUKI
TÉCNICO AVÍCOLA DA TORTUGA

1 — HISTÓRICO

Uns acreditam ter sido D. C. Kenard, do Departamento Exeprimental de Agricultura de OHIO, EE.UU., o primeiro a criar aves em gaiolas coletivas, no ano de 1924; ao passo que outros dão as ilhas Hawai como o berço do sistema. O certo, porém, é que, comprovada a sua eficiência, o sistema logo começou a se difundir; vindo a tomar um desenvolvimento mais acentuado após a Segunda Guerra Mundial. Hoje, 95% dos aviários novos dos estados sulinos dos Estados Unidos já adotaram-no, embora modificado para gaiolas individuais. Desta nação, atingiu o Japão, a Europa e, em 1954, através de duas vias — japonesa e americana — aportou ao Brasil. Nessa data, isto é, em 1954, a "Tortuga" iniciou trabalhos experimentais em cooperação com avicultores dos arredores da Capital e das zonas da Noroeste e Alta Paulista. À vista das vantagens que oferece, vem se espalhando cada vez mais, notadamente nestes dois últimos anos. Tanto assim que, atualmente, sobe a mais de 100.000, o total de aves mantidas sob nossa orientação, em gaiolas individuais.

2 — RESUMO DAS VANTAGENS DO SISTEMA

- a) Maior aproveitamento do espaço, pois, as instalações com um só andar comportam seis aves por metro quadrado; aquelas de dois andares, de 10 a 12; e as de três, de 15 a 18.
- b) Redução de 50% na mão de obra, em consequência do maior rendimento do trabalho; pois, conforme a organização, uma só pessoa cuida de 2.000 a 5.000 aves.
- c) Segurança no descarte ("refugação") das más poedeiras, graças ao contróle perfeito da produção individual.
- d) Produção mais elevada, porquanto, observamos que, sem a eliminação das aves refugo, a postura média anual atinge de 55 a 60% e que, com a eliminação de cerca de 50% dos refugos, ela sobe a 70 — 75%.
- e) Menor consumo de ração: produção de uma dúzia de ovos com apenas 1.600 a 2.400 gramas, em aves com 60 a 75% de postura.
- f) Desaparecimento total dos vícios (pica-

SAIS MINERAIS E VITAMINAS TORTUGA

O DEPARTAMENTO AVÍCOLA TORTUGA fornece plantas e demais informes sôbre o Sistema de Gaiolas Individuais, assim como sôbre outros quaisquer, destinados à criação e manutenção de aves.

Curvas comparativas da produção anual de ovos no sistema tradicional e naquele de gaiolas individuais, frente à oscilação do preço dos ovos.

c) A acentuada umidade do estêrco, favorecendo a evolução dos ovos e das larvas de mosca, acarreta maior quantidade destes indesejáveis insetos.

4 — RAÇA MAIS INDICADA AO SISTEMA

A Leghorn branca, devido à sua maior produtividade e persistência de postura, é a mais indicada. Em relação à New-Hampshire, cada ave representa 30 ovos a mais por ano, com o consumo de 7 kg a menos de ração.

A New-Hampshire só é aconselhável nas proximidades das grandes cidades, onde o transporte pouco pesa, quer sobre a produção quer sobre a ração, e onde melhor é o preço e maiores são as facilidades de venda das aves refugadas.

5 — CRIAÇÃO DOS PINTOS

Embora possam ser criados por qualquer um dos

sistemas tradicionais, consegue-se mortalidade mínima, uniformidade máxima de crescimento e reduzida incidência de moléstias infecciosas, criando-os em baterias, porém, em lotes pequenos por compartimento. Boa distribuição é a seguinte:

a) *Pintos de 1 a 20 dias* — 25 por compartimento, cuja altura acima do piso (na figura acima representada por A) seja igual a 15 cm; e cuja distância entre o piso e o fundo (na mesma figura representada por B), seja igual a 6 cm.

b) *Pintos de 20 a 60 dias* — 15 por compartimento, com A = 15 cm e B = 6 cm.

c) *Frangas de 60 a 90 dias* — 10 por compartimento, com A = 27 cm e B = 9 cm.

d) *Frangas com 90 dias* — 5 por compartimento com A = 36 cm e B = 15 cm.

6 — CRIAÇÃO DE FRANGAS

a) Em zonas novas para a avicultura: a partir de 60 dias de idade, criação em estaleiros com pátio.

b) Em zonas velhas, isto é, onde já se explora a avicultura: a partir de 90 — 100 dias de idade, criação em estaleiros com pátio.

Registro de ovos
Registra até 60 ovos

c) Em zonas altamente contaminadas pela coccidiose: nunca soltá-las em pátio, porém, criá-las em baterias como acima, até os 90 dias. Depois passá-las diretamente para as gaiolas individuais, colocando duas aves em cada. Ao início da postura, distribuir-se-á cada uma em sua gaiola. Pouco antes desta, tratá-las com vermífugo (Piperzool).

7 — DIMENSÕES DAS GAIOLAS

As dimensões ideais são: altura da face anterior, 45 cm; largura, 25 cm; profundidade, 40 cm; altura da face posterior, 40 cm. As gaiolas são, portanto, mais altas na frente que atrás, o que dá ao piso a inclinação para a descida do ovo. Para a Leghorn, pode-se reduzir a largura até 20 cm. Não esquecer que, nas gaiolas de madeira, as ripas roubam um pouco de espaço e que, por isso, a queda para o ovo rolar deve ser superior a 12%.

8 — MATERIAL USADO NA CONFECÇÃO

a) *Gaiola metálica* — *Vantagens*: higiene perfeita, durabilidade maior, boa circulação de ar, ausência de parasitos, ovos limpos e queda fácil do ovo. *Desvantagem*: custo elevado.

Tipo n.º 1

b) *Gaiola de madeira* — *Vantagem*: custo reduzido. *Desvantagens*: higiene duvidosa; menor durabilidade, pois as ripas terão que ser estreitas (2,5 cm) para facilitar a circulação de ar; necessidade de constante controle e desinfecção, devido à presença de parasitos; ovos mais sujos; queda do ovo mais difícil, comumente interrompida pelas ripas empenadas ou pelo estérco a ela aderido.

c) *Gaiola de ripas de madeira, com o piso de bambu* — É mais vantajosa que a anterior, principalmente no que diz respeito aos dois últimos itens. Em consequência da maior elasticidade do bambu, o ovo dificilmente se quebra.

d) *Gaiola de madeira com piso metálico* — Associação interessante que, ao lado do preço menor, afasta vários dos inconvenientes acima apontados. Assim, os ovos rolam facilmente no coletor, não quebram e saem limpos.

9 — O GALPÃO

O galpão para as gaiolas poderá ser novo, isto é, construído especialmente para o sistema, ou, então, resultar da adaptação de um aviário tradicional (de ripas ou de cama).

No primeiro caso, deve-se, evidentemente, obedecer às medidas do modelo à esquerda (Tipo 1). Abertos por todos os lados, os galpões guardarão entre si uma distância, no máximo, igual a duas vezes a sua maior altura. Em galpões com mais de quatro metros de largura, importa favorecer a ventilação. Recorre-se, então, à instalação de chaminé ou ao sistema de telhados abertos na cumieira, nos quais uma das águas é mais inclinada e mais longa que a outra, de maneira a deixar um vão entre ambas. Se a largura do galpão passar de cinco metros, usar algumas telhas de vidro, distribuídas no telhado, com o objetivo de uniformizar a luminosidade interior. Cuidado necessário para a uniformidade da produção. No caso do aproveitamento de construções já existentes e cujo espaçamento seja superior ao indicado (distância dos galpões = 2 vezes sua maior altura), torna-se necessário quebrar a violência das correntes de ar e o excesso de sol, com o auxílio de cercas vivas plantadas entre os galpões.

10 — TRATAMENTO

- Dar ração duas vezes por dia.
- Proporcionar água corrente, limpa e fresca.

11 — CONTRÔLE DA FERMENTAÇÃO DO ESTÉRCO

Controla-se a fermentação com uma boa ventilação e com a limpeza freqüente das gaiolas. Esta é feita com jatos de água que, depois, se recolhe em um depósito apropriado. Outro processo consiste em misturar cal ao estérco e deixá-lo juntar por baixo das gaiolas, até à altura de um palmo. As fezes tratadas com cal podem permanecer de seis meses e um ano (na foto acima, depósito de um ano) depositadas, sem dar mau cheiro e nem criar moscas.

12 — DESCARTE ("REFUGAÇÃO") E RENOVAÇÃO DAS AVES

Em galinhas com 60 a 70% de postura, há necessidade de se fazer um descarte de 60%, sendo 30% nos primeiros quatro meses de postura e o restante nos outros.

Aves com menos de 15 ovos mensais devem

ser refugadas; quanto àquelas de 15 a 17, examina-se primeiro a produção anterior. Em geral, 20% do plantel permanece para postura no segundo ano. Contudo, durante a muda utiliza-se a iluminação artificial para perfazer, com a luz solar, um total de 14 a 15 horas diárias de luz.

13 — CONTRÔLE DA PRODUÇÃO

A postura é registrada, em cada gaiola, com o auxílio de um marcador do tipo redondo, ou com o de chapa horizontal, ou ainda com simples prendedores de roupa. A leitura é feita quinzenalmente e os dados anotados em fichas especiais.

14 — DOENÇAS TÍPICAS DAS GAIOLAS

No Brasil ainda não se observou um caso sequer, que possa ser atribuído ao sistema.

15 — DOENÇAS PARASITÁRIAS

Só nas gaiolas de madeira é que podem aparecer piolhos, carapatos e percevejos. Por isso, elas devem sempre ser desinfetadas com Carbolíneo ou com outro qualquer bom parasiticida.

16 — DETALHES DO BEBEDOURO E COMEDOURO

Bebedouro: Pode ser de chapa ou de bambu. Em gaiolas justapostas, formando duas filas, o bebedouro, sempre com água corrente, é disposto entre as filas. Quando as gaiolas formam uma só fileira, o bebedouro fica na face anterior, por cima do comedouro, ou na posterior e na mesma altura do comedouro. A sua profundidade e a largura são iguais, medindo de 3 a 4 cm.

Comedouro: Possui 10 cm de profundidade e conformação especial para evitar que a ração caia sobre o ovo, uma vez que se encontra logo acima do vão de saída deste e a seis centímetros dele.

Bebedouro de bambu, colocado atrás da gaiola

Comedouro e bebedouro dispostos na frente da gaiola

17 — ALIMENTAÇÃO

A alimentação das aves deve apresentar uma relação caloria/proteína adequada ao sistema de criação. Pois, enquanto as mantidas soltas ou em gaiolas coletivas requerem de 130 a 140 calorias por unidade de proteína bruta, as aves em gaiolas individuais exigem de 120 a 125 calorias, em rações com 17 a 18% de proteína. Por outro lado, uma vez garantida a relação caloria/proteína indicada, importa administrar os suplementos indispensáveis à boa alimentação, sobre os quais, aliás, já falamos em trabalho publicado no "NOTICIÁRIO TORTUGA" N.º 42 (Revista dos Criadores, Janeiro 1959).

Apresentamos, abaixo, algumas fórmulas para aves em gaiolas individuais ou coletivas. Lembremos, porém, que rações perfeitamente ajustadas ao sistema, seja sob o ponto de vista biológico, seja sob o econômico, só podem ser estudadas conhecendo-se as condições de clima, disponibilidade de matéria-prima, estação do ano etc. Por isso, os interessados poderão solicitar, diretamente à Secção Técnica da "Tortuga", a visita de um de seus técnicos, o qual, estudando no próprio local as referidas condições, estará apto a lhes aconselhar quais as fórmulas de ração tecnicamente mais convenientes.

FÓRMULAS DE RAÇÃO

Ingredientes	Pintos até 40 dias	Pintos de 40 a 80 dias	Frangas de 80 dias até início da postura	Poedeiras
Fubá	49,0	51,0	55,0	50,0
Farelo de trigo ou de arroz	20,0	20,0	17,3	18,2
Alfafa moída	3,0	3,0	3,5	4,0
Farinha de carne com 50% de proteína	15,0	14,0	13,0	14,0
Farelo de amendoim ou de soja	5,0	7,0	6,0	8,0
Sal comum	0,3	0,3	0,3	0,3
Ostra fina	0,7	1,2	2,2	2,5
Complexo Mineral Iodado "Tortuga"	2,5	2,5	2,0	2,0
Pólvitamínico "Tortuga" para Aves	1,5	1,0	0,7	1,0
	100,0	100,0	100,0	100,0

Observação: O fubá deve ser bem fino, qualquer que seja a idade, o mesmo acontecendo com a farinha de soja. Se o estêreo das poedeiras tornar-se muito úmido, reduzir de 300 para 100 gramas o teor de sal em 100 quilos de ração.

AVICULTORES DO BRASIL

AS RAÇÕES ALPAN CONTEM TUDO PARA PROPORCIONAR RENDIMENTO ECONOMICO À AVICULTURA RACIONAL

Alta qualidade dos alimentos em mistura:

- ★ Cereais e resíduos de trigo nas porcentagens ótimas
- ★ Concentrados proteicos de origem animal e vegetal do melhor padrão técnico
- ★ Suplemento antibiotico
- ★ Vitaminas básicas estabilizadas
- ★ Minerais de base e em traços
- ★ Fatores de crescimento
- ★ Alto nível em vitamina B12

As rações **ALPAN** são do tipo farelado total, podendo receber sulfas, hormônios ou outro qualquer suplemento em pó, a critério do avicultor ou das necessidades das criações especializadas ou dos surtos de doenças.

ALPAN — PINTOS

- Combinação eficiente de fatores do crescimento, com alto nível em vitamina B12
- Crescimento rápido com menor consumo de ração por kg de peso vivo
- Pigmentação acentuada e empenamento rápido
- Mortalidade reduzida

ALPAN — POSTURA (farelada total)

- Maior produção econômica de ovos e de pintos
- Postura intensa e uniforme durante todo o ciclo de produção
- Menos ração por dúzia de ovos
- Melhor estado de saúde
- Eliminação total de poedeiras refugo

Alpan

Alimentos para Animais Ltda.

**Saúde para os animais...
lucro para o criador**

SELEÇÃO DAS AVES

De um modo geral, o rendimento econômico da criação de galinhas é condicionado por três fatores de grande importância:

1) o número de ovos postos pelo lote de aves durante o ano;

2) o número de ovos postos pelo lote nos meses chuvosos e de muda;

3) o número de aves mortas durante o ano.

Maiores serão os lucros quanto maior for o número de ovos postos pelas galinhas durante o ano, tendo sido intensa a postura nos meses chuvosos e de muda, bem como pequena a porcentagem de animais mortos. O avicultor, portanto, deverá prestar o máximo de atenção para alcançar aquele objetivo, praticando para isso a seleção das aves, a fim de não manter na criação as de baixa produtividade, que somente darão prejuízos. E para reconhecer as boas poedeiras, poderá lançar mão de dois processos:

1) controle pelo ninho-alcapão;

2) «culling» ou escoina marcada nos caracteres externos.

Controlando a postura por meio do ninho-alcapão, o avicultor terá 100% de eficiência na seleção de suas galinhas. Tal controle, entretanto, exige mais tempo, maior empenho de capital, marcação das aves com anéis numerados e um fichário de registro da postura diária. É indicado somente para aqueles que se dedicam a venda de reprodutores, ovos de incubação e pintos de um dia, pois necessitam separar com exatidão as galinhas em reprodução pelo número de ovos. Os avicultores especializados na venda de ovos para consumo e que renovam anualmente parte de seu rebanho, adquirindo cada vez novos pintos de um dia, poderão fazer o «culling», ou seja uma seleção baseada nos caracteres externos dos animais. Este tipo de seleção pode ser realizado com eficiência e confiança, mediante uma prática continuada, em que se apura o golpe de vista para perceber as melhores características exteriores das galinhas que está criando. O «culling» é realizado ao passarem as frangas para os alojamentos das poedeiras e quando as aves estão em franca postura.

Examinando-se franga por franga, comparando-as, podemos separar as que apresentam crescimento retardado, defeito do esqueleto (espinha desviada, quilha torta, defeitos das pernas, etc.), as de corpo muito fino e as muito compridas, que devem ser refugadas. A percepção de outras características externas o avicultor irá adquirindo, reduzindo-se cada vez mais a porcentagem de seus erros. Escolhidas as de melhor conformação, terá ele maiores lucros, pela maior e mais intensa produção das frangas e diminuição da mortalidade, por se tratar de aves sadias e fortes.

O segundo passo na prática do «culling» processa-se com as aves em franca postura, devendo então o avicultor observar o comportamento delas nos galinheiros. O alojamento deverá ser exa-

minado diariamente pelo proprietário, nunca devendo deixar unicamente a cargo dos empregados essa inspeção. À tarde, após a colheita dos ovos, deverá dar um balanço na produção, estabelecendo a relação entre o número de aves em postura e o número de ovos colhidos.

O cálculo diário da porcentagem de produção de ovos fornecerá elementos para verificar se há necessidade de mais rigorosa seleção das poedeiras. Se a postura se mantiver em porcentagem elevada, não haverá necessidade de trabalhar com o lote em criação. Se não for satisfatória, sofrendo grandes alterações, diminuindo a quantidade de ovos em época de postura intensa e regular, haverá necessidade de afastar do galinheiro as aves cuja produção não estiverem correspondendo à previsão do avicultor. Para se obter uma base de comparação entre a porcentagem de postura que se tem e da que se deveria

ter, enumeramos abaixo uma escala de produção anual que, sem ser uma regra fixa de valor absoluto, servirá para orientar o avicultor principiante:

MESES	POSTURA MÉDIA			
	150 ovos	%	180 ovos	%
Agosto	20	67	24	80
Setembro	20	67	24	80
Outubro	17	57	21	70
Novembro	16	53	19	63
Dezembro	13	44	16	53
Janeiro	9	30	12	40
Fevereiro	7	23	8	26
Março	6	20	7	23
Abril	6	20	7	23
Mai	9	30	10	33
Junho	12	40	14	46
Julho	15	50	18	60

Naturalmente, a produção varia de granja para granja, de acordo com a qualidade das aves, seu arraçamento e alojamento, sistema de criação, trato, etc.; mas, de posse dos próprios elementos e comparando-os com a tabela, terá o avicultor uma orientação para saber quando deverá repassar o lote.

No galinheiro de poedeiras, no caso de ser preciso retirar as aves que estão prejudicando a produção diária, deve o criador atentar para os seguintes caracteres das boas e das más poedeiras, pelos quais se orientará na escolha:

BOA POEDEIRA

CRISTA: grande, reluzente, lisa e macia

ABDOMEM: largo e flexível, com cavidade mínima de 4 dedos

ABDOMEM: estreito, duro e com muita carne

MÁ POEDEIRA

CRISTA: dura, seca, enrugada e escamosa

OSSOS DO PUBIS: finos, flexíveis, c/ separação mínima de 2 dedos

OSSOS DO PUBIS: grossos, duros e fechados

	BOA POEDEIRA	MA POEDEIRA
Crista	Grande, reluzente, lisa e macia.	Dura, seca, enrugada e escamosa.
Cara	Vermelha e reluzente.	Estreita e seca.
Cloaca	Larga, macia e umida.	Amarelada.
Ossos do pubis	Pinos, flexíveis, com separação mínima de dois dedos	Grossos, duros e fechados.
Processo lateral	Saliente e flexível.	Rígido e pouco saliente.
Abdomem	Largo, flexível, com cavidade mínima de quatro dedos.	Estreito, duro e com muita carne.
Pele	Macia, solta e flexível.	Grossa, sobre camada de gordura

Esses dados se completam com as indicações abaixo, que caracterizam as aves de postura intensa e continuada e as de postura irregular e breve:

	POSTURA INTENSA E CONTINUADA	POSTURA IRREGULAR E BREVE
Cloaca	Branco azulada	Amarelada.
Anel do olho	Branco	Amarelado.
Esmalte	Branco	Amarelado.
Bico	Branco	Amarelado.
Tarsos	Branco e achatados	Amarelados e redondos.
Plumagem	Suja, penas surradas	Não muito surrada
Muda	Tardia e rápida	Precoce e demorada

O avicultor poderá estranhar que as galinhas que apresentam sempre amarelados o anel do olho, esmalte, cloaca e tarsos sejam as de postura menos intensa e mais breve. Há, todavia, uma razão fisiológica explicativa. É que, quando as aves não estão em postura, os pigmentos contidos na ração passam para o corpo, aí se depositando; quando em postura, esses pigmentos não se fixam no corpo, sendo transferidos para a gema do ovo. Assim, à medida que a postura aumenta, as zonas de pigmentação mais intensa vão embranquecendo, dando ao avicultor uma orientação nos trabalhos de seleção: quanto mais ovos botar uma galinha, tanto mais brancas se tornam as partes já citadas, anel do olho, esmalte, cloaca, bico e tarsos.

Adquirida a prática necessária, o avicultor poderá examinar as suas aves com relação à perda do pigmento e determinar com precisão razoável a sua postura. A escala que se segue indicará as zonas do corpo que deverão ser examinadas, na seguinte ordem:

1) CLOACA — A pele ao redor da cloaca é a primeira a perder o pigmento (desbotar); quando se observa uma cloaca completamente desbotada, a galinha terá posto de 6 a 8 ovos.

2) ANEL DO OLHO — A margem das palpebras, ao redor do olho, é a zona que se descora em segundo lugar. Esse descolorimento indica que a ave já botou de 8 a 10 ovos.

3) ESMALTE — ou brinco — O descolorimento do esmalte somente se observa em raças que têm o esmalte branco, indicação uma postura de 10 a 15 ovos.

4) BICO — A base do bico, perto da cabeça, descora-se em primeiro lugar e a cor amarela vai desaparecendo da base para a ponta; quando só a base está descorada, isto significa uma postura de 19 ovos, mais ou menos; um bico inteiramente branco representa uma postura de 35 a 40 ovos.

5) TARSOS — Os tarsos, canelas, perdem o pigmento amarelo em último lugar. Essa perda começa pela parte da frente da canela, seguindo-se a parte posterior e, por fim, a junta tarsiana. Quando houver despigmentação total dessas partes, teremos uma postura de 110 ovos, aproximadamente.

De posse desses elementos e do controle diário da produção, poderá o avicultor entrar nos galinheiros e separar as aves que estão prejudicando o ren-

dimento da produção. Naturalmente, no começo não será fácil, mas, com a prática e a observação diária das aves, o trabalho será realizado a contento.

Um primeiro exame poderá ser feito nos meses de agosto a outubro, quando a postura é intensa; as frangas, que não satisfizerem as exigências da escala apresentada, deverão ser afastadas. Outro repasse deverá ser feito antes do Natal, quando serão vendidas para o corte as frangas de muda precoce, pois a seleção das frangas pela muda é uma medida das mais seguras e acertadas de que dispõe o avicultor. As galinhas que passam mais tempo sem iniciar a troca das penas serão melhores poedeiras do que as outras, que a iniciam muito cedo.

O último repasse poderá ser feito na primeira quinzena de março. Desse modo serão vendidas para o corte as galinhas fora de condição e aquelas que sobram poderão ficar no galinheiro para o segundo ano de postura, como poedeiras ou reprodutoras.

De um modo geral, a seleção das poedeiras deverá ser feita sempre que a produção de ovos não corresponder ao trato e manejo e daí eliminar aves fora de condição, por doença, defeitos e acidentes.

MAIOR ESTÍMULO À EXPANSÃO DA AVICULTURA

Associações e cooperativas estão solicitando maior atenção da Comissão Nacional de Avicultura para medidas que proporcionem novas condições econômicas para a expansão da avicultura no País. Reclamam essas entidades a formação de cursos de capacitação profissional para melhor assistência técnica e a execução de um plano de pesquisas sobre alimentação de aves de plantéis, a fim de melhorar a produtividade dos granjos. Na última reunião da C.N.A., salientaram os representantes e líderes das classes avícolas que os benefícios dos investimentos oficiais feitos com esse objetivo proporcionarão melhora substancial no padrão de alimentação da população do Interior, além de fortalecer a economia rural. As entidades da classe insistem em um trabalho de maior profundidade e extensão do Projeto-42 (Avicultura), resultante do acordo entre o Escritório Técnico de Agricultura Brasil-Estados Unidos e o Ministério da Agricultura, pela Divisão de Fomento da Produção Animal, cujos planos de ação conjunta foram retardados em virtude de cortes em verbas orçamentárias nos anos anteriores.

ABRIL DE 1959

De acordo com as declarações do diretor do referido Projeto, sr. Mário Vilhena, também presidente da Comissão Nacional de Avicultura, os trabalhos reclamados pelos avicultores deverão ser realizados no atual exercício, pois no orçamento do Ministério da Agricultura estão consignadas verbas específicas para isso. Entre as medidas programadas, constam a instalação de unidades avícolas, postos de demonstração, controle de produtividade e outros que virão dar condições de segurança ao avicultor.

FORNECIMENTO DE REPRODUTORES

O "Cinturão Verde", através de suas Casas da Lavoura de Itabaia, Capital, Cotia, Franco da Rocha, Guararema, Ibiúna, Itapeverica da Serra, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mauá, Moji das Cruzes, Nazaré Paulista, Piedade, Poá, São Roque, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santo André, Santo Amaro, Santa Isabel, São Bernardo do Campo e Suzano, comunica que a Escola Agrícola de Jacaréi poderá fornecer reprodutores de porcos das raças Nilo, Berkshire, Duroc, Edelschwien e Coruncho, com 2 a 3 meses de idade.

— 65 —

Avicultor:

A qualidade e a eficiência dos produtos RHODIA na defesa da avicultura

AVISSULFA: - Eficiente medicamento polivalente. Por sua eliminação lenta a **AVISSULFA** dá lugar a uma sufamídemia elevada e persistente, que favorece a destruição dos micróbios das doenças.

Aos primeiros sintomas de Coccidiose, Pulorose, Tifo ou Cólera Aviária, aplique **AVISSULFA** em tratamento individual ou coletivo.

LIO-DIFTERINA - Vacina preventiva da boubá aviária.

ROYA-10: - Suplemento para rações à base de **ROYAMICINA** — o mais moderno antibiótico, custa menos e ainda aumenta mais o peso e a postura de suas aves:

VACINA NEWCASTLE RHODIA: - Sòmente a vacinação preventiva pode evitar que a doença de **NEW CASTLE** acabe com as suas aves — **VACINA NEWCASTLE RHODIA** — Máxima facilidade na vacinação: emprega-se, simplesmente, na água de beber. Póde ser utilizada, também, em injeções intramusculares.

... e lembre-se: **QUALIDADE TAMBÉM É ECONOMIA!**

Peça folhetos e informações à

Companhia Química Rhodia Brasileira

DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Rua Libero Badaró, 101/119 - 4.º andar

Telefone: 37-3141 - Rede Interna

Caixa Postal 1329 - SÃO PAULO

A marca de confiança

TAMBÉM A SERVIÇO DA AVICULTURA

ASSOCIAÇÕES AVICOLAS, ÓRGÃOS OFICIAIS, FIRMAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS GRANJAS, COOPERATIVAS, COMISSÁRIOS E MATADOUROS.

ASSOCIAÇÕES AVICOLAS

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE AVICULTURA
Av. Ipiranga, 1.248 — 4.º andar — Sala 404
— Tel. 36-9805 e 37-9755 — S. Paulo.

UNIÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Ipiranga, 1.248 — 10.º andar — Tel. 33-2278 — S. Paulo.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA AVICULTURA

Alimentos

CARLOS BUTORI & CIA.
Al. Olga, 279 — Tel. 52-8330 — São Paulo.

ALPAN — ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA.
Rua São Bento, 470 — 12.º andar — Sala 1.206 — Tel. 33-3391 e 36-0016 — S. Paulo

AVISCO — AVICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
Rua Artur Azevedo, 1.643 — Tel. 80-2161 — São Paulo.

D-RAÇA — AVICULTURA, LAVOURA E PECUÁRIA LTDA.
Rua Pinheiros, 913 — Tel. 8-8693 — São Paulo.

EXATIL — LAVOURA E PECUÁRIA
Rua Saldanha Marinho, 199 — Tel. 3-557 — Campinas — S. P.

MOINHO DA LAPA
Rua Paula Souza, 365 — 5.º andar Tel. 35-8347 — São Paulo

MUSA S/A
Rua Santa Rosa, 262 — Tel. 33-5951 — São Paulo.

RAÇÕES AVEVITA (MOINHO FLUMINENSE)
Rua Boa Vista, 314 — 4.º andar — Caixa Postal, 260 — Tel. 33-3164 — São Paulo.

RAÇÕES SANTISTA (MOINHO SANTISTA)
Largo do Café, 11 — Cx. Postal, 507 — Tel. 33-6111 — São Paulo.

REFINAÇÕES DE MILHO BRASIL
Rua Xavier de Toledo, 14 — 4.º andar — Tel. 34-7131 — São Paulo.

SOCIÉTÉ DES SUCRÉRIES BRÉSILIENNES — INDUSTRIAS ANEXAS
Caixa Postal, 97 — Tel. 4-475 — Piracicaba — S. P.

SOCIL — PRÓ-PECUÁRIA S/A
Rua Ministro Campos Vergueiro, 85 — Tels. 5-0298 e 5-0050 — São Paulo.

Material avícola

AGROTEC
Rua Artur Azevedo, 1.967 — Tel. 80-5142 — São Paulo.

CENTRAL DE INCUBAÇÃO DOURADO
Rua Pinheiros, 732 — Tel. 80-9994 — São Paulo.

COMPANHIA AVICOLA SÃO PAULO
Rua 25 de Janeiro, 233 — Tel. 34-1754 — São Paulo.

AVISCO — AVICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
Rua Artur Azevedo, 1.643 — Tel. 80-2161 — São Paulo.

ETERNIT DO BRASIL — CIMENTO, AMIANTO
Rua Xavier de Toledo, 266 — 10.º andar — sala 104 — Tel. 34-3008 — São Paulo.

FABRICA DE MISTURADORES "LYNCE"
Cx. Postal, 45 — Tel. 112 — Atibala - S.P.

FABRICA DOVE
Praça Souza Aranha, 83 — Tel. 51-6016 — São Paulo.

INDÚSTRIAS ALBAR
Rua Coriolano, 125 — Tel. 62-1843 — São Paulo.

INDÚSTRIAS LUCATO
Rua Tiradentes, 1.315 — Cx. Postal, 61 — Limeira — S. P.

J. WILSON DA COSTA
Rua 13 de Maio, 817 — Tel. 35-7452 — São Paulo.

MUSA COMERCIAL
Rua Santa Rosa, 262 — Salas 5/8 — Tel. 33-5951 — São Paulo.

ONDALIT — S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Av. Vieira de Carvalho, 132 — 10.º andar — Conj. 102 — Tel. 34-3368 — São Paulo.

RIGEZA (Caixas de Papelão para Pintos)
Rua Major Sertório, 110 — 4.º andar — Tel. 35-0367 — São Paulo.

Pintos de um dia

AGROTEC
Rua Artur Azevedo, 1.967 — Tel. 80-5142 — São Paulo.

AVISCO — AVICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A
Rua Artur Azevedo, 1.643 — Cx. Postal, 6.920 — Tel. 80-2161 — São Paulo.

CENTRAL DE INCUBAÇÃO DOURADO
Rua Pinheiros, 732 — Tel. 80-9994 — São Paulo.

D-RAÇA — AVICULTURA, LAVOURA E PECUÁRIA
Rua Pinheiros, 913 — Tel. 8-8693 — São Paulo.

FAZENDA BELA ALIANÇA
Caixa Postal, 343 — Tel. 9-1986 — Campinas — S. P.

FAZENDA PARAÍSO
Itatiba — S. P.

GRANJA ARCO-IRIS
Praça dos Expedicionários, 10 — Tel. 24 — São Roque — S. P.

GANJA CARMELA
Estância Lynce — Atibala — S. P.

GRANJA CASTANHEIRO
Caixa Postal, 235 — Jundiá — S. P.

GRANJA CENTRAL
Av. Fernando Costa, 230 — Cx. Postal, 92 — Mogi das Cruzes — S. P.

GRANJA DUDU
Rua Xavantes, 176 — Cx. Postal, 7.917 — Tel. 9-8884 — São Paulo.

GRANJA DA FAZENDA SÃO PEDRO
Valinhos — São Paulo

GRANJA GUARA
Cx. Postal, 12.633 (Santo Amaro) — Tel. 61-5325 — São Paulo.

GRANJA ITÓ
Caixa Postal, 273 — Tel. 44-1985 — Santo André — S. P.

GRANJA MALAVAZI
Caixa Postal, 61 — Limeira — S. P.

GRANJA MONTE SANTO
Rua Pinheiros, 279 — Tel. 8-2500 — São Paulo.

GRANJA REGINA
Caixa Postal, 171 — Rio Claro — S. P.

GRANJA SAKAI
Av. Voluntário Pinheiro Franco, 74 — Cx. Postal, 99 — Mogi das Cruzes — S. P.

GRANJA SANTA RITA
Brotas — S. P.

GRANJA SANTO ONOFRE
Caixa Postal, 4.913 — Tel. 9-0293 — São Paulo.

GRANJA SÃO PAULO
Caixa Postal, 46 — Vinhedo — S. P.

GRANJA SHIGUEFO
Estrada do Corcuera, km-6 — Caixa Postal, 11 — Mogi das Cruzes — S. P.

GRANJA TUPI
Itapeccirica da Serra — S. P.

GRANJA UNIÃO
Rua Barão de Jaceguai, 1.707 — Caixa Postal, 61 — Mogi das Cruzes — S. P.

GRANJA VAJATA
Via Anhanguera, km-105 — Campinas-S.P.

GRANJA YPE
Cx. Postal, 12.707 (Santo Amaro) — Tel. 61-2261 — São Paulo.

Antibióticos, sais minerais, vitaminas, medicamentos em geral

COMPANHIA QUÍMICA RHODIA BRASILEIRA
Rua Líbero Badaró, 119 — Caixa Postal, 1.329 — Tel. 37-3141 — São Paulo.

CYANAMID QUÍMICA DO BRASIL S/A.
Rua Lavapés, 326 — Cx. Postal, 1.750 — Tel. 35-4777 — São Paulo.

E. R. SQUIBB & SONS, S/A
Av. João Dias, 2.758 — Tel. 61-2141 — São Paulo.

FONTOURA-WYETH S/A
Rua Caetano Pinto, 278 — Tel. 37-7111 — São Paulo.

PARMOPECUÁRIA S/A
Rua Adrubal Nascimento, 502 — Cx. Postal, 1.666 — São Paulo.

LABORATÓRIO BRASILEIRO DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A (ISA)
Praça Cornélla, 96 — Tel. 62-4178 — São Paulo.

LABORATÓRIO EATON DO BRASIL LTDA.
Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1.212 — Tel. 32-6501 — São Paulo.

MERCK-SHARP & DOHME S/A
Rua Augusto Severo, 41 — Tel. 37-9505 — Caixa Postal, 8.734 — São Paulo.

PFIZER CORPORATION DO BRASIL
Rua Dr. Cândido Espinheira, 143 — Caixa Postal 5.291 — Tel. 51-9101 — São Paulo.

PROVIMI DO BRASIL S/A
Av. Liberdade, 65 — 6.º and. — Tel. 35-4743 — Cx. Postal, 2.167 — São Paulo.

SABLA LTDA.
Rua 15 de Novembro, 228 — 4.º andar — Tel. 35-6025 — São Paulo.

SIVAM — CIA. DE PRODUTOS PARA FOMENTO AGRO-PECUARIO
Rua Sete de Abril, 105 — Cx. Postal, 9.054 — Tel. 35-0921 — São Paulo.

TORTUGA — CIA. ZOOTÉCNICA AGRÁRIA
Av. João Dias, 1.356 — Cx. Postal, 12.635 (Santo Amaro) — Tel. 61-1856 — S. Paulo.

COOPERATIVAS AVICOLAS

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA
Rua Cardinal Arcoverde, 2.539 — Tel. 8-2191 — São Paulo.

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOGI DAS CRUZES
Rua Senador Queiroz, 537 — Tel. 33-7614 — São Paulo.

COOPERATIVA AVICOLA DE JAU
Rua Senador Queiroz, 498 — 5.º andar — Sala 53 — Tel. 36-0909 — São Paulo.

COOPERATIVA BANDEIRANTE
Rua Barão Duprat, 545 — Tel. 34-7021 — São Paulo.

COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA DE SÃO PAULO
Praça João Mendes, 182 — 3.º andar — Tel. 33-7830 — São Paulo.

COOPERATIVA CENTRAL AGRÍCOLA SUL-BRASIL
Rua Américo Brasiliense, 419 — Tel. 37-1156 — São Paulo.

COMISSÁRIOS DE AVES E OVOS

- AVIÁRIO PAULISTANO**
Rua Dr. B. Rodrigues, 295 — Tel. 33-3749 — São Paulo.
- AVÍCOLA BANDEIRANTE**
Rua C — Mercado Municipal, 9 — Tel. 32-6587 — São Paulo.
- AVÍCOLA BONSUCESSO**
Rua Afonso Celso, 1.337 — Tel. 7-3683 — São Paulo.
- AVÍCOLA CANTAREIRA**
Rua Cantareira, 1.060 — Tel. 35-1492 — São Paulo.
- AVÍCOLA CAPANO LTDA.**
Rua Maria Benedita, 14 — Tel. 32-2264 — São Paulo.
- AVÍCOLA CENTENÁRIO**
Rua 25 de Março, 215 — Tel. 32-2642 — São Paulo.
- AVÍCOLA D. PEDRO II**
Rua 25 de Março, 226 — Tel. 32-7496 — São Paulo.
- AVÍCOLA FERREIRA**
Rua 9 — Mercado Municipal — Tel. 32-6587 — São Paulo.
- AVÍCOLA IPIRANGA**
Rua Silva Bueno, 873 — Tel. 63-2229 — São Paulo.
- AVÍCOLA MODELO ARAPONGAS**
Rua Gal. Rondon, 69 — Tel. 52-6746 — São Paulo.
- AVÍCOLA NOVA ERA**
Rua 25 de Março, 219 — Tel. 32-3981 — São Paulo.
- AVÍCOLA ROCHA**
Rua Aplacás, 489 — Tel. 62-4673 — São Paulo.
- AVÍCOLA SÃO PAULO-RIO LTDA.**
Praça Fernando Costa, 42 — Tel. 33-1697 — São Paulo.
- AVÍCOLA SUPER-AVÍCOLA**
Rua Calubi, 1.098 — Tel. 62-3422 — São Paulo.
- AVÍCOLA UNIDA**
Rua Maria Benedita, 20 — Tel. 32-8674 — São Paulo.
- AVÍCOLA VITORINO**
Rua 25 de Março, 148 — Tel. 33-1071 — São Paulo.
- AVICULTURA CONCORDIA**
Largo da Concórdia, 80 — Tel. 9-1196 — São Paulo.
- AVICULTURA OLIVEIRA**
Rua Silva Jardim, 77 — Tel. 9-7954 — São Paulo.
- AVISCO — AVICULTURA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A**
Rua Artur Azevedo, 1.643 — Cx. Postal, 6.920 — Tel. 80-2161 — São Paulo.
- CIA. HARKSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO KIBON (Compra ovos na safra)**
Rua Pres. Soares Brandão, 237 — Caixa Postal, 2.834 — Tel. 36-0141 — São Paulo.

GRANJAS AVÍCOLAS

CAPITAL

- GRANJA GUARÁ**
Estrada de Guarapiranga — Tel. 61-5325 — (Santo Amaro) — São Paulo.
- GRANJA MONTE SANTO**
Rua Pinheiros, 279 — Tel. 8-2500 — São Paulo.

MOGI DAS CRUZES

- COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOGI DAS CRUZES**
Rua Decadato Wertheimer — Mogi das Cruzes — S. P.
- GRANJA CENTRAL**
Av. Fernando Costa, 230 — Mogi das Cruzes — S. P.
- GRANJA SAKAI**
Av. Voluntário Pinheiro Franco, 589 — Mogi das Cruzes — S. P.
- GRANJA SHIGUEFO**
Estrada do Corcuera, km-6 — Tel. 194 — Mogi das Cruzes — S. P.
- GRANJA UNIÃO**
Rua Barão de Jaceguai, 1.707 — Mogi das Cruzes — S. P.

MATADOUROS AVÍCOLAS

- AGOSTINHO FERREIRA DOS SANTOS**
Rua João Pacheco, 102 — São Paulo
- AVÍCOLA ROCHA LTDA.**
Rua Aplacás, 479 — São Paulo.
- FRIGORÍFICO ANGLIO**
Rua Anchieta, 35 — 10.º andar — Tel. 33-9171 — São Paulo.
- FRIGORÍFICO ARMOUR DO BRASIL**
Rua João Bricola, 24 — 16.º andar — Sala 7 — Tel. 33-9131 — São Paulo.
- FRIGORÍFICO AVÍCOLA MODELO ARAPONGAS**
Rua General Rondon, 69 — Tel. 52-5746 — São Paulo.
- FRIGORÍFICO WILSON DO BRASIL**
Al. Cleveland, 466 — Tel. 51-9161 — São Paulo.
- GRANJA CAMPO VERDE LTDA.**
Rua Fradique Coutinho, 343 — Tel. 80-9831 — São Paulo.
- GRANJA YPÊ LTDA.**
Estrada Santo Amaro-Itapeverica, km-19 — Tel. 61-2261 — São Paulo.
- GRANJAS REUNIDAS LTDA.**
Rua Bento Pais, 11 — Atibaia — S. P.
- MATADOURO AVÍCOLA ANDRETTO**
Rua João Pacheco, 39 — Tel. 34-4609 — São Paulo.

INSTITUTOS OFICIAIS DE ASSISTÊNCIA À AVICULTURA

- DEPARTAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DA AGRICULTURA**
(Instituto Biológico)
Av. Cons. Rodrigues Alves, 1.252 — Tel. 70-1163 — São Paulo.
— Assistência e controle sanitário dos aviários. Exames e diagnóstico das doenças. Exame de portadores de pulrose, tifo e neurolinfomatose. Preparo e venda de vacinas contra: bouba, doença de New Castle e outras.

DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL — SECÇÃO DE AVICULTURA

Av. Francisco Matarazzo, 455 — Tel. 51-2178 São Paulo.
— Assistência zootécnica em geral. Cursos Rápidos e Práticos de Avicultura. Folhetos sobre manejo da criação. Plantas para instalação de aviários. Venda de ovos e pintos de raças selecionadas.

DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL — SERVIÇO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO DA CAPITAL

CINTURÃO VERDE
Rua Germaine Burchard, 515 — Tel. 62-1553 — São Paulo.
— Assistência técnica às granjas dos arredores da Capital. Central de incubação para incubar ovos em colaboração com os avicultores. Venda de pintos. Fábrica de Rações Balanceadas para pintos e poedeiras. Distribuição de impressos sobre criação de aves.

DIRETORIA DO ENSINO AGRÍCOLA

Escolas Agrotécnicas de Pinhal, Jacarei, Jaboticabal, São Manuel e Presidente Prudente.

— Cursos de Avicultura Prática, formando Práticos de Avicultura.

DIRETORIA DE PUBLICIDADE AGRÍCOLA

Rua Anchieta, 42 — 8.º and. — São Paulo.
— Distribuição de folhetos sobre criação de aves.

DIVISÃO DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (Ministério da Agricultura)

INSPETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
Av. Francisco Matarazzo, 913 — Tel. 51-4869 São Paulo.

— Atestados para embarque de pintos. Licenciamento de medicamentos.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"

Piracicaba — S. P.
Cadeira de Zootecnia — Secção de Avicultura.
Consultas em geral. Venda de ovos e pintos de raças selecionadas.

PROTEÇÃO PARA SUAS AVES?
EXIJA os afamados produtos da

FARMOPECUÁRIA S.A.

PRODUTOS VETERINÁRIOS

de EFICIÊNCIA COMPROVADA

Vacina contra a BOUBA E DIFTERIA DAS AVES

Vacina contra o TIFO AVIÁRIO

Vacina contra a DOENÇA DE NEWCASTLE

CORIZINA

CORIZON

PIGARROL

COCCIDIOSAN

NUTROMINERAL PARA AVES

R. Asdrubal do Nascimento, 502 — S. PAULO — Caixa Postal, 1666

REVISTA DOS CRIADORES

CRIADOR:

OBTENHA MELHORES RESULTADOS

ALIMENTANDO SEUS REBANHOS

com

QUALIDADE SUPERIOR

MOINHO DA LAPA S/A

MOAGEM DE TRIGO — FÁBRICA DE RAÇÕES

ESCRITÓRIO CENTRAL:
RUA PAULA SOUZA, 365 - 5.º ANDAR

FONES: 35-8346 - 35-8347
End. Teleg.: "MOINHOLAPA" - S. PAULO

SECÇÃO INDUSTRIAL:
ESTR. VELHA DE CAMPINAS, 777

TELEFONE: 5-0884
ESTAÇÃO DA LAPA — (Desvio Tapuyo)

A vigência do novo salário mínimo e sua aplicação aos trabalhadores rurais

ROLANDO LEMOS

Também o empregador rural se movimentou em torno da debatida questão da vigência do novo salário mínimo, já que pelo artigo 76 da Consolidação das Leis do Trabalho, o direito ao salário mínimo estende-se aos trabalhadores rurais: — "Salário mínimo é a contraposição mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo o trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, etc."

Assim, consultam-nos sobre o aumento que deve ser dado aos empregados, e quando se tornou objetivo esse aumento.

Ora, a fixação da nova tabela do salário mínimo não determinou, necessariamente, um aumento salarial para os trabalhadores, maxime o trabalhador do campo. Isto porque, o trabalhador rural, que percebe grande parte do seu salário em utilidades, teve, forçosamente maior acréscimo percentual na fixação do novo salário mínimo. Assim, se o valor da residência era de 33% do valor do salário, continuou sendo os mesmos 33%, totalizando Cr\$ 1.716,00 (tomando-se o salário mínimomínimo da região Cr\$ 5.200,00). Ao par disso, teríamos as percentagens de higiene, transporte, além de outros valores de terras para plantio, razão pela qual, com relação ao aumento teríamos que afirmar que, na maioria dos casos, como na indústria, os trabalhadores rurais há muito que vêm percebendo além do mínimo salarial fixado.

Com relação, entretanto ao início da vigência do novo salário mínimo, para aqueles que se devesse realmente pagar diferenças, temos a esclarecer que há pronunciamento quase unânime dos nossos Tribunais Trabalhistas, segundo os quais, o novo decreto 45.106-A de 24 de Dezembro de 1958, teve força de revogar o preceito do artigo 116 da

Consolidação das Leis do Trabalho, que determina a vigência do novo salário somente 60 dias após a sua publicação no Diário Oficial.

Essas decisões têm ido, entretanto, de encontro às lições de renomadas autoridades e mestres do direito, mas os interesses imediatos de ordem política social têm suplantado a serena interpretação legal contida no artigo 116, que determina expresamente: — "O deceto fixando o salário mínimo, decorridos 60 dias de sua publicação no Diário Oficial, obrigará a todos que utilizem o trabalho de outrem mediante remuneração."

Isto posto, seria impertinência de nossa parte, discutir nesse trabalho de orientação prática aos nossos leitores ruralistas, alinhar argumentos contrários à orientação seguida pelos Tribunais, preferindo apenas assegurar que, de acôrdo com o novo decreto 45.106-A, desde primeiro de Janeiro deste ano, àqueles que tem o direito a aumento para alcançar o mínimo legal, devem ser pagos o novo salário mínimo.

Qualquer orientação no sentido de observação ao disposto no artigo 116 da Consolidação das Leis do Trabalho poderá ser mais jurídica, mas não mais realistas.

MONUMENTO AO COWBOY

Um monumento nacional a um dos heróis folclóricos favoritos da América — o cowboy — está sendo elevado no velho território indio perto de Oklahoma. O Hall da Fama e Museu Nacional do Cowboy será construído no alto de um morro e homenageará a indústria do gado por seu papel no desenvolvimento do oeste americano e também a cowboys renomados, homens das planícies, governadores territoriais e outros que foram pioneiros ou ajudaram a perpetuar as tradições ocidentais. Dezesete estados do oeste terão sessões nesse hall para seus heróis.

Um
CAMARADA
que não pode
faltar em
sua Fazenda

desinfetante

GETÊ

indispensável
para:

HIGIENIZAÇÃO
DOS ESTÁBULOS,

BANHO DO GADO,

DESINFECÇÃO
DOS AVIÁRIOS.

O desinfetante GETÊ
é inofensivo para pessoas
e animais domésticos.

INDÚSTRIA DE PRODUTOS
QUÍMICOS "GT" S. A.

Rua Casa do Ator, 90/134
56a Paulo

Norlan - 23.861

AVICULTORES

Para a Produção Eficiente e Econômica em sua Granja,
EXIJA PRODUTOS COMPROVADOS

AVICILIN

Polivitamínico para rações de poedeiras, com antibiótico, vitaminas e sais minerais, em dosagens estimulantes para garantir postura intensa, com ovos de cascas fortes e uniformes.

CRESCILIN

Fórmula completa de antibiótico, vitaminas, sais minerais e fatores de crescimento, com estabilidade comprovada. Única solução para aumentar o rendimento econômico de suas criações proporcionando: Crescimento Rápido — Baixa Mortalidade — Maior Produção — Menor Gasto de Ração.

ZOOSTRESS

Associação de Antibióticos, Sulfaminas e Vitaminas, para ser adicionado nas rações nos casos de:

Doença Crônica Respiratória — Coriza — Tifo Aviário

Aos interessados fornecemos folhetos com amplos informes sôbre os produtos.

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS QUÍMICOS S/A.

DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Praça Cornélio, 96 — Fone: 62-4178

SÃO PAULO - BRASIL

PECUÁRIA LEITEIRA

E PECUÁRIA DE CORTE

A indústria leiteira em nosso meio, mormente nas regiões de maior produção, está passando pela maior crise da sua história, resumida em aumento de produção e aumento de custo, sem correspondente aumentos de preços de venda (dada a exaustão da capacidade de consumo do povo) e de volumes de consumo. Uma só exceção se verificou — é para os produtos de alta qualidade. Para estes não há crise. Queijos, manteiga, leite em pó e outros produtos, perfeitos em suas qualidades encontram pronta saída, mesmo por preços reconhecidamente altos. Daí a conclusão a que se chega: nossa indústria leiteira está condenada ao progresso (num grande plágio ao nosso saudoso Euclides da Cunha) — ou ela evolui, ou desaparece. Tende a desaparecer, nitidamente, a parte negativa da nossa indústria leiteira — os maus fabricantes e os maus comerciantes, cedendo terreno aos profissionais organizados.

Entretanto, a situação nada tem de difícil aos produtores de leite, cuja única preocupação tem de ser a de reduzir o custo da produção mediante racionalização dos trabalhos. Menos vacas; vacas mais bem alimentadas com elementos da própria fazenda; maior litragem por cabeça (ou por úbere) e outras providências de todos conhecidas, redundarão em aumento da produção com sensível redução do custo, tornando assim bons os preços atuais do leite. Nas bases em que nos encontramos, usineiros e industriais laticinistas não podem pagar mais do que estão pagando, visto que a capacidade aquisitiva do consumidor já chegou ao máximo.

Neste mês de março verificaram-se diversas manifestações interessantes, de varias origens, sobre o assunto em estudo, tais como:

1) No programa anti-carestia lido na Hora do Brasil pelo sr. presidente da Republica, o primeiro conselho que s. excia. dá ao povo brasileiro é o de não consumir produtos estrangeiros. O consumo de produtos estrangeiros é uma das causas da nossa crise economica. Então porque motivo a COFAP importa manteiga, leite em pó e outros generos alimenticios de grande produção nacional?

2) Na mesma ocasião em que os usineiros pleiteavam aumento de preço do leite ao consumidor (de Cr\$ 12,00 para Cr\$ 16,50) os produtores de leite pleiteavam aumento do preço, de Cr\$ 6,10 para Cr\$ 6,90, ou mesmo para Cr\$ 8,00 ou Cr\$ 10,00. Diante da corrida à "marcha da fome" parece terem se arreferido os animos pleiteadores deste aumento.

3) Aumento de impostos — fazendo-se uma análise dos impostos que incidem sobre o leite e derivados, verifica-se que o governo é o que mais ganha na brincadeira e isso sem arriscar um níquel. Se o Governo quisesse mesmo contribuir para baixar o preço, pelo menos do leite, que é o produto mais sacrificado com as medidas protecionistas ao consumidor, bastaria tirar do leite os impostos e taxas que lhe incidem. Isso reduziria as despesas em mais de Cr\$ 1,50 e seria uma contribuição realmente util ao consumidor, que, ao final, é quem paga todos os impostos. Infelizmente, a mentalidade oficial do País é o de ser o leite mais uma fonte de renda aos cofres do Governo, do que uma fonte de energia, de vida e de saúde ao povo...

4) De uma grande firma que fornece leite a uma grande industria de leite em pó, anotamos os seguintes aumentos de despesas, a partir de janeiro de 1959:

	Aumento de
Transporte de 1 litro de leite da fazenda ao posto ..	Cr\$ 0,30
Transporte de 1 litro de leite do posto à Usina	Cr/ 0,15
Transporte de 1 litro de leite da Usina à fabrica ...	Cr\$ 0,20
Imposto de compra ao produtor (de 3.4125 para 4,8%) .	Cr\$ 0,07
" " venda à fabrica (de 3.4125 para 4,8%) .	Cr\$ 0,10
Taxa de frigeração (aumento de salários, etc.)	Cr\$ 0,25
	Cr\$ 1,07

Há pouco tempo as despesas por litro eram de Cr\$ 2,60, e agora, Cr\$ 3,67. E todo este aumento foi consequencia de determinação do Governo aumentando o preço da gasolina, de dolares, de salario minimo, etc., etc.

5) Reconhecendo a incapacidade da COFAP em resolver os problemas de abastecimento e de tabelamento de preços, o Governo Federal vai extinguir este órgão criando outro, o INAP (Instituto Nacional de Abastecimentos e Preços)! Será que o Governo não percebe a incoerencia?

6) O comercio de generos alimenticios do Rio de Janeiro, na louvavel pretensão de colaborar com o Governo Federal na luta contra a carestia, propôs, voluntariamente, vender ao consumo varios produtos por preços ligeiramente inferiores aos tabelados. No meio destes se encontra a manteiga que é oferecida a Cr\$ 105,00 o quilo. Não se faz referencia à qualidade. Não se tratará da manteiga norte-americana, da COFAP, encalhada?, ou de manteiga desdobrada tipo nordestina, ou o que é mais fácil — manteiga do sul de Goiás que não encontra saída a 70-80 cruzeiros o quilo, no atacado?

7) O D.P.A. deu publicidade a um interessante trabalho de uma equipe de tecnicos, analisando a industria leiteira paulista e o seu grande avanço. Com muita alegria vimos a confirmação de varias observações por nós feitas, nestes comentarios. O êxito da industria leiteira em São Paulo é cada vez mais sensível. Há aqui muitas razões de ótimas condições ecológicas para grande produção de leite, onde esta matéria prima para a industria tem sido adquirida por preços reconhecidamente baixos. Racionalizemos a produção de leite e sua industrialização de modo a se obter produtos bons e por preços acessíveis, e veremos dentro em breve o nosso Estado ser o lider da industria leiteira nacional!

Confirmam-se plenamente as predições feitas nestas colunas com respeito ao mercado de carnes. Atravessando o período correspondente ao ponto máximo da safra, os preços se mantêm em alta, em parte acompanhando os passos do regime inflacionário vigente, porém sem deixar de demonstrar, de modo cabal, que o fenômeno é peculiar ao tipo de negócio influenciado pela voragem da exportação.

Em recentes declarações de alta autoridade do Ministério da Agricultura aos jornais de todo o País foi claramente exposta a politica de exportação de carnes com a afirmativa de que esse movimento deverá atingir 60.000 toneladas para o ano em curso. A palavra de ordem é conseguir divisas sem atentar aos meios necessários para atingir o objetivo.

Com as medidas restritivas adotadas pelo governo argentino no setor da produção e consumo de carnes, aumentou no Brasil a demanda de produtos cárneos de toda a classe. E que já contávamos com os mercados europeus continentais, habitados desde os períodos anteriores à segunda guerra a re-

correr aos nossos fornecimentos. Ora, tendo cessado, por motivos que não desejamos comentar, as remessas das carnes platinas, as organizações exportadoras da República irmã procuraram em nossos mercados mercadorias que lhes permitissem manter seus contratos e freguêses. Dessa forma, a situação argentina veio, inopinadamente, estimular o movimento brasileiro de exportação, ficando, portanto, somadas as responsabilidades de atendimento dos mercados internacionais. Com isto, enquanto a Argentina está conscientemente preservando seu rebanho, nós, mais perdulários e imediatistas, lançamos a cartada da delapidação. O futuro dirá qual das duas políticas foi a mais acertada e adequada aos interesses nacionais dos dois países que, por muitas características geo-econômicas, devem representar o celeiro do mundo.

Como resultado das considerações expostas, assistimos à matança desenfreada. Já não há mais preocupação de qualidade pois, ao que estamos seguramente informados, o maior volume de exportação é formado de dianteiros ou de carne salgada que servirá de matéria prima para industrialização nas fabricas dos países importadores.

As cotações alcançadas nestes últimos dias, para boiadas gordas de boa qualidade, estão em muitos casos, ultrapassando a casa dos nove mil cruzeiros. O gado magro, que deverá lotar as invernadas para a próxima safra, está sendo negociado em bases mínimas de sete mil e quinhentos cruzeiros.

Os estabelecimentos de matança, grandes e pequenos têm atravessado período de intensa atividade, não sendo poucos aqueles que se preparam tecnicamente para participar da corrida de exportação de carnes curadas por ser esta a classe de industrialização mais simples e que absorve a total produção de dianteiros.

O mercado de suínos também está passando por fase realmente eufórica. Lotes de bom peso e qualidade têm sido procurados em base superior a novecientos cruzeiros a arroba.

Cooperativa de Produtores de Leite de Eloi Mendes

Reconhecendo a necessidade em que se encontram, um grupo de produtores de leite de Eloi Mendes resolveu fundar uma cooperativa, para defesa dos interesses da classe. O objetivo da organização é proporcionar aos fazendeiros uma orientação racional na produção e no comércio do leite, indicando a modalidade mais econômica de aproveitamento desta matéria prima, vendendo-a em natureza a usinas de pasteurização (nos grandes centros de consumo), ou aos grandes estabelecimentos de laticínios da região, ou industrializando-a, obtendo queijos, manteiga, etc, para comércio interestadual.

Todos sabem que na produção e no comércio do leite há uma série de pequenos problemas, que o fazendeiro não pode resolver, dados os múltiplos afazeres que as fazendas de atividade mista proporcionam. As providências para solução destes pequenos problemas são de caráter coletivo, decorrendo daí a vantagem da cooperativa, cujos elementos executivos se propõem resolvê-los em conjunto, com o que se tornam os grandes problemas da produção do leite. Da eficiência na solução destes depende o êxito econômico da atividade.

Eloi Mendes é, no Sul de Minas, o município que maior volume de leite tem apresentado. Em dez anos, sua produção aumentou ocorreu até agora, sem a ação eficiente de uma organização cooperativista, pode-se avaliar o grande incremento que terá, doravante, com a racionalização desta atividade.

Os fazendeiros de Eloi Mendes se reuniram no dia 1º de fevereiro e constituiram a Cooperativa de Produtores de Leite de Eloi Mendes Ltda. (Coprolem), tendo sido eleita, na mesma ocasião, a seguinte direção: Presidente — Amélio Pergentino; Diretor Gerente — Tertuliano Alves; Secretário — Antonio Flausino Pereira Filho; Conselho de Administração — José Procopio Filho, Antonio Roque e José Adello Rezende; Conselho Fiscal — Octavio Marques de Paiva, Antonio Bueno Sobrinho e João Alves Pereira Neto; Suplentes — José Renato Santos, José Roberto Martins e Benedito Balbino.

Por favor,
cure-me.
Agora existe...

MIOZOL

Para frieira, bicheira e ferimentos em geral, devido ao seu grande poder de cicatrização. PREVENTIVO E CURATIVO DAS INFECÇÕES DO UMBIGO DE BEZERROS.

LABORATÓRIO MIOZOL
Rua Mato Grosso, 175 - ARAÇATUBA
EST. DE S. PAULO

SAL "DIAMANTE"

PRODUTO DO RIO GRANDE DO NORTE

GROSSO
XARQUE

MOÍDO
CASCALHO

únicos distribuidores:

S/A MARTINELLI

Rua 15 de Novembro, 200 — 1.º andar
Tel. 34-3985 — Cx. Postal 340 — São Paulo

O PLANO DE REERGUIMENTO DAS FORÇAS PRODUTIVAS DE S. PAULO

JOSÉ BONIFACIO C. NOGUEIRA

A agricultura não tem acompanhado o ritmo de crescimento dos demais setores da economia paulista, não só no que diz respeito ao seu produto, mas também no que respeita ao valor dos investimentos. Ainda que se não disponha de numeros precisos, sabe-se que o dispêndio com a melhoria dos solos, construção de benfeitorias e aquisição de máquinas não se faz no ritmo necessário à manutenção da produtividade por unidade de área ou por unidade de capital. Como reflexo, acentua-se o desnível do salário entre o campo e a cidade, assim como entre as condições de habitação e conforto, gerando o exodo do meio rural, principalmente de braços qualificados, de capital e de empresários, que procuram setores mais remuneradores.

Entre as dificuldades que se opõem à solução do problema, avultam as de natureza cambial. A situação se afigura gravíssimo, pois o preço do café caiu de um nível de 50 cents por libra peso, em que se vinha mantendo de 1955 a 1957, para os 35 cents atuais. Isso significa um decréscimo de receita de 282 milhões de dólares, numa exportação de 15 milhões de sacas. Se o preço cair a níveis mais baixos, de 25 cents, por exemplo, teremos, sem medidas colaterais que determinem o aumento do volume exportado, um decréscimo dramático na receita cambial, que elevará mais ainda o déficit potencial na balança de pagamentos.

A falta de um mercado melhor organizado e de um sistema eficaz de comercialização é outro elemento que tem contribuído para dificultar o desenvolvimento da agricultura em São Paulo. A diferença entre o preço pago pelos consumidores e o recebido pelos produtores é, em geral muito elevada, devido à ineficiência da comercialização, ao desperdício e a eventuais situações oligopolísticas.

O mercado também está sujeito a flutuações violentas de preços, parte devido à sua fácil manipulação, parte devido à própria fraqueza estrutural, ou seja, a incapacidade de poder reter o excedente em anos de safras grandes para colocá-los no mercado, em épocas de safras pequenas.

O elevado preço das terras, por sua vez, tira o estímulo ao agricultor assalariado, que não vê possibilidade de, com a sua poupança, vir a adquirir, no futuro, uma área de terra própria. O assalariados e os parceiros desanimam de se transformar em proprietários, transferindo-se para a cidade em busca de atividades que ofereçam melhor perspectiva. Sendo o valor das terras superior à capitalização dos lucros que podem ser obtidos com a exploração agrícola, os produtores que as arrendam, por não poder comprar, não têm possibilidade de financiamento para a melhoria da produtividade.

OBJETIVOS BASICOS

A promoção do suprimento adequado dos mercados consumidores e exportadores de produtos agrícolas, em condições de preços que permitam ao agricultor um nível de renda estável e em paridade com os demais setores de economia é, assim, o grande objetivo da agricultura de São Paulo. Para sua consecução, faz-se necessário:

- 1 — Aumento da produtividade econômica das explorações, com o emprego de máquinas, adubos, melhor preparo e conservação do solo etc., e também, no caso da exploração animal, reprodutores selecionados, melhora dos pastos, rações equilibradas etc;
- 2 — Melhora das condições econômicas dos trabalhadores rurais;
- 3 — Comercialização eficiente dos produtos agrícolas;
- 4 — Manutenção dos recursos naturais, que têm sido gas-

tos de forma primitiva e perdularia, tanto os recursos florestais, que foram simplesmente queimados, como a própria fertilidade do solo, que foi rapidamente exaurida pelo fogo e por culturas sucessivas, sem o emprego de fertilizantes e de práticas de combate à erosão.

O ESTADO E A UNIÃO

Esses objetivos não podem ser totalmente alcançados por um programa estadual. O emprego de adubos, de máquinas e de muitos outros implementos essenciais ao aumento de produtividade está na dependência de valores cambiais ou de importação direta pelo governo federal; no momento, as condições gerais não permitem sua aplicação mais ampla. O governo estadual poderá apenas esclarecer o agricultor quanto às condições em que o emprego desses elementos se torne economicamente vantajoso. Por meio de modificações no imposto territorial, concedendo diversas isenções aos pequenos lavradores, e da adoção de leis que garantam melhores condições de parceria, de salário e conforto aos trabalhadores, bem como pela da instituição de financiamento e comercialização favoráveis ao pequeno proprietário, o Estado poderá propiciar a melhora das condições econômicas do trabalhador rural.

Ensino agrícola eficiente e fortalecimento das cooperativas são o caminho para habilitar o trabalhador rural a explorar economicamente a pequena propriedade.

Na conservação dos recursos naturais, o Estado pode, por meio de legislação especial e de esclarecimento dos produtores, criar uma consciência conservacionista. Assim, pode-se estabelecer o seguinte roteiro de trabalho: 1) fazer com que os agricultores aumentem as culturas e criações que melhor se adaptem à conjuntura; 2) fazer com que o aumento se processe com técnica intensiva, sempre que se mostre econômica e seja acompanhada das necessárias medidas de conservação do solo; 3) facilitar a reorganização das fazendas de café; 4) promover a melhora das condições de comercialização, de modo a permitir que os produtores obtenham melhor preço para os seus produtos, sem que isso resulte em encarecimento para os consumidores.

O PROBLEMA AGRARIO EM S. PAULO

Essas, as linhas gerais do problema agrário em S. Paulo e de sua solução. Em particular, cada uma das atividades rurais paulistas, para que seu desenvolvimento se processe eficientemente, exige providências especiais, que compendiamos em esquemas próprios. Cabe aqui lembrar a consideração que dispensamos ao café, à pecuária de leite, à seringueira e oliveira, à rede de silos e armazéns, ao Centro de Abastecimento, ao financiamento especial, à intensificação da pesquisa, assistência técnica e fomento e à instalação adequada das casas de lavoura. No que respeita a serviços, a produção e certificação de sementes e mudas, a fiscalização do comércio de produtos de origem vegetal e animal, assistência sanitária animal e vegetal, inseminação artificial, serviços de economia rural, pesca, ensino agrícola, imigração e colonização. Casos especiais: os problemas de geologia e geografia, serviço florestal, pesquisa pura e pesca marítima.

Em suma, cuidamos de indicar as possibilidades de cada uma das culturas de exploração econômica, tanto no que res-

(Conclui na página 86)

PROGRESSO

para sua fazenda!

FORDSON DEXTA DIESEL

- Motor Diesel de 3 cilindros, de eficiência aumentada
- Contrôles instrumentos agrupados no painel
- Freios de direção - de trava conjunta
- 6 velocidades à frente e 2 à ré
- Alavanca de controle hidráulico, de quadrante único e seletor de serviços simplificado
- Direção com fricção mínima e acelerador manual de fácil manejo
- Ampla caixa de ferramentas ao alcance da mão
- Capacidade de tração para arados de 3 discos

OUÇA de 2.ª a sábado — das 6 às 7 horas — o programa

"Rádio-Folhinha Ford"

pela Rádio Bandeirantes de São Paulo, em cadeia com 62 emissoras, norte-sul do País.

PARA A ARAÇÃO

PARA O CULTIVO

O MAIS "JEITOSO" E
ECONÔMICO TRATOR PARA
TODOS OS SERVIÇOS!

**PARA PRONTA
ENTREGA**

É de um Fordson Dexta que V. precisa, para fazer sua lavoura render mais! O Fordson Dexta não enjeita trabalho! Ara, destoca, gradeia, cultiva, aciona motores. Trabalha o ano inteirinho, sem dar enguiço!

**ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
PERMANENTE!**

Converse sôbre êste grande negócio
com seu Revendedor **FORD**

MAIS DE DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS VENDIDOS

A Associação Paulista de Criadores Bovinos fez realizar no dia 6 deste, no Parque Fernando Costa, o seu VII Leilão de Gado Leiteiro, que, diga-se de passagem, alcançou o mais completo êxito apesar da anormal situação econômico-financeira que atravessamos. Avultada foi a concorrência de afeiçoados e inú-

meras as disputas em torno dos produtos licitados.

Entre os presentes notavam-se muitos criadores de outros Estados, confirmando mais uma vez ser São Paulo, no Brasil, o maior centro de criação de gado leiteiro de pedigrí.

No que tange a organização, o certame

nada deixou a desejar, tendo-se corrigido falhas observadas nos leilões anteriores. O catálogo com os pedigrís pormenorizados sobre cada animal a ser apregoado foi distribuído com alguma antecedência o que facilita sempre a escolha dos interessados.

Na parte sanitária foi seguida rigorosamente as exigências federais e estaduais. Aliás, a esse respeito antecipadamente ao leilão, o dr. João Laraya falando à imprensa diária afirmou que tinham sido tomadas todas as providências necessárias para que os citados bovinos fossem submetidos às provas de tuberculina e de soro-aglutinação, para diagnóstico da brucelose. Tais provas foram executadas por médicos veterinários do Instituto Biológico, sendo, por isso, a respectiva inscrição sujeita à apresentação dos atestados de isenção de tuberculose e de brucelose assim como da prova de vacinação contra febre aftosa, tudo segundo normas adotadas pela defesa sanitária animal.

O critério escolhido, disse, ainda, o dr. João Laraya, visa garantir os criadores contra a contaminação de seus rebanhos por animais possivelmente afetados, cujo estado só poderia ser positivado já no recinto de Água Branca, se as provas não fossem feitas nas fazendas de origem ou procedência dos bovinos. Tais medidas foram tomadas de acordo com os técnicos do Departamento de Produção Animal, do Instituto Biológico e da Divisão de Defesa Sanitária Animal, do Ministério da Agricultura, como as mais indicadas para a profilaxia e combate da tuberculose e da brucelose. É evidente, no caso, o interesse do Ministério da Agricultura, justamente porque esse órgão da administração federal tomou a si o encargo do financiamento das transações até o limite de 70 mil cruzeiros por cabeça.

Concluindo as suas declarações, o sr. João Laraya afirmou: "Como se verifica, a Associação Paulista de Criadores de Bovinos, entidade que tanto tem propugnado pelo combate e erradicação de tuberculose, não descuidou da parte sanitária dos animais que serão vendidos. Os criadores podem, por isso, ficar tranquilos porque está perfeitamente resguardada a sanidade dos bovinos oferecidos à venda no VII Leilão Leiteiro, no recinto de exposições do Parque da Água Branca".

Antes da abertura dos negócios, os diretores da A. P. C. B. e criadores tiveram a satisfação da visita do dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, atual secretário da Agricultura, que, como fazendeiro, e afeito às lides do campo, logo ao amanhecer estava apreciando os reprodutores expostos e indagando da organização e do interesse pelo certame.

Os trabalhos foram abertos pelo dr. João Laraya, presidente da A.P.C.B.

RAÇA HOLANDÊSA PRETA E BRANCA

Animais vendidos	43
Machos puros de origem vendidos	15
Machos puros por cruza vendidos	2
Fêmeas puras de origem vendidas	1
Fêmeas puras por cruza vendidas	25

Maior preço de macho puro de origem: Cr\$ 75.000,00 — CASTROLANDA L. M. FRANS — 1a 6m. Criado e apresentado pela Sociedade Cooperativa Castrolanda Ltda. Comprador: Companhia Agrícola Rodrigues Alves, Guaratinguetá — S.P.

Maior preço de fêmea pura de origem: Cr\$ 25.000,00 — CASTROLANDIA V. Frieda 4 — 1a 4m. Criada e apresentada pela Sociedade Cooperativa Castrolanda Ltda. Comprador: Orlando Veloso de Almeida.

Maior preço de macho puro por cruza: Cr\$ 21.000,00 — COPACABANA J. K., 12 meses. Criada e apresentada pela D. Pires Agro-Pecuária S/A. Comprador Domingos Farani.

Maior preço de fêmeas pura por cruza: Cr\$ 24.000,00 — EMBARAÇADA DE MONTE D'ESTE — 2 anos. Criada e apresentada pela Companhia Agro-Pecuária Fazenda Monte D'Este. Comprador: Francisco de Paula Rodrigues Alves Netto.

PREÇOS MÉDIOS

Bezerro puro de origem (1 a 12 m)	26.000,00
Bezerro puro por cruza (1 a 12 m)	20.500,00
Bezerra pura por cruza (1 a 12 m)	16.000,00
Macho puro de origem (13 a 24 m)	42.285,00
Fêmea pura de origem (13 a 24 m)	25.000,00
Fêmea pura por cruza (13 a 24 m)	21.100,00
Fêmea pura por cruza (25 a 36 m)	21.150,00
Mestiça (24 a 36 m)	13.500,00
Mestiça (mais de 36 meses)	10.000,00

RAÇA HOLANDÊSA VERMELHA E BRANCA

Animais vendidos	19
Machos puros de origem	11
Machos puros por cruza	8

Maior preço de macho puro de origem importado: Cr\$ 68.000,00 — NELLA 2ªS PRINS — 3a 7m. Criador: A. E. Van S. Vendedor: Cooperativa Agro-Pecuária Holambra. Comprador: João Baptista Ferreira.

Maior preço de macho puro de origem, nascido no Pa's: Cr\$ 60.000,00. Dois produtos — Rio Verdinho Conde Aukel — 11 m. Criado e apresentado pelo sr. Hélio Moreira Salles. Comprador: Miguel Petrilli. O outro produto que alcançou idêntico preço foi: CASTRO IRENA'S JOOP — 1a 2m. Criado e apresentado por Adriano Sleutjes. Arrematado por Miguel Petrilli.

Maior preço para macho puro por cruza: Cr\$ 46.000,00 — MARAMBAIA G. Alex — 1a 4m. Criado e apresentado pelo dr. Luciano Vasconcellos de Carvalho. Comprado por Olavo M. Santos.

PREÇOS MÉDIOS

Bezerras puras de origem (1 a 12 m)	41.800,00
Bezerras puras por cruza (1 a 12 m)	33.750,00
Machos puros de origem (13 a 24 m)	48.250,00
Machos puros por cruza (13 a 24 m)	41.500,00
Machos puros de origem (25 a 36 m — só um)	51.000,00

PALAVRAS DO DR. JOÃO LARAYA,

presidente da A.P.C.B.

cujas palavras publicamos nas página ao lado e a seguir usou da palavra o secretário da Agricultura, dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, que em rápido improviso, asseverou "que dias melhores virão para aqueles que labutam no campo".

AS VENDAS

Nesse leilão em volume de negócios e interesse formou-se em primeiro lugar a raça Holandesa vermelha e branca com a venda de dezenove cabeças pelo preço de Cr\$ 838.000,00. O maior preço da raça foi alcançado por um touro importado, Nella 2° Prins, com 3a e 7m. Foi apresentado pela Cooperativa Agro-Pecuária Holambra e adquirido pelo sr. João Batista Ferreira. Dos puros de origem nacionais dois produtos alcançaram o preço recorde: Cr\$ 60.000,00. Um deles foi Rio Verdinho Conde Auke, 11m, apresentado pelo sr. Hélio Moreira Salles e o outro produto recordista foi Castro Irena's Joop, com 1a. 2m, apresentado pelo sr. Adriano Sleutjes e arrematado pelo sr. Miguel Petrilli. Dos puros por cruza o preço recorde foi alcançado por Marambala G. Alex, 1a 4m, crioulo do dr. Luciano Vasconcellos de Carvalho e arrematado por Cr\$ 46.000,00 pelo sr. Olavo M. Santos.

A A.P.C.B. dá início ao leilão de animais das raças leiteiras.

Em primeiro lugar quero agradecer a presença entre nós do digníssimo sr. secretário da Agricultura, dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira.

Os agricultores e pecuaristas, tão abandonados nos governos anteriores, podem ter a certeza de que dias melhores virão. A vontade de ajudar o homem do campo, o planejamento nos diversos setores da pecuária e agricultura que E. Excia. está elaborando é trabalho de quem tem o firme propósito de acertar. Todos nós que vivemos em contacto com a terra aprendemos a amá-la, somos persistentes, somos tenazes, mas para acompanhar o ritmo da vida de nossos dias, precisamos de leis que garantam o escoamento da produção por preços razoáveis, de financiamento fácil, de adubo barato, para que possamos produzir economicamente.

Nunca tivemos um Secretário que encarasse estes problemas com coragem. Estou certo de que S. Excia. tudo fará, na medida do possível, para retribuir a confiança que nele depositamos.

Agradeço ao dr. Nemésio Gomes, muito digno diretor do Fomento da Produção Animal do Ministério da Agricultura a quem devemos o financiamento deste leilão. O dr. Nemésio Gomes está estu-

dando, presentemente, uma nova modalidade, visando uma cobrança mais efetiva e rápida para imediata aplicação em novos empréstimos.

Agradeço também ao diretor do D.P.A., dr. João Barisson Villares as facilidades que nos proporcionou neste recinto desse Departamento. As técnicas a incansável e eficiente ajuda e orientação — assim como aos criadores que corresponderam ao nosso apelo e trouxeram animais para serem licitados — e a todos os presentes pela solidariedades com que nos estão prestigiando.

Em todo empreendimento, com o tempo vão-se corrigindo seus erros e cremos que nosos futuros leilões serão cada vez mais eficientes, com tribuindo assim a A.P.C.B. para desenvolvimento da pecuária do nosso Estado.

Nos dia 4 a 10 de junho próximo, teremos a Exposição Especializada de Gado Leiteiro com leilão — Os senhores criadores deverão preparar desde já os seus animais e os interessados em aquisições devem providenciar, com antecedência, as suas fichas de idoneidade do Banco do Brasil.

Conto com todos para com uma numerosa e escolhida representação, colocar em destaque, no Brasil, a capacidade do criador paulista.

Aspecto do Leilão

SAIS MINERAIS IODADOS SIVAM

tipo Extra

SAIS MINERAIS VITAMINIZADOS

tipo Star

ROLOS

FOSFO - CÁLCIO - FERRO - IODADO
STAR

SIVAM

COMPANHIA DE PRODUTOS PARA FOMENTO AGRO-PECUÁRIO

MILÃO - FOLIGNO - SÃO PAULO - HAM SUR HEURE - ZARAGOZA

SÃO PAULO - Rua 7 de Abril N.º 105 - Cx. Postal 9054 - Fones: 35-0921 - 35-7237

PORTO ALEGRE - Cx. P. 2521

B. HORIZONTE - Cx. P. 2461

EMBARAÇADA DE MONTE D'ESTE — Francisco de Paula Rodrigues Alves Neto	24.000,00
ESCOLTA DE MONTE D'ESTE — José Cambaúva ESCOTISTA E MONTE D'ESTE — Raul Alves Guimarães	20.500,00
ENTREVISTA DE MONTE D'ESTE — Raul Alves Guimarães	20.500,00
EPOCA D EMONTE D'ESTE — Orlando Candeloro	20.000,00

Proprietário: Cooperativa Agro-Pecuária Holambra — Jaguariúna — SP.

HOLAMBRA ADEMA XXVI — H — 390/868 — Anthony Assumpção	52.000,00
HOLAMBRA AAGJES ADEMA III — Celso Ramalho da Silva	26.000,00
HOLAMBRA RIETS ADEMA XI — João Batista Maciel França	61.000,00
HOLAMBRA MINA'S ADEMA V — Antônio de Oliveira Costa	41.000,00
HOLAMBRA DOETJE'S ADEMA XIII — Horácio de Melo	38.000,00
HOLAMBRA CLARA'S ADEMA XX — José Afonso Junqueira de Barros Cobra	28.000,00
HOLAMBRA ADEMA IMPERADOR H — José Afonso Junqueira de Barros Cobra	26.000,00

RAÇA HOLANDESA, VERMELHA E BRANCA

Proprietário: Coop. Agro-Pecuária Holambra

NELLA 2's PRINS — João Batista Ferreira	68.000,00
HOLAMBRA FLORINE'S PRINS II — Sílvio Bor-san	38.000,00
HOLAMBRA KOOSJE'S WODAN VII — Cia. Cimento Portland Maringá	45.000,00
HOLAMBRA ROOSJE'S PRINS — Manoel Ferraz do Vale	40.000,00

Proprietário: Adriano Sleutjes — Castro - Pr.

CASTRO KLAARTJE'S JOOP III — Soc. Agr. Restinga S/A	50.000,00
CASTRO IRENA'S JAAP — Miguel Petrilli	60.000,00
CASTRO MINAS HENDO — Miguel Petrilli	51.000,00
CASTRO MINA'S JOOP — Ivens Vieira	36.000,00

Proprietário: Luciano Vasconcelos de Carvalho — Vinhedo-SP

MARAMBAIA IMPERIO TEIANO — Comercial Sto. Antônio	31.000,00
MARAMBAIA IDOLO TEIANO — Ivens Vieira ..	42.000,00
MARAMBAIA GUARÁ DIAMANTINO — Miguel Petrilli ..	45.000,00
MARAMBAIA GENOVÉS ALEX TEIANO — Olavo M. Santos ..	46.000,00
MARAMBAIA IVAN TEIO DIAMANTINO — Sílvio Gomes de Camargo	39.000,00
MARAMBAIA IRAPUA ALEX DIAMANTINO — Miguel Petrilli	36.000,00
MARAMBAIA INVICTO DIAMANTINO — Virgílio Lemos da Silva	31.000,00
MARAMBAIA INVENTOR TEIO HEINIANO — Luiz Antônio Junqueira	41.000,00

Proprietário: D. Pires Agro-Pecuária S/A — São Carlos - SP

FAZENDA DE COPACABANA — Manoel Carlos Gonçalves ..	16.000,00
--	-----------

Proprietário: Hélio Moreira Salles — Casa Branca - SP.

RIO VERDINHO CAPATAZ AUKE — Roberto Fernandes Moreira	31.000,00
RIO VERDINHO CONDE AUKE — Miguel Petrilli	60.000,00
RIO VERDINHO CAMPEIRO — Luiz Antônio Junqueira ..	32.000,00

ABRIL DE 1959

PARA MELHORAR a Higiene Rural Apareceu

Gyrolar

DESINFETANTE

NA AFTOSA E FRIEIRA DO GADO: — fazer a desinfecção dos cascos com Gyrolar.

PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO das Cocheiras, Currais, Estábulos, Cavalariças, Poçilgas, Apriscos, Galinheiros.

PARA A HIGIENE PROFILÁTICA NA AVICULTURA: — empregar o Gyrolar.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BOLETINS VETERINÁRIOS

Gyrol

Caixa Postal 1643 — SÃO PAULO

RAÇA JERSEY

Proprietário: Cesar Francisco Bereta e Novi — Itapecerica da Serra — SP.

AMAZONAS DO EMBU — Albino Hosken de Oliveira ..	31.000,00
BIMBA DO EMBU — Danilo Vautier Franco	50.000,00
CAPITU (mestiça Jersey) — Albino Hosken de Oliveira ..	18.000,00

Proprietário: T. R. Warren — Santo Amaro, São Paulo - SP

BALLY OCA BORBOLETA — Virgílio Lemos da Silva ..	15.500,00
BALLY MINEIRO ROYAL — Isac Ferreira de Almeida ..	15.000,00
BALLY GALICIA ANGÉLICA — Danilo Vautier Franco ..	14.000,00

RAÇA SCHWYZ

Proprietário: Edgard Jafet — Jaguariúna - SP.

MIRKO DO CAMANDUCAIA — José Afonso Junqueira de Barros Cobra	75.000,00
--	-----------

Alimentação, dever primordial do Estado

Valter Henrique ZANCANER
(Pecuarista em Guararapes)

É inestimável a importância da alimentação na vida dos povos. Tão grande é o seu valor, que um dos primeiros princípios da FAO é "que a alimentação é o primeiro dever do Estado." Alguns povos que se alimentam mal ou de modo inadequado, apresentam conhecidos distúrbios ou consequências como raquitismo, diminuição de crescimento, membros tortos, e outras molestias carenciais.

Talvez devido à grande extensão territorial do Brasil, ninguém se preocupa realmente com esse problema, quem sabe na ilusão de que a imensidão de terras do Brasil seria suficiente para dar abundância de gêneros. É fácil perceber que, cada dia que passa, a maioria dos brasileiros se alimenta mal e de modo insuficiente. Não falamos somente do Nordeste, onde as secas, flagelando a lavoura e a pecuária, obrigam as populações a um ciclo de emigrações quase constante. No ano de 1958 até a safra de açúcar e a do algodão de fibra longa foram muito prejudicadas pela seca.

A fuga para as cidades no Centro e no Sul do Brasil é um fato atual, que será incrementado com o salário mínimo de Cr\$ 6.000,00. Isso resulta em diminuição do braço disponível para lavoura e pecuária, e aumentam os consumidores nas cidades.

Como no Brasil não existe efetiva garantia de preços para os produtos da agricultura, quando acontece grande produção de um deles, os intermediários baixam os preços pagos no interior, esmagam os lavradores que, não possuindo resistência econômica (principalmente os pequenos e médios rurícolas), vendem pelo preço que encontram, e temos então produtores e consumidores sacrificados a uma voraz intermediação. No ano seguinte temos então uma "corrida" para produzir aquilo que deu bom preço no ano anterior, abandonando-se outros artigos também importantes para o abastecimento. Essa balart'gos também importantes para a produção de gêneros alimentícios, burdia provoca quedas na produção de lavrador, causa desequilíbrio o mercado, deixa a descoberto o lavrador, causa sacrifícios ao consumidor, impede a formação de estabilidade na economia do País, e há muito tempo estamos nesse círculo vicioso.

Lembramo-nos aqui dos Estados Unidos, pois lá quando o produtor não consegue alcançar o preço oficial para o seu produto, o governo compra por intermédio da C.C.C., e vende nas épocas de escassez ou exporta. Entre nós vemos que é mais fácil construir escolas normais e faculdades (até mesmo

em vilas), do que enfrentar com coragem e planejamento os problemas agrícolas, os quais são tratados por todos com desprezo visível e generalizado.

Não podemos pensar em mecanização quando temos gasolina e produtos de petróleo por preços caros, quando a reforma de um trator é mais cara às vezes que seu custo inicial, os pneus, adubos e inseticidas sobem de preço mensalmente, as maquinas agrícolas estão fora de capacidade aquisitiva dos rurícolas, e não existe financiamento para destoca e preparo da terra mecanicamente, principalmente para o pequeno produtor, o mais necessitado, e que aumentaria sua capacidade de trabalho certamente, com o uso maior de animais, arados e carpeleiras.

Temos portanto que o grosso de nossa produção agropastoril ainda é feita pelo braço do trabalhador. Pois é este que precisa de preferência ser amparado, principalmente quando arrenda ou possui pequenas áreas onde quer plantar. Será uma das maneiras de diminuir o ritmo da corrida para as cidades, já que achamos difícil terminar com esse exodo, que está aumentando sempre as favelas citadinas. O que adianta encher o país de prédios escolares, se os alunos estão subalimentados e chegam a desmaiar nas aulas? E de outro lado não serão os novos hospitais sempre insuficientes para o grande numero de doentes, cujas molestias são na maioria, provocadas por desnutrição ou má alimentação?

E de pasmar a indiferença dos governos para com a agricultura. Não são solucionados os problemas agropastoris, não existe nem se procura um plano serio, eficiente e duradouro para melhoria e fomento de nossa agricultura. Diminuem-se as verbas para a agricultura! Até quando o Ministério de Agricultura terá só 8% do orçamento da União, e os três ministérios militares, 33%?

Para culminar com tantos desacertos vem agora o governo federal com congelamento unilateral, pois só para os produtos da terra. Invés de fomento, temos o poder policial, que nunca resolverá uma situação provocada por falta de produção, e que irá certamente desestimular o desanimado produtor. Até quando o dolar para vender café será de Cr\$ 43,00 e o dolar para comprar mercadorias uteis na agricultura será de Cr\$ 200,00 até Cr\$ 300,00? Até quando permanecerá de pé esse monte de erros, desidia, má vontade e confusão? Até quando vamos esperar para nos convencermos que a alimentação é "o dever primordial do Estado"?

SUPLEMENTOS MINERAIS

PROVIMI

para gado bovino

PROVIMI DO BRASIL S/A.

Avenida da Liberdade, 65 - sala 601 - Telefone 35-4743 - Caixa Postal, 2167 - Endereço Telegráfico: PROTEINA - São Paulo

REVISTA DOS CRIADORES

4 NOVILHAS SCHWYZ, p.o., SERÃO VENDIDAS

por FRANCISCO RENNÓ, no Leilão da III Exposição - Feira de Gado Leiteiro, a se realizar em 6 de Junho próximo, no Parque da Agua Branca.

BOM CAFÉ FLUNA — Filha de Olívia

BOM CAFÉ FEIRA DA AGUA BRANCA — Filha de Palmeira 4.

BOM CAFÉ FRAMBOEZA — Filha de Urania, Campeã e Grande Campeã da XXV Exposição Nacional de Animais, realizada no Parque da Agua Branca.

BOM CAFÉ FAVELA — Filha da Alegria.

ESTANCIA SANTA MARIA

Prop. de Benedito Rennó

JACUTINGA - Minas Gerais

(Disto de Itapira (estrada asfaltada) 40 minutos. Estas bezerras poderão ser vistas a qualquer momento).

As novilhas são filhas de Fernando, importado da Suíça. É filho de Furst 1500, que obteve três grandes prêmios e de Bumer 3779 que em 300 dias e em primeira lactação produziu 3.900 quilos de leite com 4% de gordura.

OS CRIADORES OPINAM SÔBRE EXPOSIÇÕES

Marcada para 6 de junho a III Exposição-Feira de Gado Leiteiro promovida pelo Associação Paulista de Criadores de Bovinos e por outras entidades congêneres, em cooperação com o Departamento da Produção Animal da secretaria da Agricultura, a "Revista dos Criadores" empreendeu rápido inquerito entre alguns criadores, visando colher sua opinião a respeito de qualidades e falhas dos certames que em nossa Capital vêm sendo realizados. Se é verdade que muitos dos que procuramos não nos puderam oferecer seu valioso parecer, a qualidade dos pronunciamentos que hoje oferecemos aos leitores preenche cabalmente a ausência que porventura se faça sentir.

Em verdade, trata-se de observações e sugestões de conhecidos pecuaristas, as quais poderão ser de grande utilidade aos organizadores do certame. Sabemos, é certo, que a regulamentação do certame de Junho já foi aprovada, mas a discussão que se estabelece sobre o assunto sempre

será proveitosa, podendo vir a ser utilizadas as idéias novas nos próximos certames.

A propósito, desejamos lembrar que as exposições-feiras foram idealizadas para serem realizadas pelos próprios criadores, com a colaboração dos técnicos dos departamentos oficiais, com a con-

dição de que toda a sua renda viesse a constituir um fundo destinado a promoção de exposições, fundo esse que deveria ser administrado pelos próprios criadores.

As nossas perguntas dirigidas ao criadores da região de São Paulo e regiões tributárias, foram as seguinte:

QUE PREFERE V.S., EXPOSIÇÃO ESPECIALIZADA OU EXPOSIÇÃO NACIONAL? POR QUE?

ACHA V.S. QUE AS EXPOSIÇÕES ESPECIALIZADAS DEVEM SER REALIZADAS PELAS RESPECTIVAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE? POR QUE?

ACHA V.S. QUE SE PODERIA DAR AS EXPOSIÇÕES ESPECIALIZADAS UM CUNHO DE EXPOSIÇÃO NACIONAL, CONVIDANDO EXPOSITORES DE OUTROS ESTADOS?

QUANTO AO JULGAMENTO? QUE PREFERE V.S., JUÍZ ÚNICO OU COMISSÃO DE TRÊS JUÍZES? POR QUE?

ACHA V.S. QUE OS LEILÕES SATISFAZEM COMO MEIO DE VENDA DE REPRODUTORES? POR QUE? TEM ALGUMA SUGESTÃO A FAZER SÔBRE AS EXPOSIÇÕES?

"Sou de opinião que elas devem ser feitas pelas respectivas associações de classe", afirma o dr. João de Moraes Barros, agrônomo e ex-presidente da A.P.C.B.

O sr. dr. João de Moraes Barros, ex-presidente da Associação Paulista de Criadores de Bovinos, grande criador de gado Holandês em Campinas, um dos representantes mais autorizados da classe, ofereceu-nos as seguintes respostas ao nosso questionário:

— Como já tive oportunidade de dizer, até mesmo em entrevista dada a essa «Revista», sou de opinião que as exposições devem ser especializadas e, dentro do possível, regionais. As razões são claras, pois, exposições nacionais obrigam a uma movimentação dispendiosa de ani-

mais de outros Estados e também exigem recintos muito grandes, o que nós não temos: a restrição de número de animais para o aproveitamento dos recintos existentes desvirtua os fins da exposição.

Como organizador da primeira exposição especializada em São Paulo, sou de opinião de que elas devem ser feitas pelas respectivas associações de classe e, naturalmente, tanto as repartições federais e estaduais, devem colaborar no certame, o que, aliás, é indispensável. A responsabilidade, entretanto, deve ser das associações de classe, pois são elas que fazem o registro das diversas raças.

REVISTA DOS CRIADORES

As exposições especializadas poderão ter cunho de exposições regionais, mas nunca nacionais, porque implicam numa movimentação de transporte de animais muito caro.

Quanto a julgamento, prefiro que seja feito por um único juiz. Assim se define perfeitamente a responsabilidade e o critério a que obedecem as decisões. Aliás, a Granja Boa Vista não tomou parte na exposição nacional de Agosto, por diversas razões, sendo a principal o fato de terem feito uma comissão de julgamento, quando sempre me bati por juiz único.

Como iniciador do processo de venda por leilões aqui em São Paulo, sou de

“A direção das exposições pelas associações de classe representa para o expositor uma garantia de sucesso”, assevera o sr. Manoel Carlos Gonçalves, líder pecuarista da região de Pinhal.

Criador em Pinhal, o sr. Manoel Carlos Gonçalves vem-se mostrando não somente grande interessado pelas exposições, mas também conhecedor de seus problemas, como é dos problemas da pecuária, proporcionou-nos valioso depoimento:

— Interessantíssima sua iniciativa de consultar os expositores sobre exposições. Asseguro que todos terão muito que dizer, para evitar que, de certame para certame, cresça o número de desiludidos.

Prestigiando a brilhante idéia dessa

opinião que é o meio mais equitativo para apreciação de valores e que traz maiores facilidades para o confronto dos animais pelos compradores. Além disso, facilitam aos governadores aproveitar as verbas de financiamento que são aplicadas pelas secções de fomento da pecuária.

Para concluir, quero lembrar que, para o aproveitamento de uma exposição, é indispensável a boa compreensão e colaboração de todos que nela influem: expositores, associações de registro, governo federal e governos estaduais e todos aqueles que direta ou indiretamente trabalhem para o certame.

«Revista», verdadeira representante e defensora dos interesses dos criadores, é com o maior prazer que passamos a responder a sua consulta.

As exposições especializadas são as que melhor atendem aos interesses da pecuária e dos pecuaristas. Possibilitam a apresentação de maior número de animais, o que dá, evidentemente, maior idéia do que vale o rebanho, possibilitam o confronto mais amplo entre os animais julgados, o que dá a justa medida de seu valor e, finalmente, levam ao re-

cinto um «público especializado» que avalia o que vê, trazendo melhores oportunidades de negócios.

A direção das exposições pelas associações de classe representa para o expositor uma garantia de sucesso, pois seus diretores, pecuaristas também, conhecem o que interessa e o que prejudica o expositor, que faz não pequenos esforços para apresentar seus animais. Além do mais, já foi provada a maior eficiência desta direção.

As exposições especializadas, se fossem de âmbito nacional, teriam inegavelmente maior brilho.

O juiz único tem todas as vantagens: uniformidade de critério, rapidez e responsabilidade; mesmo porque, sendo tão difícil encontrar-se elementos capazes, as comissões nunca são homogêneas.

Os leilões são indispensáveis, porque estabelecem os valores reais dos animais e proporcionam ao criador um mercado seguro.

Acho imprescindível que os exames sanitários sejam feitos na própria fazenda. Que sejam feitos quantas vezes forem necessários e à custa do criador, mas que se evite a repetição dos acontecimentos da última Nacional, que foram simplesmente lamentáveis.

Todo esforço merece recompensa; que seja um simples diploma de papel ou, se possível, medalhas ou taças, mas que não se desestime o criador, fazendo-o voltar de mãos abanando. Que o critério de distribuição seja uniforme, também é muito importante. Na última Nacional, campeões nada receberam, ao passo que classificações de nenhuma im-

Banco do Brasil S. A.

SÉDE - Rio de Janeiro - Rua 1.º de Março, 66

FILIAL EM SÃO PAULO — Ag. Centro

Novo Edifício — Av. São João, 32 — Fone 37-6161 e ramais e Rua Álvares Penteado, 112

AGÊNCIAS METROPOLITANAS EM SÃO PAULO:

Bosque da Saúde — Avenida Jabaquara n. 476

Brás — Avenida Rangel Pestana n. 1990

Ipiranga — Rua Silva Bueno n. 181

Lapa — Rua Anastácio n. 63

Penha — Rua Dr. João Ribeiro n. 487

Bom Retiro — Alameda Nothmann, 73/7

Moóca — Rua da Moóca, 2728/36

Pinheiros — Rua Iguatemi, 2266/72

Santana — Rua Voluntários da Pátria, 1548

Santo Amaro — Av. Adolfo Pinheiro, 241

Enderço telegráfico para todo o Brasil — SATÉLITE

TAXAS DE JUROS PARA AS CONTAS DE DEPÓSITOS:

DEPÓSITOS POPULARES — Limite de Cr\$ 200.000,00....	5 %
DEPÓSITOS LIMITADOS — Limite de Cr\$ 1.000.000,00..	3 %
DEPÓSITOS SEM LIMITE	2 %
DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO — sem limite avisa prévio superior a 30 dias.....	5 %

DEPÓSITOS A PRAZO FIXO — sem limite

de 1 a 6 meses.....	5 %
de 7 a 11 meses.....	5,5 %
de 12 meses ou mais.....	6 %

O BANCO DO BRASIL S. A. possui Agências nas principais praças do País, além de duas no Exterior (en. Montevidéu e em Assunção), para todas as operações bancárias

Agências em funcionamento no Estado de São Paulo:

Andradina
Araçatuba
Araraquara
Araras
Assis
Avaré
Bariri
Barretos
Batatais
Baurú
Bebedouro
Birigui
Botucatu
Bragança Paulista

Cafelândia
Campinas
Catanduva
Franca
Gorçã
Guaratinguetá
Itapetininga
Itapira
Itú
Ituverava
Jaboticabal
Jaú
Jundiá
Limeira
Lucélia

Marília
Martinópolis
Matão
Mirassol
Mogi das Cruzes
Monte Aprazível
Nova Granada
Novo Horizonte
Olimpia
Orlândia
Paraguacú Paulista
Piedade
Pindamonhangaba
Piracicaba

Pirajú
Pirajuí
Piracununga
Pompéia
Presid. Prudente
Presid. Wenceslau
Promissão
Rancharia
Ribeirão Bonito
Ribeirão Preto
Rio Claro
S. Cruz do Rio Pardo
Santo Anastácio
Santo André

Santos
São Caetano do Sul
São Carlos
São João da Boa Vista
São José dos Campos
São José do Rio Pardo
São José do Rio Preto
São Manuel
Sorocaba
Valparaíso
Votuporanga
Tupã
Teaquaritinga
Taubaté

portância foram contempladas com artísticos troféus.

Julgo que a elaboração de um regulamento único para todas as exposições, sejam nacionais, regionais ou especializadas, só traria vantagens. O desencontro de critério quanto ao limite de idades, categorias, formação de conjuntos, provas

“As associações de classe, mantendo melhor contacto com os criadores, é que deveriam empreender as exposições especializadas” — declara o sr. F. J. Bongersen, diretor da Cooperativa Agro-Pecuária Holambra.

A Cooperativa Agro-Pecuária Holambra, estabelecida na estrada de Campinas a Mogi Mirim, é uma entidade de fundação relativamente recente, mas já bastante conhecida, principalmente dos criadores, que reconhecem a valiosa contribuição que ela trouxe dos nossos plantões. Seus membros e diretores também já se familiarizaram com os nossos problemas e podem oferecer-nos opiniões, principalmente no que se refere a exposições, às quais têm concorrido e onde têm colhido valiosos troféus. Quem responde, em nome dos cooperados, é o sr. F. J. Bongersen, que chefia o departamento de gado da Fazenda Ribeirão:

— Nossas preferências se voltam para as exposições regionais ou estaduais, que oferecem maior interesse aos criadores da região e que aos mais novos proporcionam oportunidade de se iniciarem na matéria. A cada dois anos, poderíamos ter uma exposição nacional. As associações de classe, mantendo melhor contacto com os criadores, é que deveriam empreender as exposições especializadas, o que seria também estimular suas respectivas atividades. Ademais, no caso da nossa sugestão, os juizes das exposições especializadas indicariam os animais a ser enviados à exposição nacional, o que seria dar maior uniformidade e estabelecer um sistema para atingir o tipo desejado. Parece-nos melhor a comissão de três

de identidade, escolha de juizes, etc. tem causado não pequenos disabores aos expositores.

Finalizando, acho que a inauguração dos certames antes do julgamento dos animais faz com que se tornem muito mais interessantes e instrutivos.

juizes. O resultado é mais justo do ponto de vista técnico e se evita que prevaleça o gosto pessoal de um juiz único.

Quanto aos leilões, satisfazem plenamente, quando não realizados nas exposições.

Uma sugestão final: obedeça-se severamente o programa de trabalhos mencionado nas publicações, a fim de não desagradar o público que comparece aos certames pecuários.

“As associações é que deve caber promovê-las”, assevera o dr. Luciano Vasconcelos de Carvalho, reputado criador de gado Holandês vermelho e branco.

O sr. Luciano Vasconcelos de Carvalho, adepto da variedade vermelha do gado Holandês, do qual possui em Valinhos um dos mais apurados rebanhos, tem sido expositor frequente aos certames que se realizam em São Paulo. Sua opinião nos chegou, em poucas palavras, mas eloquente:

— Prefiro a exposição especializada, porque a nacional nada significa num território como o nosso: não consegue ser nacional e se transforma em feira. As associações é que deve caber promovê-las, porque a realização se torna mais flexível e prática. Não haveria, é certo, inconvenientes em que o certame espe-

cializado tivesse o concurso de expositores de outros Estados, mas duvido dos resultados dessa iniciativa.

Quanto ao julgamento, juiz único, regime de responsabilidade.

Os leilões satisfazem. O preço aí é objetivo.

Muito haveria que sugerir sobre as nossas exposições, mas o principal é torná-las lucrativas para a sociedade que as promova e gratuitas para os expositores. Um programa de divertimentos públicos realmente interessantes, com entradas pagas, muito poderia contribuir para isso.

**TRATORES
HANOMAG**
Todos os tipos, para os
mais variados serviços.
Máxima resistência e co-
modidade.
SABRICO
Rua do Grito, 719 - C. Postal 590
SÃO PAULO

ARADOS de diversos tipos
SEMEADEIRAS
GRADES de dentes/discos
CULTIVADORES
ADUBADEIRAS
PULVERIZADORES
POLVILHADEIRAS
ENXADAS
ROTATIVAS "GEM"

Cortadores de forragens
Máquinas para arroz
Moinhos para fubá
Descascadores de café
Trituradores
Engenhos/Moendas

Desnatadeiras — Batedeiras
Latas para leite, etc. etc.

CASA FOSTER

Rua Florêncio de Abreu, 441 - Caixa Postal, 56
SÃO PAULO

FILIAIS:
RIO DE JANEIRO — Av. Almirante Barroso, 91 - 4.º
Caixa Postal, 1412
RECIFE — Rua do Imperador, 290 - Caixa Postal, 907

FOSTER. — A CASA AMIGA DOS AGRICULTORES

Tradicional fornecedora de máquinas agrícolas.

CERCAS ELÉTRICAS BALLERUP

(Dinamarquesas)

Para bovinos - equinos - suínos

Economicas - Seguras - Eficientes - Instalação fácil.
Largamente comprovadas nos Estados Unidos, Europa e
America do Sul. - Laudos a disposição dos interessados.

Representante exclusiva:

Soc. Alfa Ltda. - Fone 80-6766

Rua Bélgica, 152 — CAPITAL

“Caberia às associações realizá-las...”, considera o dr. José Procópio do Amaral, conhecido criador de São João da Boa Vista.

O dr. José Procópio do Amaral, fazendeiro e criador em São João da Boa Vista, é um dos autorizados líderes da classe. No seio das associações pecuárias, sua palavra é sempre recebida com agrado, porque portadora da experiência e do bom senso. Eis como nos respondeu:

— Penso que deveremos preferir realizar exposições especializadas de gado leiteiro, mas de âmbito nacional, pois, sendo o recinto atual do Parque da Agua Branca pequeno para uma exposição de tôdas as raças, não poderão os criadores apresentar seus conjuntos completos. Ca-

beria às associações de classe realizá-las, sempre em cooperação com os departamentos estadual e nacional de produção animal.

O julgamento deverá ser proferido por um juiz único, que assuma a inteira responsabilidade de seu veredicto.

Quanto aos leilões, satisfazem plenamente, maximé quando financiados pelo Ministério da Agricultura.

Como sugestão final, julgo que a exposição especializada nacional deva ser realizada após exposições especializadas regionais, sendo naquela admitidos os animais premiados nestas.

“...devem ser promovidas pelas associações de classe que estejam devidamente organizadas e em condições de realizá-las”, diz o sr. Donald Strang, melhorista do zebu na Alta Noroeste.

De Araçatuba, o sr. Donald Strang nos manda seu parecer sobre a orientação das exposições da Agua Branca. Trata-se de adiantado criador de bovinos de córte e de grande conhecedor dos nossos cer-

tames, cujas qualidades e defeitos sabe apontar.

— Julgo a exposição especializada mais instrutiva — diz-nos ele. — No cômputo geral, apresenta melhores re-

“CADAL”

CIA. INDUSTRIAL DE SABÃO E ADUBOS
Agentes exclusivos do salitre do Chile para o
Distrito Federal, Estados do Rio e Espírito Santo
R. MÉXICO, 111-12.º AND. - SEDE PRÓPRIA
42-0881
TELS.: 42-0115 REDE INTERNA
42-0980

• Solicitem informações e folhetos, gratuitamente

BOLSA DE ANIMAIS DA A.P.C.B.

compra e venda para
qualquer parte do País

SERIEDADE — QUALIDADE — SANIDADE

Rua Jaguaribe, 634 — Telefone: 52-4388 — São Paulo

sultados, tanto práticos, como econômicos e financeiros. Ademais, devem ser promovidas pelas associações de classe que estejam devidamente organizadas e em condições de realizá-las; em caso contrário, deve a tarefa caber ao órgão oficial, assessorado pela classe. Muito acertado seria que contassem com a presença de expositores de outros Estados.

Juiz, único, mas competente, na plena aceção do termo.

Quanto aos leilões, satisfazem, não obstante seja modalidade de venda, à qual nosso homem do campo não está afeito, dada a sua natural timidez. A propósito, precisamos obter para os nossos leilões maior amparo oficial no que diz respeito a financiamento. Na última exposição de Montes Claros, em Minas Gerais, três eram os órgãos financiadores: o Banco do Brasil, a Valorização do São Francisco e a Valorização da Amazônia. Em São Paulo, não poderia o Banco do Estado ser levado a participar desse empreendimento em prol da nossa pecuária?

Para terminar, um conselho: devemos ter cautela, não promovendo certames em excesso e evitando que as respectivas datas coincidam com a de outras promoções, que lhes disputem a assistência. Além disso, cumpre que levemos para o recinto dos nossos certames outros motivos de atração, inclusive de vendas, como acontece na cidade norte-americana de Dallas.

Vacina c/ aftosa LEIVAS LEITE Cr\$ 4,50. Motores. Conjunto geradores. Dinamos. Alternadores. Wincharger. Bombas para irrigação, para poço, para pulverizar com ou sem motor. Polvilhadeiras. Máquinas para picar carne, verdura, palha, capim. Para triturar raízes. Desintegradores. Moinho para tubo dinamarquês, inglês e nacional. Lanternas "Aladim", "Perromax", "Sonambulo", "Tupan". Latões para leite. Coadores. Coalho. Brometo de metila. Formicida "Blenco", "Tatú", "MM 33". Aplicadores para brometo de metila. B.H.C. a 12%. D.D.T. Deenate, Laxane. Gamerial. Gamexane. Sablavita (Vit. 8-12). Sablavina (comp. 8). Sablacina (antibiótico). Oleo de fígado de bacalhau e cação. Delsterou. Sulfato de manganês. Sulphamezotina. Sulfamerazina. Sulfanilamida. Sulfatiazol. Sulfaguanidina. Sulfadiazina. Fenatox. Cuprosan. Perenox. Parzate. Calda sufocálica Dupont. Enxofre. Talco. Pratt's. Termômetros para chocadeiras e animais. Criadeiras Brower. Debulhadores de milho. Lança chamas. Sementes. Tesouros para poda. Torqueza "Burdizzo" e "Hauptner". Seringas "Hauptner" e outras. Agulhas.

Todos os produtos veterinários e agrícolas nacionais e estrangeiros VENDEMOS PELO REEMBOLSO POSTAL LOJA: Rua Florencio de Abreu, 40 Fone: 33-4387

MULTIFARMA
SÃO PAULO

"As exposições especializadas devem caber aos criadores" escreve o sr. Jorge Wilson Franco, antigo criador em Barretos.

Fazendeiro em Barretos, onde mantém valioso plantel de bovinos, o sr. Jorge Wilson Franco, tem sido frequente aos certames da Água Granca, onde seus animais têm conquistado prêmios. Suas respostas a nossas perguntas caracterizam-se pela objetividade:

— *Prefiro que a exposição seja nacional, porque oferece ocasião de encontrarmos criadores de todos os Estados do Brasil. A exposição especializada deve caber às associações de criadores, todas de comum acôrdo. "A união faz a força". E essas especializadas deveriam ser intercaladas entre as exposições nacionais. Além disso, estas poderiam reunir expositores de outros Estados também.*

Entre o juiz único e comissão de três

juizes, prefiro a última modalidade, desde que um representante os criadores, pois os produtos particulares se situam acima dos que procedem dos estabelecimentos oficiais. Isso tudo, particularmente no que se refere às raças Indianas, que são as do meu conhecimento.

Quanto aos leilões, satisfazem, devido ao financiamento proporcionado pelo ministério da Agricultura.

Para concluir, parece-me que tudo quanto se refira a exame sanitário dos animais a expor deva ser feito na fazenda e que o julgamento se proceda antes da inauguração do certame. Ademais, os animais dos governos federal e estadual deveriam competir com os dos particulares.

TEMOS EM ESTOQUE:

- Ordenhadeiras "DAN-MILKER"
- Desnatadeiras
- Batedeiras
- Compressores de amônia
- Pasteurizadores de placas
- Material para laboratório

Marca "DAN-MILKER"

SOCIEDADE IMPORTADORA SUÍSSA LTDA

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

Av. R. Branco, 14-2/3.º a.

Tels.: 43-3059 - 23-2325

Caixa Postal, 1404

End. Telegráfico

"SISLA"

Filial: PORTO ALEGRE - Av. Farrapos, 53 - Loja - Telef. Provisório: 9-1037 - C. P. 2690

FILIAL: SÃO PAULO

R. 7 de Abril, 264 - térreo

Tels.: 35-5097 - 35-4860

Caixa Postal, 7939

O PLANO DE...

(Conclusão da pág.74)

transformação, industrialização, armazenamento, distribuição e consumo. Trata-se de empreendimento de envergadura e que determinará a aplicação de verbas reprodutivas num total de cerca de três bilhões de cruzeiros durante os exercícios de 1960, 1961 e 1962, dentro de uma tabela de prioridade organizada de acordo com as necessidades imediatas e mediatas de cada exercício.

HOJE E AMANHÃ

O plano que tivemos a honra de apresentar ao sr. governador Carvalho Pinto, estadista a quem S. Paulo já tanto deve,

procura, assim reerguer as forças produtivas de nosso Estado. Não partimos de utopias, nem as objetivamos. A realidade de nosso meio, com as suas deficiências e as de homem que está no seu centro, constituiram a base do planejamento que empreendemos. Mas, estudando o meio e o homem, vimos emergir a nossos olhos o potencial imenso de possibilidades que ambos representam, chegando à conclusão alentadora de que, ajudados que sejam pela ação oficial, poderão atingir as mais significativas realizações.

Vamos, pois empreender uma tentativa de cura dessas deficiências e de dinamização das reservas de energia do homem e da terra que o cerca.

MAIS LEITE!

Adicione à alimentação
de seu gado, a famosa

Ração
SANTISTA

alimento racional e perfeito
para bovinos

S.A. MOINHO SANTISTA INDUSTRIAS GERAIS

São Paulo: Largo do Café, 11 - Caixa Postal, 507 - Telefone: 33-6111

Depósitos: Santos - Campinas - Mogi das Cruzes - São Roque - Baurú

Importancia das provas de ganho de peso na seleção do gado de corte

L. P. JORDÃO

No propósito de aprimorar cada vez mais a produtividade dos animais domésticos, os zootecnistas têm envidado constantes esforços no sentido de descobrir, com a maior precocidade possível, os animais mais eficientes e capazes de transmitir suas boas características à prole.

Durante muito tempo o melhoramento do gado de corte ficou subordinado à observação de certas partes do corpo, "in vivo", e de determinados pontos de referência "post-mortem", na carcaça.

Muitas investigações foram efetuadas tendo em mira o estudo das correlações entre certas medidas do corpo e o aumento de peso e as características da carcaça. Zootecnistas norte-americanos, comandados pelo especialista Black, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, publicaram, em

1938, importante trabalho realizado com animais representativos dos tipos de corte, leiteiro e misto, sacrificados ao atingirem aproximadamente o peso vivo de 409 kg. A altura no garrote e o comprimento do corpo mostraram correlação negativa, altamente significativa, com a eficiência de ganho de peso, o ganho médio diário, o rendimento da carcaça, a porcentagem de gordura na carcaça, a porcentagem de carne comestível e a classificação dos novilhos como animais de açougue. Apesar de todas essas correlações, a classificação do animal antes da matança foi considerada como a melhor medida do tipo de corte, em comparação com as proporções das diferentes medidas do corpo.

Mais recentemente, muitas investigações foram feitas sobre o valor prospectivo do

peso ao nascer, o peso ao desmame e o ganho de peso no período que se segue à desmama, tendo em vista, sobretudo, que essas características podem ser precocemente observadas, na prole dos genitores que comandam os trabalhos de seleção e melhoramento.

O peso ao nascer, como já vimos em artigo anterior, nesta "Revista", fornece preciosas indicações sobre o peso final, a eficiência, a classificação do novilho e a produção de carne, apreciada através do corte do músculo longo dorsal. Todavia, esse elemento pouco diz quanto à qualidade da carcaça, à espessura da gordura de cobertura e a outros dados considerados importantes.

O peso ao desmama é, sem dúvida, um importante fator na avaliação da capacidade lactífera e da habilidade de criação da mãe do bezerro. É um bom índice do peso final, da eficiência de utilização dos alimentos, da classificação do novilho de corte antes do sacrifício e da área do músculo longo dorsal. Mas, pouco representa em conexão com a classificação da carcaça e a espessura da gordura periférica.

A vista disso, os zootecnistas tinham de averiguar o valor informativo da fase de crescimento que se segue imediatamente ao desmame e, assim, foram realizados os necessários estudos, tendo por base um período de cerca de 6 meses.

O AUMENTO DE PESO LOGO APÓS O DESMAME

Sem entrar em detalhes demasiadamente técnicos, diremos que o período de crescimento do bovino, logo depois da apartação, é uma característica importante, justamente porque sua variação depende do patrimônio hereditário. As várias estimativas do respectivo coeficiente de herdabilidade revelam valores que flutuam de 19 a 70 por cento. Diferentes autores mencionam como mais prováveis as médias situadas entre 46 e 65 por cento, vale dizer, das mais elevadas entre muitas características econômicas do gado de corte. Esses coeficientes parecem ser mais altos quando se referem a provas relativamente demoradas. Quando os "feeding-tests" se prolongaram pelo espaço de 252 dias, foi possível determinar, para cada secção de 84 dias, o respectivo coeficiente de herdabilidade, verificando-se os seguintes resultados: 1.º período, 10%; 2.º período, 54%; e 3.º período, 84%.

Para explicar o que na prática significa um coeficiente de herdabilidade de 65 por cento, vamos supor que certo criador possui um tourinho que, em prova de "feeding-test", tenha revelado o ganho de 12 kg mais do que a média dos espécimes de sua raça ou grupo. Se esse genitor for acasalado com um lote de vacas médias (em relação à raça ou grupo) poder-se-á esperar que a prole resultante apresente um aumento de peso correspondente a 3,9 kg, comparativamente ao peso apresentado pela média dos tourinhos que tenham participado de provas similares. Esse valor (3,9 kg) é obtido, tomando-se 65 por cento de 12 kg (7,8 kg) e dividindo-se por 2, porque os ganhos esperados são influenciados só por um dos genitores (no caso o pai), isto é, em 50 por cento.

As provas de ganho de peso, como ensaios de registro de "performances", até certo ponto se assemelham aos torneios leiteiros e outros concursos de controle da produção dos animais. Foram criadas nos Estados Unidos pela estação experimental de gado de corte de Miles City, em cooperação com a estação experimental de criação de Montana.

A consideração da herdabilidade do ganho de peso na seleção do gado de corte, desde cercanias de 1946, tem produzido contínuo melhoramento da taxa e da eficiência do aumento de peso dos animais, nos rebanhos supervisionados pela referida estação experimental. Esse método de seleção é denominado pelos norte-americanos "Bull Inde-

BENZOCREOL
PRODUTO DE USO VETERINÁRIO

FRIEIRAS
BICHEIRA
MAGRESA
FRAQUESA
CORTES
BERNES
PIOLHO
MOSCAS
SARNA
VERMES
BOUBA
DIARRÉA
CARRAPATOS

Benzocreol é o baluarte medicinal que protege a criação contra doenças. É o segredo dos triunfos de todos os Criadores experimentados! Peça grátis à Cx. Pt. 1002 - São Paulo "O Guia do Criador" e conheça as inúmeras e úteis aplicações de Benzocreol.

BENZOCREOL

CICATRIZANTE - GERMICIDA - FORTIFICANTE

ving". De ano para ano, tem-se verificado o aumento de 1 libra de peso (453 g) na taxa de aumento dos animais de corte. De acordo com relatórios da estação de Montana, os resultados alcançados nos primeiros seis anos de trabalhos, com touros das raças Hereford, Polled Hereford, Shorthorn e Polled Angus, foram, em média os seguintes:

Período	Peso inicial (kg)	Peso final (kg)	Ganho total (kg)	Ganho diário (kg)
1946-47	249	425	176	1,05
1947-48	255	413	158	0,94
1948-49	249	404	155	0,92
1949-50	222	385	163	0,97
1950-51	233	420	187	1,11
1951-52	209	361	152	1,09

Cumprir dizer que, de 1946 a 1950, as provas tiveram a duração de 163 dias. A partir dessa última data, o período foi reduzido para 140 dias.

Segundo informa uma revista técnica dedicada ao gado de corte, várias estações experimentais norte-americanas, tais como a de Bluebonnet e de Balmorra, de 1942 a 1957, haviam testado cerca de 3.000 touros de várias raças, entre os quais 213 Santa Gertrudes. Desses três milheiros de indivíduos, somente quatro ganharam mais de 500 lb (227 kg), sendo três da nova raça mestiça de zebu formada no Texas. Um Santa Gertrudes detinha, nessa época, o recorde nacional, com o ganho de 532 lb (241 kg) ou 3,8 lb (1,72 kg) por dia, durante o período de vinte semanas. Esse espécime tinha cerca de 15 meses de idade ao terminar a prova.

Dados interessantes, mostrando a influência das provas na performance das proles de três touros, são reproduzidos na última edição do conhecido livro de zootecnia de Rice e colaboradores: El-los:

PERFORMANCE DOS TOUROS

Animal n.º	Peso à desm.	Ganho diário
339	205	1,20
373	208	1,10
374	175	0,90

PERFORMANCE MÉDIA DAS PROLES (novilhos)

Peso aos 36 m.	Peso à desmam.	Ganho diário	Peso médio depois de 6 meses
788	200	1,13	484
721	198	1,07	471
635	200	0,98	450

As carcaças de todos os novilhos tiveram classificação "muito boa". O ganho diário dos filhos foi proporcional ao ganho dos pais.

Como tem sido amplamente divulgado em nosso meio, as provas de ganho de peso foram introduzidas em São Paulo pelo zootecnista Barrison Villares, quando chefe da Seção de Zootecnia das Raças de Corte e Zebuínas do Departamento da Produção Animal. A primeira prova realizou-se no recinto de Exposições de Animais de Barretos em 1951. Atualmente, o referido Departamento possui dados referentes a 1.500 animais testados, de várias raças zebuínas, mestiços de raças européias, caracus e 12 búfalos. O melhor resultado é o de 211 kg ou 1,51 kg por dia, alcançado por um produto "Canchim" da IRFA em São Carlos. Esse animal, tem cerca de 18 meses de idade, e possui 5/8 de sangue Charolês e 3/8 de sangue zebu (Indubrasil).

DECOMPOSIÇÃO DOS DADOS DAS PROVAS DE GANHO DE PESO

Nas provas de ganho de peso, encontramos vários elementos de estudo, tais como: a) ganho de peso, dado pela diferença entre os pesos ao entrar e ao sair da prova, expresso em dados absolutos ou em termos de ganho diário; b) peso final, após os 140 dias de permanência na baía individual ou de grupo; c) eficiência da utilização dos alimentos. Cada um desses elementos tem sido investigado no que se refere à herdabilidade ou em relação ao grau de correlação com outras características de apreciação do gado de corte. Vejamos os resultados de alguns estudos realizados na América do Norte:

a) Ganho de peso

As estimativas da herdabilidade desta característica já foram objeto de comentário.

Verificou-se que o ganho de peso apresenta correlação positiva e altamente significativa com o peso ao nascer; positiva e não significativa com o peso à desmama; positiva e significativa com os seguintes atributos: eficiência na utilização dos alimentos; classificação do animal antes do sacrifício; classificação da carcaça; área do lombo (corte do músculo longo dorsal, entre as duas últimas costelas); espessura da camada de gordura em torno do referido músculo (correlação de valor bastante elevado); rendimento da carcaça; comprimento da carcaça (valor elevado) e comprimento do pernil.

A título informativo, diremos que o comprimento da carcaça é medido da extremidade anterior da primeira vértebra torácica à extremidade anterior da sínfise púbica. O comprimento do pernil é tomado dessa última extremidade ao ponto mais elevado da articulação do jarrete. A área do lombo pode ser calculada com o auxílio de papel transparente e medição da figura resultante com planímetro. A espessura da gordura que envolve o referido músculo, dando ao corte o aspecto de um grande olho, é medida em três lugares, a 25, 50 e 75 por cento do eixo longitudinal do músculo longo dorsal.

b) Peso final

O peso final do tourinho, ao terminar o "feeding-test", tem sido objeto de alguns estudos concernentes à herdabilidade, menos, porém do que a característica precedente. Na tabela organizada por Shelby em 1955, esse atributo figura com o elevado coeficiente de 84 por cento. Dentre doze características econômicas importantes do gado de corte, mencionadas pelo referido investigador, o peso final aparece em segundo lugar, apenas suplantado pelo valor correspondente à quebra de peso pelo transporte (91%) e acima dos correspondentes ao rendimento da carcaça (73%), peso ao nascer (72%) e área do lombo (72%).

O peso final está em correlação direta e positiva com o peso ao nascer; o peso ao desmame; a classificação do animal antes do abate; a área do lombo; a espessura da camada de gordura; a classificação e o rendimento da carcaça; o comprimento da carcaça (valor elevado) e o comprimento do pernil (coeficiente também muito alto). A correlação com a eficiência de ganho é negativa, mas não importante.

c) Eficiência na utilização dos alimentos

Uma publicação que resume dados de várias fontes indica uma variação de 3 a 75 por cento para o coeficiente de herdabilidade deste característico. Os valores médios flutuam de 22 a 39%. Conseqüentemente, este é, dentre os três elementos, o que parece depender mais das condições não genéticas.

Quando a eficiência (estimada através do ganho total e do consumo total de nutrientes durante a prova de alimentação) é correlacionada com as outras características já mencionadas, observa-se coeficiente positivo e significativo apenas com o ganho de peso. A classificação antes do abate e a classificação da carcaça se referem a valores positivos, mas não significativos. A área do lombo, a espessura da gordura, o rendimento da carcaça, o seu comprimento e o ta-

PEÇAS HANOMAG PRONTA ENTREGA
 Originais da fábrica, para qualquer modelo de nossa linha. Atendemos imediatamente também encomendas do interior.
SABRICO
 Rua do Grito, 719 - Fone: 63-5121
 SÃO PAULO

manho do pernil proporcionam valores negativos (os quatro últimos significantes). Os coeficientes relacionados com o peso ao nascer e o peso ao desmame são negativos, porém, somente no caso deste último, o valor foi considerado significativo.

É interessante verificar que a eficiência de ganho não está positivamente correlacionada com qualquer das medidas da qualidade da carcaça. Também, foi constatado que o comprimento da carcaça e o comprimento do pernil têm pequena relação com o ganho de peso, quando os dados são ajustados a um peso final constante. Finalmente, verifica-se que alguns dados mais recentes, obtidos em estudos de correlações, se acham em conflito com as conclusões de Black e colaboradores, antes citadas. Por isso, os estudos a respeito continuam em vários centros de pesquisa.

Os antibioticos beneficiam o desenvolvimento

Prova dos benefícios que o Aureomicina clofetraciclina, antibiótico de amplos aspectos descoberto há dez anos passados, tem proporcionado aos criadores, é-nos dada pela diferença de tamanho entre os dois porcos do clichê. São da mesma ninhada. Foram alimentados com as mesmas rações, porém com uma diferença — foi adicionada uma pequena quantidade de Aureomicina à alimentação do porco à direita. Tal aumento de crescimento significa mais carne produzida em menos tempo com menos despesa para o fazendeiro.

SITUAÇÃO DA...

(Conclusão da pág. 98)

Todavia, a entrada da nova safra de milho, já é uma boa perspectiva, capaz de aliviar a crise dos componentes das rações, aliada à entrada contínua de carregamentos de trigo em grão, de procedência estrangeira.

De qualquer maneira, porém, os preços pagos pelos avicultores ainda são elevados, na base de Cr\$ 8,00 por kg de ração balanceada.

CALENDÁRIO DOS CERTAMES E CONCENTRAÇÕES PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL EM 1959

25 — PRESIDENTE PRUDENTE	I Concurso de novilhos de córte.
26 a 28 — FRANCA	IV Exposição de Animais.
MAIO	
2 — NOVA ODESSA	Leilão de reprodutores das raças H.V.B., Caracú e Mõcha dp P.D.A. e Concentração de criadores.
9 — BARRETOS	I Concurso de novilhos de córte.
16 a 18 — GUARATINGUETA	V Exposição do Vale do Paraíba.
23 — S. JOSÉ DO RIO PRETO	I Concurso de novilhos de córte.
JUNHO	
1 — INTERIOR DO ESTADO	Início dos Concursos de Eficiência de Postura.
6 a 14 — SÃO PAULO	III Exposição-Feira de Gado Laiteiro e Equídeos.
29 — SANTOS (tarde/noite)	Concentração dos pescadores para demonstrações técnicas.
29 — ITANHAEM (manhã)	Concentração de pescadores para inauguração do Entrepôsto de Pesca Itanhaem-Peruíbe.
JULHO	
11 a 13 — BASTOS	III Festa do Ovo e da Avicultura.
11 a 13 — ANDRADINA	III Exposição de Animais.
12 — ANDRADINA	Concentração de pecuaristas na Fazenda de Seleção de Gado Indiano.
18 a 20 — PINHAL	II Exposição de Animais.
28 — ARAÇATUBA	Início das provas de Ganho de Pêso, em 1959.
28 — BAURÚ	Início das provas de Ganho de Pêso, em 1959.
No decorrer do mês, nas regiões zootécnicas de Bebedouro, Jaboticabal, Piracicaba, Queluz, Ribeirão Preto, Rio Claro, Taquaritinga e Tatuí.	
AGOSTO	
1 a 3 — BAURÚ	V Exposição de Animais.
11 — BARRETOS	Início das provas de Ganho de Pêso, em 1959.
11 — SERTÃOZINHO	Início das provas de Ganho de Pêso, em 1959.
25 — FRANCA	Início das provas de Ganho de Pêso, em 1959.
SETEMBRO	
1 a 13 — SÃO PAULO	I Exposição-Feira de Médias e Pequenos Animais.
21 a 26 — ITAPETININGA	II Concurso de Ovinocultura.
26 a 28 — BRAGANÇA PAULISTA	IV Exposição de Animais.
OUTUBRO	
4 — ITAPETININGA	II Concurso Anual de Lã.
18 — COLINA	Concentração de Pecuaristas na Coudelaria Paulista e Leilão de Equídeos.
24 a 26 — PRESIDENTE PRUDENTE	V Exposição de Animais.
No decorrer do mês, nas regiões zootécnicas de Bebedouro, Jaboticabal, Piracicaba, Queluz, Ribeirão Preto, Rio Claro, Taquaritinga e Tatuí.	
NOVEMBRO	
14 a 16 — S. JOSÉ DO RIO PRETO	I Exposição de Animais.
DEZEMBRO	
6 — SERTÃOZINHO	Concentração de pecuaristas na Faz. Exp. Criação.
14 — ITAPETININGA	Curso Artexanal de tecidos de lã.

É com satisfação que podemos inserir neste número o calendário de certames e concentrações do Departamento da Produção Animal da Secretaria da Agricultura. E cabe-nos salientar que essa publicação representa uma vitória da «Revista dos Criadores». Sim, porque há muito que nos batemos para que no início do ano seja organizado tal repertório de exposições e de trabalhos de fomento — e pela primeira vez isso pôde ser conseguido.

Sem pretender apropriar-nos de todas as honras dessa vitória, diríamos que a elaboração do calendário de 1959 somente se tornou possível depois que o nosso velho e competente colaborador, o dr. Fidelis Alves Netto, passou a exercer, ainda como substituto, o posto de diretor da Divisão de Fomento da Produção Animal do D.P.A., no qual, aliás, tem tomado outras providências que enaltecem seu renome.

Agora, com este novo elemento em mãos, ninguém mais poderá deixar de comparecer a uma exposição ou a outro certame, alegando ignorância da data. As datas aqui estão e, ao que fomos informados, não mais serão alteradas: serão cumpridas à risca. E já podemos registrar que ainda este ano será pródigo em vitórias. Assim, a Secretaria da Agricultura de São Paulo, dinamizada pela energia e pela capacidade de um secretário jovem, passa a trabalhar em prol da produção, adotando métodos e processos racionais, em que o planejamento substitui a improvisação, que em nosso País tantos males tem causado.

BÕA ALIMENTAÇÃO

para o seu GADO, com

RAÇÕES BALANCEADAS

MATERIA PRIMA PARA TODAS AS RAÇÕES

ESPECIALIDADES EM:

- FARINHA DE CARNE
- FARINHA DE PEIXE
- FARINHA DE ALFAFA
- FARELO DE AMENDOIM
- FARELO DE ALGODÃO
- FARELO DE BABASSÚ
- SAIS MINERAIS

FARINHA DE OSTRAS DE TODOS OS TIPOS

RICARDO FERNANDES RIBEIRO

ESCRITÓRIO E FABRICA:

Rua Lopes Trovão, 33/35 — Tel. 34-1746

RIO DE JANEIRO, D.F.

Camisas Gravatas Meias e Lenços

CASA KOSMOS

CÊRCAS ELÉTRICAS

Sabemos que o Ministério da Agricultura por intermédio de seus técnicos drs. Ernesto V. Faria e Vicente de Paula Mendes ambos da S.E.C. do Rio de Janeiro, está recomendando o uso de aparelhos eletrificadores de cercas para gado e incentivando os órgãos oficiais agro-pecuários à difusão de seu uso entre os criadores e lavradores, devido às grandes vantagens que oferecem.

Julgamos portanto oportuno dar os necessários esclarecimentos aos criadores e homens do campo sobre estes aparelhos pouco conhecidos entre nós.

A recomendação dos técnicos do Ministério da Agricultura acima citados baseia-se em primeiro lugar na grande economia que apresenta o emprego de bons eletrificadores de

cercas, especialmente idealizados para este fim e que garantem um fator de segurança absoluto.

Alguns criadores se referem às cercas eletrificadas com certo pessimismo, alegando terem tido mortes entre gado vitimado por choques elétricos. Queremos deixar bem claro que as mortes acima citadas entre os animais foram provocadas por cercas elétricas improvisadas, isto é, montadas sem nenhum conhecimento técnico e ligadas diretamente à rede de luz ou força. Alertamos aqui os interessados em cercas eletrificadas para que de maneira nenhuma usem este perigosíssimo sistema, que pode provocar mortes, não somente entre gado, mas também entre pessoas adultas e crianças.

Um bom eletrificador de cercas apresenta segurança absoluta pois fornece choques intermitentes que embora de voltagem bastante alta, têm a durabilidade de uma fração de segundo e são por conseguinte insuficientes para provocar um espasmo muscular prejudicial ao organismo. São inocuos para o gado, pessoas e mesmo crianças.

Sobre outros fatores que recomendam a utilização das cercas elétricas equipadas com bons aparelhos, podemos citar que o seu pequeno custo e facilidade de montagem e desmontagem as recomenda para campos de pastoreio em rodízio. As estacas empregadas podem ser bem mais baixas do que as usadas nas cercas comuns, sendo colocadas de 6 em 6 metros ou mais dependendo esta distância da consistência do solo e da grossura das próprias estacas. O diâmetro normal das estacas varia de 5 a 8 cm de diâmetro. Um único fio de arame liso de ferro galvanizado n.º 14 é recomendado, devendo ser esticado a uma altura de aproximadamente 90 cm. do solo. Isto para vacas e cavalos. Para porcos, a altura do fio deve ser de aproximadamente 40 cm.

O arame deve ser preso em cada estaca a um isolador e não deve encontrar em árvores, arbustos ou mesmo em capim crescido. Isto provocaria uma descarga elétrica na terra e conseqüente diminuição de intensidade de choques no fio da cerca.

Em nosso país uma firma importadora vem introduzindo com sucesso no mercado os aparelhos marca «Ballerup» de procedência dinamarquesa, fabricados pela maior fábrica europeia destes aparelhos, que vem satisfazendo plenamente, ao que parece, todas as exigências da finalidade a que se destinam. São fornecidos em dois modelos distintos, sendo um a ser ligado à rede de luz e o outro funcionando com pilhas ou bateria.

A difusão de cercas elétricas tornou-se rápida a ponto de nos países europeus de agro-pecuária adiantada, suplantarem o uso de cercas de arame farpado. Também nos Estados Unidos, Canadá e até na África do Norte seu uso se difundiu de um modo extraordinário nos últimos anos, não encontrando nenhuma contra-indicação.

TRITURADOR

MOREIRA

para forragens

Economia

Solidez

Durabilidade

Segurança

Para triturar a mesma quantidade de forragem, consome incomparavelmente menos energia do que os trituradores comuns.

Fôrça necessária	7 1/2 HP
Velocidade	3.000 RPM
Pêso	150 quilos

Capacidade:

Cana: 1.000 a 1.500 quilos por hora
Milho em espiga: 200 a 400 quilos por hora

Pode ser desmontado fácil e rapidamente para a substituição de peneiras ou facas.

Uma única parte móvel

4 tamanhos diversos de peneiras, inclusive para fubá grosso.

Para cana, milho
debulhado ou em
espiga, só sabugo,
batata-doce,
mandioca e
rama de
mandioca
alfafa,
sorgo,
etc.

Fabricantes dos modelos
"SECADORES MOREIRA"
para café

Máquinas Moreira S.A.

Rua da Moóca, 2100 - Fone: 9-1164 (14 ramais) - Correspondência para
Caixa Postal 5882 - End. Telegráfico "SECADORES" - São Paulo

II — O "LUR" É O SIMBOLO DINAMARQUÊS DE QUALIDADE

Na Dinamarca o gado leiteiro é predominantemente constituído pela famosa raça Vermelha, que representa 68% de todo o rebanho; seguem-se a raça Preto e Branco com cerca de 20%, a Shorthorn e a Jersey com 4% cada uma e o restante é calculado como variado cruzamento. Segundo relatório oficial de 1953, o Rebanho Vermelho Dinamarquês apresentou média de produção igual a 4.096 quilos de leite com 196,2 quilos de gordura, enquanto a Preto e Branco ofereceu média de 3.942 quilos de leite com 156,9 quilos de gordura. Trata-se do rebanho geral controlado, porque há plantéis que, em 365 dias, produzem 10.710 quilos de leite com 489 quilos de gordura. Na competição anual da melhor produtora, ainda em 1953, a raça Vermelha venceu com 13.614 quilos de leite e 686 quilos de gordura.

A seleção do gado leiteiro atingiu na Dinamarca notáveis resultados em característicos de conformação física e de produção. Desde 1895, quando foi criada a primeira sociedade de controle leiteiro na Dinamarca e no mundo, a seleção tem sido cada vez mais orientada no sentido da produção. Pode-se dizer que mais de 50% do rebanho leiteiro são hoje controlados individualmente. Os plantéis são mensalmente visitados por um representante da sociedade de controle, o qual para cada animal, anota rendimento de leite e porcentagem de matéria gorda e, ao mesmo tempo, calcula o consumo de alimentos. Este critério capacita o fazendeiro a selecionar os melhores animais para reprodução, levando em consideração custo de produção e as qualidades de cada vaca, tais como: qualidade do leite, exterior, conformação de úbere, etc.

Na seleção de touros, o critério adotado foi o da formação de sociedades cooperativas de fazendeiros, para facilitar a aquisição de excelentes exemplares, aproveitados graças ao uso extensivo da inseminação artificial, praticada hoje em 90% do

rebanho dinamarquês. Há cerca de 100 sociedades desse tipo, em todo o território, empregando 1.200 touros, com resultados verdadeiramente surpreendentes: 60% de fertilizações por diagnóstico de prenhez, alcançando 75% o índice de fertilização por uma só inseminação, isto é, sem retorno.

Atualmente, a mais alta produção é a de uma filha do touro Hoj, a qual deu 6.250 quilos de leite em 304 dias de lactação, com porcentagem média de gordura de 4,4%. Em 1956, a média de produção de todo o rebanho dinamarquês foi de 4.038 quilos de leite com 4,34% de gordura.

Com tal base de produção, compreende-se facilmente o progresso alcançado pela industrialização, calculando-se que 45 a 50% do rendimento total agrícola procedam do gado leiteiro por meio dos laticínios.

A manteiga é a principal fonte de renda e sua qualidade a impôs em cerca de cem diferentes mercados, em todo o mundo. De fato, 75% do total da produção de manteiga se destinam à exportação, ostentando a célebre marca "Lur" no rótulo da embalagem. O "Lur", antigo instrumento musical usado pelos primitivos povos nórdicos, ainda na Idade do Bronze, representa a marca de qualidade testada pelas autoridades oficiais. Essa marca aparece também nos queijos e outros laticínios e constitui padrão de garantia dos consumidores no país e no estrangeiro.

O Serviço de Controle de Qualidade, órgão oficial, determina quais os estabelecimentos laticinistas que podem usar o "Lur" no rótulo, agindo como verdadeiro júri formal de nove pessoas habilitadas, sendo três representantes de exportadores, três gerentes de laticínios, dois funcionários oficiais e um representante do Serviço de Controle de Qualidade. No caso da manteiga, o produto somente é submetido ao conselho julgador após catorze dias, no mínimo, para ensejar a veri-

TORNOS
56
NARDINI

TEARES
56
NARDINI

MAQUINARIA AGRICOLA

Arados - Semeadeiras - Cultivadores - Adubadeiras
Sulcadores - Todos os implementos para a lavoura

MOTORES ESTACIONÁRIOS

Mantemos estoque permanente de peças para motores:
VIKING ● BRIGGS STRATTON ● CLINTON ● C.L.
CONORD ● DEUTZ ● SMITH ● JAP, etc.

AMERICANA

Linha Paulista - Est. S. Paulo
RUA 30 DE JULHO, 329
Caixa Postal N.º 38
TELEFONE N.º 1053
Inscrição 171

NARDINI LTDA. S. A.

SÃO PAULO

Rua Florêncio de Abreu, 429
DEPÓSITO
Rua Augusto Severo N.º 58
TELEFONES: 33-1422 e 33-4841
End. Telegr.: "NARDINI"
Inscrição, 261405

COM TODO PRAZER ATENDEREMOS PEDIDOS DE FOLHETOS E LISTAS DE PREÇOS

ficação da condição importantíssima de estabilidade. Nos testes realizados para adjudicar o direito de usar a marca "Iur" verificam-se também características organoléticas e fazem-se análises químicas do produto em exame, as amostras são sempre identificadas em código, para evitar influências estranhas que poderiam prejudicar o julgamento.

Além deste teste oficial, que visa alcançar o direito de uso da marca de qualidade, há testes efetuados semanalmente nos armazéns das diferentes organizações exportadoras, cujos resultados são integralmente relatados ao Serviço de Controle de Qualidade. Nessas condições, todo o sistema se desenvolve no sentido do aperfeiçoamento da qualidade do produto: os relatórios do júri são publicados e os melhores gerentes de usinas e fábricas, além de receber prêmios, ainda adquirem reputação nacional de perícia e habilidade.

A Dinamarca ocupa o terceiro lugar como país exportador de queijos, sendo apenas superada pela Nova Zelândia e pela Holanda. Há anos, os queijos dinamarqueses recebiam nomes estrangeiros porque eram, em muitos casos, baseados originalmente em tipos de outros países. Entretanto, a tecnologia de fabricação foi de tal forma alterada, adquirindo características próprias, que alcançou individualização suficiente quanto a caracteres físico-organoléticos, de sorte que hoje a nomenclatura é inteiramente nacional. Acrescente-se que, assim procedendo, a Dinamarca cumpriu a convenção internacional acerca da proteção dos nomes originais. Portanto, os queijos dinamarqueses entram agora nos mercados internacionais ostentando características próprias e nomes que estão associados à designação das regiões onde mais intensa é a fabricação. Assim, entre os diversos tipos, podemos citar os mais populares, de consumo doméstico e de exportação: Samsøe, Danablu, Fynbo, Molbo, Elbo, Maribo, Havarti, Esrom.

Todos estes queijos podem ser exportados se ostentarem a marca "Iur", símbolo de qualidade e que, entre outras exigências, refere o mínimo de gordura porcentual: 45 para uns e 40 para outros. Antes de obter permissão para usar a marca "Iur" para certo tipo de queijo, a fábrica deve ter obtido número suficiente de pontos em testes sobre produtos de sua produção e o estabelecimento deve ser aprovado pelo Serviço de Controle de Qualidade. Amostras para os testes são retiradas das fábricas e do varejo, armazéns e depósitos e, se não se enquadrarem nos padrões do Serviço de Controle, não poderão fazer uso da marca "Iur". Cada forma de queijo deve ter estampados o número de registro da fábrica, a porcentagem de gordura e a data de produção.

É fixado semanalmente o preço, do leite, sendo o mesmo quer o produto se destine ao consumo em natureza, quer à industrialização. Na fixação do preço intervêm as autoridades municipais e as cooperativas, porém está sempre em relação com os preços da avela, manteiga, queijo e carne de porco.

Deve-se lembrar que o soro de leite nas usinas e fábricas é devolvido ao fazendeiro para alimentação de suínos, daí advindo a influência do preço da carne na cotação do leite. Por outro lado, a avela é um dos alimentos que pode ser computado, o que não impede que outros componentes de rações também sejam levados em consideração.

Podemos afirmar que, na fixação do preço de leite, todos, ou pelo menos os principais elementos em conexão com a produção, são levados em conta. O exemplo da suinocultura, que na Dinamarca é atividade muito relacionada com a produção de leite, é marcante e dispensa maiores comentários.

EXIGÊNCIAS DOS MARREÇOS DE PEKIM QUANTO ÀS PRINCIPAIS VITAMINAS

A criação industrial dos marreços de Pekim acompanha de perto as exigências previstas para a criação de frangos de corte, no que tange ao teor de vitaminas das rações balanceadas.

Assim, podemos apontar as necessidades das principais vitaminas, na alimentação dos marreços de Pekim, a raça mais indicada para a produção de carne, a saber:

Vitaminas	100 kg de ração
A	600.000 U.I.
D3	60.000 U.I.
E	1 1/2 gramas
B1	200 miligramas
Ácido Nicotínico	2 1/2 gramas
Ácido Pantoténico	1,4 gramas
B12	1,3 miligramas

Bichol

O SALVADOR DOS ANIMAIS
MARCA REGISTRADA

GRACIAS AO BICHOL OS ANIMAIS
ESTÃO FORTES E SÁBIOS

REMÉDIO INFALÍVEL
PARA A CURA DE
BICHEIRAS, FERIDAS
BERNES, PISADURAS, ETC

CUIDADO COM
AS IMITAÇÕES

FABRICAÇÃO DA
INDÚSTRIA QUÍMICA VENTURACCI

FÁBRICA E ESCRITÓRIO

RUA FAUSTOLO, 898 • SÃO PAULO • TEL. 5-0791

À VENDA TAMBÉM NA
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES
RUA SENADOR FEIJÓ, 30 — SOBRE LOJA

Coleman

Tamanhos:

Nº 237 de 500 velas
Nº 249 de 300 velas

- Igual ao original estrangeiro
- Luz brilhante e intensa
- Globo de Vidro "Pyrex"
- Estoque permanente de peças
- Válvula de segurança contra vazamentos

Produtos NATIONAL CARBON

Respondendo Sobre Zootecnia e Veterinaria

RAÇAS DE SUINOS MAIS POPULARES NOS ESTADOS UNIDOS

T. S. C. (Curitiba, Pr.), pergunta: Quais são as raças de suínos preferidas nos Estados Unidos?

R: Existem na grande república do norte cerca de duas dezenas de raças e sub-raças porcinas, que podem ser classificadas dentro dos dois tipos tradicionais, para banha e para "bacon" (toucinho). No primeiro grupo se acham as raças mais antigas, tais como: Poland China; Spotted Poland China (Poland pintada), desenvolvida às custas da precedente; Duroc Jersey; Chester White; O. I. C., ou Chester White Melhorada; Hampshire, raça pintada, tal como as inglesas Wessex Saddleback e Essex; tôdas essas raças foram formadas nos EUA; a Berkshire é a única originariamente inglesa. No segundo grupo, estão classificadas duas raças antigas: Yorkshire (Large White) e Tamworth, ambas de origem inglesa; Landrace americana (descendente da Landrace dinamarquesa, que por sua vez provém da Large White); e as novas sub-raças americanas, oriundas de cruzamentos diversos, tais como: Minnesota nº 1 (a mais velha deste grupo, constituída por meio das raças Landrace e Tamworth); Minnesota nº 2 (produto da Large White canadense com a Poland China); Hamprace (mescla de Hampshire e Landrace, também conhecida como Montana nº 1; Betsville nº 1 derivada da Landrace e da Poland China); Betsville nº 2 (produto de quatro raças: Yorkshire, Landrace, Duroc Jersey e Hampshire); e Maryland nº 1 (cruzamento de Landrace com Berkshire). Além dessas, existe o tipo Hereford (de pelagem semelhante à dos bovinos de corte do mesmo nome, tido como bom produtor de banha e carne, formado mediante mistura das raças Chester White, Duroc, Poland e Hampshire) e o tipo Palouse, produto da união dos sangues Landrace e Chester White. Cumpre esclarecer que a separação

dessas raças e sub-raças em dois tipos economicos não obedece a características tão distintas como antigamente. Em um relatório publicado em 1957, encontram-se os seguintes dados relativos ao numero de espécimes registrados de cada uma das raças referidas:

ordem	raça	animais registrados
1	Duroc Jersey	90.209
2	Hampshire	68.114
3	Spotted Poland China	27.670
4	Poland China	21.758
5	Berkshire	21.437
6	Chester White	19.515
7	Yorkshire	17.243
8	Tamworth	8.809
9	Chester W. Melhorada (O.I.C.)	3.653
10	Landrace americana	1.912
11	Minnesota nº 1	1.044
12	Hamprace	901
13	Minnesota nº 2	505
14	Beltsville nº 1	153
15	Maryland	110
16	Beltsville nº 2	55

A raça Duroc Jersey ainda é a mais popular nos EUA, embora venha perdendo terreno, gradativamente, pois, em 1947, as estatísticas acusavam 100.259 espécimes de pedigree, registrados. Em 1947, o segundo posto era disputado por duas raças: a Spotted Poland China e a Hampshire, ao passo que, em 1956, a raça pintada mostrava nitida vantagem sobre a pintada. Os primeiros lugares ainda estão ocupados pelas raças classificadas como do tipo "lard", a despeito do que foi dito

SIGA O CAMINHO CERTO

DESNATE — BATA — ESPREMA

Desnatadores e Batedeiras elétricas ALFA-LAVAL, de procedência Suéca, fabricadas inteiramente de aço, permitem um trabalho prático, rápido e eficiente.

Espremedeira manual de mesa ALFA-LAVAL, com capacidade para 7 quilos de manteiga.

DISTRIBUIDORES:

Cia. Fabio Bastos

R. Florêncio de Abreu, 828
SÃO PAULO

Caixa Postal 2350
End. Telegráfico "NIFAF"

RIO DE JANEIRO — BELO HORIZONTE — PORTO ALEGRE
JUIZ DE FORA — CURITIBA — PELOTAS

a respeito desse critério de classificação. A influência da raça branca — Landrace — é notória, direta ou indiretamente, através de novas sub-raças.

Em 31 de dezembro de 1956, a "Inbred Livestock Registry", entidade que absorveu a associação primariamente constituída para registrar os suínos Minnesota nº 1, incorporada sob a direção técnica do zootecnista L. M. Winters, já havia inscrito cerca de 37.500 espécimes pertencentes a vários agrupamentos novos de porcinos. Na formação das novas sub-raças, visa-se a obtenção de suínos menos gordos, com mais carne e mais precoces do que os das antigas raças americanas ou inglesas.

BEZERROS QUE NASCEM PELADOS

H. F. (Tupã, S. P.) pergunta: Como se explica o caso de um bezerro que, nascendo sem pelos, morreu logo nos primeiros dias?

R: O caso deve merecer toda a atenção do criador, pois pode tratar-se de um defeito genético, isto é, de uma mutação parecida com a que registra a literatura zootécnica, ocorrida em 1902 na gado Holando-sueco, atribuída a um gene recessivo, transportado por um famoso reprodutor procedente da Alemanha. Lá, os bezerros não nasciam completamente glabros, visto que acusavam alguns pelos na extremidade da cauda, ao redor do focinho, nas pálpebras e em algumas partes do corpo, sobretudo nos membros anteriores; tudo o mais era aparentemente normal; os animais nasciam vivos, depois de um período de gestação idêntico aos demais, mas morriam dentro de alguns minutos.

O gene recessivo foi largamente distribuído pelo touro e seus descendentes durante cerca de 25 anos. Casos similares são referidos, na Alemanha, em conexão com plantéis que possuíam o mesmo sangue do reprodutor, excelente por outros motivos, que fôra para a Suécia. Casos parecidos se verificaram no Japão e nos Estados Unidos. A referência mais recente é a de um bezerro da raça Guernsey que, apesar de nascer careca, conseguiu sobreviver com a imediata intervenção de criador, que, para tanto, se serviu de cobertores e de uma lâmpada de raios infra-vermelhos. Após dois meses, o animal pôde dispensar o tratamento especial e assim foi criado até atingir a maturidade. Seu crescimento foi satisfatório, apenas não podia tomar sol diretamente: para evitar o eritema, passava o tempo todo no estábulo, durante o verão e a primavera.

Pelo que se depreende da carta do interessado, o caso, aliás único, refere-se a um espécime mestiço de zebú. Não obstante, convém investigar se já apareceram outros casos semelhantes em animais mais ou menos aparentados com os pais do bezerro portador da anomalia. O resultado dessa investigação deve ser levado ao conhecimento da competente seção técnica do Departamento da Produção Animal, para cuidadoso estudo e orientação dos criadores.

SRS. FAZENDEIROS NA FAZENDA... TEMOS O QUE NECESSITA ARAME PARA CERCAR...

...criação, próprio e incomparável para vedar o gado, sem perigo de se inutilizar. Não arrebenta, aço extra-resistente "Catieland Wire". Regula 1 cruzelro o metro

SOCIEDADE COMERCIAL S. PAULO - MATO GROSSO

S. Paulo - S. Bento, 848 - 2º - Fones: 33-4053 e 33-1548.

SOC. COM. PECUARISTA D'OESTE

Araçatuba - Osvaldo Cruz, 185 - Fone: 330

Presidente Prudente - A. Brasil, 657 - Fone 5

SOC. COM. MATO GROSSO

Campo Grande - 14 de Julho, 668 - Fone: 146

Aquidauana - Rua Manuel Antonio Paes de Barros, 198

Com balancim do próprio arame, economizando: morões, tempo, dinheiro e perda como cerca definitiva. Únicos distribuidores dessa marca. Só atendemos consumidores.

SAL PECUARISTA - Sacos de 30 e 60 quilos, preparado com Cobalto, Cobre, Ferro etc. (Complemento mineral - Chavantes, regist. n. 1.219). Custando apenas mais dez por cento que o sal comum.

SAIS MINERAIS "Chavantes" reg. n. 1.118, 23 M. Agricultura, Sulf. Cobalto, Cobre, Ferro, Manganês etc. (Fórmula preconizada pelo Dr. René Corrêa - Inst. Biológico de São Paulo).

GRAMPOS - Para cerca - Carrapato - (n/ exclusividade). Pás de ponta e Ferrões de pua para cercas.

FIVELAS - Veda-tudo, p/balancim e armar tela no local.

INSETICIDAS - Arseniato de Chumbo e Rhodiatox para combater pragas de algodão, mascaras, polvilhadeiras.

CREOLINA - Pearson, Bichol, Aphot, Mataberne, Benzofenol Azul, Vacinas, Seringas Vet., penicilinas etc.

ALICATES - Marcar orelha de bezerros e torqueses.

FORMICIDA - Blenco - Apar. portátil (comprovada eficiência), mata-formigas, Imunizantes, Carbolium etc.

ARADOS - Semeadeiras, Carpadeiras, Desmatadeiras Engenhos, Moinhos para quireras etc.

MACHADOS - Colins, Falces, Enxadas, Enxadões, Serrotes, Ancinhos etc.

SEMENTES - Alfafa, Colômbia, Gordura (roxo e cabelo de negro), Jaraquá, farinha de osso.

ENCERADOS - "Chavantes" - Todos os tamanhos e para todos os fins, sacos de colheita.

TELHAS - Onduladas para coberturas de alumínio refratárias ao calor, Caixas de água, Canos etc.

MATERIAL ELETRICO - Enceradeiras, Liquidificadores, Painéis de Pressão, Talheres (faqueiros), Lanternas, Pilhas, Lâmpadas, Fios elétricos etc.

- Sal "LUZENTE"
- Sal "BRILHANTE"
- Sal "BOIADEIRO"

PRODUTORES

CIA. COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO

Mossoró - Areia Branca - Macau - Rio Grande do Norte

VENDAS

Cia. Comércio e Navegação

RUA DR. ALMEIDA LIMA, 1290 - SÃO PAULO - Telefone 9-2896

Caixa Postal, 15.188 — End. Teleg.: NAVISAL

O MITO DA "BRASPOOL"

BRENNO FERRAZ DO AMARAL

Não adianta afirmar-se-á — que as greves para aumento de salário são humanas e são justas, mas contraproducentes. A dos professores, por exemplo, a resolver-se com sobrecarga do Tesouro Nacional, põe pelos ares o famoso Plano de Estabilização de Preços. Igualmente, a de transportes urbanos (aliás, ainda em ameaças), se a solução for semelhante. Também não adianta dizer que o governo federal perdeu a vez de agir ou, pelo menos, a de não praticar certos erros... Agora, é tarde.

No sentir geral, haja errado ou não o governo, o que é preciso é achar solução para a triste realidade: com o que se ganha no trabalho da indústria, do comércio, do funcionalismo e mesmo das profissões liberais não se pôde comprar o que é preciso para viver no Brasil... como não podem comprar lavradores, comerciantes e industriais. Esse é o problema. Punir os culpados, não resolve. Substituí-los, também não interessa. Concedamos que efetivamente assim seja. A solução é que é necessária.

Ora, a ciência é o instrumento humano para resolver problemas e ela assenta na experiência. Pois, experiência se vem fazendo em São Paulo, no comércio retalhista e dele se colhe resultado, que é elemento positivo de cálculo: vende mais barato quem mais compra; a grande massa de aquisições feitas na origem, isto é, diretamente dos produtores, cons-

titui a base do barateamento dos produtos, quer os da terra, quer os da indústria. Outra coisa é a administração, certa ou errada, desse negócio em grande; isto é, outra coisa, o insucesso ou o êxito deste. Aliás, é o velho princípio do «trust», que se tornou famoso, no século passado, nos Estados Unidos e tanto e tanto vem sendo combatido, mesmo no Brasil. Assentemo-lo, pois. É verificação experimental de nossos dias. Apenas, deve-se notar, oferece serios inconvenientes, tal como foi adotado.

Pois, assente o postulado e vistos os males de sua aplicação, tratemos de corrigi-la, a esta, afim de salvar aquele que será a salvação do governo e a de todos nós. Euréca, euréca! O grande erro dos «trusts» consiste no oligopolio (oligo, varios). Organize-se o monopolio (mono, um) — nunca o do governo — mas o monopolio social ou coletivo, digamos, coisa inteiramente nova e original, que irá singularizar o País entre os demais.

Imagine-se que os grande capitalistas, lavradores, industriais, comerciantes do Rio de Janeiro se aliassem aos de São Paulo, Santos, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Belém e de outros centros economicos, afim de constituir o «Grande Pool» de abastecimento e vendas do Brasil, a que se subordinassem — por meios e interesses mercantis, é claro — todas as classes de comerciantes, das mais diversas especialidades, de

tal modo que ninguém ficasse de fóra. Caso de organização, puramente. E grandes organizadores, grandes chefes não faltam em São Paulo e Rio, com uma coorte de técnicos para devidamente acolita-los. Estaria resolvido o problema da compra em massa. Uma unica grande compra, por assim dizer. Restaria partilha-la por toda parte... Simplesmente, questão de transportes. E transportes unificados...

Como já temos «Petrobrás», «Eletrobrás» e não sei que mais na mesma «carreira», dar-lhe-íamos o nome de «Poolbrás» ou, para variar, «Braspool», já que não é essencial a rima, no caso. Ficariam para melhor estudo certos pormenores e combinações. Parece perfeito. Impecavel.

Dir-se-á, todavia, que semelhante mito assemelhar-se-ia muito com a soviétização ou tenderia para ela. Feita a centralização, com a padronagem e a uniformidade, só faltaria o golpe. E não estaria eu longe de concordar. Que é que se quer, porém? Criam-se as condições materiais. Põe-se o bestunto a trabalhar. Pede-se solução e solução imediata. Estabelece-se o princípio: é a alavanca de Arquimedes. Que culpa tem um mortal das similitudes e das extensões?...

A mecanica do espirito não dá para mais. Eis o condicionamento a que a inflação conduziu o Brasil: condições totalitárias, em regime liberal.

Agora também
"HASENCLEVER"
 vendendo

H
 CLEVER

MWM
 DIESEL

GRUPOS
 GERADORES
 de 6 a 30 KVA

HASENCLEVER S. A.
 FERRAGENS E MÁQUINAS
 R. Florêncio de Abreu, 333 - Tels.: 36-4106 - 34-9676
 São Paulo

Orçamentos sob consulta.
 Exposição em nossa loja
 Estudamos facilidades de pagamento

Para o tratamento seguro
das infecções uterinas

METRICILINA

ação rápida e poderosa

COMPRIMIDOS EFERVESCENTES
À BASE DE ANTIBIÓTICOS...

para uso veterinário

INDICAÇÕES: - É indicada no tratamento de: metrites; piometra; como profilático nos casos de retenção de placenta, cervicite; vaginite e nas infecções produzidas pelo vibrio fetus.

MODO DE USAR: Introduzir os comprimidos de METRICILINA bem profundamente no utero, logo após o parto ou nos primeiros sinais de infecção.

ASSOCIAÇÃO SINÉRGICA
DE ANTIBIÓTICOS COM ATIVIDADE AMPLA SÔBRE GER-
MENS GRAM-NEGATIVOS E
GRAM-POSITIVOS.

OBSERVE!

A espuma abundante produzida pelos comprimidos efervescentes de METRICILINA serve de veículo aos princípios ativos que assim revestem toda a mucosa uterina.

Industrias Farmacêuticas

Fontoura-Wyeth S.A.

DIVISÃO AGRO-PECUÁRIA

Rua Caetano Pinto, 129 - Fone 37-7111 - Ramal 2 - São Paulo

1918

40 ANOS DE SELEÇÃO

1958

A FAZENDA INDIANA conquista
os melhores prêmios na
EXPOSIÇÃO DE BARRETOS de 1958

ABOIO DA INDIANA

com 25 meses pesou 585 quilos.
O melhor macho controlado.
Readquirido pela Fazenda Indiana.

ZORRO DA INDIANA,

Reservado Campeão. Propriedade
de Mme. Fernando Soares Sampaio
e Frederico Chateaubriand.

VINGADOR DA INDIANA,

1.º prêmio. Pesou, aos 41 meses,
828 quilos. Propriedade
de Rubens e João de Carvalho

GRANDE PORTE E MUITA CARNE, QUALIDADES DA MARCA "TAÇA"

VENDA PERMANENTE DE MACHOS E FÊMEAS

Avenida Heitor Beltrão, 29

Telefone 48-3125

RIO DE JANEIRO

Grandes produções de

Arlete Clara Sylvia V, 6.368 kg em 365 dias — Allen de Kol Beutymore, 7.959 kg em 365 dias — Garradinha, 6.458 kg em 303 dias — Pietje 86, 5.041 kg em 365 dias — Castrolanda Bur Minkje 24, 4.308 kg em 305 dias — Holambra Oda II, 4.477 kg em 305 dias, tôdas da raça Holandêsa preta e branca. Castro Aafge V, 4.771 kg em 305 dias e Holambra Rik V, 4.207 kg em 305 dias, da raça Holandêsa vermelha e branca. Boas lactações em marcha

O relatório do Serviço de Controle Leiteiro referente ao mês de Dezembro de 1958 foi publicado com pequeno atraso.

Apesar disso, os resultados das lactações encerradas nesse período já são conhecidos e, dentre eles, podemos ressaltar alguns bem interessantes. Na Divisão de 365 dias, em que não é exigida nova parição, não tivemos nenhum novo recorde de produção. Mas, na Divisão de 305 dias, assinalaram-se dois novos recordes de leite e gordura, em lactações registradas na classe Aj, isto é, até 2½ anos e na Classe Bj a de 3 a 3½ anos, por animais pertencentes à raça Holandêsa, variedade preta e branca. Também na variedade vermelha e branca foram assinalados dois novos recordes, ambos na classe A, com novilhas em primeira lactação.

HOLANDESA PRETA E BRANCA

Vejamos o que ocorreu na variedade preta e branca da raça Holandêsa, Divisão de 365 dias. Embora não tenham sido

registradas grandes lactações neste mês de Dezembro, não podem deixar de ser citadas quatro vacas:

Arlete Clara Sylvia V, PO, com 3 anos e um mês, em duas ordenhas, registrou, em 365 dias, 6.368 kg de leite com 248,2 kg de gordura, 3,89%. Criação e propriedade do Dr. Manoel Alves de Castro.

Allen de Kol F. Beutymore, PO, com 11 anos e um mês, produziu, em três ordenhas, em 365 dias, 7.959 kg de leite com 262,2 kg de gordura, ou 3,29%. Fazenda Paraiso, S. João da Boa Vista.

Garradinha, PC, com 8 anos e cinco meses, produziu, em 303 dias, em duas ordenhas, 6.458 kg de leite, com 187,6 kg de gordura. Pertence ao sr. Caio Ramos, Campinas.

Pietje 86, PO, com 5 anos e 7 meses, em duas ordenhas, produziu, em 365 dias, 6.041 kg de leite com 251,6 kg de gordura, ou 4,16%. Pertence ao sr. A. Barkema, Soc. Cooperativa Castrolanda, Paraná.

**PROTEÇÃO
INTEGRAL
CONTRA AS
DOENÇAS
DO GADO!**

BABESAN

Específico contra as piropilomoses dos bovinos, equinos e suínos. Eficaz também na "tristeza" dos bovinos e nas babesioses. Fácil aplicação.

HIBITANE

Especialmente indicado no tratamento das mastites ou mamites das vacas e das cabras leiteiras. Cura radicalmente, restabelecendo o volume normal do leite. Combate os demais micróbios das glândulas do úbere. Apresentado em bisnagas para aplicação local.

PHENOVIS

(Fenotiazina Inglêsa)
Mineralizado. Contrôla efetivo das infecções de vermes e das doenças parasitárias internas. Ministrado com o sal ou com a ração. Não exige período de jejum antes do tratamento nem o uso de purgante depois deste.

COMPANHIA IMPERIAL DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO BRASIL

Rua Xavier de Toledo, 14 - 7.º andar
Cx. Postal 6980 - São Paulo
FILIAIS: RIO DE JANEIRO - PORTO ALEGRE
SALVADOR - RECIFE

Na Divisão de 305 dias, tivemos os seguintes recordes e destaques, ainda com vacas da raça Holandesa, variedade preta e branca:

Castrolândia Bur Minkje 24, PO, com lactação iniciada aos 2 anos, em 305 dias, em duas ordenhas, registrou 4.308 kg de leite com 162,2 kg. de gordura, 3,76%. São os novos registros máximos na Divisão, na respectiva classe e categoria. Pertence ao sr. H. de Boer, Castrolândia.

Holambra Oda II, PO, com lactação iniciada aos 3 anos e 4 meses, em duas ordenhas, em 305 dias, produziu 4.477 kg de leite com 181,0 kg de gordura, ou 4,04%. Pertence à Cooperativa Holambra, S. Paulo.

Estas duas vacas deram nova cria antes de completados 427 dias do início da lactação: a primeira aos 375 dias e a segunda aos 389 dias.

Merçam ainda destaque, nesta Divisão, as seguintes vacas:

Elizabeth, PC, com 4 anos e 4 meses, em duas ordenhas, em 305 dias, produziu 5.167 kg de leite, com 192,7 kg de gordura, ou 3,73%; (Sr. H. Rebbers, Castrolândia) é Herculea S.M., PC, com 4 anos e 10 meses, em duas ordenhas, em 305 dias, com 5.575 kg de leite com 197,9 kg de gordura, 3,54%, (Sr. Darío F. Meirelles); Dora 15, PO, com 6 anos e 5 meses, em duas ordenhas, em 305 dias, com 5.794 kg de leite e 223,4 kg de gordura ou 3,85% (Sr. J. Vos, Castrolândia).

HOLANDESA VERMELHA E BRANCA

Na variedade vermelha e branca da raça Holandesa, na Divisão de 305 dias, tivemos: Castro Aafge V, PO, com 2 anos e 2 meses, em 300 dias, que produziu 4.771 kg. de leite e 196,7 kg de gordura, ou 4,12%, com nova parição aos 368 dias, recorde para a classe e idade. Esta novilha pertence ao Sr. Adriano Sleutjes, Paraná.

Novo recorde foi registrado por Holambra Rika V, PO, que, com 2 anos e 8 meses, em duas ordenhas, em 305 dias, produziu 4.207 kg de leite com 157,8 kg de gordura ou 3,75%, com nova parição aos 417 dias. Esta recordista é de criação e propriedade da Cooperativa Castrolândia.

É interessante notar que ultimamente vêm sendo registradas boas lactações na Divisão de 305 dias para ambas as variedades. A maior porcentagem, porém, cabe à variedade vermelha e branca, fato compreensível, dado o elevado valor dos machos, pela reduzida oferta existente em nosso mercado.

BOAS LACTAÇÕES EM MARCHA

Dentre as boas lactações em marcha pode ser citada atualmente Backa, importada da Suécia, que está fazendo sua terceira lactação, iniciada aos 5 anos e 8 meses; tem 5 controles feitos, com produções de 26,1 - 28,8 - 26,5 - 24,0 e 18,9, pertence ao Sr. Alberto Ferraz - Fazenda Bela Vista.

Na Fazenda Copacabana, da firma D. Pires, duas vacas prometem resultados bem altos, ambas em regime de tres ordenhas: Amazonas Aristocrata: 29,1 - 33,2 - 31,1 - 33,9 - 32,2 - 27,6 - 26,2 - 24,0 e Amazonas Artista: 30,3 - 32,5 - 32,5 - 32,9 - 33,6 - 35,6 - 28,2 - 26,6 - 23,8.

Na Fazenda S. Martinho, temos: Martona's Milkmaster Cruzader 77, PO aos 8 anos e 10 meses com 31,1 - 32,6 - 35,7 - 22,0 - 29,2 - 23,2 - 22,1 - 21,7; 3 X; Ms Rag Apple Cruzader, 3 x, aos 5 anos e 2 meses: 31,4 - 30,1 - 28,2 - 19,9 - 21,5 -

Simbolo de qualidade

DESDE 1927

BOMBA A PISTÃO TUPAN

TIPO A-5

PARA POÇOS RAZOS OU PROFUNDOS

PRÁTICA
ECONÔMICA

Funcionamento seguro e silencioso - Durabilidade e eficiência - Peças sobressalentes e facilmente substituíveis - Engrenagens herméticamente fechadas em caixas com banho contínuo de óleo - Lubrificação automática dos mancais e biela - Cilindro e êmbolo inteiramente de bronze.

ESTABELECIMENTO MECANICO TUPAN LTDA.

RUA PADRE RAPOSO N. 389
Telefone: 9-7734

End. Telegr.: MOTUPAN
S. PAULO - BRASIL

16,7 - 12,2 - 12,8. S. M. Peg Meer Roakerco, 3x, 6 anos e 2 meses: 28,4 - 36,2 - 27,3 - 29,7 - 25,8 - 20,7 - 24,1. Juliana Maria, em 3 x aos 7 anos e 3 meses com 34,8 - 42,4 - 37,7 - 26,4 - 21,1 - 18,8.

A Companhia Agrícola São Quirino tem, por sua vez, três vacas em duas ordenhas e mais uma que foi ordenhada inicialmente em tres, mas que fará sua lactação em duas ordenhas, com boas produções, a saber: A. Navy, PC, 7-4, com 27,4 - 26,0 - 26,4 - 24,4 - 23,7 - 22,8 - 17,5 - 14,8 e 12,0; S. Quirino Ararpuá, PC aos 5 - 3, com 28,5 - 27,2 - 22,4 - 17,8 - 20,2 - 20,4 - 21,3 - 19,3 - 17,8 - 17,8 - 14,1; Amazonas Meeira, PC, aos 8 - 5 meses com 28,4 - 25,5 - 24,5 - 21,8 - 20,6 - 18,8 - 17,5 e Willy's Rossana M. Alegria, PO, aos 6 - 11, com dois controles em tres ordenhas, 32,4 e 34,4 e um em duas ordenhas 33,8.

Todas estas lactações prometem bons resultados finais, muito embora não possam ser consideradas desde já, como as melhores em marcha, pois, como todos sabemos, as lactações apresentam sempre muitas surpresas e somente o controle sistemático de todas permite destacar as melhores.

PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Para todas as estações e para todas as ocasiões preferam sempre os tecidos das afamadas

CASAS PERNAMBUCANAS

FILIAIS EM TODO O BRASIL

RELATÓRIO N.º 171
SERVIÇO DE CONTROLE LEITEIRO

da
Associação Paulista de Criadores de Bovinos
Em cooperação com o Departamento Nacional da Produção Animal do
Ministério da Agricultura
FEVEREIRO DE 1959

LACTAÇÕES TERMINADAS

Nome da vaca	Grau de Sangue	Idade anos e meses	N.º SCL	Dias de Lactação	Produção		%	Proprietário
					Leite kg	Gordura kg		
RAÇA HOLANDÊSA — VARIEDADE PRETA E BRANCA.								
Lactações de até 365 dias (II Divisão)								
Três ordenhas (3x)								
CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.								
Jardim Narceja - LM	NR	3-4	6271	296	5332,0	191,9	3,59	Cia. Baptista Scarpa Ind. Com.
Jardim Olinda - (1)	NR	3-5	6461	307	4844,0	161,7	3,33	Cia. Baptista Scarpa Ind. Com.
CLASSE CJ — De 4 a 4½ anos.								
V. B. Bartira - B11/4127	PO	4-2	5732	323	3923,0	149,6	3,80	Lafayette A. de Souza Camargo
S. C. Fabiana Marksman-21800	PC	4-1	5107	173	2585,0	89,1	3,44	Cia. Cafeeira do Rio Feio
CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.								
Arlete Paulina - B7/3595-LM	PO	4-10	5654	327	6267,0	210,6	3,35	Lafayette A. de Souza Camargo
CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.								
Jardim Jarreta -	NR	5-7	6272	304	5771,0	193,2	3,34	Cia. Baptista Scarpa Ind. Com.
Jardim Jornalesca-1734 (2)	7/8	6-3	4905	180	3377,0	119,3	3,53	Cia. Baptista Scarpa Ind. Com.
Boa Vista Gaita-15635	7/8	7-5	2348	361	3270,0	110,9	3,39	Cia. Cafeeira do Rio Feio
Amazonas Fogliona - 11448	PC	10-1	1620	178	1801,0	64,8	3,59	Cia. Cafeeira do Rio Feio
Amazonas Iomogenia - 13772 (1)	PC	8-6	1597	94	1437,0	42,2	2,93	Cia. Cafeeira do Rio Feio
Duas ordenhas (2x)								
CLASSE AJ — Até 2½ anos.								
Cast. E. Marie 94-B13/5161-LM	PO	1-11	6675	327	4071,0	151,1	3,71	R. Salomons
S. M. Mattie Chlefcomet								
Marksdekol-B13/4841	PO	2-5	6510	349	3701,0	121,8	3,47	Dario Freire Meirelles
Wiersma 472-B13/5106	PO	2-0	6277	270	2487,0	104,9	4,21	Roelof Rabbers
CLASSE AS — De 2½ a 3 anos								
S. M. Burke Maria Marksdekol-B13/4835 - LM	PO	2-9	6509	365	5161,0	169,0	3,27	Dario Freire Meirelles
Cast. E. Marie 93-B13/5095-LM	PO	2-6	6161	332	3882,0	151,3	3,89	R. Salomons
Cast. R. Romkje - B13/5070-LM	PO	2-6	6536	341	3842,0	159,1	4,11	Roelof Rabbers
S. Quirino Cocada - 27167	PC	2-9	6515	360	2759,0	105,3	3,81	Cia. Agricola São Quirino
Bruixa - 26462	PC	2-10	6227	249	2743,0	87,4	3,18	Cia. Agricola São Quirino
CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.								
Cast. J. Hinke 40-B12/4279-LM	PO	3-2	5291	290	5066,0	209,4	4,11	Jager & Borg
Hol. Bertha LXV-B12/4498-LM	PO	3-3	5614	344	4820,0	196,1	4,06	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Bontje - LM	NR	3-3	6678	307	3663,0	152,3	4,15	Lucas Katerberg
CLASSE BS — De 3½ a 4 anos.								
Hol. Treesje II - B10/3265-LM	PO	3-6	4870	365	4863,0	198,6	4,03	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Lilja M 170-F7/2999	PO	3-9	5519	328	3476,0	139,8	4,02	Alberto Ferraz
Cyrilla M 20-F7/3001	PO	3-8	6599	346	3397,0	130,2	3,84	Alberto Ferraz
Amaz. Lisboa - 25196	PC	3-7	5920	310	3247,0	109,9	3,38	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Woud Hoeve W. Adema-B11/3990(1)	PO	3-10	4675	222	2917,0	118,6	4,06	Berend Willem Bouwman
Academia de Monte D'Este-21386	PC	3-10	5246	223	2653,0	95,0	3,53	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Bomba Ag. Negras - 1079	PC	3-8	5092	250	2394,0	82,7	3,45	Alberto Ferraz
Babilonia de Monte D'Este-23107	PC	3-6	5392	223	2277,0	86,6	3,80	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
CLASSE CJ — De 4 a 4½ anos.								
Begonia Ag. Negras - 1078	PC	4-2	5204	196	2128,0	78,6	3,69	Alberto Ferraz
CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.								
Agra de Monte D'Este-21382-LM	PC	4-8	4578	332	5424,0	189,2	3,48	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
S. M. Burke M. V. Supreme-B11/4150 - LM	PO	4-9	4419	365	4618,0	180,5	3,90	Dario Freire Meirelles
Maj - F6/2826	PO	4-10	4401	365	4127,0	144,0	3,43	Alberto Ferraz
S. M. Aaltje G. Rag Apple-B11/4152	PO	4-9	6301	255	4045,0	140,3	3,46	Dario Freire Meirelles
S. Quirino Alemã - 21901	PC	4-11	4815	308	3868,0	119,1	3,07	Cia. Agricola São Quirino
Holambra Cora - B10/3735	PO	4-9	5199	304	3845,0	144,7	3,76	Cooper. Agro-Pec. Holambra
S. Quirino Cantata - 23725	PC	4-10	6774	322	3329,0	104,5	3,13	Cia. Agricola São Quirino

ABRIL DE 1959

Nome da vaca	Grau de Sangue	Idade anos meses	N.º SCL	Dias de Lactação	Produção		%	Proprietário
					Leite kg	Gordura kg		
CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.								
Juweeltje 65-F4/1765-LM	PO	6-4	6668	314	5736,0	223,1	3,88	Wed H. Moorlag
Pietje 85-F5/2473-LM	PO	5-11	5118	343	5682,0	234,5	4,12	Jan Noordegraaf
Amazonas Zazá-15014	PC	6-11	2565	365	5522,0	168,1	3,04	Agrindus S.A.
Galera S. Martinho - 18760	PC	6-9	3136	365	5479,0	171,0	3,12	Dario Freire Meirelles
Fabela S. Martinho - 14535 - LM	7/8	8-1	3431	333	5276,0	196,1	3,71	Dario Freire Meirelles
Rooske 2-F6/2516 - LM	PO	5-10	6543	336	5238,0	205,9	3,93	Hermannes Harm Rabbers
Emblema - 20636 - LM	PC	7-2	4968	310	5109,0	193,8	3,79	Lello de T. Piza e Almeida
Janke 23-F6/2682 - LM	PO	6-1	6571	342	5080,0	214,4	4,22	J. R. Fokkema
Amazonas L. Malogenea - 14599	PC	8-1	2886	244	4994,0	172,9	3,46	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Hiltje 74-F6/2533-LM	PO	5-11	3952	318	4989,0	181,9	3,64	Jan van der Schrer
Itahyê Bambina - 23034	PC	6-9	5787	358	4976,0	162,7	3,27	A. J. Byington Júnior
Utinga de Paraiba - 15905	PC	6-9	3621	365	4947,0	170,1	3,50	Espolio de Olivo Gomes
Amazonas C - 43 - 17078	PC	6-9	2972	319	4942,0	149,7	3,07	Agrindus S.A.
Mansinha de Paraiba - 10132	PC	9-10	2114	327	4745,0	162,0	3,41	Espolio de Olivo Gomes
Altaneira Ag. Negras - 18079	PC	6-6	3906	341	4569,0	157,3	3,44	Alberto Ferraz
Caldas - 19223	PC	5-5	6601	319	4451,0	163,2	3,66	S.A. Faz. Paraiso Ind. e Agr.
Desdenhada de Paraiba - 14136	PC	8-0	6497	365	4345,0	154,9	3,56	Arthur Monteiro Neves
Dina 2 - F4/1546	PO	7-3	4997	307	4320,0	159,7	3,67	Geert Leffers
Margarete Madcap C.A.B. - 19179	PC	5-0	6590	337	4311,0	140,1	3,24	Espolio de Olivo Gomes
Frisia - 12947	PC	10-11	6240	294	4272,0	149,7	3,50	João de Vasconcellos
Hol. Roza - B10/3276	PO	5-3	4933	318	4162,0	167,9	4,03	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Espuma de Paraiba - 13184	PC	6-2	3672	359	4093,0	134,6	3,29	Espolio de Olivo Gomes
Pigesch M 233-F6/2715	PO	5-8	5014	338	4041,0	145,7	3,60	Alberto Ferraz
Hawala S. Martinho - 18950	PC	5-9	5530	365	4017,0	140,9	3,50	Dario Freire Meirelles
Boukje 25-F4/1508	PO	7-6	4277	268	4010,0	144,8	3,61	Geert Leffers
Doquinha - 20339	PC	9-2	6264	274	3945,0	146,2	3,70	S.A. Faz. Paraiso Ind. e Agr.
Araras de Paraiba - 8638	PC	10-10	2231	365	3931,0	129,6	3,29	Espolio de Olivo Gomes
Ala Ag. Negres - 18092	PC	6-9	3999	354	3917,0	127,7	3,26	Alberto Ferraz
I. Coreia P. Omot - 23084	PC	6-3	6181	245	3906,0	121,3	3,10	A. J. Byington Júnior
Faisca	NR	-	4367	361	3890,0	146,0	3,75	Alberto Ferraz
Guaraná de Paraiba - 14125	7/8	8-5	4162	245	2906,0	93,3	3,21	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Estrangeira de Copacabana - 19498	PC	5-5	6180	261	2346,0	80,1	3,41	D. Pires Agro-Pecuária S.A.
Fosquinha (3)	NR	-	6724	224	2322,0	75,5	3,25	A. J. Byington Júnior
Azeitona de Paraiba -	NR	-	6194	241	2247,0	103,6	4,61	Espolio de Olivo Gomes
Amaz. Microcega - 15140	PC	7-0	2214	217	2210,0	61,2	2,76	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Grietje VIII - F3/1314	PO	8-6	4529	115	1200,0	42,2	3,51	Cooper. Agro-Pec. Holambra

RAÇA HOLANDÊSA — VARIEDADE VERMELHA E BRANCA.

Lactações de até 365 dias (II Divisão)
Duas ordenhas (2x)

CLASSE AS — De 2½ a 3 anos

M. Espada Alexina - 23934	PC	2-11	6645	309	3379,0	129,3	3,82	Helio Moreira Salles
Suelli - 25624	PC	2-11	7072	257	2501,0	89,1	3,56	Dario Bacelar
Nina - 25625	PC	2-9	7142	111	1163,0	43,0	3,69	Dario Bacelar

CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.

Hol. Koosje VII-BB1/345	PO	3-2	5569	339	4166,0	145,5	3,49	Cooper. Agro-Pec. Holambra
-------------------------	----	-----	------	-----	--------	-------	------	----------------------------

CLASSE BS — De 3½ a 4 anos.

Hol. Rika III -BB1/293	PO	3-11	4918	247	2494,0	90,0	3,60	Cooper. Agro-Pec. Holambra
------------------------	----	------	------	-----	--------	------	------	----------------------------

CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.

Copacabana - 23836 (1)	PC	4-11	6546	345	3862,0	121,5	3,14	Octavio Bierrenbach de Castro
------------------------	----	------	------	-----	--------	-------	------	-------------------------------

CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.

Florine - FF1/197	PO	9-1	4840	312	4887,0	162,4	3,32	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Mina III-FF1/230	PO	9-4	3065	302	4517,0	162,9	3,60	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Sta. Filomena Diana - 15928	PC	8-2	7073	164	2307,0	86,6	3,75	Dario Bacelar
Rebeca - 13080	PC	10-0	2408	138	2187,0	77,8	3,55	Dario Bacelar
Candeia (1)	NR	-	6323	167	2078,0	71,2	3,42	Carlos Whately
Avenca de Pinheiro - BB1/273	PO	5-9	3925	176	1625,0	63,6	3,91	Ministério da Agricultura

RAÇA JERSEY

Lactações de até 365 dias (II Divisão)
Duas ordenhas (2x)

CLASSE AJ — Até 2½ anos.

Fada Magnet Sta. Hilda-3081-C-LM	PO	2-1	6664	317	3262,0	139,9	4,28	João Laraya
----------------------------------	----	-----	------	-----	--------	-------	------	-------------

CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.

Mafalda Basil de Canela-A/208-LM	PO	7-2	2763	365	4828,0	253,5	5,25	Espolio de Olivo Gomes
Alegria do Esteio - 2949 - LM	PO	-	3614	349	3693,0	191,0	5,18	Espolio de Olivo Gomes
Sant'Ana Catita Magnet-794-C-LM	PO	10-5	2116	344	3346,0	156,1	4,66	Espolio de Olivo Gomes
Batalha Sta. Hilda - 1686-C-LM	PO	5-5	5803	315	3205,0	152,3	4,75	João Laraya
Aroeira da Patente-1449-C	PO	7-1	3568	346	2972,0	145,2	3,46	Marcus Rafael Alves de Lima
Nini Basil de Canela-A/421	PO	5-0	5345	301	2839,0	126,2	4,44	Espolio de Olivo Gomes
Sant'Ana Bartira Patrician-A/812	PO	-	4692	330	2277,0	106,0	4,65	Espolio de Olivo Gomes
Galicia do Passa Tempo-1529-C (1)	PO	5-0	5410	141	1090,0	52,2	4,78	Cesar Beretta e Novi

Nome da vaca	Gráu de Sangue	Idade anos meses	N.º SCL	Dias de Lactação	Produção			Proprietário
					Leite kg	Gordura kg	%	
RAÇA SCHWYZ								
CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.								
Xatista de Pinheiro-1444 (2)	PO	8-3	4452	234	2823,0	102,4	3,62	Ministério da Agricultura
Ugicá de Pinheiro - 1237	PO	10-4	2515	312	2605,0	94,4	3,62	Ministério da Agricultura
Roberta - 911	PO	13-4	2787	265	2541,0	91,7	3,60	Ministério da Agricultura

I DIVISÃO — ATÉ 305 DIAS (COM NOVA PARIÇÃO DENTRO DOS 14 MESES)

Nome da vaca	Gráu de san-gue	Idade anos meses	N.º SCL	Dias de lactação	Produção			Nova Parição aos (dias)	Dias de lactação prenhe	Proprietário
					Leite kg	Gordura kg	%			
RAÇA HOLANDÊSA — VARIEDADE PRETA E BRANCA.										
Três ordenhas (3x)										
CLASSE AS — De 2½ a 3 anos										
Jardim Linka-D3/853	PO	2-6	6273	300	4452,0	143,8	3,22	453	—	Cia. Baptista Scarpa Ind. Com.
CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.										
V. B. Ibirapuera-B11/4130-LM	PO	3-3	6426	305	4544,0	175,4	3,85	407	173	Lafayette A. de Souza Camargo
Duas ordenhas (2x)										
CLASSE AJ — Até 2½ anos.										
Hol. Doetje X-B13/4984-LM	PO	2-1	6463	305	3405,0	139,0	4,08	367	213	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Hol. Clara IV-B13/4980	PO	2-3	6464	305	3365,0	128,1	3,80	347	233	Cooper. Agro-Pec. Holambra
Cast. S. Anke's Keurvorst-B13/5107	PO	2-1	6398	238	1330,0	59,7	4,48	427	86	A. Stryker
CLASSE AS — De 2½ a 3 anos.										
Cast. J. Marie 31-B13/5045-LM	PO	2-8	6383	305	4485,0	181,2	4,03	401	179	Jager & Borg
Americana Zwarte Piet-LM	NR	2-11	6411	305	4150,0	194,7	4,69	406	174	Norremóse & Cia.
Cast. J. Nylander 180-B13/5089	PO	2-6	6679	258	3195,0	135,3	4,23	319	214	Jager & Borg
S. Q. Cometa Africana-B14/5430	PO	2-6	6358	305	3177,0	114,1	3,59	408	172	Cia. Agricola São Quirino
S. Q. Cartilha - 23722	PC	2-9	6450	305	2995,0	108,4	3,61	377	202	Cia. Agricola São Quirino
Danas Klaske 31-4820	PO	2-6	6610	290	2914,0	126,5	4,34	317	248	Norremóse & Cia.
Catanduva Mte. D'Este - 25636	PC	2-8	6406	305	2719,0	95,2	3,50	387	193	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Brincadeira Ag. Negras - 1562	7/8	2-7	6598	187	1728,0	69,1	3,99	344	118	Alberto Ferraz
CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.										
Svea M 170-F7/3004	PO	3-5	5524	291	2386,0	87,3	3,65	360	206	Alberto Ferraz
Hol. Betsy - B12/4495	PO	3-4	5617	92	979,0	38,1	3,88	371	—	Cooper. Agro-Pec. Holambra
CLASSE BS — De 3½ a 4 anos.										
Bragantina Mte. D'Este - 23121	PC	3-6	5565	300	4334,0	144,2	3,32	331	206	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Itahyê Gina Pietertje - 23198 (1)	PC	3-7	6434	278	3152,0	98,8	3,13	353	200	A. J. Byington Júnior
Bela Floresta Mte. D'Este - 23113	PC	3-7	5561	271	2785,0	88,6	3,20	372	174	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
CLASSE CJ — De 4 a 4½ anos.										
S. Quirino Alvorada - 21879	PC	4-1	5350	295	5001,0	143,2	2,86	424	146	Cia. Agricola São Quirino
Hol. Claartje - B11/3756	PO	4-5	5596	305	2370,0	95,7	4,03	384	196	Cooper. Agro-Pec. Holambra
CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.										
Floresta Cascata - LM	NR	4-7	6394	305	5126,0	180,7	3,52	397	183	Arthur Monteiro Neves
Boneca Oak Colantha - 1157	3/4	4-7	5536	268	3984,0	154,5	3,87	383	100	Norremóse & Cia.
Aliança Oak Colantha - 858	15/16	4-7	5359	295	2608,0	105,6	4,04	371	199	Norremóse & Cia.
CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.										
Floresta Cigarra - 25878 - LM	PC	5-2	6395	305	5847,0	184,7	3,15	408	172	Arthur Monteiro Neves
Marie 89 - F4/1960 - LM	PO	5-11	6395	305	5235,0	178,4	3,40	409	171	R. Salomons
Cachoeira de Paraíba - 15796	PC	6-5	3134	305	4761,0	163,1	3,42	372	208	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
Amazonas Atenta - 17328	PC	6-4	5388	305	4749,0	144,0	3,03	412	168	D. Pires Agro-Pecuária S.A.
Mansinha de Paraíba - 10132	PC	9-10	2114	305	4708,0	158,6	3,37	368	212	Espollo de Olivo Gomes
Woudman 52 - F6/2687	PO	5-10	6570	270	4279,0	171,1	3,99	324	221	J. R. Fokkema
S. Quirino Anhumas - 19448	PC	5-3	3970	284	4019,0	135,6	3,37	378	181	Cia. Agricola São Quirino
Mocha Colombo Sentinel - 1101	3/4	9-6	3309	305	3957,0	157,7	3,98	399	181	Norremóse & Cia.
Olinda Oak Colantha - 1140	3/4	6-4	3100	244	3662,0	144,3	3,93	315	204	Norremóse & Cia.
Jonbel S. Harriet-F4/1864 (2)	PO	7-4	3409	278	3504,0	101,9	2,90	318	235	S.A. Faz. Paraiso Ind. e Agr.
Metje 7-F6/2596	PO	5-8	4336	288	3312,0	125,1	3,77	373	190	H. de Boer
Janke 4-F5/2457	PO	5-9	4445	234	2880,0	109,3	3,79	400	109	Jan Noordegraaf
Baiana Colombo Sentinel - 850	15/16	8-0	2878	219	2415,0	94,7	3,91	313	181	Norremóse & Cia.

Nome da vaca	Gráu de san-gue	Idade de anos - mēses	N.º SCL	Dias de lactação	Leite kg	Produção Gordura kg	%	Nova Parição aos (dias)	Dias de lactação - prenhe	Proprietario
--------------	-----------------	-----------------------	---------	------------------	----------	---------------------	---	-------------------------	---------------------------	--------------

RAÇA HOLANDESA — VARIEDADE PRETA E BRANCA.

Duas ordenhas (2x)

CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.

Batuta - 26724	PC	4-10	6525	305	4051,0	133,4	3,29	410	170	José Procônio do Amaral
M. Emboscada Alexina - 23933	PC	4-7	6468	305	2794,0	107,0	3,82	334	246	Cia. Agro-Pecuár. Marambala

CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.

M. Beduína Alexina - 18436	PC	5-8	4830	260	3779,0	127,5	3,37	364	171	Cia. Agro-Pecuár. Marambala
Hendrika 4-FF1/262	PO	7-2	2410	300	3082,0	111,3	3,61	368	207	Cia. Agro-Pecuár. Marambala

RAÇA JERSEY

Duas ordenhas (2x)

CLASSE AS — De 2½ a 3 anos.

Elite Sta. Hilda - 27714 - LM	PC	2-6	6496	303	3335,0	139,5	4,18	368	220	João Laraya
-------------------------------	----	-----	------	-----	--------	-------	------	-----	-----	-------------

CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.

Duqueza Bolhayes Sta. Hilda-1765-C	PO	3-3	5765	169	1384,0	61,7	4,45	352	92	João Laraya
------------------------------------	----	-----	------	-----	--------	------	------	-----	----	-------------

CLASSE CS — De 4 a 4½ anos.

Canaria Sta. Hilda-1683-C	PO	4-6	5626	121	1044,0	55,2	5,29	385	11	João Laraya
---------------------------	----	-----	------	-----	--------	------	------	-----	----	-------------

CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.

Sant'Ana Harmonia Patton-1456-C	PO	6-4	4392	305	2439,0	114,4	4,68	363	217	Espolio de Olivo Gomes
---------------------------------	----	-----	------	-----	--------	-------	------	-----	-----	------------------------

RAÇA SCHWYZ

Duas ordenhas (2x)

CLASSE AS — De 2½ a 3 anos

Embira de Pinheiro - 386	PO	2-9	6378	305	2678,0	94,6	3,53	413	167	Ministério da Agricultura
--------------------------	----	-----	------	-----	--------	------	------	-----	-----	---------------------------

CLASSE BJ — De 3 a 3½ anos.

Agrindus Girota - 24624	1/2	3-1	4829	304	3370,0	147,2	4,36	337	242	Agrindus S.A.
-------------------------	-----	-----	------	-----	--------	-------	------	-----	-----	---------------

CLASSE CS — De 4½ a 5 anos.

Birmania de Pinheiro - 193	PO	4-11	5435	305	2626,0	95,8	3,64	325	255	Ministério da Agricultura
----------------------------	----	------	------	-----	--------	------	------	-----	-----	---------------------------

CLASSE D — Adultas, de mais de 5 anos.

Alliança de Pinheiro - 1622	PO	6-3	3627	305	4166,0	150,5	3,61	401	179	Ministério da Agricultura
Aprisionada de Pinheiro	NR	-	5332	305	3636,0	132,1	3,63	359	222	Ministério da Agricultura
Firmeza	NR	12-8	4136	299	3253,0	129,2	3,97	368	206	Agrindus S.A.
Adenda de Pinheiro - 1620	PO	6-8	3878	305	3152,0	116,0	3,67	408	172	Ministério da Agricultura

LM - LIVRO DE MÉRITO — (1) - SEM NOTICIA — (2) - DOENTE — (3) - MORREU.

O último número em seguida ao nome de cada vaca corresponde ao seu número em registro genealógico.

CATEGORIA DE LONGEVIDADE

Esta relação passa a ser publicada sempre que seja registrada qualquer nova parição.

VACAS INSCRITAS

A — Vacas que superaram as exigências mínimas de leite e gordura.

I — RAÇA HOLANDESA — variedade preta e branca.

Nome da vaca	Gráu de Sangue	Dias	Leite kg	Produção Gordura kg	%	Gl.p/G.	Proprietario
--------------	----------------	------	----------	---------------------	---	---------	--------------

Esta relação passa a ser publicada sempre que seja registrada qualquer nova parição.

A — Vacas que superaram as exigências mínimas de leite e gordura.

I — RAÇA HOLANDESA — VARIEDADE PRETA E BRANCA.

1.º - Fortaleza (M)	PC	3547	54469	1937,1	3,37	2.º	Colégio Adventista Brasileiro
2.º - Unica	PC	3590	53331	2025,0	3,79	1.º	Carlos Alberto Willy Auerbach
3.º - S. M. Korndike Ollie Colanthus (M)	PO	2141	45927	1454,5	3,16	3.º	Dario Freire Meirelles
4.º - Faroleza Sentinel	PC	2039	45246	1364,3	3,01	6.º	Colégio Adventista Brasileiro
5.º - B. V. Duchess Senator Bela	PO	1825	42443	1448,0	3,41	4.º	Alberto Ferraz
6.º - Embirrada (M)	PC	2043	38606	1382,1	3,57	5.º	Dario Freire Meirelles

Nome da vaca	Grau de Sangue	Dias	Produção		%	Gl.p/G.	Proprietario
			Leite kg	Gordura kg			
7.º - Firmeza Sentinel	PC	2060	38406	1325,4	3,45	9.º	Colégio Adventista Brasileiro
8.º - Canilla Prilly Lions S. 4 (M)	PC	2328	39071	1499,9	3,93	7.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
9.º - Agatha São Martinho	PC	1825	37047	1364,2	3,68	8.º	Dario Freire Meirelles
10.º - B. V. Jantje 633 LB 2º Ceres	PO	2248	34170	1098,9	3,21	13.º	Carlos Alberto Willy Auerbach
11.º - Amazonas Cabrita (80938)	PC	1453	34144	1142,7	3,34	11.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
12.º - Garça Sentinel	PC	1884	33451	1107,1	3,30	12.º	Espolio de Olivo Gomes
13.º - Balinha Sentinel	PC	1825	32590	1152,8	3,53	10.º	Colégio Adventista Brasileiro
14.º - B. V. Jantje Ceres I	PO	2238	32111	1074,4	3,34	15.º	Carlos Alberto Willy Auerbach
15.º - Buena Pinta (M)	PC	1995	32044	1034,0	3,23	18.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
16.º - Portuguesa	NR	1955	29760	1000,8	3,36	20.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
17.º - Vigo Burke Marla	PO	1453	29393	986,9	3,35	23.º	Dario Freire Meirelles
18.º - Flora Sentinel (M)	PO	1693	29311	943,9	3,22	23.º	Colégio Adventista Brasileiro
19.º - B. V. Bena 629 LB 3º Ceres	PO	2070	28923	962,7	3,32	25.º	Carlos Alberto Willy Auerbach
20.º - Amaz. Dominó Gordina (9617)	PC	1400	28658	1011,9	3,53	19.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
21.º - Ariete Silvia	PO	1335	28607	1092,0	3,81	14.º	Manoel Alves de Castro
22.º - Amaz. L. Maré (10518) (M)	PC	1516	28515	998,5	3,50	21.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
23.º - Esperança Sentinel (M)	PC	1757	28470	973,5	3,41	24.º	Colégio Adventista Brasileiro
24.º - Javaneza	7/8	1828	28043	1054,4	3,75	17.º	Cia. Cafeeira do Rio Feio
25.º - Veneza Sentinel	PC	1460	28422	987,6	3,60	22.º	Espolio de Olivo Gomes
26.º - B. V. Pantalla 5324 Ceres II (886) (M)	PC	1822	27370	924,1	3,37	33.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
27.º - Gelatina (944)	PC	1693	27261	942,9	3,45	29.º	Dario Freire Meirelles
28.º - Fidalga (797)	NR	1999	26927	951,3	3,53	26.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
29.º - Linda (M)	PC	1432	26617	887,4	3,33	40.º	Colégio Adventista Brasileiro
30.º - Lira Sentinel	PC	1411	26411	924,7	3,50	32.º	Espolio de Olivo Gomes
31.º - Alba	PC	1969	26268	1059,5	4,03	16.º	Carlos Alberto Willy Auerbach
32.º - Arlete Liberdade (M)	PO	1021	26232	884,9	3,37	41.º	Lafayette A. de Souza Camargo
33.º - Silene (603)	NR	1460	26136	878,6	3,36	45.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
34.º - Alicita São Martinho	PC	1550	25776	880,0	3,48	44.º	Dario Freire Meirelles
35.º - Arapanema Y	PC	1233	25646	876,8	3,41	47.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
36.º - Hansa	3/4	1805	25409	897,4	3,46	37.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
37.º - Belinha (M)	PC	1486	25357	917,0	3,56	31.º	Colégio Adventista Brasileiro
38.º - B. V. Unica 5334 Ceres 4º (863)	PC	2005	25241	882,9	3,49	42.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
39.º - V. Brandina Campana	7/8	1230	25120	927,5	3,69	31.º	Lafayette A. de Souza Camargo
40.º - B. V. Unica 5334 Ceres 5º (875)	PC	1795	25068	878,4	3,50	46.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy

B - Vacas que superaram apenas as exigências mínimas de Leite.

41.º - Martona's Posch Cevada	PC	1531	28317	793,3	2,80	71.º	Dario Freire Meirelles
42.º - Lina	PC	1307	26844	849,2	3,16	58.º	Colégio Adventista Brasileiro
43.º - Amazonas Nave	PC	1548	26329	857,2	3,19	53.º	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
44.º - Amareluz (535)	PC	1753	25997	871,3	3,35	48.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
45.º - Martona's Fobes Divisa	PC	1340	25617	857,7	3,34	52.º	Dario Freire Meirelles
46.º - Amazonas Napeva	PC	1222	25264	731,9	2,89	107.º	Cia. Agr.-Pec. Faz. Mt.D'Este
47.º - Amazonas Guivannaita	PC	1702	25003	791,8	3,16	73.º	Cia. Cafeeira do Rio Feio

C - Vacas que superaram apenas as exigências mínimas de Gordura.

48.º - Sorocaba	PC	1770	23953	946,6	3,96	27.º	Cia. Cafeeira do Rio Feio
49.º - Baturia São Martinho	PC	1618	23775	930,8	3,91	30.º	Dario Freire Meirelles
50.º - Sata Prilly E. 23 (873)	PC	1630	24125	905,0	3,74	35.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
51.º - Amazonas Grotta	PC	1825	24865	902,3	3,62	36.º	Cia. Cafeeira do Rio Feio
52.º - Ruyter 4 (229)	PO	1239	24458	896,7	3,66	38.º	Cooper. Agro-Pec. Holambra
53.º - Pantalla 2 (876)	PC	1905	24830	893,2	3,71	39.º	Cia. Agro-Pec. Faz. e G. Irohy
54.º - Arboleda's Bena 629 Lind. 13	PO	1695	24596	881,0	3,58	43.º	Carlos Alberto Willy Auerbach

II - RAÇA HOLANDÊSA - VARIEDADE VERMELHA E BRANCA.

A - Vacas que superaram as exigências mínimas de leite e gordura.

1.º - Jardineira II J. B.	PC	922	30758	1008,8	3,27	2.º	Urbano Junqueira
2.º - Aafje I	PO	1456	26236	1016,9	3,87	1.º	Adrianus Sleutjes

C - Vacas que superaram apenas as exigências mínimas de gordura.

3.º - Roosje II	PO	1582	24383	880,3	3,61	3.º	Cooper. Agro-Pec. Holambra
-----------------	----	------	-------	-------	------	-----	----------------------------

III - RAÇA JERSEY

C - Vacas que superaram apenas as exigências mínimas de gordura.

1.º - Sant'Ana Olinda Patton	PO	1617	19447	936,7	4,81	1.º	Espolio de Olivo Gomes
2.º - Índia V	PO	1551	18164	909,4	5,00	2.º	Espolio de Olivo Gomes
3.º - Sant'Ana Estrela Bolhayes	PO	1450	16995	904,1	5,31	3.º	Espolio de Olivo Gomes
4.º - Sant'Ana Hera Magnet	PO	1529	18516	889,2	4,80	4.º	Espolio de Olivo Gomes
5.º - Sant'Ana Malta Bolhayes	PO	1599	19155	879,8	4,59	5.º	Espolio de Olivo Gomes

(M) — MORTA.

Fazenda Bela Vista

AGULHAS NEGRAS,
ESTADO DO RIO

criação e seleção
de gado holandês
preto e branco

PRODUÇÃO LEITEIRA OFICIALMENTE
CONTROLADA PELA A.P.C.B.

B. V. BORIS — Filho de São Martinho Colanthus Comet Marksdekol, primeiro prêmio na II Exposição-Feira de Gado Leiteiro, de São Paulo, 1957 e na XXV Exposição Nacional de Animais, 1958. Neto de Glenafon Nugel, "All-Canadian" e campeão do I Exposição-Feira de Gado Leiteiro de São Paulo. A mãe de BORIS é Bela Vista Duchess Senador Belo, puro sangue de origem. Inscrito no Livro de Mérito e no Livro de Escol do S.C.L.

Proprietário:

ALBERTO FERRAZ

Agulhas Negras — Estrada Mauá, Km 18
Estado do Rio

RESULTADOS PARCIAIS DE CONTROLE

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura %
---------	--------------	----------------	-----------------------	-----------	-------------------	----------------	-----------

RAÇA HOLANDESA — variedade preta e branca.

S. A. Fazenda Paraíso Industrial e Agrícola. São João da Boa Vista, Est. de São Paulo. Controle em 12/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

2.868	G. & B. Dugline F. Sensation	PO	8-8	1.º	30	18,720	0,409	2,18
2.925	Wanda Tensen Coiantaus	PO	8-2	6.º	162	13,400	0,600	4,48
3.152	Daisy Grownurst Perfection	PO	7-3	7.º	204	14,000	0,542	3,67
3.328	Ma,je Lane R. Lochinvar	PO	7-10	2.º	49	19,000	0,631	3,41
3.657	Bob-Mar inka Dewdrop	PO	7-2	8.º	229	13,720	0,547	3,99
4.923	Benton Ormsby Viola (Twin)	PO	7-2	6.º	168	16,970	0,642	3,18
5.869	Gazella	PCOD	11-6	9.º	273	15,300	0,617	4,03
5.873	Dengosa	PCOD	5-0	7.º	207	16,600	0,403	2,42
5.878	Quata	PCOD	7-3	5.º	141	15,270	0,456	2,99
5.879	Racaria	PCOD	11-11	7.º	208	13,130	0,483	3,68
5.882	Madcap Marathon Of 3 Mar-tona	PO	7-7	7.º	212	18,430	0,512	2,78
5.895	Inca	PCOD	3-9	8.º	239	14,960	0,446	2,98
5.987	Corombina	PO	9-8	2.º	50	22,390	0,631	2,82
6.038	Martona	PCOD	8-2	7.º	228	16,320	0,559	3,43
6.040	Caçara	PCOD	9-3	6.º	171	14,050	0,594	4,23
6.110	Paaua	PCOD	7-5	4.º	105	20,150	0,640	3,17
6.205	Xarqueada	PCOD	7-1	2.º	77	19,600	0,702	3,68
6.206	Lagoa	PCOD	6-11	5.º	139	18,550	0,530	2,85
6.367	Fuerkje (Leopoldina)	PO	8-9	3.º	95	16,510	0,543	3,29
6.368	Lomita I	PCOD	11-9	2.º	70	16,690	0,457	2,74
6.425	Candeias	PCOD	7-0	5.º	103	20,350	0,729	3,58
6.822	Canoas	PCOD	6-6	9.º	269	17,740	0,525	2,96
7.267	Japke II (Leonilda)	PO	8-5	4.º	109	14,280	0,460	3,22
7.268	Guerra's Potentado Daisy	PO	12-8	4.º	105	13,440	0,447	3,32

2 ordenhas

2.397	Benton O. Supreme Nancy	PO	9-5	1.º	10	16,750	0,524	3,12
3.407	Mary De Kol Sovereign	PO	8-0	1.º	25	16,900	0,414	2,45
3.409	Jonbell Sterling Harriet	PO	8-2	1.º	10	18,250	0,516	2,83
3.492	Forsgate Successor Posch	PO	7-5	7.º	194	15,130	0,554	3,66
3.854	Placid Heilo Crocus	PO	7-10	1.º	30	13,800	0,498	3,60
4.034	Hillycrest De Kol R. Apple	PO	7-7	5.º	137	13,000	0,364	2,80
5.984	Alerta	PCOD	5-8	1.º	20	20,300	0,663	3,26
6.036	Omissa	PCOD	7-6	6.º	170	15,350	0,499	3,25
6.042	Sineta	PCOD	10-0	6.º	163	14,390	0,477	3,32
6.265	Rancheira	PCOD	10-0	2.º	43	13,100	0,537	4,10
6.266	Boloonha	PCOD	5-10	2.º	71	13,100	0,379	2,89
6.268	Garça	PCOD	9-11	6.º	169	14,650	0,467	3,18
6.363	Borracha	PCOD	11-2	2.º	43	13,150	0,426	3,24
6.423	Viçosa	PCOD	7-2	2.º	42	17,560	0,536	3,05
6.475	Argelia	PCOD	4-8	2.º	52	13,000	0,392	3,01
6.821	Antena	PCOD	4-7	9.º	268	14,650	0,503	3,43
6.823	Alva	PCOD	4-3	9.º	266	13,900	0,499	3,59
7.511	Sertão Camélia	PO	2-5	2.º	97	14,200	0,513	3,61
7.512	Sta. C. Florida Marksman	PCOC	4-2	2.º	74	13,150	0,362	2,75
7.514	Mariposa	PCOD	11-10	2.º	43	13,100	0,467	3,56
7.515	Pabst Leader Ro Syna	PO	4-7	2.º	41	16,250	0,502	3,09
7.558	Anjú	PCOD	5-7	1.º	30	18,000	0,535	2,97
7.559	Biritiba	PCOC	3-3	1.º	26	14,900	0,488	3,27
7.560	Sta. Carolina Daphne Mar-ksman	PCOC	5-3	1.º	7	15,000	0,521	3,47

Cia. Agro-Pecuária Fazenda Monte D'Este. Campinas. Estado de São Paulo. Controle em 15/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.209	Amazonas L. Mabiltaional	PCOD	8-2	2.º	67	13,630	0,375	2,75
2.213	Amazonas L. Malografica	PCOD	8-6	2.º	74	14,200	0,496	3,49
2.262	Amazonas Majacadacea	PCOD	8-1	3.º	69	18,320	0,466	2,54
2.263	Amazonas Narrativa	PCOD	8-3	1.º	10	20,830	0,707	3,39
2.343	Amazonas L. Mafalgesia	PCOD	8-3	3.º	85	14,610	0,525	3,59
2.684	Falange de Paraiba	PCOD	7-3	6.º	164	13,630	0,603	4,46
2.995	Drogaria de Paraiba	PCOC	7-6	3.º	99	17,000	0,593	3,52
3.134	Cachoeira de Paraiba	PCOC	7-6	1.º	39	16,070	0,602	3,74
3.322	Bailarina II de Paraiba	PCOC	8-2	4.º	121	13,430	0,550	4,10
4.010	Antartica de Monte D'Este	PCOC	6-0	1.º	27	19,020	0,751	3,95
4.576	Athena de Monte D'Este	PCOC	5-7	3.º	68	17,210	0,536	3,11
4.873	Aconegua de Monte D'Este	PCOC	5-7	1.º	27	19,500	0,729	3,73
5.246	Academia de Monte D'Este	PCOC	5-1	1.º	35	22,220	0,680	3,06
5.392	Eabilonia de Monte D'Este	PCOC	4-10	1.º	9	21,560	0,787	3,65
5.561	Bela Floresta de Mte. D'Este	PCOC	4-7	1.º	15	18,590	0,496	2,67
5.826	Amazonas Italiana	PCOD	3-5	10.º	315	13,130	0,426	3,24

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura %	%
5.834	Amazonas Azuma	PCOD	3-8	7.º	193	13,130	0,448	3,41
5.912	Amazonas Campineira	PCOD	3-11	7.º	210	14,210	0,511	3,59
5.913	Amazonas Grecia	PCOD	3-11	6.º	175	13,230	0,460	3,46
6.044	Amazonas Cuba	PCOD	4-0	7.º	188	14,070	0,495	3,44
6.047	Amazonas Nova Odessa	PCOD	4-7	2.º	58	15,340	0,669	4,36
6.132	Amazonas India	PCOD	4-3	2.º	58	14,540	0,509	3,50
6.135	Amazonas Parisiense	PCOD	4-6	2.º	67	14,490	0,414	2,86
6.198	Bisca de Monte D'Este	PCOC	3-11	3.º	74	14,630	0,457	3,11
6.406	Catanduva de Monte D'Este	PCOD	3-9	1.º	24	13,700	0,502	3,66
7.064	Amazonas Rumania	PCOD	4-3	6.º	159	14,990	0,472	3,14
7.277	Doninha de Monte D'Este	PCOC	2-9	4.º	99	13,030	0,444	3,41
7.280	Dezenhada de Monte D'Este	PCOC	2-8	5.º	94	14,430	0,550	3,80
7.481	Drama de Monte D'Este	PCOC	2-8	2.º	64	15,220	0,579	3,80
7.482	M. D. Crusader Butter Girl	PO	2-3	2.º	35	20,740	0,930	4,00

Ministério da Agricultura. Fazenda Experimental de Juparanã. Marquês de Valença. Estado do Rio de Janeiro. Controle em 23/1/959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

2.824	Elisabeth's Norita M. Snowden	PO	7-8	10.º	282	14,200	0,462	3,25
3.044	Uberaba	PO	10-0	10.º	280	15,600	0,601	3,85
3.045	F. S. M. Alba	PO	8-5	1.º	49	21,600	0,543	2,53
3.207	F.S.M. Bicuiba	PO	7-9	1.º	35	19,800	0,499	2,52
3.730	F.S.M. Batauí	PO	-	7.º	-	15,500	0,627	4,04
4.264	Cereja	PO	6-2	10.º	279	18,300	0,591	3,23
5.865	F.S.M. Elite	PO	4-4	4.º	117	21,300	0,793	3,74
5.866	F.S.M. Elemi	PO	4-2	5.º	139	18,000	0,641	3,56
7.131	F.S.M. Fada	PO	3-3	5.º	135	16,600	0,617	3,71
7.151	F.S.M. Garota	PO	2-11	1.º	42	18,000	0,466	2,58
7.313	F.S.M. Falange	PO	3-6	3.º	67	17,200	0,439	2,84
7.504	F.S.M. Fabula	PO	3-3	1.º	53	19,300	0,539	2,79
7.557	F.S.M. Facecia	PO	3-3	1.º	30	18,900	0,449	2,37

Dr. Alkindar e Guilherme M. Junqueira. Itatiba. Estado de São Paulo. Controle em 25/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

7.443	Martona	PCOD	4-0	2.º	52	13,190	0,387	2,93
7.617	Ventania	PCOD	4-4	1.º	1	13,220	0,380	2,87
7.618	Renhida Melu	PCOD	3-11	1.º	13	14,020	0,386	2,76
7.619	Ceres Vinhedo	PCOD	4-9	1.º	13	15,300	0,433	2,86

Cia. Agricola São Quirino. Campinas. Est. de São Paulo. Controle em 25/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.705	Amazonas Imagem	PCOD	9-5	7.º	193	15,150	0,505	3,33
2.103	Amazonas Milonga	PCOD	8-5	7.º	185	17,430	0,607	3,47
2.919	W. Rosana Miady Alegria	PO	6-11	4.º	96	31,580	1,105	3,50
3.141	Martona's Senator Robert 2	PO	7-0	1.º	21	20,430	0,609	2,97
3.317	M's. Senator Madcap 5 (Quinta)	PO	6-11	2.º	50	23,300	0,653	2,80
3.554	Amazonas Média	PCOD	8-3	9.º	247	17,620	0,536	3,04
3.966	São Quirino Acará	PCOC	5-9	6.º	188	17,000	0,526	3,09
3.970	São Quirino Anhumas	PCOC	6-4	1.º	4	25,270	0,809	3,20
5.210	São Quirino Bagaceira	PCOC	4-3	5.º	132	18,180	0,643	3,54
5.250	São Quirino Aveia	PCOC	4-10	5.º	123	15,260	0,527	3,45
5.255	São Quirino Aida	PCOC	5-2	1.º	17	15,930	0,525	3,29
5.257	São Quirino Alba	PCOC	5-0	3.º	66	16,580	0,556	3,35
5.350	São Quirino Alvorada	PCOC	5-3	1.º	4	18,590	0,487	2,62
5.353	S. Quirino Bastilha Africana	PO	4-3	5.º	154	15,380	0,601	3,91
6.094	São Quirino Cidalia	PCOC	3-11	2.º	36	13,300	0,659	3,58
6.170	São Quirino Calunia	PCOC	3-7	5.º	136	16,030	0,526	3,27
6.225	S. Quirino Caxangá Xeura	PO	3-8	3.º	66	19,640	0,622	3,16
6.232	São Quirino Baldroca	PCOC	3-11	3.º	82	15,440	0,520	3,37
6.450	São Quirino Cartilha	PCOC	3-10	1.º	15	15,850	0,539	3,40
6.768	Cuando 31 Master Baradero	PO	2-3	10.º	278	15,690	0,578	3,63
7.214	Amazonas Naviculada	PCOD	8-0	5.º	144	17,310	0,477	2,76
7.308	Balança	PCOD	4-1	4.º	103	15,810	0,477	3,05
7.404	Carlucha 6 Master Baradero	PO	2-4	3.º	77	16,600	0,498	3,00
7.485	Gringa 9 B 1541	PO	2-8	2.º	53	15,090	0,452	3,00
7.489	São Quirino Diadema	PCOC	2-8	2.º	31	16,090	0,432	3,00
7.629	Suerte 7 B 1549 Baradero	PO	2-11	1.º	21	15,940	0,437	3,05
7.631	São Quirino Doravada	PO	2-11	1.º	25	16,290	0,492	3,02
7.636	São Quirino Defumada	PCOC	3-0	1.º	33	17,630	0,519	2,94
7.637	São Quirino Disciplina	PCOC	2-7	1.º	31	16,870	0,465	2,75
7.638	São Quirino Dallia 5º	PO	2-11	1.º	3	16,110	0,531	3,29
7.640	São Quirino Dedeira	PCOC	2-9	1.º	9	15,450	0,434	3,13
7.641	São Quirino Desejosa	PCOC	2-9	1.º	16	15,590	0,445	2,85
7.643	São Quirino Dalva	PCOC	2-9	1.º	20	15,800	0,446	2,82
7.645	São Quirino Dama	PCOD	2-11	1.º	5	20,610	0,640	3,10
7.649	São Quirino Dina	PCOC	2-10	1.º	24	15,820	0,494	3,12

ABRIL DE 1959

Sociedade Cooperativa
CASTROLANDA Ltda.

**GADO
HOLANDÊS**

PRETO E BRANCO
puro de origem

**PRODUÇÃO LEITEIRA OFICIALMENTE
CONTROLADA PELA A.P.C.B.**

CASTROLANDA MORLAG NETTE 62
— Primeiro prêmio na categoria de 18 a 24 meses, na XXV Exposição Nacional de Animais, realizada em Agosto, no Parque da Água Branca, S.P.

**VENDA DE
REPRODUTORES
DA
RAÇA
SADLE BLACKKE**

Sua visita
será um prazer

Sociedade Cooperativa
CASTROLANDA LTDA.

C. Postal, 131 - CASTRO - Est. Paraná

CONDUÇÃO

TREM - direto de São Paulo a Castro
pela E. F. Sorocabana
AVIÃO - até Ponta Grossa prosseguindo
de onibus até Castro (45 minutos)
**CAMPO DE POUSO PARTICULAR
DENTRO DA COLONIA**

— 107 —

COLEGIO ADVENTISTA BRASILEIRO

30 ANOS

DE SELEÇÃO DE GADO HOLANDEZ

NOSSAS CRIOULAS

FAROLEZA SENTINEL, campeã pura por cruzamento da raça na I Exposição-Feira de Gado Leiteiro do Estado de São Paulo. No Serviço de Controle Leiteiro da A.P.C.B., é recordista de classe na categoria de 1 a 5 anos, com a produção de 9.020 kg de leite.

- Longevidade e produção média com provada.
- Temos várias crioulas inscritas na Categoria de Longevidade e Livro de Mérito do Serviço de Controle Leiteiro da A.P.C.B.
- **FORTALEZA**, crioula e pertencente ao nosso plantel, foi a primeira produtora a atingir a produção de 50 toneladas de leite.
- Vejam a paginas..... desta edição, as médias das nossas produtoras.

Durante sua estada em S. Paulo conheça nosso rebanho. Sua visita será um prazer. Quilometro 23 da estrada asfaltada de Itapeverica - via Sta. Amoro

COLEGIO ADVENTISTA BRASILEIRO

Cxa. Postal 7258 - Telefone 61-2606
SÃO PAULO

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura %
Dr. A. J. Byington Júnior. Perús. Est. de São Paulo. Controle em 12/2/959.							
Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.							
5.780	I. Alnadia Miller F. R. Apple	PCOD	6-7	2.º	37	14,000	0,455 3,25
5.787	Itahyê Bambina	PCOD	7-9	1.º	13	14,600	0,477 3,25
5.789	Itahyê Picadora	PCOD	5-11	1.º	6	20,000	0,609 3,04
5.915	I. Lambari Granadero Pabst	NR	6-9	5.º	149	19,720	0,581 2,94
5.970	Itahyê Aleluia	PCOD	8-9	4.º	128	19,000	0,597 3,14
6.090	Itahyê Costureira Miller	PCOD	7-0	6.º	170	13,100	0,429 3,27
6.434	Itahyê Gina Pietertje	PCOD	4-5	1.º	66	17,500	0,560 3,20
6.808	I. Boa-Bola Granadero Pabst	PCOD	7-5	9.º	255	14,210	0,461 3,24
6.973	Olinda Miller Farm Mike	NR	6-4	7.º	215	13,500	0,457 3,35
7.243	Itahyê Arica Omot	NR	4-0	3.º	213	13,300	0,458 3,44
7.494	Itahyê Favorita	NR	5-7	2.º	40	14,130	0,500 3,53
7.495	Itahyê Klarisse Pabst	PCOD	4-7	2.º	39	13,200	0,468 3,55
7.496	Itahyê Beatriz	PCOD	5-4	2.º	44	14,030	0,462 3,30
7.666	Sibllina	PCOD	10-2	1.º	1	14,030	0,473 3,37
7.667	Itahyê Sofia Man Sentinel	NR	4-6	1.º	6	15,510	0,526 3,39

Cia. Gessy Industrial. Campinas. Est. de São Paulo. Controle em 12/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 ordenhas.

4.426	Lucas Joco 2	PO	6-3	5.º	144	14,460	0,597 4,12
7.253	C. G. Cigana 2ª	PCOD	4-5	4.º	104	13,990	0,578 4,13

Dr. Arthur Monteiro Neves. Souza. Est. de São Paulo. Controle em 3/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

6.394	Floresta Cascata	NR	5-9	1.º	18	23,450	0,801 3,41
6.395	Floresta Cigarra	PCOD	6-3	1.º	16	27,420	0,711 2,59
6.986	Floresta Pila Jaçaná	PO	5-4	7.º	206	21,950	0,812 3,70
6.987	Floresta Jaçaná Bartira	PO	2-7	7.º	204	14,020	0,483 3,44
6.991	Censura de Paraiba	PCOC	4-9	7.º	212	13,620	0,418 3,07
6.992	Floresta Diamantina	PCOD	8-1	7.º	189	14,490	0,507 3,50
7.057	Floresta Planeta	PCOD	2-1	6.º	170	13,000	0,508 3,91
7.133	Leviana Martona's	PCOD	4-4	5.º	126	13,780	0,391 2,84
7.139	Avenca	PCOD	4-11	5.º	127	14,740	0,509 3,45
7.505	Floresta Zazá	7/8	10-5	2.º	71	17,030	0,543 3,19
7.507	Floresta Alvorada	NR	7-3	2.º	58	16,140	0,535 3,31
7.508	Dama	PCOD	4-1	2.º	48	20,630	0,521 3,01
7.582	Floresta Milonga	3/4	6-9	1.º	14	14,110	0,358 2,53
7.584	Lucecita	PCOD	4-1	1.º	21	16,430	0,497 3,02

João de Vasconcellos. Sumaré. Est. de São Paulo. Controle em 27/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

5.920	F.B.A. Ituzá	PCOD	9-0	8.º	226	20,430	0,613 3,00	
6.002	F.A. Saritana	PCOD	8-1	4.º	90	17,980	0,540 3,00	
6.004	F.A. Martonita	PCOD	9-9	7.º	200	14,260	0,587 4,12	
6.008	F.A. Donzela	PCOD	4-7	1.º	28	25,130	0,666 2,65	
6.009	F.A. Mascaradinha	NR	-	8.º	237	16,410	0,654 3,99	
6.171	F.A. Fortaleza	NR	-	6.º	178	13,730	0,443 3,23	
6.173	F.A. Pintora	PCOD	5-1	4.º	96	18,220	0,688 3,77	
6.239	F.A. China	PCOD	-	7-10	6.º	162	14,800	0,423 2,88
7.227	F.A. Rangeira	NR	-	5.º	-	13,150	0,462 3,51	
7.408	F.A. Ponta Preta	NR	2-1	3.º	75	13,160	0,472 3,59	
7.533	F.A. Margiana	PCOD	3-6	2.º	30	13,270	0,464 3,50	
7.534	F.A. Mucamba	NR	3-1	2.º	43	15,090	0,449 2,98	
7.535	F.A. Murça	PCOD	7-1	2.º	32	19,150	0,422 2,20	
7.536	F.A. Cafelandia	PCOD	9-10	2.º	32	24,660	0,770 3,12	
7.537	F.A. Leta	NR	3-3	2.º	32	16,030	0,531 3,31	
7.538	F.A. Surpreza	NR	3-5	2.º	37	15,630	0,529 3,38	
7.539	F.A. Mogiana	NR	7-0	2.º	45	15,990	0,465 2,90	
7.651	F.A. Cortina Negra	NR	3-11	1.º	28	18,440	0,557 3,02	
7.652	F.A. Valsa	NR	7-2	1.º	27	25,120	0,697 2,77	
7.653	Amazonas Mandada	PCOD	8-3	1.º	27	24,320	0,575 2,36	
7.654	F.A. Andorinha	PCOD	6-4	1.º	28	22,560	0,672 2,98	
7.655	F.A. Valiza	PCOD	10-10	1.º	33	19,450	0,619 3,18	
7.656	F.A. Paschoa	PCOD	5-5	1.º	10	24,150	0,623 2,58	

D. Pires Agro-Pecuária S.A.. São Carlos. Est. de S. Paulo. Controle em 24/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

5.388	Amazonas Atenta	PCOD	7-6	1.º	18	34,650	1,215 3,50
5.390	Amazonas Artista	PCOD	6-8	10.º	300	20,340	0,805 3,95

REVISTA DOS CRIADORES

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con- trole	Dias de Lac- tação	Produção		
						Leite	Gordura	%
5.762	Amazonas Aristocrata	PCOD	6-10	9.º	266	20,160	0,749	3,71
7.670	Raelwi 850 Freizeppa P. Wayless	PO	2-6	1.º	1	13,900	0,565	4,06
7.671	Raelwi 840	PO	2-7	1.º	11	22,340	0,811	3,63
2 ordenhas								
5.858	Amazonas C-210 Caçadora	PCOD	7-0	5.º	132	15,100	0,514	3,40
5.919	Amazonas B-340 (43)	PCOD	7-9	3.º	69	15,280	0,517	3,38
7.426	Ditosa de Copacabana	7/8	7-6	3.º	59	14,240	0,458	3,22
7.427	Espiã de Copacabana	PCOD	4-5	3.º	78	14,140	0,483	3,41

Espolio de Olivo Gomes, Jacareí. Est. de São Paulo. Controle em 19/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

1.954	Cercada de Paraiba	PCOD	11-7	12.º	336	13,530	0,491	3,55
1.997	Espanada de Paraiba	PCOD	13-3	4.º	95	21,610	0,783	3,62
2.019	Cananea	7/8	14-8	2.º	61	14,310	0,499	3,42
2.056	Rama de Paraiba	PCOC	9-9	10.º	292	14,070	0,507	3,60
2.182	Bi-Bop de Paraiba	PCOC	8-5	4.º	120	17,830	0,564	3,16
2.230	Javas de Paraiba	PCOC	8-4	2.º	59	15,010	0,499	3,32
2.892	Tecelagem de Paraiba	PCOC	10-2	3.º	81	17,430	0,597	3,42
3.388	Rima	NR	7-3	1.º	11	21,600	0,599	2,77
3.445	Carinhosa de Paraiba	PCOC	7-8	2.º	38	23,240	0,781	3,36
3.545	Crizallda de Paraiba	PCOC	6-8	3.º	92	17,040	0,789	4,62
3.621	Utinga de Paraiba	PCOC	6-9	13.º	379	13,220	0,639	4,83
5.957	Allança de Paraiba	7/8	12-7	3.º	78	14,890	0,490	3,29
6.093	Favela de Paraiba	PCOD	4-9	2.º	35	22,050	0,393	1,78
6.418	Balada de Paraiba	PCOC	5-4	2.º	57	15,580	0,542	3,48
6.843	Menina de Paraiba	PCOC	4-6	9.º	248	13,840	0,527	3,80
6.925	Mantiqueira	PCOD	2-9	8.º	218	13,540	0,324	2,40
7.014	Perola de Paraiba	PCOC	9-4	7.º	188	13,550	0,514	3,79
7.190	Fartura	PCOD	3-8	5.º	136	13,310	0,471	3,54
7.282	S. Martinha Palomita Paul	PO	4-5	4.º	103	14,910	0,512	3,43
7.295	Ambiciosa de Paraiba	NR	6-9	4.º	110	14,720	0,592	4,02
7.296	Limonada	PCOD	2-6	4.º	99	15,480	0,540	3,49
7.297	Lembrança de Paraiba	PCOD	2-6	4.º	93	14,390	0,561	3,90
7.387	Capoeira de Paraiba	PCOC	6-2	3.º	92	14,570	0,543	3,72
7.398	Bandeira de Paraiba	PCOC	6-3	3.º	88	17,840	0,620	3,47
7.544	Sant'Ana Formosa	PO	3-3	2.º	43	14,210	0,466	3,28
7.546	Tunica de Paraiba	PCOC	6-1	2.º	48	16,710	0,546	3,27
7.590	Gruta	PCOD	8-3	1.º	27	19,120	0,562	2,94
7.591	Austrla	PCOD	6-11	1.º	12	21,440	0,670	3,12
7.592	Candura	PCOD	2-8	1.º	20	13,610	0,381	2,80
7.595	Gravura de Paraiba	PCOC	9-4	1.º	23	14,690	0,448	3,05

Agrindus S.A., Descalvado. Est. de São Paulo. Controle em 25/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.436	Amazonas B-482	PCOD	-	1.º	-	18,100	0,662	3,66
2.437	Amazonas Maleável	PCOD	7-9	8.º	220	13,000	0,485	3,73
2.442	Amazonas B-315	PCOD	7-11	3.º	59	19,520	0,705	3,61
2.984	Amazonas Micropila	PCOD	8-2	2.º	52	17,050	0,548	3,21
4.135	Amazonas B-462	PCOD	7-6	6.º	174	17,850	0,609	3,41
4.301	Amazonas 3656	PCOD	6-7	4.º	71	16,650	0,560	3,36
4.302	Amazonas 3778	PCOD	6-1	8.º	218	19,750	0,692	3,45
4.408	Amazonas 3770	PCOD	6-8	1.º	14	22,700	0,738	3,25
4.536	Amazonas 3684	PCOD	6-4	4.º	99	13,000	0,445	3,42
4.989	Agrindus Residência	1/2	7-8	8.º	236	17,750	0,650	3,66
5.219	Agrindus Adalina	PCOD	5-5	4.º	71	18,500	0,633	3,42
5.379	Amazonas 3704	PCOD	6-1	6.º	200	15,750	0,558	3,54
6.178	Amazonas 3651	PCOD	6-5	7.º	199	13,950	0,498	3,57
7.228	Amazonas 23591	NR	-	5.º	250	13,260	0,502	3,79
7.396	Agrindus Chapa	PCOD	3-7	4.º	100	13,600	0,490	3,60
7.556	Amazonas 3677	PCOD	6-9	2.º	42	18,700	0,650	3,31
7.689	Merluza	3/4	-	1.º	8	14,650	0,487	3,32

Jotamar Administração e Comércio S.A., Santo Amaro. Est. de São Paulo. Controle em 24/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

7.422	Sant'Ana Anita	PO	5-4	3.º	65	14,910	0,509	3,41
-------	----------------	----	-----	-----	----	--------	-------	------

Cooperativa Agro-Pecuária Holambra, Mogi Mirim, Est. de São Paulo. Controle em 3/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

4.056	Holambra Marie	PO	8-3	1.º	31	13,780	0,522	3,79
4.168	Holambra Griet	PO	5-8	2.º	47	18,850	0,635	3,37
4.467	Betsy 6	PO	10-8	2.º	58	14,900	0,540	3,62
4.884	Holambra Marie II	PO	4-5	8.º	258	14,970	0,603	4,03
4.932	Sophietje 47	PO	9-11	1.º	21	17,620	0,609	3,45

ABRIL DE 1959

Fazenda N. S. DE COPACABANA

GADO HOLANDÊS

PRETO E BRANCO

puro de origem e
puro por cruz

PRODUÇÃO LEITEIRA OFICIALMENTE
CONTROLADA PELA A. P. C. B.

COPACABANA ILUMINADA — Premia-
da na XXV Exposição Nacional de
Animais

Servindo nosso plantel possuímos animais de
ótima linhagem leiteira, entre os quais o touro
HOARNE RICKUS 68, importado diretamente
da Holanda.

FAZENDA "N. S. COPACABANA"

S. CARLOS - C. P. - TEL: 16 - Cxa.
Postal, 218 - EST. DE S. PAULO

PROPRIETÁRIO:

D. PIRES AGRO PECUÁRIA S. A.

Venda permanente de reprodutores puros
de origem e puros por cruz.

Criadores de Gado Holandês da raça preta
e branca, de alta produção leiteira.

Fazenda PRIMAVERA

Criação e seleção de gado
Holandês, preto e branco, puro
de origem e puro por cruz
de alta produção
PRODUÇÃO LEITEIRA OFICIALMENTE
CONTROLADA PELA A.P.C.B.

CAMPEÃO DA RAÇA PURO
DE ORIGEM ANIMAL

- Melhor Conjunto Puro de Origem Nacional.
- Melhor vaca leiteira Detentora da Taça Melhor Criador da Região.

AGRO-PECUÁRIA PRIMAVERA

LTD.

JARINU - Est. de S. Paulo
Em S. Paulo:

RUA JOÃO BRICOLA, 39 - 2.º AND.

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con- trole	Dias de Lac- tação	Produção Leite	Gordura %	%
5.181	Holambra Reintje XLI	PO	4-9	3.º	87	22.040	0.741	3.36
5.200	Holambra Martha VI	PO	4-9	1.º	4	17.520	0.573	3.27
5.377	Holambra Oda II	PO	4-5	3.º	84	15.330	0.543	3.54
5.393	Holambra Sophietje L	PO	4-4	2.º	41	15.610	0.542	3.47
5.542	Holambra Marie XV	PO	3-11	8.º	221	14.710	0.639	4.34
5.596	Holambra Claartje	PO	5-5	1.º	13	15.100	0.475	3.14
5.598	Holambra Pietje XXV	PO	4-2	2.º	40	14.590	0.524	3.59
5.616	Holambra Coba	PO	4-4	1.º	5	14.530	0.451	3.10
5.806	Visser Aderra LVI	PO	9-9	2.º	37	17.590	0.559	3.17
5.908	Holambra Reintje XLI	PO	4-3	4.º	129	13.780	0.590	4.23
5.952	Holambra Griet V	PO	3-2	7.º	194	13.100	0.491	3.67
5.982	Holambra Henneke II	PO	-	2.º	-	14.200	0.592	4.10
6.034	Holambra Jikke V	PO	3-1	7.º	192	14.960	0.505	3.33
6.293	Holambra Antie XXXVI	PO	3-6	2.º	62	14.370	0.484	3.37
6.334	Holambra Sophietje L	PO	3-4	1.º	11	21.300	0.633	2.99
6.369	Holambra Emma X	PO	3-1	2.º	44	19.350	0.671	3.47
6.371	Holambra Wepkje X	PO	3-10	2.º	33	13.590	0.465	3.42
6.402	Holambra Gonda V	PO	3-2	2.º	31	13.300	0.435	3.27
6.463	Holambra Dcetje X	PO	3-1	1.º	3	17.570	0.535	3.04
6.464	Holambra Clara IV	PO	3-2	1.º	13	15.690	0.523	3.36
6.976	Holambra Boukje XC	PO	2-2	7.º	233	15.420	0.677	4.39
6.995	Holambra Holander CX	PO	2-7	7.º	209	13.200	0.452	3.42
7.349	Holambra Christina II	PO	2-3	3.º	89	13.550	0.491	3.62
7.350	Holambra Sirkje XXXII	PO	2-2	3.º	82	14.730	0.534	3.01
7.480	Holambra Martha VII	PO	2-6	2.º	34	14.410	0.478	3.32
7.591	Holambra Kooistra VI	PO	1-11	1.º	5	16.600	0.497	2.99
7.628	Holambra Ali IV	PO	2-7	1.º	8	18.300	0.570	3.11

Sucessores de Francisco Modesto de Souza. Lavras. Estado de Minas Gerais. Controle em 26/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

7.127	Pintona	NR	9-2	6.º	157	21.550	0.548	2.54
7.128	Açucena	NR	5-3	6.º	163	17.040	0.632	4.00
7.242	Esfera	NR	9-5	5.º	131	22.160	0.711	3.21
7.416	Rainha II	NR	5-5	3.º	85	24.210	0.716	2.96
7.417	Fortuna	NR	5-6	3.º	75	21.510	0.653	3.04
7.474	Boa Vista Cocada	NR	2-10	2.º	60	16.290	0.518	3.18
7.475	Boa Vista Esperança	NR	5-1	2.º	60	20.550	0.640	3.11
7.476	Boa Vista Revista	NR	3-11	2.º	53	24.690	0.704	2.85
7.664	Boa Vista Namorada	NR	4-1	1.º	11	19.860	0.662	3.33
7.665	Boa Vista Roseira	NR	2-11	1.º	27	20.400	0.692	3.39

2 ordenhas

6.778	Estância	NR	9-2	10.º	276	13.450	0.492	3.58
7.042	Cintada	NR	4-6	7.º	209	14.690	0.538	3.66

Empresa Imobiliária Bandeirantes. São Bernardo do Campo. Est. de São Paulo. Controle em 3/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

6.584	Revista	PCOD	4-2	11.º	315	13.110	0.518	3.95
6.970	Crioula	PCOD	5-3	6.º	185	18.030	0.630	3.48
7.058	Mineira	PCOD	8-3	5.º	157	19.730	0.651	3.30
7.143	Lindola	PCOD	3-6	4.º	121	17.720	0.582	3.23
7.345	Campinas	PCOD	3-8	2.º	85	17.810	0.597	3.35

Alberto Ferraz. Agulhas Negras. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 28/2/959.

Regime de semi-estabulação, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

4.307	Backa	PO	5-8	6.º	59	17.070	0.487	2.85
-------	-------	----	-----	-----	----	--------	-------	------

2 ordenhas

3.998	Bambina das Agulhas Negras	PCOD	7-1	1.º	7	15.060	0.541	3.59
4.231	Bateria das Agulhas Negras	PCOD	6-8	4.º	98	19.480	0.585	3.00
4.235	Irohy	NR	9-0	3.º	80	20.500	0.730	3.59
4.359	Boemia das Agulhas Negras	PCOD	6-11	3.º	62	20.550	0.634	3.08
4.400	Olga 2 M 231 (575)	PO	6-1	1.º	5	13.730	0.407	2.97
5.521	Beatriz das Agulhas Negras	7/8	4-9	2.º	45	21.900	0.772	3.52
5.935	Brejeira das Agulhas Negras	PCOD	4-4	6.º	167	13.280	0.496	3.73
6.113	Lissi 329	PO	4-9	6.º	162	14.050	0.521	3.71
6.598	Brincadeira das Ag. Negras	7/8	3-7	1.º	7	15.060	0.541	3.59
7.291	Bella	PO	5-0	4.º	113	13.390	0.440	3.23
7.517	Bela Vista Fokje Corina	PO	2-6	2.º	49	13.260	0.453	3.41
7.588	Backa 410	PO	2-3	1.º	10	14.740	0.496	3.37

REVISTA DOS CRIADORES

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura %
Norremóse & Cia., Minduri, Est. de Minas Gerais. Controle em 17/2/959.							
Regime de semi-estabulação, 3 e 2 ordenhas.							
3 ordenhas							
6.411	Americana Zwarte Piet	3/4	4-0	1.º	21	19,340	0,715 3,90
6.412	Caricia Zwart Piet	7/8	4-1	4.º	95	20,040	0,813 4,03
6.560	Mineira Zwarte Piet	7/8	3-9	2.º	47	22,320	0,822 3,63
6.610	Dana Klaske 31	PO	3-5	1.º	15	19,530	0,677 3,46
2 ordenhas							
2.700	Belezinha Oak Colantha	3/4	7-3	4.º	97	15,200	0,607 3,99
2.802	Italia Colombo Sentinel	NR	8-10	1.º	30	14,900	0,502 3,37
2.803	Granada Oak Colantha	NR	7-10	3.º	70	17,600	0,650 3,69
2.804	Riqueza Colombo Sentinel	3/4	8-8	3.º	82	15,450	0,612 3,96
2.878	Baiana Colombo Sentinel	15/16	8-11	1.º	15	18,030	0,621 3,44
3.098	Gracinha Oak Colantha	3/4	7-10	1.º	31	21,010	0,603 3,30
3.099	Jarrinha Oak Colantha	7/8	-	5.º	-	13,300	0,530 3,93
3.100	Olinda Oak Colantha	7/8	7-3	1.º	37	19,020	0,578 3,04
3.101	Estrela Oak Colantha	7/8	7-11	2.º	44	15,730	0,556 3,53
3.159	Princesa Oak Colantha	3/4	6-7	1.º	15	15,150	0,427 2,82
3.160	Estrangeira Oak Colantha	NR	8-1	1.º	23	14,750	0,490 3,25
3.267	Bonitinha Oak Colantha	PCOD	7-5	5.º	142	14,950	0,602 4,02
3.307	Lustrosa Colombo Sentinel	3/4	8-4	7.º	221	13,550	0,553 4,03
3.309	Mocha Colombo Sentinel	3/4	10-7	1.º	25	14,440	0,304 2,10
3.475	Pinheira Oak Colantha	7/8	8-3	4.º	104	16,350	0,622 3,80
3.478	Bela Rica	3/4	9-0	6.º	180	15,060	0,629 4,17
3.491	Gentiva	7/8	9-0	1.º	13	20,140	0,723 3,59
3.639	Rancheira	NR	-	10.º	297	15,050	0,526 3,50
3.640	Rainha	NR	-	2.º	-	16,020	0,509 3,74
3.760	Anabela Oak Colantha	NR	6-3	4.º	113	17,690	0,672 3,80
3.948	Lina Oak Colantha	3/4	6-1	5.º	191	14,050	0,537 3,82
4.430	Teie Corrie	PO	6-7	4.º	129	15,700	0,627 3,99
4.758	Donzela Oak Colantha	3/4	5-4	6.º	180	17,230	0,692 3,95
5.359	Aliança Oak Colantha	15/16	5-7	1.º	33	19,300	0,667 3,45
5.425	Bragança Oak Colantha	3/4	8-7	2.º	44	18,300	0,703 3,84
5.536	Boneca Oak Colantha	3/4	7-3	1.º	29	16,480	0,530 3,22
5.635	Perola Oak Colantha	3/4	-	2.º	-	17,850	0,717 4,02
6.116	Creola Oak Colantha	NR	-	3.º	-	16,520	0,573 3,47
6.287	Minerva Zwart Piet	7/8	-	2.º	-	13,350	0,433 3,24
6.561	Vita Zwarte Piet	NR	-	2.º	-	17,040	0,526 3,03
6.562	Harmonia Oak Colantha	PCOD	4-7	2.º	60	17,530	0,663 3,78
6.608	Rouxinol Zwarte Piet	NR	2-7	11.º	344	14,470	0,546 3,77
7.314	Alpina Zwarte Piet	NR	2-5	4.º	105	13,680	0,603 4,41

Dr. Lafavette Alvaro de Souza Camargo. Campinas, Est. de São Paulo. Controle em 21/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 ordenhas.

3.375	Vila Brandina Agua Branca	PO	7-7	10.º	293	13,800	0,581 4,21
3.376	Vila Brandina Kollumer	PO	6-6	5.º	123	15,550	0,438 2,81
3.435	Arlete Clara Silva IV	PO	6-9	7.º	213	16,860	0,594 3,52
5.354	Friso Bontie XXVI	PO	9-11	6.º	154	20,270	0,649 3,20
5.529	Vila Brandina Elske	PO	5-7	2.º	46	19,110	0,655 3,42
6.426	Vila Brandina Ibirapuera	PO	4-4	1.º	2	14,770	0,467 3,16
7.187	Vila Brandina Erna Ruurd	PO	3-5	5.º	140	13,850	0,566 4,03
7.188	Aukje P. 29	PO	3-7	5.º	128	13,840	0,530 3,83

Cia. Cafeeira do Rio Feio. Campinas, Est. de São Paulo. Controle em 11/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 ordenhas.

1.557	Amazonas Savorosa	PCOD	11-6	1.º	21	15,900	0,461 2,89
1.593	Amazonas Guinada	PCOD	9-10	2.º	37	13,460	0,337 2,51
1.718	Amazonas Iejeda	PCOD	7-3	2.º	43	16,830	0,468 2,78
1.759	Florida Maria	1/2	9-7	4.º	95	14,310	0,373 2,60
1.807	Garôa Maria I	PCOD	10-8	2.º	48	14,310	0,373 2,60
1.833	Celeuma Maria	PCOD	9-7	4.º	114	17,330	0,502 2,90
1.942	Amazonas Iomologa	PCOD	9-9	1.º	18	20,030	0,942 4,70
3.905	Boa Vista Primavera	PCOC	6-7	2.º	35	13,790	0,403 2,96
4.727	Amazonas Oiticia	PCOD	5-3	2.º	53	16,520	0,520 3,15

Cia. Baptista Scarpa Indústria e Comércio. Itanhandú, Estado de Minas Gerais. Controle em 6/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 ordenhas.

2.888	Jardim Falange	PQ	6-10	10.º	276	14,100	0,525 3,72
3.271	Jardim Jamaica	15/16	7-2	2.º	38	25,000	0,781 3,12
3.602	Jardim Jalapa Adema	PO	10-4	5.º	128	18,600	0,652 3,50

ABRIL DE 1959

**QUALIDADE
PRODUÇÃO
FERTILIDADE**

**NA II EXPOSIÇÃO FEIRA DE GADO
LEITEIRO DE S. PAULO - 1957**

APRESENTAMOS:

- Grande Campeã Pura por Cruza
- Campeão Puro por Cruza
- Reservada Campeã Pura por Cruza

REALEZA — Grande Campeã P.P.C. e primeiro prêmio de mais de 48 m. na II Exposição-Feira de Gado Leiteiro de São Paulo, em 1957.

Gado Holandês, malhado de vermelho, puro de origem e puro por cruza.

**PRODUÇÃO LEITEIRA OFICIALMENTE
CONTROLADA PELA A.P.C.B.**

A maior produtora de leite tipo "A"

Produção leiteira oficialmente controlada pela A. P. C. B.

Várias produtoras inscritas na categoria de longevidade, no quadro de recordes e de honra do Serviço de Controle Leiteiro da A. P. C. B.

Sua visita nos será um prazer

GRANJA IROHY

Km 17 da estrada de Mogi das Cruzes a Salesópolis

MOGI DAS CRUZES - Est. S. Paulo
Em S. Paulo, à Rua Sen. Feijó, 29
Tel.: 32-6998

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção		
						Leite	Gordura	%
3.980	Jardim Gravakão	PO	6-4	3.º	75	34.350	1,156	3,36
5.949	Jardim Jandilka	PO	4-1	2.º	34	20,700	0,733	3,54
6.105	Jardim Horda	PO	-	7.º	—	14,600	0,564	3,86
6.272	Jardim Jarreta	NR	-	1.º	—	22,900	0,811	3,54
6.273	Jardim Linka	PO	3-9	1.º	11	18,950	0,676	3,56
6.805	Jardim Lourdes	NR	6-7	9.º	265	15,600	0,605	3,88
6.910	Jardim Ovelha	NR	-	8.º	—	14,900	0,546	3,66
7.068	Jardim Guardiã	PO	6-3	6.º	161	13,500	0,481	3,56
7.069	Jardim Narly	NR	5-6	6.º	178	13,400	0,506	3,78
7.159	Jardim Marambaia	NR	6-7	5.º	137	21,050	0,726	3,45
7.255	Jardim Jarrilha	—	-	4.º	—	19,000	0,634	3,34
7.381	Jardim Fada	PO	6-11	3.º	81	18,500	0,696	3,76
7.382	Jardim Minaliza	PO	2-9	3.º	71	13,750	0,517	3,76

Dr. Lelio de Toledo Piza e Almeida, Jarinú, Est. de S. Paulo. Controle em 23/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

4.969	Ximbica	PCOD	7-5	7.º	207	14,550	0,546	3,75
5.083	Lill	PCOD	7-4	11.º	320	14,850	0,541	3,64
5.084	Perola	PCOD	7-8	8.º	210	14,170	0,389	2,74
5.195	Rumba	PCOD	5-7	6.º	152	22,680	0,673	2,96
5.198	Pipoca	PCOD	7-7	5.º	143	17,790	0,721	4,05
6.684	Artista	PCOD	4-3	11.º	317	13,220	0,547	4,14
6.968	Primavera Baiana	PO	3-0	8.º	223	14,670	0,576	3,92
7.026	S. M. 739 Elbita Lord Michael	PO	3-5	7.º	185	14,870	0,433	2,91

Dr. Manoel Alves de Castro, Passa Quatro, Est. de Minas Gerais. Controle em 3/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 ordenhas.

4.268	Arlete Cortina	PO	5-8	9.º	249	20,700	0,802	3,87
6.911	Arlete Paulina	PO	-	8.º	—	20,500	0,782	3,81
6.912	Arlete Nora	PO	-	8.º	—	17,400	0,676	3,88
6.974	Arlete Mineira	PO	5-1	7.º	203	22,100	0,917	4,15
6.975	Arlete Dina	PO	2-9	7.º	189	21,600	0,873	4,13
7.158	Galicia Jan	PO	4-6	5.º	134	29,300	0,989	3,37
7.286	Arlete Sílvia Jan	PO	4-8	4.º	83	21,700	0,820	3,78

Ministério da Agricultura, Fazenda Experimental de Criação de Juparanã, Marquês de Valença, Est. do Rio de Janeiro. Controle em 27/2/959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

2.824	E. Norita Man Snowden	PO	7-8	11.º	312	13,400	0,500	3,73
3.044	Uberaba	PO	10-0	11.º	310	15,300	0,580	3,79
3.045	F.S.M. Alba	PO	8-5	2.º	79	20,500	0,616	3,00
3.207	F.S.M. Bicuiba	PO	7-9	2.º	65	18,800	0,658	3,50
3.730	F.S.M. Batauí	PO	-	8.º	—	14,600	0,575	3,94
4.264	Cereja	PO	6-2	11.º	309	18,000	0,592	3,28
5.865	F.S.M. Elite	PO	4-4	5.º	147	18,900	0,705	3,73
5.866	F.S.M. Elemi	PO	4-2	6.º	169	17,000	0,614	3,61
7.131	F.S.M. Fada	PO	3-8	6.º	165	16,000	0,611	3,81
7.151	F.S.M. Garota	PO	2-11	2.º	72	19,700	0,590	2,99
7.313	F.S.M. Falange	PO	3-6	4.º	97	16,100	0,469	2,91
7.504	F.S.M. Fabula	PO	3-3	2.º	83	19,000	0,552	2,90
7.557	F.S.M. Facecia	PO	3-3	2.º	60	19,900	0,694	3,49

Luiz Paulino da Costa, Alfenas, Est. de Minas Gerais. Controle em 21/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

7.452	Gilda Roand	NR	3-4	2.º	36	22,450	0,522	2,32
7.453	Camponesa Alegre	NR	3-8	2.º	61	23,500	0,723	3,07
7.454	Javanesa Roand	NR	3-3	2.º	103	19,800	0,670	3,39
7.567	Querida Alegre	NR	3-9	1.º	21	24,750	0,688	2,78
7.568	Patativa Acreana	NR	3-4	1.º	18	22,100	0,557	2,52
7.569	Silhueta Josam	NR	3-7	1.º	2	18,300	0,567	3,09

Urbano Junqueira, Cruzília, Est. de Minas Gerais. Controle em 23/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

3.060	Dançarina II J.B.	PCOC	8-8	3.º	72	14,680	0,521	3,55
3.062	Jardineirinha J.B.	PCOD	7-1	5.º	168	17,390	0,574	3,30
3.465	Traviata J.B.	PCOC	7-4	5.º	176	16,500	0,721	4,37
3.466	Triguerinha J.B.	PCOC	7-7	3.º	57	14,800	0,486	3,28
4.693	Esperança J.B.	PCOC	5-1	3.º	124	14,350	0,550	3,83

REVISTA DOS CRIADORES

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con- trole	Dias de Lac- tação	Produção Leite	Gordura %
4.700	Campeonata J.B.	PCOC	-	1.º	—	24,770	0,667 2,69
5.239	Valsa J.B.	NR	-	2.º	—	15,830	0,539 3,41
7.543	Gostosa J.B.	PCOD	2-11	2.º	33	19,750	0,593 3,00

José de Souza Moreyra. Machado. Est. de Minas Gerais. Controle em 17/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

7.271	Gege Serrinha	NR	-	4.º	—	15,750	0,637 4,04
7.518	Xalvi Serrinha	NR	-	2.º	—	13,800	0,562 4,07
7.519	Zinia Serrinha	NR	5-1	2.º	69	13,250	0,584 4,41
7.520	Tata Serrinha	NR	4-3	2.º	65	13,760	0,523 3,80

Dr. Brenno Ferreira de Camargo Filho. Vargem Grande do Sul. Estado de São Paulo. Controle em 16/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

7.528	Princeza	PCOD	7-6	2.º	37	21,890	0,638 2,91
-------	----------	------	-----	-----	----	--------	------------

2 ordenhas

7.265	Beleza	PCOD	4-3	4.º	118	13,420	0,519 3,87
7.266	Rainha	PCOD	8-2	4.º	96	16,570	0,572 3,45
7.572	Dora	PCOD	8-6	1.º	25	15,060	0,433 2,88

Empresa Imobiliária Bandeirantes. São Bernardo do Campo. Estado de São Paulo. Controle em 18/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

6.970	Crioula	PCOD	5-3	7.º	185	18,090	0,630 3,48
7.058	Mineira	PCOD	8-3	6.º	157	19,730	0,651 3,30
7.143	Lindola	PCOD	3-6	4.º	121	17,720	0,582 3,23
7.345	Campinas	PCOD	3-8	3.º	85	17,810	0,597 3,35

SOCIEDADE COOPERATIVA «CASTROLANDA» LTDA.

CASTRO. Estado do Paraná.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

Berend Willem Bouwman. Control eem 2/2/959.

3.437	Gelske 14	PO	6-11	3.º	97	13,150	0,585 4,45
-------	-----------	----	------	-----	----	--------	------------

Roelof Rabbers. Controle em 19/2/959.

7.458	Martha 12	PO	6-10	2.º	58	15,410	0,608 3,94
-------	-----------	----	------	-----	----	--------	------------

Roelof Rabbers. Controle em 6/2/959.

4.199	Betje 21	PO	6-6	6.º	161	13,960	0,493 3,53
-------	----------	----	-----	-----	-----	--------	------------

RAÇA HOLANDESA — variedade vermelha e branca.

Cooperativa Agro-Pecuária Holambra. Mogi Mirim. Estado de São Paulo. Controle em 3/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.095	Marie 4	PO	9-9	3.º	68	20,870	0,642 3,07
4.055	Holambra Jaantje	PO	5-8	5.º	140	17,040	0,527 3,09
4.918	Holambra Rika III	PO	5-2	2.º	54	13,800	0,451 3,27
5.319	Holambra Nera XX (H 189)	PO	4-5	3.º	83	17,150	0,595 3,47
5.397	Holambra Clementina V	PO	4-4	3.º	78	15,260	0,558 3,66
5.446	Holambra Elsa VII	PO	4-1	2.º	73	15,170	0,597 3,93
6.243	Holambra Astrid III	PO	4-6	3.º	82	18,550	0,614 3,31
6.248	Holambra Rika V	PO	3-10	2.º	62	20,120	0,631 3,14
6.282	Holambra Noldien VI	PO	3-2	3.º	83	17,530	0,573 3,27
6.284	Holambra Nera XX (H 223)	PO	3-6	3.º	73	15,000	0,520 3,47
6.335	Holambra Roosje VII	PO	3-9	3.º	87	20,460	0,628 3,07
6.336	Holambra Roosje V	PO	3-5	3.º	87	18,280	0,601 3,29
6.817	Holambra Bertha X	PO	2-2	9.º	274	14,070	0,561 3,99
7.337	Holambra Treeseje V	PO	2-4	3.º	67	15,490	0,496 3,20
7.339	Holambra Elsa XV	PO	1-11	3.º	86	15,950	0,507 3,18

Fazenda Serrinha

C. Postal, 22 - ALFENAS, MG.
REDUZIDO NUMERO DE
VACAS E GRANDE QUAN-
TIDADE DE LEITE

• A SERRINHA possui no reba-
nho filhos de vacas como: COITELA
S. MARTINHO, Manoelita S. Mar-
tinho, Albina S. Martinho, Destaca-
da S. Martinho, Peg S. Martinho e
Perola S. Martinho (as duas últimas
por inseminação) todas descendentes
dos estupendos produtos da Granja
S. Martinho, que conta nos seus está-
bulos com as melhores linhagens dos
EE.UU., do Canadá e da Argentina.
Tambem a Granja Vila Brandina se
faz representar nesta Fazenda de
propriedade do Sr. José de S. Mo-
reyra, com filhos de: Jeanete V.
Brandina, e Dourada com Cesar 22.
Como se vê, a Fazenda da Serrinha
pode orgulhar-se em apontar em seus
estábulo tipos oriundos dos EE.UU.
Canadá, Argentina e Holanda.

ZALI — Nascida em 18 de Outubro

Fazenda
Serrinha

JOSÉ DE SOUSA MOREYRA

MACHADO, MG.

Tipo e Produção

Granja
SÃO MARTINHO

Prop.:
Dario Freire Meirelle

Confirmando os resultados obtidos em todas as exposições a que tem concorrido desde a sua fundação, julgadas por juizes tanto nacionais como estrangeiros e com os mais variados critérios, a Granja São Martinho ganhou na II Exposição-Feira de Gado Leiteiro a MEDALHA DE OURO Presidente da República (pela segunda vez) conferida pelo governo do Estado ao MELHOR EXPOSITOR da raça Holandesa preta e branca, assim como os prêmios ao MELHOR CRIADOR DE PUROS POR CRUZA. (Apesar de ter concorrido somente com fêmeas).

KERATITE SÃO MARTINHO — Primeiro prêmio P.C. de 18 a 24 m. na II Exposição-Feira de Gado Leiteiro de São Paulo em 1957.

Detentora por duas vezes da BATEDIRA DE OURO e três vezes do BALDE DE OURO.

GRANJA SÃO MARTINHO

Prop.: DARIO FREIRE MEIRELLES

Tourinhos puros de origem e puros por cruza das melhores reprodutoras

CAIXA POSTAL, 18 — CAMPINAS

Esta Granja é produtora do melhor leite tipo "A" — Padidos em São Paulo à Rua José Maria Lisboa, 751 - Tel. 31-2608
ESTADO DE SÃO PAULO

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura %
7.340	Holambra Elza VIII	PO	2-0	3.º	83	16,500	0,551 3,34
7.425	Holambra Corrie IV	PO	3-1	3.º	79	14,450	0,472 3,26

Cia. Agro-Pecuária Marambaia. Vinhedo. Est. de S. Paulo. Controle em 12/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.410	Hendrika 4	PO	8-3	1.º	6	13,650	0,439 3,22
2.692	Pintada	PCOC	9-11	3.º	64	15,310	0,486 3,17
3.202	Argentina de Marambaia	7/8	7-7	4.º	118	14,730	0,468 3,18
5.791	Marambaia Boemia	7/8	6-5	3.º	78	19,110	0,633 3,34
6.295	Dora 69	PO	4-11	2.º	54	16,050	0,625 3,89
6.296	M. Balangandan Alexina	PCOC	6-6	3.º	73	15,010	0,500 3,33
7.334	Marambaia Chinezta Teiana	7/8	4-11	4.º	117	14,150	0,496 3,50
7.409	Marambaia Durada Alexina	PCOC	4-4	3.º	78	13,000	0,415 3,19
7.436	Marambaia Eva Teiana	PO	3-9	2.º	44	13,150	0,426 3,24

Adrianus Sleutjes. Castro. Estado do Paraná. Controle em 1/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

1.866	Aafje 1	PO	10-3	5.º	122	15,030	0,593 3,94
2.800	Mina 61	PO	7-5	7.º	176	16,460	0,627 3,81
3.242	Lena	PO	7-11	5.º	131	18,020	0,671 3,72
5.401	Castro Therezinha	PO	4-6	3.º	66	17,200	0,531 3,03
6.275	Castro Aafje 5	PO	3-2	3.º	94	15,210	0,623 4,13
6.640	Lena 2 de Carambei	PO	3-8	11.º	305	13,610	0,499 3,67
7.260	Castro Lucia	PO	2-1	4.º	119	13,240	0,474 3,58
7.439	Lena 3 de Carambei	PO	-	2.º	35	18,960	0,688 3,63
7.440	Castro Roosje	PO	2-1	2.º	39	17,890	0,678 3,79

Urbano Junqueira. Cruzília. Est. de Minas Gerais. Controle em 23/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 3 e 2 ordenhas.

3 ordenhas

1.548	Jardineira II J.B.	PCOC	11-3	3.º	71	40,060	1,278 3,19
-------	--------------------	------	------	-----	----	--------	------------

2 ordenhas

5.358	Bandeja J.B.	PCOD	4-5	3.º	66	16,640	0,487 2,93
-------	--------------	------	-----	-----	----	--------	------------

Gonçalves & Filho. Pinhal. Est. de São Paulo. Controle em 7/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.584	Aragonita	PCOD	16-5	3.º	62	17,740	0,575 3,24
2.665	Tentadora	PCOD	10-10	3.º	81	17,610	0,603 3,42
2.985	Yalta	PCOD	7-10	5.º	137	22,130	0,796 3,60
6.106	Cascata de Palmeiras	7/8	9-9	5.º	122	15,120	0,544 3,60
7.149	Heroica de Palmeiras	PCOD	4-8	5.º	151	13,000	0,433 3,36
7.150	Jotta de Palmeiras	PCOD	3-2	5.º	131	17,430	0,632 3,62
7.371	Hiette de Palmeiras	PCOD	5-3	3.º	80	13,040	0,616 4,72
7.372	Fada de Palmeiras	PCOC	7-7	3.º	62	15,850	0,519 3,27
7.373	Margge 3	PO	5-0	3.º	58	21,110	0,739 3,50
7.374	Fiesta de Palmeiras	PCOD	7-6	3.º	58	18,400	0,629 3,42
7.375	Nelly	PO	11-10	3.º	56	13,340	0,463 3,47
7.576	Baeta	-	-	1.º	8	17,320	0,558 3,22
7.577	Famosa de Palmeiras	PCOD	7-11	1.º	6	19,130	0,688 3,59
7.578	Golondrina de Palmeiras	PCOD	6-1	1.º	5	14,530	0,478 3,29

Jayme da Silveira Leme. Pinhal, Est. de São Paulo. Controle em 6/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

3.880	Reserva	PCOD	7-4	4.º	105	19,900	0,656 3,47
5.176	Leme's Brasileira	PO	7-8	1.º	5	18,990	0,625 3,29
7.575	Leme's Caiçara	PCOC	7-8	1.º	6	21,690	0,603 2,80

Helio Moreira Salles. Casa Branca. Est. de São Paulo. Controle em 17/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

6.531	Leme's Fazendeira	QCOC	4-8	2.º	49	18,450	0,705 3,82
7.367	Marambaia Ditinha Alexina	PCOC	4-4	3.º	91	13,340	0,341 2,56
7.368	Rio Verdinho Airosa	PCOD	4-11	3.º	88	13,800	0,469 3,39
7.516	Geertje	PO	2-11	2.º	51	13,900	0,478 3,44

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de meses	Idade de anos e meses	Dias de lactação	Produção de Leite	Gordura %
---------	--------------	----------------	----------------	-----------------------	------------------	-------------------	-----------

Dr. José Procópio do Amaral. São João da Boa Vista. Estado de São Paulo. Controle em 24/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

6.525	Batuta	PCOD	5-0	1.º	4	18,020	0,587	3,26
6.526	Antartica	PCOD	7-4	2.º	49	17,430	0,521	2,99
7.134	Ama	PCOD	7-5	6.º	157	13,610	0,498	3,66
7.229	Lorena	PCOD	6-8	5.º	147	14,900	0,491	3,29
7.418	Amostra	PCOD	7-4	3.º	91	16,900	0,463	2,74
7.419	Aramina	NR	7-6	3.º	66	18,430	0,665	3,60
7.420	Rancheira	PCOD	11-5	3.º	64	16,500	0,606	3,67
7.421	Mientje 4	PO	8-10	3.º	64	18,240	0,701	3,84

RAÇA JERSEY

Espollo de Olivo Gomes. Jacareí. Est. de S. Paulo. Controle em 22/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

2.057	Meadow's Magnet's Erin	PO	14-0	7.º	211	10,240	0,533	5,21
2.060	Sant'Ana Olinda Patton	PO	8-1	8.º	232	10,170	0,483	4,80
2.121	Buckhurst Paddy	PO	13-7	4.º	113	13,050	0,555	4,25
2.626	Mimosa Basil de Canela	PO	7-3	3.º	71	11,620	0,609	5,24
2.627	Nora Basil de Canela	PO	6-5	8.º	242	11,050	0,497	4,40
3.551	Ninfa Basil de Canela	PO	6-5	3.º	81	16,140	0,651	4,03
3.615	Prima Dona 2ª	PO	6-5	2.º	33	13,850	0,652	4,71
3.922	Sant'Ana Hellada Patrician	PO	5-3	7.º	189	10,330	0,625	6,05
4.027	Sant'Ana Encantada Patrician	PO	5-10	3.º	71	14,990	0,566	3,78
4.131	Novata Basil de Canela	PO	5-11	7.º	187	12,060	0,466	3,86
4.206	Sant'Ana Harpa Patrician	PO	5-4	4.º	124	13,160	0,618	4,70
4.265	Sant'Ana Esperança Patrician	PO	5-3	10.º	316	11,350	0,593	5,14
4.298	Sant'Ana Itapema Patrician	PO	5-3	6.º	166	12,190	0,626	5,13
4.392	Sant'Ana Harmonia Patton	PO	7-4	1.º	30	17,960	0,652	3,63
4.393	Sant'Ana Xalmas Patrician	PO	4-11	8.º	215	10,320	0,496	4,70
4.516	Norma Basil de Canela	PO	6-7	5.º	136	16,250	0,832	5,12
4.921	Sant'Ana Balsa Patrician	PO	4-2	8.º	235	11,540	0,628	5,44
5.032	Sant'Ana Cativa Patrician	PO	4-9	2.º	38	16,770	0,672	4,01
5.441	Sant'Ana Olimpica Paxford	PO	3-9	5.º	136	15,350	0,639	4,49
5.468	Sant'Ana Cantora Colorado	PO	4-4	2.º	59	10,460	0,571	5,46
5.896	Sant'Ana Cecília Bolhayes	PO	3-10	1.º	13	18,250	0,725	3,97
6.056	Sant'Ana Caravana Bolhayes	PO	-	3.º	81	16,470	0,617	3,74
6.057	Broinha de Fubá	PO	7-6	1.º	20	14,270	0,563	3,94
6.060	Sant'Ana Regia Records	PO	-	4.º	124	11,230	0,499	4,44
6.189	Sant'Ana Caneta Records	PO	3-3	5.º	153	10,930	0,677	6,16
6.351	Sant'Ana Xandoca Paxford	PO	3-3	2.º	49	10,490	0,433	4,13
6.352	Sant'Ana Dama Patrician	PO	-	3.º	74	13,220	0,578	4,37
6.928	Sant'Ana Niagara Patrician	PO	2-1	8.º	236	11,670	0,606	5,20
7.196	Sant'Ana Bacana Paxford	PO	2-3	5.º	152	12,130	0,594	4,90
7.390	Sant'Ana Raquel 2ª Zanalua	PO	2-0	3.º	71	11,220	0,569	5,07
7.547	Sant'Ana Xarda Paxford	PO	2-5	2.º	53	15,000	0,552	3,65
7.548	Sant'Ana Grinalda 2ª Paxford	PO	2-0	2.º	51	10,500	0,382	3,64

Dr. João Laraya. Jacareí. Est. de São Paulo. Controle em 19/2/959.

Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

5.340	Corruira Brampton Sta.	PO	5-1	3.º	71	13,630	0,562	4,12
5.026	Canaria de Sta. Hilda	PO	5-6	1.º	19	10,490	0,585	5,58
5.765	Duqueza Bolhayes de Sta. Hilda	PO	4-3	1.º	10	13,460	0,528	3,92
6.496	Elite de Sta. Hilda	PCOD	3-7	1.º	10	17,790	0,592	3,33
6.932	Fagulha Bolhayes de Sta. Hilda	PO	2-0	8.º	237	10,070	0,440	4,37
7.551	Aracy de Empyreo	PO	2-3	2.º	62	10,030	0,441	4,40
7.586	Flauta de Sta. Hilda	-	-	1.º	21	10,440	0,438	4,19

Ministério da Agricultura. Fazenda Experimental de Criação de Juparanã. Marquês de Valença. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 28/1959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

3.934	F.S.M. Barimbé	NR	7-0	1.º	23	16,400	0,770	4,69
4.998	F.S.M. Colmeia	PO	6-0	1.º	42	16,100	0,762	4,73

ABRIL DE 1959

Fazenda Campo Lindo

Recordista brasileira de produção de leite e gordura com

JARDINEIRA II J.B.

Produções:

305 12.067,935 380,852 3,15% 3x
365 14.056.150 452,892 3,22% 3x

JARDINEIRA II J.B., da raça Holandesa, vermelha e branca, crioula do nosso

plantel e de-

tentora do

"Baldo" e da

"Batedeira de Ouro".

150 anos de seleção

URBANO JUNQUEIRA

Criação de gado Holandês, preto branco e vermelho e branco.

FAZENDA CAMPO LINDO

CRUZILIA

MINAS GERAIS

**DIRETORES DA COOPERATIVA
CENTRAL AGRÍCOLA
DE SÃO PAULO
NA SQUIBB**

A convite da Divisão Agro-Pecuária da E. R. Squibb & Sons S. A., esteve em visita aos laboratórios dessa organização, em Santo Amaro, uma comitiva de diretores e filiados da Cooperativa Central Agrícola de São Paulo, que congrega, mais de quarenta mil lavradores e criadores do Estado.

O Grupo visitante era composto dos srs. Massamichi Yamamoto, presidente da Cooperativa Agrícola da Fazenda Tietê; Zenji Nakashima, diretor-gerente da Cooperativa Mista ASPASE de Mococa; Takujiro Shimizu, presidente da Cooperativa dos Agricultores de Registro; Sadao Hara, diretor da Cooperativa Agrícola da Fazenda Aliança; Hidejiro Takakuwa, chefe da Seção de Compras da Cooperativa Central; Hiroshigue Yano e Atsushi Otsutumi, respectivamente chefe do Departamento Avícola e técnico da Seção Agrícola da referida entidade.

Em companhia de funcionários da empresa, a comitiva teve oportunidade de percorrer demoradamente as instalações da fábrica Squibb em Santo Amaro e apreciar de perto as várias fases da manufatura de produtos veterinários e farmacêuticos. Foram igualmente visitados os laboratórios de controle da fábrica, nos quais os medicamentos, tanto para uso humano quanto para uso veterinário, são submetidos a delicados testes de pureza antes de serem entregues ao mercado consumidor. Na sala de cinematografia, os visitantes assistiram à exibição de películas sobre produtos e atividades científicas da Squibb em vários países do mundo.

Durante o almoço que foi oferecido aos visitantes, usaram da palavra, em nome da comitiva, os srs. M. Yamamoto e H. Takakuwa, e o sr. J. R. Petersen, gerente-geral de vendas da Divisão Agro-Pecuária, em nome da Squibb.

N.º SCL	Nome da vaca	Grau de sangue	Idade de anos e meses	Con-trole	Dias de Lac-tação	Produção Leite	Gordura
Ministério da Agricultura. Fazenda Experimental de Criação de Juparanã Marquês de Valença. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 27/2/959.							
Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.							
3.934	F.S.M. Barimbé	NR	7-0	2.º	53	16,200	0,770
4.998	F.S.M. Colmeia	PO	6-0	2.º	72	16,200	0,779
7.658	F.S.M. Evania	PO	4-1	1.º	29	16,400	0,726

RAÇA SCHWYZ

Agrindus S.A., Descalvado. Est. de São Paulo. Controle em 25/2/959.
Regime de pasto com ração suplementar, 2 ordenhas.

3.743	Trepadeira	1/2	10-3	5.º	141	14,100	0,549
3.748	Agrindus Nelly	NR	9-2	5.º	82	15,770	0,678
4.136	Firmeza	NR	11-8	1.º	31	18,000	0,750
4.389	Agrindus Espanhola	1/2	11-3	4.º	135	16,000	0,714
4.735	Agrindus Marília	3/	5-6	5.º	128	15,250	0,555
4.829	Agrindus Girota	1/2	5-1	1.º	5	13,540	0,521
4.899	Zazá	1/2	10-4	4.º	111	17,750	0,803
4.990	Tosca	3/4	11-10	5.º	133	13,250	0,519
4.991	Revista	1/2	5-9	4.º	96	14,300	0,686
5.151	Lima	3/4	9-6	1.º	14	17,750	0,659
6.184	Garantia	NR	-	5.º	146	16,020	0,781
7.398	Agrindus Festiva	3/4	4-9	4.º	98	13,500	0,482

Alberto Ferraz. Agulhas Negras. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 28/2/959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

3.991	Caipora	15/16	6-11	2.º	38	14,140	0,524
4.145	Morena	7/8	8-8	8.º	230	14,420	0,576

Ministério da Agricultura. Fazenda de Criação de Pinheiro. Pinheiral. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 25/1/959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

2.511	Zarentona de Pinheiro	PO	8-5	1.º	36	14,200	0,487
2.911	Zaná de Pinheiro	PO	8-4	2.º	61	13,200	0,478
3.455	Acapurana de Pinheiro	PO	7-7	3.º	89	13,500	0,482
5.207	Cena de Pinheiro	PO	5-6	1.º	31	14,400	0,483
5.594	Deixa de Pinheiro	PO	4-8	1.º	36	15,300	0,519
5.867	Cigarra	NR	-	2.º	67	13,400	0,472

Ministério da Agricultura. Fazenda de Criação de Pinheiro. Pinheiral. Est. do Rio de Janeiro. Controle em 23/2/959.

Regime de semi-estabulação, 2 ordenhas.

2.511	Zarentona de Pinheiro	PO	8-5	2.º	64	16,100	0,576
2.911	Zaná de Pinheiro	PO	8-4	3.º	89	15,400	0,572
2.915	Abanadela de Pinheiro	PO	7-4	10.º	278	16,400	0,598
3.455	Acapurana de Pinheiro	PO	7-7	4.º	117	16,400	0,598
3.627	Aliança de Pinheiro	PO	7-6	1.º	17	18,800	0,643
3.836	Aliada	PO	6-11	7.º	208	14,000	0,528
3.878	Adenda de Pinheiro	PO	7-9	1.º	16	16,700	0,569
5.207	Cena de Pinheiro	PO	5-6	2.º	59	16,500	0,579
5.332	Aprisionada de Pinheiro	NR	-	1.º	26	14,300	0,493
5.435	Birmania de Pinheiro	PO	6-11	1.º	19	15,800	0,534
5.436	Corista de Pinheiro	PO	5-1	1.º	21	17,500	0,533
5.594	Deixa de Pinheiro	PO	4-8	2.º	64	18,500	0,665
5.727	Ciranda	NR	-	1.º	27	15,200	0,536
5.867	Cigarra	NR	-	3.º	95	14,300	0,515
6.378	Embira de Pinheiro	PO	3-11	1.º	16	19,400	0,563
7.660	Espuma de Pinheiro	PO	3-3	1.º	28	13,700	0,475
7.662	Façanha de Pinheiro	PO	2-11	1.º	12	13,600	0,405
7.663	Fabula de Pinheiro	PO	3-0	1.º	8	13,600	0,452

OBSERVAÇÕES: — Hol. - Holandesa; pb - preta e branca; vb - vermelha e branca; NR - não registrada; PCOC - pura por cruz de origem conhecida; PCOD - pura por cruz de origem desconhecida; PO - pura de origem; RP - registro provisório.

São Paulo, Fevereiro de 1959.

DR. FIDELIS ALVES NETTO
CHEFE DO S.C.L.

REVISTA DOS CRIADORES

MERCADOS

LEITE E DERIVADOS

Produtos	Para o atacadista	Para o varejista	Para o consumidor
QUEIJO MINAS			
comum	35-38	42-45	50-55
pasteurizado (Edméa e Boa)	—	55-60	65-80
duro (Araxá e Canastra)	70-72	75-78	80-85
REQUEIJÃO — Catupiri	—	20-25	25-35
QUEIJO PRATO			
de 1.ª qualidade	65-70	75-80	90-105
de 2.ª qualidade	60-63	65-68	75-80
QUEIJO TIPO PARMESÃO			
Comum	60-70	75-80	90-100
Faixa Azul e Dolar	—	110-120	130-140
QUEIJO TIPO PROVOLONE			
Fresco	55-60	60-70	80-90
Mussarela	55-60	60-70	80-90
Polenghi	—	95-100	110-120
MANTEIGA			
Extra	—	100-130	130-150
de 1.ª qualidade	80-85	85-90	110-115
Comum	60-70	70-80	95-100
LEITE CONDENSADO			
Caixa com 48 latas de 1 libra	—	764,00-789,00	23,00-25,00 cada lata
LEITE EM PÓ			
Caixa com 24 latas de 1 libra	—	1.230-1.250,	63 a 65 cada lata
LEITE DE CONSUMO		Ao produtor	Ao consumidor
Tipo C		6,80	12,00
" B		9-10	18-20
" A		—	22-25
Cru — Capital		—	12-15
" — Interior		—	10-12
LEITE PARA A INDÚSTRIA			
Zona abastecedora de S. Paulo, Santos e Campinas			5-6,00
Nas demais zonas			4-5,00
No Sul de Minas — para queijos			5,50-6,00
CREME			
por kg de matéria gorda — Extra			100
— 1.ª qualidade			80
— 2.ª qualidade			60
CASEÍNA — lática			42
LACTOSE — bruta			50-51
— refinada			120-130

SITUAÇÃO DA AVICULTURA

A crise que a avicultura racional e organizada atravessa não tem precedentes em épocas anteriores. Crises têm havido no abastecimento de rações balanceadas; surtos de doenças como o da doença de Newcastle; ameaça de importação de ovos e pintos e tabelamentos diversos, como foi a temida "Lei dos entrepostos de ovos". A de agora, porém, é praticamente a associação de todos esses fatores e, mais ainda, a depressão no preço das aves e dos ovos.

Um dirigente de cooperativa dos mais importantes no setor da avicultura, colocou em um milhão de poedeiras vendidas até meados de março, além do total que é habitualmente vendido na mesma época do ano: substituição das poedeiras fora de condição por frangos no início de postura. Este fato assinala exatamente a extensão da crise sem precedentes da nossa avicultura. Nem a reação no preço dos ovos foi capaz de sustentar a venda intensiva das poedeiras. Segundo cotação da Associação Paulista de Avicultura, o preço dos ovos no atacado foi o seguinte no dia 21 de março de 1959:

ESPECIAL	Cr\$ 1.690,00
TIPO A	Cr\$ 1.400,00
TIPO B	Cr\$ 1.575,00

Estes são os preços mais elevados obtidos pelos ovos de granja em São Paulo, porém, abaixo das previsões dos entendidos no ramo.

No setor produção de carne, o panorama é francamente desanimador pelos preços abaixo do custo de produção, que em 21-3-1959 a APA divulgou:

Frango tipo corte ..	Cr\$ 55,00 por kg
Frango Leghorn ..	Cr\$ 50,00 por kg
Galinha Vermelha ..	Cr\$ 47,60 por kg
Galinha Leghorn ..	Cr\$ 38,00 por kg

Estes preços são o reflexo da intensa venda de galinhas, fazendo baixar tanto o preço das próprias galinhas, como dos frangos de corte.

Como os cálculos de produção dos frangos de corte assinalam um iníquo de Cr\$ 55,00 por kg vivo, a maioria dos avicultores praticamente não ganha nada na venda dos frangos, pelos preços apontados.

No setor de rações balanceadas, o panorama continua ainda sombrio, pois o milho sofreu nova alta, depois de queda de 100% no seu preço máximo, isto devido às chuvas contínuas e intensas de março, à falta de resíduos de trigo e às dificuldades para obter farinhas de carne e de peixe.

(Conclui na pág. 89)

CARNE, COURO E BANHA

Bovinos para engorda (gado magro)	BARRETOS	FRIGORIFICO	FRIGORIFICO
	Em 13 de abril 4.000,00 a 4.500,00	AMOUR DO BRASIL S.A. Posto Frigorífico 31/3/59	WILSON DO BRASIL S.A. Posto Frigorífico 31/3/59
	Por arroba	Por arroba	Por arroba
Preços de compra:	Cr\$	Cr\$	Cr\$
Novilhos gordos	450,00	480,00	490,00
Carreiros e marrucos	380,00	430,00	430,00
Vacas e torunos gordos	380,00	430,00	430,00
Novilhos tipo consumo	—	300,00	350,00
Bols tipo consumo	—	480,00	420,00
Gado tipo conserva	—	350,00	350,00
Vitelos gordos	—	460,00	480,00
Vacas	380,00	—	420,00
Preços de venda:		Quilo	Quilo
Couro de boi até 27 quilos	—	29,00	28,50
Couro de boi acima de 27 quilos	—	28,50	29,00
Couro de vaca	—	27,00	27,00
Banha em rama	—	(sem cotação)	(s/cotação)
Banha em latas 3/20	—	(sem cotação)	5.290,00 p/caixa
Suínos gordos			p/arroba
Enxutos	780,00	(compra suspensa)	780,00
Gordos	810,00	(compra suspensa)	830,00
Especiais	840,00	—	—
Suínos magros (média 6 arrobas)	1.500,00	—	—

ANUNCIOS CLASSIFICADOS

Revista dos Criadores

ORGÃO OFICIOSO DA ASSOCIAÇÃO
PAULISTA DE CRIADORES DE BOVINOS

Redação: Rua Jaguaribe, 634 - S. Paulo - Brasil
Tels.: 51-9234 e 52-6686
Endereço telegráfico: Criadores

CORRESPONDENTES

Belo Horizonte - M.G.

Gil Guimarães de Andrade
Rua Pium-I, 551 Carmo

Compinas - S.P.

José Valdez Corrêa
Rua Tiradentes, 457

Piracicaba - S.P.

Octavio de Almeida Penna
Rua Prudente de Moraes, 679

Uberaba - M.G.

Hugo Prata

Uberlândia - M.G.

Lauro Coelho de Oliveira
Caixa Postal, 116

Livramento - R.G.S.

Achyllis Alves

Moçambique - África

José Antonio Cardoso Vilhena

REPRESENTANTES

Rio de Janeiro - DF

Sebastião de Araujo
Av. Rio Branco, 143 - 4.º
- s/5

Belo Horizonte - M.G.

Jayme Batista
Caixa Postal, 625

Estados Unidos

Halpern Associates
108 West 43rd Street
New York 36, N.Y. - U.S.A
Rep. Argentina.

Asociacion Argentina Criadores
de Cebu
Bartolomé Mitre, 754 - 2.º p
Buenos Aires

VENDA AVULSA

Rio de Janeiro - DF

Sogeco - Sociedade Geral de
Representações e Comércio
Ltda.
Av. Rio Branco, 9 - s/2218 -
Tel.: 43-6009

Juiz de Fora - M.G.

Agência Campos
Caixa Postal, 49

São José do Rio Preto - S.P.
Agência Comercial
Rua Bernardino de Campos,
3031

Salvador - Bahia

Afonso C. Queirós
Rua Chile, 23

Vitória - E.S.

Alfredo Capallo
Rua Geronimo Monteiro, 36

Rio Grande - R.G.S.

Ernani R. Lopes
Rua Manoel Floriano, 372

Fortaleza - Ceará

J. Filinto & Cia.
Rua Major Facundo, 142

Montevideo - Uruguai

Livraria Monteiro Lobato
Rua Andes, 2415

Natal - R.G.N.

Luz Romão
Caixa Postal, 11

Baurú - S.P.

Salomão Cantus
Rua 1.º de Agosto, 640

Três Pontas - M.G.

Livraria Condevila
Caixa Postal, 14

Recife - Pernambuco

Agência de Rev. Mauricêa
Rua Imperatriz, 58

Uberlândia - M.G.

Agência Lopes
Rua Floriano Peixoto, 579

São Paulo - Capital

Pedro Lazarini
Livraria da Estação da Luz

Salvador - Bahia

Distribuidora de Rev. Souza
Rua Saldanha da Gama, 6

Laurenço Marques - Africa
O. Portuguesa

J. A. Carvalho & Cia. Ltda.
Rua Consiglieri Pedroso, 20

Piracicaba - S.P.

Licínio Antonio
Huffenboecker
Caixa Postal, 5

ALIMENTOS

REFINAZIL

O AMIGO DA CRIAÇÃO
FARELO COM 24,75% DE
PROTEINA
A BASE DAS BOAS
RAÇÕES BALANCEADAS

ALIMENTOS PARA AVES E ANIMAIS

CRIADORES E AVICULTORES, PEÇAM COTAÇÕES
À CASA ESPECIALIZADA EM FORRAGENS

GUILHERME D'AMICO

Depósito permanente de alfafa, milho, aveia,
cevada, farelo, linhaça, trigoilho, farinha de carne,
ossos, refinazil, ostras, etc.

RUA BRIGADEIRO GALVÃO, 996 - Fone 52-6770
SÃO PAULO

AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS

Capotas para Jeep "TRIUNFO"

• Mela porta com cortinas de
molas automáticas • Hermética-
mente impermeável à chuva e ao
pó • Inteligente desmontável
• Lona Locomotiva • Torniquetes
e fivelas inoxidáveis • Visores
plásticos que não amarelam.
Preço: Cr\$ 4.000,00

TEMOS PARA PRONTO EMBARQUE
Pedidos à:

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES
Rua Jaguaribe, 634
SÃO PAULO

COALHO

COALHO FRISIA

EM LIQUIDO E EM PÓ - 1.ª fábrica de coalho no Brasil

Único premiado com 10 medalhas de ouro

Fabricado por KINGMA & CIA. LTDA. - Mantiqueira E.F.C.B. - Minas
À VENDA EM TODA PARTE - Peçam amostras grátis aos repre-
sentantes ou diretamente aos fabricantes.

CRIADORES DE BOVINOS DA RAÇA HOLANDESA - Vendemos ótimos
animais puros de pedigree, puros por cruzar, etc.

Representantes:

CAIXA POSTAL, 342 - Rio de Janeiro
CAIXA POSTAL, 26 - Santos Dumont - E.F.C.B. - Minas
CAIXA POSTAL, 3191 - São Paulo
CAIXA POSTAL, 397 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul

LIVROS

O NELORE, —

ORIGEM, FORMAÇÃO
E EVOLUÇÃO DO REBANHO

ALBERTO ALVES SANTIAGO

Preço: Cr\$ 500,00 (pelo correio mais Cr\$ 30,00)

Pedidos à

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CRIADORES
DE BOVINOS

RUA JAGUARIBE, 634

SÃO PAULO

ANUNCIOS CLASSIFICADOS

ANUNCIOS CLASSIFICADOS

COLUNAS DE 43 MM.

Cada centímetro por coluna comporta no máximo 10 palavras, inclusive nome e endereço.

Cr\$ 60,00 por centímetro e por publicação

Nesta Secção só se aceitam anúncios no tamanho máximo de 1/2 página. Ótima oportunidade para os senhores fazendeiros, criadores, comerciantes, etc., fazerem suas ofertas. Todo pedido de publicação deverá vir acompanhado da respectiva importância líquida e em nome da

REVISTA DOS CRIADORES

Rua Jaguaribe, 634

São Paulo

GADO LEITEIRO

COMPRA E VENDA permanente de reprodutores PO e PC e NOVILHAS E VACAS PO - PC - 7/8 e 3/4 de sangue, das raças HOLANDESA, GUERNSEY, JERSEY e SCHWYZ, com os devidos certificados de registro nos Herd-Books das raças, acompanhados dos respectivos atestados de sanidade.

ANTÃO CORRÊA

CORRETOR DE ANIMAIS

Praça 15 de Novembro, 20 - 6.º andar - sala 602 - Telefones 43-6808 e 43-0159 - Caixa Postal 851 - Endereço Telegráfico: "Bovinos" — RIO DE JANEIRO

COELHOS

COELHOS: CRIAÇÃO LUCRATIVA E OPORTUNA:

Peça os folhetos: "É fácil criar coelhos" e outros a

GERMANO H. HATZFELD

MORRO AZUL • EST. DO RIO

COELHOS DE RAÇA

**GRANJA ALASKA
(DENNIS VIEIRA PIZA)**

Gigante de Flândres, Chinchila, Azul de Viena e Nova Zelândia. Premiados e Importados da Argentina. Ver à Rua Aluizio Azevedo n. 345 SANTANA — Onibus 43 — SÃO PAULO

VINHOS

VINHOS "VELHO JUNQUEIRA"

Branco seco tipo "Liebfraumich"

Branco suave tipo "Porca de Murso"

Velho Junqueira

Rosado suave

Niagara

Tinto

Fabricados na região de CALDAS, com uvas de castas Européias. — Chácaras em Caldas e Divinolândia

Pedidos para **VINICOLA JUNQUEIRA S/A.**

em Poços de Caldas — Caixa Postal n.º 66

Vendedores autorizados:

S. PAULO — João Cardilo - R. Barão do Bananal, 896 - Fone 52-4325
SANTOS — José Fernandes Claro - R. Cunha Moreira 174 - Fone 2-5108
CAMPINAS — Benedito Amarante - R. José Alencar 399 - Fone 6763
BELO HORIZONTE — Soc. Filadelfia Ltda. - Ed. DANTES - Fone 20619

FAZENDA BARRA DO PEIXE

Criador e Prop.: **Dr. Carlos Kós**

Mun. Além Paraíba - Estação de Simplicio - Tel. 4

MINAS GERAIS

Em nosso plantel, possuímos precioso conjunto puro de origem, composto de 70 cabeças, importado diretamente do Canadá e da Frísia.

PRODUÇÃO - QUALIDADE
ALTA LINHAGEM

Criação e seleção de gado Holandês preto e branco, puro de origem e puro por cruz. Permanente venda de excelentes reprodutores.

SUA VISITA NOS
CAUSARÁ PRAZER

TOP HOPE — Reprodutor Puro de Origem. É um dos mais famosos touros do mundo importado para o Brasil diretamente do Canadá.

Informações no Rio: Dr. Carlos Kós — Av. Almirante Barroso, 72 - 9.º - s/911-12-13 - Telefone 22-9483 - Rio de Janeiro

ANUNCIOS CLASSIFICADOS

CALENDÁRIO DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS

MAIO

BARRETOS - S.P.

9
I Concurso de Novilhos de Corte.

GUARATINGUETÁ - S.P.

16 a 18
V Exposição do Vale do Paraíba.

S. JOSÉ DO RIO PRETO - S.P.

23
I Concurso de Novilhos de Corte.

CURVÉLO - M.G.

24 a 28
XIX Exposição de Animais.

JUNHO

SÃO PAULO

6 a 14
III Exposição-Feira de Gado Leiteiro e Equídeos.

MONTES CLAROS

21 a 25
Exposição e Concurso de Bois Gordos.

SETE LAGOAS - M.G.

7 a 11
III Exposição de Animais.

LEOPOLDINA - M.G.

24 a 4
XXII Exposição de Animais.

JULHO

BASTOS - S.P.

11 a 13
III Festa do Ovo e da Avicultura.

ANDRADINA - S.P.

11 a 13
III Exposição Municipal de Animais.

12
Concentração de pecuaristas na Fazenda Seleção de Gado Indiano.

PINHAL - S.P.

18 a 20
II Exposição Municipal de Animais.

ARAÇATUBA - S.P.

28
Início das provas de Ganho de Pêso.

BAURÚ - S.P.

28
Início das provas de Ganho de Pêso.

No decorrer do mês, nas regiões zootécnicas de Bebedouro, Jaboticabal, Ribeirão Preto, Rio Claro, Taquaritinga e Tutu - I Prova dos Torneios Leiteiros Regionais.

ALVINÓPOLIS - S.P.

V Exposição de Animais.

AGOSTO

BAURÚ - S.P.

1 a 3
V Exposição de Animais.

BARRETOS - S.P.

11
Início das provas de Ganho de Pêso.

SERTÃOZINHO - S.P.

11
Início das Provas de Ganho de Pêso.

FRANCA - S.P.

25
Início das Provas de Ganho de Pêso.

SETEMBRO

SÃO PAULO

1 a 13
I Exposição-Feira de Médios e Pequenos Animais.

ITAPETININGA - S.P.

21 a 26
II Concurso de Ovinocultura.

BRAGANCA PAULISTA - S.P.

26 a 28
IV Exposição de Animais.

CAXAMBÚ - M.G.

6 a 13
X Exposição de Animais.

MURIAÉ - M.G.

6 a 13
XIV Exposição de Animais.

GUAXUPÉ - M.G.

RIO BRANCO - M.G.

13 a 18
IV Exposição de Animais.

OUTUBRO

ITAPETININGA - S.P.

4
II Concurso Anual de Lã.

COLINA - S.P.

18
Concentração de Pecuaristas na Coudelaria Paulista e Leilão de Equídeos.

ALFENAS - M.G.

17 a 22
V Exposição Regional de Animais.

PRÉCID. PRUDENTE - S.P.

24 a 26
V Exposição de Animais.

No decorrer do mês, nas regiões zootécnicas de Bebedouro, Jaboticabal, Piracicaba, Queluz, Ribeirão Preto, Rio Claro, Taquaritinga e Tutu - II Prova dos Torneios Leiteiros Regionais.

NOVEMBRO

S. JOSÉ DO RIO PRETO - S.P.

14 a 16
I Exposição de Animais.

DEZEMBRO

SERTÃOZINHO - S.P.

6
Concentração de pecuaristas na Fazenda Experimental de Criação.

ITAPETININGA - S.P.

14
Curso Artexanal de tecidos de lã.

ORQUIDEAS

ORQUIDEAS

CACTOS E BROMÉLIAS

Solicite catálogo com 186 ilustrações, sendo 40 em cores, mediante envio de Cr\$ 35,00 em selos postais

ORQUIDEÁRIO CATARINENSE

Caixa Postal, 1 - CORUPÁ Santa Catarina

VIOLETAS AFRICANAS - Oferecemos uma super-coleção de 12 raridades diferentes, inclusive a célebre trepadeira e as melhores variedades dobradas e de folhas decorativas por apenas Cr\$ 600,00 - pelo reembolso postal ou aéreo.

MARCA REGISTRADA

CRIADORES! FAZENDEIROS! AVICULTORES!

Conservem a saúde dos seus animais empregando os insuperáveis produtos veterinários "VIGOR" que há mais de 25 anos protegem a Pecuária e a Avicultura nacional.

ARSENATROL — Tônico geral dos animais convalescentes e doenças prolongadas. Anemias (Caquexias), Magreza dos Bovinos, Mal de Cadeiras e Estimulante respiratório e circulatório. Tratamento auxiliar das doenças parasitárias (peste de sear, etc.) dos bovinos, equinos e carneiros. Reconstituinte de cães.

AZUL-FENOL — Empregado nas Bicheiras, Arranhaduras, Machucaduras, Feridas, Córtes, Frieiras, Aftosa (ulcerações). Auxiliar no tratamento das Diarréias, Sapinhos, Pisaduras, Desinfetante do Umbigo das Bezerros e Animais Novos. Nas doenças das aves.

COLARGUINOL — Pneumonia dos grandes e pequenos animais, Pneumo-Enterite, dos bezerros (Tristeza), Adenite equina (garrotinho), Curso de Sangue, Curso Negro, Gastro-Enterite e Diarréias em geral.

CICATRIZANTOL — Pomada de eficácia no tratamento das Feridas Úlcera, Fistulas, Pisaduras, Castrações, Gavarros, Arranhaduras, Córtes, Mastite (inflamações do úbere), Arranhadura da Teta e Umbiguetas dos aturros.

FENOLAN — Poderoso antisséptico, hemostático e cicatrizante. Nas frieiras em geral. Extraordinário larvicida, germicida e parasiticida. Uso tópico nas feridas, córtes, ferimentos, úlceras, tumores. Estanca hemorragia evitando infecções.

FRIERIZOL — Ótimo e enérgico medicamento cicatrizante e desinfetante empregado com grande êxito no tratamento das frieiras em geral.

ÓLEO CANFORADO "VIGOR" — Enérgico estimulante e tônico cardíaco as depressões dos centros nervosos, fraqueza cardíaca, Septicemias, Pneumonias, Colapsos e Choques.

PNEUMOSAN — Diarréia em geral dos suínos, Pneumonia e Pneumo-Enterite (batadeira) dos porcos e leitões.

PLACENTOL — Excelente hemostático. Constrictor de hemorragias "post-partum", Metrorragia (hemorragia do útero). Inflamações catarrais do colo do útero, etc. Enérgico estimulante do útero em todos os casos de partos difíceis e retenção da placenta.

PÓ ANTI-DIARRÉICO — Na Diarréia branca, Diarréia Amarela, Diarréia Preta e Infecções intestinais dos bezerros, pequenos e grandes animais.

REUMATOSAN — Empregado com grande êxito no tratamento das manqueiras antigas ou recentes, entorses (esforço violento exercido sobre os ligamentos de uma articulação). Contusões, luxações, matismo agudo ou crônico e em todas as inflamações que sobrem em qualquer parte do corpo, a sua ação é decisiva.

SARNALINA (Líquido e Pomada) — Anti-parasitário em piolhos, pulgas, micuins, eczemas, sarnas dos grandes e pequenos animais. Estimulante local nas moléstias da pele.

SOL. ENTÉRICO — Pneumonia dos grandes e pequenos animais, Pneumo-Enterite dos bezerros ou Péste dos "polmões". Diarréias, Estimulante nas depressões dos centros nervosos, na fraqueza cardíaca e Anti-febril.

SOL. EQUINO N.º 2 — Aguamento, Arejamento e Cólicas. Bronquites crônicas. Não ataca o coração.

AVEROL — Contem Sulfaguinoxalina, Sulfaguonidina, etc. Contra Coriza infectuosa, Diarréias. Auxiliar no tratamento da Boubá, Pigarra ou Gôgo (resfriados), Reumatismo, Artrites, Antisséptico, Cicatrizante em úlceras e Estomatites. Desinfetante das vias respiratórias das aves.

AVINOL — Suplemento mineral. Carbonato de cálcio, Farinha de ossos, Penicilina G-Benzatina, Vitaminas B12, D3, B1, B2, B6, Biotina, Piperazina, etc. — Favorece o desenvolvimento ósseo. Previne o raquitismo, a Anemia e descalcificação. Estimula o crescimento permitindo ampla assimilação dos alimentos. Aumenta a capacidade de postura. Favorece a muda. Melhora a qualidade dos ovos dando-lhes maior peso e contribuindo para maior resistência da casca.

REVENDEDORES EM SÃO PAULO (Capital) — Associação dos Criadores — Rua Jaguaribe, 634. Agropop — Rua São Caetano, 204. Casa Orestes — Rua Benjamin Constant, 210 - Esq. Sen. Paulo Egídio. Farmavet Ltda. — Praça da Sé, 47 - 1.º andar. Drogasil e Filiais.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL — Calleya & Cia. — Farmacia Calleya — Rua Val. da Pátria, 30 - PORTO ALEGRE. — No interior e demais Estados do Brasil os Produtos Veterinários "VIGOR" encontram-se à venda nas Farmácias, Drogarias, Associações Rurais, Cooperativas e Casas do ramo.

Peça gratis o MEMENTO TERAPEUTICO dos afamados produtos veterinários "VIGOR" escrevendo aos fabricantes:

LABORATORIO DE PRODUTOS QUIMICOS E VETERINARIOS "VIGOR" LTDA.
CAIXA POSTAL, 40 — JABOTICABAL — ESTADO DE S. PAULO
ATENDEMOS PEDIDOS DIRETOS

AMERICA
DO
NORTE

AMERICA
DO
SUL

O SONO QUE ATRAVESSA A AMÉRICA...

Você está a bordo de um Super Constellation Intercontinental em vôo de luxo para Nova York. Você é hóspede da Varig. Ao entrar a noite, servem-lhe o jantar, aquele delicioso jantar preparado por chefs de cuisine franceses. Depois, você adormece, porque na luxuosa e tédida cabine, onde o ruído é amortecido e o ar é condicionado, há um conforto especial para o seu repouso noturno. Sua poltrona macia, reclinada amplamente, recebe o descansa-pés, as cobertas, os travesseiros, as solícitas atenções das aeromoças. Bem acomodado, pois, você dorme. Dorme mais do que nunca, dorme três mil quilômetros. Seu sono, na verdade, atravessa a noite, atravessa a América, desde o Atlântico até o mar das Caraíbas. Ele faz por você metade da viagem. Graças a ele, você, ao acordar, está com meio caminho andado. Mais umas poucas horas e você descerá em Nova York com a alegria de quem desperta para um novo dia.

No "Intercontinental" há também leitos disponíveis, mediante uma sobretaxa. E se o passageiro quer pagar tarifa mais baixa, tem à sua disposição a cabine classe turista.

VARIG

asas do Brasil sobre as 3 Américas

exija tudo
de sua criação,
mas dê-lhe

MINERSAL

com

- sais minerais iodados

MINERSAL

com

permite

- Crescimento e desenvolvimento perfeitos
- Produção ótima: carne - leite - ovos - lãs, etc.
- Reprodução normal

existe um tipo de Minersal para cada espécie animal!

SOCIL PRÓ - PECUÁRIA S/A.

Rua Ministro Campos Vergueiro N.º 85 (Anastácio)
Tels.: 5-0298, 5-0050 e 36-4087 - Caixa Postal, 5.013
São Paulo