**REVISTA
DOS
CRIADORES**

A SERVIÇO DA PECUÁRIA NACIONAL
DE 1965 - ANO LXV - Nº 786 - R\$ 5,50
EDIÇÃO OFICIAL DA ABC

FAZENDA ORIENTE E O NOVILHO PRECOCE

"Cara Inchada" dos Bovinos: Sua Causa e Controle

GENÉTICA ANIMAL

Cruzamento em gado de corte

*o cruzamento se constituir em uma forma rápida e muitas vezes econômica de produzir carne
elimina a necessidade, nem diminui a importância da seleção como método de melhoramento
genético a ser realizado concomitantemente.*

CARNES DE 1º MUNDO A PREÇOS DE MERCOSUL

A Argentina exporta a melhor carne bovina do planeta para a Europa a preços de 1º Mundo. Agora, você pode ter a mesma carne de altíssima qualidade a preços de Mercosul, ou seja: preços abaixo da média com as vantagens que só quem faz parte deste Mercado Comum pode ter.

É o Mercosul mostrando a sua força através da nossa união. Aproveite que as carnes são exportadas com total controle de saúde para você engordar ainda mais seus lucros. Bom apetite e boas vendas, porque o resto é conversa pra boi dormir.

Frigorífico Juramento S.A.

25 de Mayo 36 - (4400) - Tel./Fax(087) 221948/313183/313641
Salta - Argentina
Sarmiento 760 - 6º Piso - Tel 394 - 1236 - Fax 394-1226 (1041)
Buenos Aires - Argentina

Nesta Edição

Na seção Gado de Corte, de nosso correspondente em Campo Grande, temos a reportagem de Najar Tubino sobre a Agropecuária Oriente, que tem por objetivo abater o Nelore Precoce até o ano 2.000. Trata-se de um empreendimento que vem sendo realizado pela iniciativa privada liderada pelo Grupo Gerda, em um rebanho de 32,5 mil cabeças em mais de 25 mil hectares de pastagens e trabalha com dois grupos diferentes para a produção de carne: animais Nelore cara limpa e cruzados, na sua maioria Brangus. São 10.000 vacas Nelore e 5.000 cruzadas (metade Brangus e o restante Simental, Hereford, Limousin, todas F1). O objetivo da empresa nos próximos 5 anos é abater toda a produção com menos de 30 meses.

Com o título "Genética Animal: Arte ou Ciência", o nosso redator, zootecnista Ruy A. de Bastos Freire, escreve: "De maneira empírica o homem vem a milênios usando a genética como uma das principais ferramentas para garantir suas safras. Nos duzentos anos que separam o inglês Robert Bakewell, do Norte Americano Jay L. Lush, passando pelo austríaco Mendel, a genética se transformou em um dos mais importantes instrumentos do fomento agropecuário. Ainda, sobre genética animal, temos o artigo do Engenheiro Agrônomo Kepler Euclides Filho, intitulado "Cruzamentos em gado de corte" e, que em seu texto, em um dos parágrafos, diz: "O cruzamento tem sido utilizado em diversas espécies animais domésticos como forma de produzir, carne, leite, ou ovos. É um termo utilizado quando a produção de determinada geração de indivíduos envolve o acasalamento de duas ou mais raças".

Sobre veterinária temos o artigo: "Cara Inchada" dos bovinos, sua causa, e controle", de Ivan Valadão Rosa, médico veterinário da EMBRAPA e que termina o seu estudo dizendo: "Embora ainda permaneçam por ser esclarecidos alguns aspectos obscuros relacionados ao fator ou fatores que atuam no desencadeamento do quadro clínico da "cara inchada", os resultados dos estudos microbiológicos e as excelentes respostas ao tratamento com antibióticos indicam claramente uma etiologia infecciosa para a doença." Com respeito a situação da inseminação artificial no Brasil, temos o relatório da ASBIA - Associação Brasileira de Inseminação Artificial, sobre o ano de 1994, com vários gráficos sobre o uso da inseminação em nosso país e diz, que: "... o Parque Industrial Brasileiro de I.A. é hoje comparado aos melhores dos países desenvolvidos, e está trabalhando muito abaixo de sua capacidade de produção."

Encerrando esta série de úteis artigos, o leitor vai encontrar a matéria intitulada: "A mandioca na alimentação de suínos" de autoria dos técnicos Aloisio Soares Ferreira e Juarez Lopes Donzle e divulgada pela EMBRAPA - CNPSA, de Concórdia, SC. Em sua introdução os autores dizem que vale destacar que a mandioca pode produzir muito mais energia digestível (ED) e proteína digestível (PD) para suínos, por Ha, por ano, que o milho". Finalizando o seu sumário vamos encontrar o título: Indicador "Cooxupé" e Notícias.

A Revista dos Criadores, órgão oficial de divulgação da Associação Brasileira de Criadores, destina-se ao fomento e melhoria da pecuária nacional.

Director Responsável: Luiz de Almeida Penna.

Redação: Ruy A. de Bastos Freire Filho e Najar Tubino (MS).

Assessoria Especial: Edilson Pereira da Silva

Revisão: Antonio Augusto Silva

Arte Visual: Luiz A. Penna

Colaboradores: F. Teatini, Fidelis Alves Neto, General Diogo Ribeiro, Manoel J. de Alcântara, Antonio Cabrera.

Fotografia: Alfredo Ribeiro

Departamento de Publicidade da Editora:

Gerente: Luiz de Almeida Penna Filho

Representante Comercial: Carvalho Hamacek Ltda. e Charles Alves

Assinatura: 12 edições da Revista: Número atrasado, ao preço da capa da edição em circulação. Publicação Mensal.

ISSN 0034-9259

Departamento de Assinatura:

Gerência: Maria Nazareth de Castro Penna.

Redação: Av. Dr. José César de Oliveira, 175 - Cep 05317-000 - Tel.: (011) 831.7712 e 831.7966 - Fax: 831.7712.

Colaboração Eletrônica:

Responsável: Sílvia M. P. de A. Moura

Endereço Avulsos: Rio de Janeiro - RJ. Guanabara Ramos e Revistas Ltda., Rua Antonio Ribas, 72 - Botafogo. Londrina - PR Jornal - Com. Publ. de Ramos e Revistas Ltda., Rua Minas Gerais, 61. Fortaleza - CE Distribuidora de Jornais e Revistas - R. Maximiliano da Matta Teixeira, 708 - J. J. Costa 01-05 - Centro - Cep 74.000 Belo Horizonte - MG Agência Van Damme Ltda. Rua Amazonas, 505 - Cep 30180.

Endereço de Remessa dos Exemplares da RC aos Assinantes da ABC: Departamento Social - Av. José César de Oliveira, 175 - Jaguaré - Cep 05317-000 - São Paulo - SP.

Os artigos publicados nem sempre traduzem a orientação da Associação Brasileira de Criadores e a ABC e são de responsabilidade dos que os assinam. Autorizamos a transcrição de trabalhos aqui publicados desde que sejam citados nosso nome e a edição.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES

(Ex-Associação Paulista dos Criadores de Bovinos).
Reconhecida como de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 33.811, de 20 de outubro de 1958.

Registrada no Ministério da Agricultura sob nº 35, com jurisdição nacional

67 ANOS DE BONS
SERVIÇOS PRESTADOS
AOS CRIADORES

DIRETORIA

Presidente

Guthermo Monteiro Junqueira

Vice-Presidente

Alberto Chap Chap
Júlio Antônio Caporale
Robson Malta de Souza Campos Filho
Roberto Cano de Arruda
Carlos Eduardo Vieira Ribeiro

Secretários:

Cláudio Brito Soares
Lucio Manoel de Campos Bezerra

Tesoureiros:

Henrique Lambert Junior
Júlio de Freitas Brito

CONSELHO DELIBERATIVO

Presidente

General Diogo Branco Ribeiro

Vice-Presidente

Lutz Rondon Teixeira de Mughelins

Conselheiros Natos

Júlio de Moraes Barros
José Bonifácio Coutinho Nogueira
Hálio Moreira Sales
Joséquin Barros Alcântara Filho
Manoel Epitácio Pereira de Queiroz Filho

Conselheiros Efetivos

Ovídio de Mesquita Sam-pelo
Manoel José de Alcântara
Lutz Glycila Greice de Freitas
Carlos Alberto Julio Lehmann
José Casti
Virgílio de Almeida Pereira
Antonio de Oliveira Pereira
José Cleonice Gomes dos Reis Junior
Henrique de Souza Dias
Vicente Martins Junior
Lutz Baptista Pereira de Almeida
Custódio Cabral de Almeida
Roberto Rodrigues
Pedro de Paula Leite Moraes
Genildo Diniz Junqueira
Pedro de Camargo Neto
Fernando Euler Bueno
Amoldo Lima
Antonio Carlos Turazza
Vicente Assini de San Marzano
Francisco Jacintho de Silveira
Jayme Vitz Roça
Sylvio José Junior
Elder Roberto Dantas Filho

Suplentes

Glá Souza Rêmod
Luiz Egidio Constantino
Francisco Pedro Rêmod
Ovídio Carlos de Brito
Ruy Calerene de Araújo
Henricus Antonius Wapereis
Cláudio Toledo Piza Filho
Paulo de Mungo Vaz de Arruda
Claudio Sobral Celeda de Castro
Dionísio Alvaro Leal
Roberto Blitencourt
José de Castro Rodrigues Neto
José Luiz Bastani Corbin
Carlos Eduardo Zampieri
Frederico Jayme Rêde

CONSELHO FISCAL

Efetivos

Antonio Tadeu Jallid
Arnaldo A. Pedro Centro
Wibere Rapchen Barão

CONSELHO TÉCNICO DELIBERATIVO

Presidente

José Casti

Vice-Presidente

Manoel José de Alcântara

Secretário

Antonio Carlos Gouvêa

Conselheiros

Representante do Ministério da Agricultura
Med. Vet. Dr. Wanderley Antunes
Flávia Alves Netto
Manoel José de Alcântara
Osmany Junqueira Dias
Carlos do Amaral Costa
Fernando do Prado Rêmod
Fernando Gomes de Castro Junior
Guilherme Lunge Goulart

Comissão Regional do Rio do Janeiro

Presidente: Custódio de Almeida
Vice-Presidente: Elder Roberto Carlos Filho

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Consultor Jurídico

Jayme Vitz Roça, Advogado

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Provas Zootécnicas e Registros

Cláudio Cláudio Sabido, Zootecnista

Associação Técnica - Veterinária

Antonio Carlos Gouvêa, Med. Vet.

AGROPECUÁRIA ORIENTE: OBJETIVO É ABATER NELORE PRECOCE ATÉ O ANO 2.000

O uso de Monoamônia fosfato, do desmame precoce e do semi-confinamento ajudam à Agropecuária Oriente a aumentar o desfrute do rebanho

A Agropecuária Oriente, do Grupo Gerdau, mantém duas fazendas na região de Água Clara, 200 Km de Campo Grande, com um rebanho de 32,5 mil cabeças e mais 25 mil hectares de pastagem, e trabalha com dois programas diferenciados para produção de animais Nelore cara limpa e cruzados, na sua maioria Brangus. Possui 10 mil vacas Nelore e 5 mil cruzadas (metade Brangus e o

restante Simental, Hereford, Limousin, todas F1). O objetivo da empresa nos próximos cinco anos é abater toda a produção com menos de 30 meses. Atualmente o abate da Agropecuária Oriente é de 6,4 mil cabeças sendo que 2/3 dessa produção vai para o frigorífico com menos de três anos.

O projeto inicial do Grupo Gerdau, ainda no final da década de 70, era abrir uma área de cerrado

para o plantio de pinus e eucalipto. Naquela época existiam incentivos fiscais para a atividade e o governo federal, incentivava o reflorestamento acenando com a possibilidade da implantação de uma fábrica de celulose. Nada disso aconteceu e os rumos do projeto mudaram. Primeiro o Grupo Gerdau tentou implantar a agricultura, com o plantio de arroz de sequeiro e soja. Mas o solo da região

"O Nelore realmente pode ser abatido com o mesmo tempo de permanência do cruzado, com uma vantagem maior; é muito menos oneroso para ser mantido." Gastão Scheerem.

- uma terra mista boa de areia grossa com fina- como define o agrônomo Gastão Scheeren, gerente da Oriente, de regime inconstante de chuvas, inviabilizaram a iniciativa.

No início dos anos 80, começaram a implantar as pastagens de braquiária (inicialmente decumbens e humidicula e posteriormente, a brizantha) e a comprar novilhas aneladas (cara limpa), adquirindo três mil, da primeira vez.

A partir de 84, fizeram uma primeira experiência em conjunto com o Centro Nacional de Gado de Corte, de cruzamento com as raças européias, basicamente, as continentais. A partir de 89, entraram no Programa Natura, com a definição de usar Aberdeen Angus e produzir o sintético Brangus. Porém, a Agropecuária Oriente nunca esqueceu do rebanho base Nelore. Desde que entrou na pecuária de corte, buscando produzir o máximo de carne por hectare, a empresa adotou como norma o descarte de fêmeas inférteis, embora não fosse um descarte técnico levando em consideração habilidade materna, intervalo entreatos ou peso à desmama, porque a fazenda estava em expansão.

Agora a situação mudou radicalmente. No ano passado, o gerente Gastão Scheeren, visitou a Agropecuária Jacarézinho, do Grupo Grandene, que trabalha na seleção da precocidade no rebanho Nelore. Voltou para Água Clara e decidiu fazer a mesma coisa. Colocou um lote de mil novilhas com 17, 18 até 19 meses para serem entouradas. Essas novilhas pariram nos meses de março e abril de 95, com um índice de nascimento que não passou dos 15%, aliás, como acontece nesses casos.

"As novilhas pegaram uma época difícil, um pouco de frio, era uma estação fora de época e algumas tinham 15, 16 meses. Mas o que nós queríamos identificar era o potencial genético para a precocidade. E o mais importante: muitos técnicos e criadores, com uma mentalidade arraigada, falam em peso mínimo para reprodução. A nossa filosofia é diferente, quem vai identificar se o animal tem condições de ser coberto é o touro. Depois com a prenhez positiva, vamos dar um manejo adequado para que elas tenham condições de parir, se desenvolver e crescer", disse ele.

Na verdade, as novilhas no esquema normal de reprodução, são

entouradas com 24 meses. A última estação de monta de fêmeas foram inseminadas na estação de monta vai de novembro a março, mas deverá encerrar em quatro meses. A Oriente é uma fazenda apenas de cria, a reprodução fica na Fazenda Verde. A desmama ocorre nos meses de maio e junho, com 215Kg e Nelore com 150Kg. A Fazenda Oriente é dividida em seis retiros, variando de 400 hectares a 1,8 mil hectares, repartindo em piquetes de 800 hectares.

"A pecuária é uma atividade que tem que dar lucro e girar o capital, porque a rentabilidade é pequena, - 10% ao ano. Se não girar o capital investido rapidamente a rentabilidade cai. Por isso temos o cruzamento industrial como uma questão de fluxo de caixa. Os cruzados vendemos a maior parte até 30 meses, 2/3 até 26 meses. Nelore nós conseguimos abater a partir dos 30 meses, sómente uma pequena parte abaixo disso. O objetivo nos próximos 4, 5 anos é abater tudo abaixo dos 30 meses. Pelo menos, estamos selecionando para isso, tanto Nelore como cruzado", comenta o gerente da Oriente.

RECOMENDAÇÕES PARA USO DO MAP

O MAP usado na fazenda Oriente é um produto diferente do usado normalmente na agricultura. É um produto comercial produzido especificamente para a pecuária, o MAP técnico. Apesar de seu grande benefício econômico, devido à toxidez da amônia, alguns cuidados devem ser tomados, para evitar um consumo muito grande por parte dos animais. Na fazenda Oriente são administrados 1-1,5 gramas de MAP por litro de água, para bois, e 2,0 gramas por litro de água no caso de vacas adultas.

Em bebedouros menores que 20 litros, devido à alta taxa de renovação de água, é aconselhável fazer a administração do produto diariamente, com base no consumo de água dos animais. Portanto, 100 bois beberem 6 mil litros de água (em torno de 30 litros diários/cabeça), devem repôr 6 kg de MAP, por dia. Em bebedouros de 50 mil litros, como a taxa de renovação da água é menor, se pode diluir o MAP em doses semanais. No caso de 100 bois, 4 kg do produto por semana.

A visão da empresa, que nos últimos anos tem investido pesado em tecnologias de manejo, procurando aumentar a eficiência da propriedade - produz atualmente 10 Kg de carne por hectare - é produzir carne com menor custo. O crescimento industrial, nas metas da empresa, sempre estará na faixa de 10% das matrizes em reprodução. Não passará disso. O objetivo maior é fazer o Nelore encostar nos melhores índices de produtividade, chegando com dois anos e entrando em reprodução aos 18 meses. Por uma questão simples: custo de produção, como explica bem o zootecnista Gastão Scheeren, que atua há quase 20 anos no Mato Grosso do Sul.

"Já está bem caracterizado e comprovado que as novilhas precoces do Nelore não deixaram de se desenvolver, mesmo entouradas precocemente. São vacas de excelente porte e não pararam de crescer, não perderam condição corporal. Então, com certeza esse programa vai ir em frente. No meu trabalho, como administrador, preciso trabalhar preservando o meu fluxo de caixa. Com a cruzada tenho o crescimento mais rápido, comparado com o Nelore. A diferença ainda é um ano e a menos, nas mesmas condições. O nosso ponto de partida é o seguinte: vamos trabalhar com a cruzada, mas ao mesmo tempo,

vamos melhorar o nosso rebanho Nelore. São poucas as agropecuárias que estão trabalhando nesse sentido, ou seja, o universo onde eu possa comprar touro, sêmen, é muito pequeno. O nosso Nelore realmente tem padrão mas precisa de precocidade."

Ele finaliza: "O Nelore realmente pode ser abatido com o mesmo tempo de permanência do cruzado, com uma vantagem maior: é muito menos oneroso para ser mantido. Vou gastar menos vermífugo, além dos produtos veterinários em geral. Ou seja, ele tem um custo menor".

A Agropecuária Oriente, por uma questão de estratégia, abate a maior parte dos animais durante a entressafra (seca). Por isso, os novilhos Nelore que "morrem" com 36 meses, na realidade, poderiam ser comercializado com 30 meses, porque já estão prontos, nesta idade.

ALTERNATIVAS PARA A SECA

O veterinário Ricardo Gonçalves, da Agropecuária Oriente, estava num casamento, quando encontrou um colega de profissão, que recentemente

visitara a Austrália. Os dois comentaram sobre novidades na área e o amigo de Ricardo falou sobre o uso de um mineral, ou uma fórmula, no bebedouro dos animais, ao invés, de colocar no cocho (sólido), na Austrália. Ricardo gravou a estória, mas não ficou sabendo que fórmula era. "Ele falou de milagre, mas não disse de que santo era".

No ano de 93, eles fizeram um primeiro teste para saber a quantidade da mistura e a reação no desempenho dos animais. O produto em questão é o *Fosfato Monoamônia pecuário*, mais conhecida como MAP, que contém na sua formulação: 23% de fósforo, 10% de nitrogênio na forma de amônia, e 7% de enxofre.

"Na verdade o produto é um fósforo de boa qualidade, solúvel que cai rapidamente na circulação do boi. O fósforo é um elemento deficiente nas nossas pastagens e, o nitrogênio vira proteína. No Brasil, não existe referências sobre o uso de mineral solúvel. Sómente nos Estados Unidos, Austrália e na Europa. No Canadá, eles usam a diamônia, que existe aqui sómente na agricultura, porém tem um componente tóxico. Aqui na Oriente não estamos usando o MAP em todas as categorias", explicou Ricardo Gonçalves.

O MAP é colocado nos bebedouros, no caso da Oriente, de tipo australiano, de chapa de aço com

Foscálcio® Serrana

Totalmente isento de metais pesados e elementos radioativos*

ÚNICO FOSFATO BICÁLCICO
A CONQUISTAR A ISO 9000

Serrana
Nutrição Animal

FONE: (011) 545-3124

*De acordo com os padrões do NRC
(National Research Council-USA)

capacidade para 50 mil litros de água. O criador que estiver interessado em usar o produto, tem que saber o seguinte conforme explicações dos técnicos da fazenda: a base da mistura na água é 1,5gr por litro, para animais adultos, acima de dois anos, que normalmente, bebem de 30 a 40 litros/dia. Os animais com menos de dois anos bebem de 20 a 30 litros/dia.

O MAP nos bebedouros com até 20 mil litros, não pode ser colocado integralmente, para um período de uma semana por exemplo. Inicialmente deverá temperar a água na razão de 1gr x 20.000lt de água, ou seja 20.000 grs ou 20 kg. No caso, de 100 bois: o criador coloca a primeira vez 20 Kg do MAP, mais 4Kg/diariamente (100 bois x 40 litros/40gr)MAP, e a partir do 2º dia 4Kg a cada dia. Se for realizada a limpeza do bebedouro, o processo deve ser reinicializado. Na Oriente ou em outras fazendas com bebedouros de 50 mil litros, se usa a quantidade total, não precisando colocar todo dia - fazem uma vez por semana (7 dias x 4Kg=28 Kg) (Obs: 1º dia utilizar-se 50Kg + 28Kg da semana dosagem para 100 bois). (ver box)

O ganho na seca de 94, a maior dos últimos anos, foi de até 875 gramas por animal. Em torno de 60% de gado para abate (boi gordo e vacas de descarte) foi "morto" no segundo semestre, ou seja, na entressafra, pegando o picos dos preços. "Foi uma das melhores remunerações que conseguimos", comenta Gastão Scheeren. Os índices de prenhez cresceram: de 75% para 80%, contando novilhas

de 13 meses no plantel, porque se analisaram apenas as fêmeas a partir de 24 meses, dá mais de 90%.

Enfim, o ganho foi geral. Nenhuma categoria animal perdeu peso na seca, o que dá um ganho geral na propriedade. Mas essa é apenas uma das tecnologias testadas na Agropecuária Oriente. A segunda, também em função da estiagem prolongada de 94, é a desmama precoce. Com o prolongamento da estiagem, e a conseqüente aproximação da estação da monta a situação se mostrava crítica, com possível perda na produção de bezerras. O professor Antônio João de Almeida, que trabalha com projetos de desmama precoce fez um plano para a empresa, que já havia experimentado esta possibilidade em 93, com poucos animais. Em 94, foram 1.800 bezerras cruzados e Nelore. Deixaram as mães com 3 meses, uma pequena parte fez *creep-feeding*, mas a grande maioria ficou dois dias no curral com ração, depois direto para um piquete com cocho, em lotes de 250 animais. Comeram uma ração comercial específica para bezerras nesta idade - 0,16 centavos de real/custo/dia. Com 9 meses de idade os cruzados passaram de 230Kg e os Nelore 203 kg. 80% das vacas (mães dos bezerras) foram inseminadas em 30 dias. Outra vantagem: as vacas de descarte paridas, na desmama precoce, chegam em junho, gordas para o abate. É um ganho de 6 a 8 meses, como dizem os técnicos da Oriente. Sem contar o pasto liberado, pois uma vaca parida tem 40% a mais de exigência nutricional.

Terceira opção da empresa é o semi-confinamento, para a cabeceira dos novilhos que são abatidos aos dois anos de faixa.

"Usamos uma ração a base de soja, milho, bicarbonato mineral e uréia. Os animais comem 1% do peso vivo, somente os cruzados. O período é de 60 dias no máximo, terminando esse período pode encostar o caminhão. Em média, os animais ganham 1 Kg/dia, mas alguns chegam até 1,5 Kg/dia no 1º mês. Eles comem 1% de ração, mais o MAP no bebedouro. Em 94, fizemos isso com os animais. É uma forma de captação o ganho em cima deles, e ter uma carne que pode pegar um preço melhor. O custo da ração é de 1,5 por animal/dia", completa Ricardo Marcos Gonçalves.

Além disso, a Agropecuária Oriente está desenvolvendo um projeto com quatro lotes de Nelores de 18 meses em cocho com touro, mais um lote testemunha, com 50 animais. Elas estão em piquetes diferentes e, toda segunda-feira, fazem um rodízio, para fazer o projeto aos 90 dias, com todos os lotes comendo o mesmo tipo de pasto. No projeto, estão sendo testadas 4 formulações diferentes de sal mineral associados a uma proteína, que pode duplicar o ganho de um pasto como a braquiária. A fórmula mineral vai misturar o sal junto. Aguardem os resultados. Estas novilhas não estão recebendo MAP para não distorcer resultados de desempenho das formulações minerais.

VENDA PERMANENTE DE GADO HOLANDÊS PO E PC

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA ARAPOTI LTDA.
FONE: (0432) 57-1300 - ARAPOTI - PARANÁ

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA BATAVO LTDA.
FONE: (0422) 31-1241 - CARAMBÉ - PARANÁ

SOCIEDADE COOPERATIVA CASTROLANDA LTDA.
FONE: (0422) 22-8233 - CASTROLANDA - PARANÁ

LINHAGEM LEMGRUBER RECONHECIDA NA PISTA

Durante muitos anos, os animais da linhagem Lemgruber, da raça alemã, não se destacavam na pista de julgamento de Uberaba. Muito ao contrário, as vezes, eram classificados, sob o argumento de não tinham problema de caracterização racial. Nos últimos 20 anos, a situação se alterou.

A seleção da linhagem, tradicionalmente realizada somente na Manah, na Fazenda Mundo Novo, em Brotas (SP), com animais selecionados a partir de 1974, do criador Geraldo de Paula, de Uberaba (MG) - já falecido - evoluiu, hoje em dia, produzindo animais adaptados às condições de mercado.

São reprodutores dóceis, de bom ganho de peso, precoces e com uma cobertura de carne excelente por qualquer criador. Em 1991, Expozebu, um garrote da linhagem Lemgruber, de propriedade de Olavo (Grupo VR) ganhou o campeonato Júnior. "É uma linhagem excelente, diz o juiz Valdecir Maria, mas que também mostra a evolução do Lemgruber no mercado". A Manah, embora tenha

fechado o seu plantel, nesta linhagem, trabalha com seleção a campo, sem nenhum tipo de artificialismo. Há muitos anos, a empresa realiza um concurso interno entre os reprodutores jovens, para escolher os melhores. A prova dura um ano a campo e mede a evolução do rebanho. A Mundo Novo também tem participado anualmente das Provas de Ganho de Peso, na Estação Experimental de Sertãozinho (SP), onde normalmente classifica os seus animais entre os melhores elite e superior.

Este ano, a Manah estava presente em Uberaba com um estande apresentando alguns exemplares da linhagem Lemgruber, - um touro adulto, premiado em Sertãozinho, que já foi destaque na fazenda, com progênie conhecida, e cinco bezerros (filhos). "É um animal que pode ter uma caracterização mais pesada, mas é um produtor de carne, está dentro dos objetivos da Manah. É um reprodutor que esta com 1.020Kg, coletando em central, com sêmen no mercado. Não é alto, mas tem

um traseiro muito bom. Acho que é o ideal para as condições do Brasil", comenta Eduardo Cardoso, um dos diretores da Manah.

Entre as preocupações da empresa, na produção de carne, esta a discussão sobre o produto final que o consumidor quer comprar. Anualmente a Manah promove um seminário e um dia de campo acoplado, para discutir um tema de interesse dos produtores. Em 95, o tema é "Nelore e a Carne" e vai abranger toda a cadeia produtiva.

"Nós queremos partir de baixo para cima, ou seja, de o consumidor até o produtor de reprodutores. A cadeia produtiva é que vai dizer que reprodutor nós temos que fazer. Para isso, vamos convidar os representantes dos açougueiros, restaurantes, frigorífico desossador (distribuidor), o frigorífico, que vai dizer aos invernistas que tipo de gado que deseja, depois ele mostrará ao criador o tipo de animal que precisa e, finalmente, o criador vai definir o tipo de reprodutor necessário para a cadeia produtiva", explicou Eduardo Cardoso.

Foscálcio® Serrana

Líder absoluto de mercado

ÚNICO FOSFATO BICÁLCICO
A CONQUISTAR A ISO 9000

Serrana
Nutrição Animal

FONE: (011) 545-3124

BETH FONTOURA: PREPARANDO PARA CONCORRER

Dona Maria Elisabeth Fontoura se tornou o centro das atenções em Uberaba, depois de comprar a vaca Corvina de Terra Boa, por R\$ 100 mil. Na verdade ela tem objetivos claros na seleção da raça Nelore, desde que decidiu investir em um plantel puro e mudar o projeto da Fazenda Água do Segredo, localizada perto da cidade de Bauru (SP), com uma área de 150 alqueires, onde também mantém uma criação de cavalos da raça Mangalarga Paulista. A fazenda existe há 10 anos, mas somente nos últimos quatro, é que dona Beth resolveu entrar na seleção de Nelore.

"O Nelore é um gado muito fácil de lidar, adaptado e além disso não é gasta. Eu na realidade já estou começando com 40 anos de seleção, porque adquiri um plantel que tinha 30 anos. Na fazenda nós já criávamos gado cara limpa. O problema é que a terra é muito cara em São Paulo e não compensa criar gado de corte nesta região, por isso optamos pela seleção", declarou a criadora.

Sobre a compra da matriz da Terra Boa, disse: "tem gente que gosta de gastar dinheiro comprando carros, eu compro vacas". Recentemente, em duas compras realizadas - a avó do touro Xenugu, e outra da criação da Brumado, - ela investiu outros 100 mil reais. A estratégia dela é muito simples: depois de comprar 150 matrizes dá plantel de Geraldo Santos Castro, de Garça, (pai do veterinário que da assistência na Água do Segredo Alfredo Castro), além do "time de exposição", está formando um núcleo de doadoras de alto nível, composto por 10 vacas.

"É a maneira mais rápida de reproduzir o melhor da genética comprada dos diferentes selecionadores. Uma forma de apressar o trabalho, que na seleção, leva muitos anos para alcançar um patamar de qualidade", afirma Alfredo Castro.

"Existe uma estrutura muito bem montada na fazenda, com pastagens intensivas de braquiária decumbens e brizantha, e uma parte destinada para produzir feno de

coast cross (18 hectares) e 40 os cavalos, sendo que nós estamos ocupando 10 hectares desmama dos bezerros. Há 5 anos, toda a bezerreira com creep-feeding, a pasto, resultados fantásticos, uma taxa de 30% no peso dos bezerros, última geração desmamados machos com média de 236Kg e fêmeas com 208Kg, acrescidos veterinário.

Os acasalamentos na propriedade contam com opiniões cruzadas entre os selecionadores Nelore: seu Dico, trabalhava com Torres Homen, e o seu Bê, e Jaime Miranda, em Garça, e o proprietário do touro Gim de Garça. Aos poucos dona Beth está preparando o seu "time" para participar das exposições. Enquanto isso, ela pretende ir a Araçatuba, Ribeirão Prudente, esse ano. Mas, a partir de 96, certamente estará em Uberaba. "Pretendo produzir mais 'Xenuguzinhos'", diz ela, rindo.

SANTA EULÁLIA INVESTE NA DUPLA APTIDÃO

A ExpoLondrina foi o local apropriado para divulgação das raças européias, que agora começam a sua expansão no Brasil, como é o caso do Gelbvieh, originário da Alemanha, animal de dupla aptidão carne e leite. A empresa que mais está investindo na criação é a Fazenda Santa Eulália,

de Pirassununga (SP), propriedade de Luiz Augusto Müller, fabricante da Caninha 51. A Santa Eulália realizou várias importações de Gelbvieh, nos últimos três anos, mantendo na fazenda, hoje em dia, 150 animais. O projeto inclui ainda, exemplares da raça Simental, também de dupla aptidão, com

aproveitamento do leite e das matrizes, além da formação de cruzadas meio-sangue com alta habilidade materna.

A Santa Eulália trabalha com importação e exportação, e está no mercado de comercialização de sêmen, embriões e receptáculos prenhas. Da raça Gelbvieh ma-

co touros em coleta. A propriedade em Pirassununga é dividida em quatro setores, com áreas separadas, envolvendo 1.500 cabeças, distribuídas em 2.500 hectares-cruzamento industrial, Nelore seleção, premunicação e uma área para Simental e outra para Gelbvieh. A empresa dispõe de um rebanho Nelore puro, que continua sendo aprimorado. No Mato Grosso, as indústrias Müller tem várias fazendas onde praticam o cruzamento industrial, testando o material genético do Simental e do Gelbvieh.

"Nós já temos meio-sangue Gelbvieh-Nelore no Mato Grosso, notamos maior rusticidade ao clima tropical, boa padronização nos cruzados, fertilidade das vacas, com alta habilidade materna. Também observamos que algumas novilhas, depois de três meses após desmama já estavam apresentando cio. Tivemos, inclusive, que mudar o nosso manejo, em função disso", comentou a zootecnista, Eliane Rossi, que trabalha no

projeto, juntamente com outros dois colegas, Marco Aurélio Matos e Ana Claudia Ambiel. Os três participam da comercialização dos produtos da Santa Eulália e fazem a divulgação nas exposições. Outros dois zootecnistas ficam na retaguarda.

"A Santa Eulália acredita na raça Gelbvieh e na sua implantação no Brasil e por isso estamos fazendo a divulgação, mostrando resultados. O nosso objetivo é a dupla aptidão, ou seja, nós tiramos leite das vacas Simental e Gelbvieh e as matrizes estão sendo controladas pela Associação Brasileira dos Criadores. O padrão dos animais é o da Alemanha, sempre buscando a produtividade, com cuidados, como a pigmentação dos animais", explica Marco de Matos.

A última importação, em março desse ano, trouxeram 77 novilhas Gelbvieh e 8 animais Simental Fleckvieh. Segundo os técnicos da Santa Eulália, a procura pela Gelbvieh aumentou muito e a procura por animais da raça é crescente, mesmo

sem contar com um trabalho intenso de divulgação.

A empresa também aproveita o momento para importar, porque na origem da criação (Alemanha), o Gelbvieh está perdendo as suas características, pois os criadores tradicionais estão se dispersando, os filhos não tem interesse em dar continuidade a seleção. E o Gelbvieh dos Estados Unidos é voltado para a produção de carne, somente. A Santa Eulália montou uma parceria com alguns criadores de Uberaba, com novilhas Nelore controladas, onde os touros Gelbvieh e Simental são testados e é feita uma avaliação do ganho genético nos cruzados. O projeto está estruturado com 1 mil novilhas zebuínas.

Na ExpoLondrina o Gelbvieh participou com 60 animais e, pelo sexto ano consecutivo, realizaram o leilão da raça. Foram comercializados 28 animais, com média de R\$ 1.966,00 e uma arrecadação de R\$ 55.050,00. O maior preço do leilão alcançou R\$ 10.000,00 por uma fêmea de 21 meses, comprada por Luiz Augusto Müller.

Foscálcio® Serrana

Pureza Absoluta

ÚNICO FOSFATO BICÁLCICO
A CONQUISTAR A ISO 9000

Serrana
Nutrição Animal

FONE: (011) 545-3124

Genética Animal: Arte ou Ciência?

Ruy A. de Bastos Freire Filho
Zootecnista

Nos duzentos anos que separaram o inglês Robert Bakewell do norte-americano Jay L. Lush, passando pelo austríaco Mendel, a genética se transformou em um dos mais importantes instrumentos do fomento agropecuário. Apesar de consolidada em suas bases científicas, em muitos países a genética animal ainda é sujeita aos caprichos e gostos de criadores, que preferem selecionar animais pelo seu exterior (muitas vezes) em detrimento da funcionalidade. Outros criadores no entanto trocaram a beleza pela balança. Tanto um como o outro estão dentro das leis naturais. Este conflito só vai ser resolvido pelas leis do mercado.

INTRODUÇÃO:

De maneira empírica o homem vem a milênios usando a genética como uma das principais ferramentas para garantir suas safras. O criador inglês Robert Bakewell (1725-1795) revolucionou a criação de animais com seus cruzamentos dirigidos. Mas foi um membro do clero que deu à genética suas primeiras bases científicas. Em uma conferência à Sociedade de História Natural em Brunn, no ano de 1865, o monge agostiniano austríaco Gregor Mendel (1822-1884), apresentou os resultados de seus estudos com cruzamentos de ervilhas. Ali, as primeiras leis da hereditariedade foram estabelecidas. As leis de Mendel foram de especial importância para as características qualitativas, características que se referem ao aspecto exterior como as cores das pelagens, a presença ou não de chifres, ou mesmo aos grupos sanguíneos dos animais. As leis que controlam as características quantitativas ou métricas, (ver quadro 1) aquelas que controlam as funções econômicas dos animais, tiveram que esperar mais 80 anos. Somente em 1945, o norte-americano Jay L. Lush e seus colaboradores na Universidade de Iowa, desenvolve-

QUADRO 1-
DIFERENÇAS ENTRE AS CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS
QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

Genética qualitativa	Genética quantitativa
1. Caracteres de tipo	Carateres de graus
2. Variação descontínua, classes fenotípicas distintas (cores de pelagens)	Variação contínua as medidas fenotípicas formam um espectro
3. efeito discernível de um único gene	Controle poligênico; os efeitos de um único gene são muito pequenos para serem identificados.
4. Concernente a acasalamentos individuais e suas progênes	Concernentes as populações de organismos representando todas as possibilidades de acasalamento
5. Analisados por contagem e por razões proporcionais	Análises estatísticas fornecem estimativas de parâmetros de populações, tais como a média, desvio padrão de determinadas características

ram uma teoria coerente de estimar o mérito genético dos animais e avaliar os métodos de seleção.

AS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS

As características qualitativas estão sob o controle genético de so-

mente um ou de poucos genes e dificilmente a ação de um gene é encoberta por outros genes. São facilmente controladas, já que podem ser classificadas em categorias típicas distintas (ex. boi mocho, chifrado, ou cavalo tordilho, alazão, etc). As pesquisas de Mendel foram de grande impor-

Foto 1: A presença de chifres é um caráter recessivo nas raças européias. O caráter mocho é dominante e forma as variações conhecidas como "Polled" nas raças britânicas. À esquerda temos um exemplar da raça Devon e à direita um animal da raça "Polled Devon"

na manipulação destas características pelo homem. Trabalhando com características do aspecto exterior das ervilhas, Mendel observou algumas das formas de certas características eram mais fortes, dominantes, e outras eram mais fracas, recessivas. O monge verificou que ervilhas lisas quando cruzadas com ervilhas rugosas, gera-

vam ervilhas lisas. As películas rugosas só eram obtidas com cruzamento entre ervilhas com esta característica. Portanto para a característica película da ervilha, a película de tipo liso é dominante sobre a de tipo rugoso que é recessivo.

Posteriormente, o estudo dos componentes da célula revelaram que os cromossomos são os respon-

sáveis pelas informações genéticas dos indivíduos. Os cromossomos são pequenas partes do núcleo da célula, semelhantes a "fios", onde se encontram "áreas" químicas que controlam a hereditariedade, conhecidas como genes. Os cromossomos, andam aos pares, isto é, cada cromossomo tem um outro cromossomo homólogo (correspondente)

Foscálcio® Serrana

Componente essencial de rações e suplementos minerais

ÚNICO FOSFATO BICÁLCICO A CONQUISTAR A ISO 9000

Serrana
Nutrição Animal

FONE: (011) 545-3124

que contem as informações genéticas das mesmas características. Os genes que determinam certas características, ficam sempre, no mesmo lugar (mesma área) de um cromossomo. Este lugar é denominado locus (de "lugar" em latim-loci no plural). Muitas vezes a palavra locus é empregada no lugar de gene.

As características qualitativas podem se expressar de várias maneiras. Através da mutação a expressão de um gene pode ser alterada em duas ou mais formas alternativas. A quantidade de formas pela qual um característica pode se exibir é determinada pela quantidade de genes alelos da característica em questão. Como exemplo temos o tipo de película que recobre a ervilha. Existem dois genes alelos para esta característica. Temos um que determina que a película seja lisa, e outro que dá a película uma superfície rugosa. São também somente dois alelos que controlam a presença ou não de chifres em bovinos. Já para a característica cor da pelagem dos animais domésticos e tipos sanguíneos, temos mais de dois alelos, já que existem mais de duas cores de pelagem e mais de dois tipos sanguíneos.

Alguns alelos mostram dominância, ou seja, basta de somente um deles em um dos cromossomos homólogos para que a característica se manifeste. É o caso da ausência de chifres e da pelagem preta no

QUADRO II

Cruzamentos entre homozigotos pretos e mochos com homozigotos vermelhos e chifrudos

Fenótipos	preto e mocho	x	vermelho e chifrudo
Genótipos	BBMM		bbmm
	(homozigoto)		(homozigoto)
Fenótipo	preto e mocho		
Genótipo	BbMm		
	(heterozigoto)		

gado Aberdeen Angus (ver foto 1 e 2) . Já para presença de chifres e para a cor vermelha da pelagem, como são recessivas, é necessário que para que o animal Angus tenha chifres ou seja vermelho, tenha estes genes em dose dupla nos cromossomos homólogos.

Em linguagem genética, um bovino Aberdeen Angus com chifres é um homozigoto, i.é., ele tem o mesmo alelo em cada um dos cromossomos envolvidos. Já um Aberdeen Angus mocho, tanto pode ter os dois cromossomos portando alelos para a ausência de chifres (o que faria dele também um homozigoto), como um cromossomo portando o gene para a ausência e o outro cromossomo portando um gene para a presença de chifres. Este último é um heterozigoto, já que cada um dos cromossomos homólogos tem um alelo diferente para a característica chifre. Os alelos recessivos, como as rugas na película da ervilha e os chifres do

gado Angus, só vão se manifestar em um indivíduo se este for homozigoto. Já ervilhas lisas e bovinos Angus mochos, tanto podem ser homozigotos como podem ser heterozigotos, portadores de genes dominantes e para a presença de chifres que não se manifestam no exterior da planta ou do animal.

No exemplo acima, em linguagem genética, temos dois fenótipos (a presença e ausência de chifres), e três genótipos (indivíduos mochos homozigotos, indivíduos mochos heterozigotos e indivíduos homozigotos com chifres - (ver quadro 2). O fenótipo é qualquer característica mensurável ou peculiaridade individual que um animal ou planta possua, já o genótipo é o conjunto de genes que constituem o indivíduo. O fenótipo de um organismo qualquer, além da parte genética, é influenciado também a influência do ambiente que o rodeia. O fenótipo é portanto o genótipo que determina

Foto 2: A esquerda temos uma vaca exemplar da raça Aberdeen Angus com a pelagem típica da raça. A vaca à esquerda é uma vaca de pelagem vermelha da raça Red Angus. A pelagem vermelha é recessiva. Esta variação de pelagem é semelhante à da raça holandesa, onde o preto é dominante e o vermelho recessivo.

erência, o desenvolvimento e a produção de um animal ou planta, e os fatores ambientais (clima, alimentação, manejo etc.). O geneticista, naturalmente se preocupa apenas pelo genótipo, mas obrigado a usar o fenótipo para avaliá-lo. Para comparar o genótipo de um animal com outro, é preciso determinar a influência que os fatores ambientais tiveram na diferença entre os dois, além de saber avaliar a presença ou não de genes recessivos.

AS CARACTERÍSTICAS QUANTITATIVAS OU MÉTRICAS

O espetacular salto na produtividade animal que a genética conseguiu a promover nos últimos 50 anos tem pouco a ver com o melhoramento das características qualitativas do animal. Com exceção dos genes, onde o exterior ainda é um dos principais atrativos comerciais para o animal, a grande contribuição para a pecuária veio das características quantitativas que são aquelas que controlam as características economicamente importantes tais como o ganho de peso dos animais, produção de leite, produção de ovos etc. Estas, ao contrário das características qualitativas, tem vários genes envolvidos (vez 10 a 100 ou mesmo mais), e o meio ambiente exerce uma influência muito maior, aumentando o efeito do componente genético. A expressão das características quantitativas se deve a uma combinação de genes em vários loci. A produção de leite é afetada pela habilidade do animal para se adaptar ao clima, de digerir alimentos, reproduzir, pela maneira como o animal fraciona a energia obtida na alimentação na produção dos vários produtos (músculo, gordura ou leite) etc.. É importante que a produção de leite é o resultado da ação conjunta dos genes que regulam todos estes atributos da lactação. Chamamos a isto efeito aditivo dos genes. No caso de uma herança aditiva, como a produção de leite, não existem

efeitos de dominância e a influência do meio ambiente na expressão das características é muito maior.

CRUZAMENTO OU SELEÇÃO ?

Uma espécie doméstica, como os bovinos que se difundiram em uma enorme área geográfica, teve diversos grupos desta população isolados no tempo e no espaço, por um período grande de tempo. Além deste isolamento, outras forças, como a mutação, a seleção natural e principalmente, a seleção feita pelo homem foi dividindo a espécie em várias raças. O pecuarista inglês Robert Bakewell (fundador do gado Longhorn) que desenvolveu a seleção racial genealógica consanguínea, usava cruzamentos consanguíneos para fixar o tipo racial e determinadas características funcionais. Os acasalamentos intraraciais e consanguíneos foram levando aquelas populações a homozigose i.é., e diminuindo a frequência com que certos alelos apareciam dentro de cada raça diferenciando ainda mais uma raça da outra nas suas características qualitativas e quantitativas. Este processo se repetiu ao redor do mundo. O gado Nelore é branco (com menor frequência rosado) mas nunca vermelho ou chitado como o Gir, que tem um maior número de alelos para as pelagens que a raça pode apresentar. O mesmo ocorre com as características quantitativas destas duas raças. O Gir, em média, produz mais leite do que o Nelore, que tem maior facilidade que o Gir para criar bezerros.

O aumento da homozigose nas populações, que surge com acasalamentos consanguíneos, favorece o aparecimento do efeito dos genes recessivos. Muitos destes genes são deletérios, levando a perda do vigor do animal e diminuindo seu desempenho produtivo. Por isso quando cruzamos duas linhagens consanguíneas (ou duas raças distintas) geralmente produzimos indivíduos heterozigotos vigorosos, que se adaptam com facilidade ao meio, resultando em

EM BUENOS AIRES

NOVO FLAT

5 ESTRELAS

FRENTE A PALERMO E SOCIEDAD RURAL
5' DO AEROPORTO E 10' DO OBELISCO

SOLARIUM • SAUNA
GIMNASIO • T.V.
AR CONDICIONADO
CONFEITARIA
RESTAURANTE

Garage - Serviço de mucama

O MAIS AVANÇADO
EM CONFORTO

PROMOÇÃO ESPECIAL

Suite 2 Pax	u\$s	90.-
Suite 4 Pax	u\$s	130.-
Suite 6 Pax	u\$s	180.-

Fray Justo S. M. de Oro 2747, Tel. 777-9622
Reservas 777-9633/44 775-9911 Fax 775-9911
1425 Buenos Aires, ARGENTINA

SEMENTES:

MILHO HÍBRIDO
MILHO FORRAGEIRO BR-126
CAPIM TANZÂNIA
BRACHIÁRIA BRIZANTHA
SORGO FORRAGEIRO
ALFAFA CRIOLA

SELEGRAM

FONE: (0182) 61-1728
FAX: (0182) 61-1163

um aumento na produção. Este vigor do indivíduo heterozigoto é chamado de vigor híbrido, e este aumento de adaptação do indivíduo ao meio é chamada de heterose.

A heterose constitui uma forte ferramenta na mão dos geneticistas. O aumento da produção gerado pela heterose, é a base dos cruzamentos como estratégia do melhoramento gené-

tic. Na avicultura quase todo melhoramento genético é feito através dos cruzamentos de linhagens altamente consanguíneas. Na suinocultura uma grande parte dos programas genéticos se fia da heterose. Na bovinocultura ela é especialmente utilizada para aumentar a adaptabilidade de raças européias altamente especializadas às condições desfavoráveis dos trópicos.

A grande vantagem do uso de cruzamento no melhoramento genético é que eles são simples de serem executados e com uma geração já podemos usufruir do trabalho do melhoramento. A grande desvantagem é que o efeito da heterose diminui ou mesmo desaparece na geração seguinte. Somos sempre obrigados a voltar as duas linhagens ancestrais para poder continuar desfrutando dos efeitos do vigor híbrido.

O melhoramento das características quantitativas se dá por meio da seleção. A desvantagem deste modelo de melhoramento em relação aos cruzamentos é que ela é mais complicada, necessitamos de uma grande quantidade de animais e algumas características necessitam um grande intervalo de gerações para poder trazer benefícios ao rebanho. A grande vantagem é que este ganho genético vai se acumulando de geração em geração. Foi este modelo de seleção que permitiu o espetacular progresso genético dos bovinos de origem européia nos últimos 50 anos.

Vários programas de melhoramento incluem a combinação de seleção e de cruzamentos. As raças sintéticas, como o Santa Gertrudis, Canchim, Australian Milking Zebu etc., começaram com os cruzamentos entre duas ou mais raças, e depois dentro de cada raça se iniciou um programa de seleção. Al-

guns sistema de cruzamento em a seleção dentro das raças para aumentar ainda mais a produtividade. Outros são ainda flexíveis. Na década de 50 o geneticista norueguês Skjervold desenvolveu o conceito de raça aberta, uma raça que era a soma de mais de uma raça, melhora apenas para as características funcionais, e sempre aberta a genes novos de outras raças pudessem incrementar ainda a produtividade.

A genética pode ter se desenvolvido como ciência nas últimas décadas, mas a relação entre os animais ainda esta longe da objetividade. Os brasileiros herdaram dos indianos a paixão de transformar animais em obras de arte. Os americanos e europeus transformam as máquinas em pouco valor em produtos de qualidade, por isso constantemente aquelas que são mais eficientes. Para se desentender os aspectos exterior do animal bastam as leis de Mendel, busca a rentabilidade recorrendo a Mendel e Jay Lush. Os programas constituem, como os marajás nos que os inspiram, uma "cracia" que visa o refinamento e seu produto é orientado para uma elite. A segunda etapa é mais "burguesa", e objetiva a democratização de seu produto ganhar na economia de escala.

Não podemos sempre olhar para um bovino como uma peça pendurada em um aquecedor de parede, balde transbordando de leite, também não podemos criar animais como animais que enfeitam as pastagens e os pavilhões das exposições. A genética pode estar a um passo de uma virada. Com a abertura de fronteiras as carnes do sul naturalmente, quem vai determinar quem da genética serão mais empregados em nossos rebanhos será o mercado. Mas isto também é uma hipótese. A genética animal é ainda daquelas áreas da ciência que a paixão derrota a razão.

INTEGRAÇÃO MERCOSUL

Alejandro Tachella Costa &
Associados de Argentina

Oferece na Estrada do Mercosul

- 1) Importante estabelecimento GANADERO excelente y totalmente equipado com ganado e cabana 12.000 hectaras. OPORTUNIDAD!!!
- 2) 10.000 hectaras zona algodoeira.(muy y bueno)
- 3) 20.000 hectaras na estrada do Mercosul para cria e invernada em aluguel. OPORTUNIDAD!!!
- 4) Sement e Reprodutores de todas as RAÇAS.

Dirigir-se: Sarmiento,846 Sp. "C"
(CP 1041) -

Telefone: 00541-325-2212/2262/
2384/2705 -

Fax: (00541-326-3205 -
Buenos Aires - Argentina

CRUZAMENTOS EM GADO DE CORTE

Kepler Euclides Filho⁽¹⁾

1-INTRODUÇÃO

Apesar dos grandes avanços últimos anos em novas técnicas que, sem dúvida, irão contribuir como importantes ferramentas para o melhoramento de bovinos de corte, suas incorporações ao sistema produtivo são lentas. Além disto, o desenvolvimento de novas metodologias de seleção do mérito genético dos animais, o melhor conhecimento das vantagens e desvantagens de cada raça e os resultados já alcançados com seleção e cruzamento mostram que esta forma tradicional, usando-se ou não ferramentas modernas, continuará sendo, por um tempo, meio seguro de selecionar animais mais produtivos e resistentes que venham compor as bases de produção de gado de corte que sejam competitivos e rentáveis.

O cruzamento tem sido utilizado em diversas espécies de animais domésticos como forma de produzir carne, leite ou ovos. É um método utilizado quando a produção é determinada geração de indivíduos envolve o acasalamento de dois ou mais raças. O cruzamento de gado de corte e, em outras espécies de animais explorados economicamente, tem como vantagens desejáveis: I) formação de heterose ou vigor híbrido; II) combinação de méritos genéticos de diferentes raças em um indivíduo, e III) possibilidade

de incorporação de material genéticos desejável de forma rápida.

2 - ESCOLHA DO SISTEMA DE CRUZAMENTO

Existem várias formas de se desenvolver programas de cruzamentos, as quais são denominadas de sistemas de cruzamentos. É importante salientar, no entanto, que nenhum sistema é adequado para todos os rebanhos ou sistemas de produção. A escolha deles vai depender de diversos fatores, tais como: 1) ambiente, 2) exigência de mercado, 3) mão-de-obra disponível, 4) nível gerencial, 5) sistema de produção, 6) viabilidade de uso de inseminação artificial, 7) objetivo do empreendimento, 8) número de vacas, e 9) número e tamanho dos pastos.

Ao se iniciar um programa de cruzamentos o que se busca normalmente é um ou mais dos seguintes benefícios:

- utilizar da heterose;
- usar as diferenças entre raças, no que diz respeito ao mérito genético aditivo, de forma a sincronizar características de desempenho e adaptabilidade dos recursos genéticos com os recursos de clima, alimentação, manejo e outros.
- usar da "complementariedade" quando se utiliza raças de touros com grande potencial para crescimento e produção de carne, sobre vacas mestiças de pequeno/médio portes, o chamado cruzamento terminal;
- formação de novas raças, ou de novos grupos genéticos.

Em qualquer destas situações, no entanto, a superioridade dos mestiços requer pelo menos uma das três mudanças em relação à população dos pais: I) maior frequência de genes com efeitos médios favoráveis; II) maior frequência de heterozigose nos loci com algum grau de dominância e, III) melhor adaptabilidade dos mestiços a situações particulares de produção e/ou de mercado.

3 - BASE GENÉTICA DA HETEROSE E CÁLCULO DA HETEROZIGOSE

Heterose é definida como sendo a diferença entre a média do parâmetro avaliado (fenótipo) nos indivíduos oriundos do cruzamento, os mestiços, e a média deste mesmo parâmetro medido nos pais, e é calculada segundo a seguinte fórmula:

$$Ht = \frac{\text{Média dos mestiços} - \text{média dos pais}}{\text{média dos pais}} \times 100$$

A teoria que suporta a existência do efeito heterótico, define que só haverá heterose quando houver diferença em frequência gênica entre as raças envolvidas no cruzamento, e o efeito de dominância entre alelos não for zero. Se qualquer destas situações deixar de existir, a heterose será nula. Isto pode ser melhor entendido se considerarmos que as raças, durante o processo de formação, permaneceram isoladas, e sendo submetidas a pressões de seleção variável, tanto artificial, quanto natural. Este processo

(1) - M.D., Ph.D., CREA No. 12153/D. Visto 1466/
 INVIAR CENTRO Nacional de Pesquisa de
 Gado de Corte, Caixa Postal 154, CER79002-070,
 Jaguariúna, MS.

resultou em alguma consanguinidade, que juntamente com a flutuação aleatória na frequência gênica contribuiu para a fixação de alguns homozigotos. Estes homozigotos produzidos tanto podem ser de genes com efeitos indesejáveis, quanto de genes cuja combinação heterozigótica produzia resultados favoráveis.

Assim, parece muito pouco provável que as diferentes raças tenham tido os mesmos alelos indesejáveis fixados na forma homozigótica. Isto será tanto mais verdade quanto mais distantes na origem e mais separadas espacialmente forem as raças.

Desta forma, ao se cruzar raças diferentes, as progênes terão os efeitos deletérios dos genes recessivos encobertos pelos genes dominantes e maior taxa de heterozigose. De fato, resultados experimentais com gado de corte tem possibilitado a conclusão de que a heterose existe em níveis variáveis dependendo da característica, e que é maior quando o cruzamento envolve raças zebuínas com européias. Alguns resultados, principalmente obtidos no MARC (Meat Animal Research Center - Nebraska, USA), têm sugerido ainda, que a retenção de heterose em gerações sucessivas tem sido proporcional à retenção de heterozigose, para a maioria das características de importância econômica em gado de corte. Portanto, conhecendo-se a heterozigose tem-se uma estimativa da heterose.

A heterozigose pode ser calculada por:

$$H_z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m S_i C_j$$

onde i é diferente de j ;

H_z = heterozigose;

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m$ representa o somatório dos produtos da composição genética do pai relativa à raça "i" pela composição genética da mãe relativa à raça "j";

S_i = composição genética do pai relativa à raça "i" ($i=1,2,\dots,n$);

C_j = composição genética da mãe relativa à raça "j" ($j=1,2,\dots,n$).

Exemplificando, suponhamos um cruzamento entre touros da raça A com vacas da raça B. Neste caso teremos:

para S_i , $A=1$ e $B=0$

para C_j , $A=0$ e $B=1$.

logo,

$$H_z = (1 \times 1) + (0 \times 0) = 1 \text{ ou } 100\%$$

Desta forma, a progênie de tal cruzamento apresentaria 100% de heterozigose. Heterozigose para cruzamentos envolvendo maior número de raças ou envolvendo animais mestiços, apesar de mais complexos, é obtida diretamente pelo uso da fórmula.

É importante salientar, contudo, que ao se promover cruzamentos esta-se não só utilizando ou procurando utilizar os benefícios da heterose, mas também, como mencionado anteriormente, combinando, nos produtos, características desejáveis das raças envolvidas. Assim, é que produtos de cruzamentos *Bos taurus* com *Bos indicus* incorporam, relativo ao *Bos taurus*, vantagens como maior precocidade, maior potencial de crescimento, melhor acabamento de carcaça; e com relação ao *Bos indicus*, maior adaptabilidade, boa habilidade materna, e maior resistência a parasitos. Características estas, que as raças puras de ambas espécies não apresentam em conjunto.

4 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS RAÇAS BOVINAS DE CORTE

Ao se decidir por cruzamentos, após analisados os itens mencionados em 2., é importante conhecer o que se deseja como produto final, e qual ou quais raças possuem as características desejáveis para que possam se comple-

mentar.

Quanto as características gerais, as raças bovinas podem ser divididas em grandes grupos: 1) raças britânicas, 2) raças européias de grande porte ou raças continentais, 3) raças zebuínas e, 4) raças europeias adaptadas a clima tropical.

Raças britânicas - representantes deste grupo, quando criadas em ambientes propícios, expressam alta taxa de sobrevivência, altas taxas reprodutivas e de crescimento, e são capazes de produzir carne de ótima qualidade. Como vantagens, pode-se mencionar que são detentoras de problemas de parto distócicos, muita gordura, altos pesos, e a taxa de crescimento é menor que aquela de raças zebuínas continentais. Conseqüentemente, apresentam taxa de conversão alimentar menor, e menor peso adulto das vacas destas últimas. As vacas apresentam cerca de 500 a 600 Kg de peso adulto, e os machos, de 800 a 1.000 Kg.

Raças européias de grande porte - este grupo caracteriza-se pelo alto potencial de crescimento, boa conversão alimentar, alto rendimento de abate, e carcaça com pouca gordura. Entretanto, apresentam problemas de parto distócicos, peso adulto elevado; como resultado, são animais de grande exigência de energia para manutenção. As vacas apresentam, em peso adulto de 700 a 800 Kg, enquanto que para os machos a média está em torno de 1.000 a 1.200 Kg.

Raças zebuínas - os representantes deste grupo comparativamente às raças européias britânicas ou continentais, apresentam baixas taxas de crescimento, baixos índices reprodutivos, e carcaça com pouca aceitabilidade, principalmente por produzir carne dura. Por outro lado, apresentam excelente taxa de sobrevivência, boa habilidade materna, e são tolerantes a parasitos e a altas temperaturas. As vacas adultas tem, em média, de 350 a 400 Kg e os machos de 600 a 700 Kg.

Raças européas adaptadas ao tropical - neste grupo entram-se todas as raças "crioulas" da América do Brasil, incluindo ainda, representantes de outros continentes. Pelo processo de seleção natural pelo passar-se por séculos vivem-se hoje, em animais que têm algumas características das raças européas e outras, especialmente aquelas relacionadas à adaptabilidade, de raças locais. As vacas adultas têm um peso médio de, aproximadamente, 350 a 450 Kg e os machos de 600 a 700 Kg.

5 - SISTEMAS DE CRUZAMENTO

Técnicamente, um sistema de cruzamento ideal deveria preencher seguintes requisitos: a) permitir que as fêmeas de reposição sejam produzidas no próprio sistema. Isto evita a aquisição de fêmeas de outros rebanhos, que não possuem um bom programa de seleção, e evita introduzir material genético de baixa qualidade. A seleção das fêmeas puras e dos mestiços é extremamente importante no cruzamento e será discutido mais a frente; b) possibilitar o uso de fêmeas de reposição. Isto se deve ao fato de que a heterose combinada resulta em um aumento na produção de quilogramas de bezerras desmamadas; c) evitar efetivamente a heterose; d) não interferir com a seleção; e) possibilitar que tanto machos quanto fêmeas sejam adaptados ao ambiente onde eles e suas progênie são criados.

Basicamente os cruzamentos podem ser classificados em três tipos: I) cruzamento simples, II) cruzamento contínuo e, III) cruzamento rotacionado ou alternado.

I) Sistema de cruzamento simples é definido como sendo o cruzamento envolvendo somente duas raças com produção da primeira geração de mestiços, os machos e fêmeas são destinados ao abate. Neste caso, há necessidade de uma parte do rebanho de fêmeas

seja mantido como rebanho puro para produção de fêmeas de reposição, tanto para o próprio rebanho puro quanto para aquele que produzirá os mestiços. Neste caso a proporção do rebanho total de fêmeas que deve participar do cruzamento é importante para que se possa promover seleção. Caso contrário, estas fêmeas tem de ser adquiridas de outros criadores. O esquema deste é mostrado no Quadro 1.

Quadro 1 Esquema de cruzamento simples, composição genética dos pais e progênie, e heterozigose.

COMPOSIÇÃO GENÉTICA				HETEROZIGOSE (%)
PAI	MÃE	PROGÊNIE		
A	B	A	B	
100	100	50	50	100

II) Cruzamento contínuo - também chamado de cruzamento absorvente, tem a finalidade de substituir uma raça ou grau de sangue por outra, pelo uso contínuo desta segunda, produz animais conhecidos como "puros por cruzar" ou PC. O esquema deste cruzamento pode ser encontrado no Quadro 2.

QUADRO 2 Esquema de cruzamento contínuo, composição genética dos pais e progênie, e heterozigose

COMPOSIÇÃO GENÉTICA					HETEROZIGOSE (%)
PAI	MÃE		PROGÊNIE		
A	A	B	A	B	
100	100	100	50	50	100
100	50	50	75	25	50
100	75	25	87	13	25
100	87	13	94	6	13
100	94	6	97	3	6
100	97	3	98	2	3
100	98	2	99	1	2

III) Cruzamento rotacionado ou alternado contínuo - é aquele em que a raça do pai é alternada a cada geração. Pode ser de duas ou mais raças. Neste caso, é importante que as raças sejam semelhantes para algumas características como tamanho corporal e produção de leite, por razões que serão discutidas mais a frente e se relacionam com adequação do

genótipo ao ambiente geral. Os Quadros 3 e 4 contêm os esquemas de cruzamentos rotacionados de duas e três raças, respectivamente. Cada um destes sistemas de cruzamento pode apresentar variações, sendo as mais importantes discutidas a seguir.

A dificuldade de se implementar um bom programa de inseminação artificial em muitas propriedades, induz a estratégias que possibilitem o uso de monta natural. Neste caso, pode-se distinguir dois tipos: a) uso de touros F1 e, b) uso de touros puros de raças européas em monta natural, alternando-se a raça de reprodutor a cada dois ou três anos.

O primeiro caso pode ser enquadrar tanto no sistema simples quanto no rotacionado (Quadro 5). Neste caso, como em qualquer situação onde se busca melhoria genética, a avaliação correta dos indivíduos a serem utilizados como reprodutores é de extrema importância para garantir o sucesso do empreendimento.

Quanto ao segundo caso, uso de touros de raças européas em monta natural, o problema maior reside nas dificuldades de adaptação destes animais às nossas condições, lembrando que sua utilização seria feita na época quente do ano, e, de aquisição de animais em quantidade e qualidade necessárias ao sucesso do programa.

Um outro tipo de cruzamento é o cruzamento terminal - caracteriza-se pelo abate de machos e fêmeas oriundos do cruzamento; e se constitui em um esquema de acasalamento que pode participar tanto do sistema de cruzamento simples quanto do rotacionado. No primeiro caso, todos os produtos F1 seriam abatidos, constituindo-se no próprio cruzamento simples, enquanto que no segundo, parte das fêmeas, as mais novas, seriam mantidas em um sistema rotacionado, e as outras seriam acasaladas com um touro terminal. Estes últimos produtos

Quadro 3 Esquema de cruzamento rotacionado de duas raças, composição genética dos pais e progênie, e heterozigose

COMPOSIÇÃO GENÉTICA						HETEROZIGOSE (%)
PAI		MÃE		PROGÊNIE		
A	B	A	B	A	B	
100	-	100	50	50	50	100
	100	50	50	25	75	50
100	25	75	63	37	63	75
	100	63	37	31	69	63
100	31	69	66	34	66	69
	100	66	34	33	67	66
100	33	67	67	33	67	67
	100	67	33	33	67	67

Quadro 4 Esquema de cruzamento rotacionado de três raças, composição genética dos pais e progênie, e heterozigose

COMPOSIÇÃO GENÉTICA									HETEROZIGOSE (%)
PAI			MÃE			PROGÊNIE			
A	B	C	A	B	C	A	B	C	
100	-	-	100	50	50	50	50	-	100
	100	-	50	50	25	25	50	-	100
	100	100	25	25	12	62	25	75	75
100	-	-	12	62	25	56	31	12	88
	100	-	56	31	12	28	16	56	88
	100	100	28	16	56	14	58	28	84
100	-	-	14	58	28	57	29	14	86
	100	-	57	29	14	29	14	57	86

Quadro 5 Esquema de um sistema de utilização de touros F1 em um cruzamento rotacionado, composição genética dos pais e progênie, e percentagem esperada de heterozigose

COMPOSIÇÃO GENÉTICA									HETEROZIGOSE (%)
PAI			MÃE			PROGÊNIE			
A	B	C	A	B	C	A	B	C	
100	-	-	100	50	50	50	50	-	100
50	50	-	50	50	50	50	25	25	75
50	50	-	50	25	25	50	38	12	62
50	50	-	50	38	12	50	19	31	69
50	50	-	50	19	31	50	34	16	66
50	50	-	50	34	16	50	17	33	67
50	50	-	50	17	33	50	33	17	67

seriam todos abatidos. Este tipo de cruzamento tem o objetivo de utilizar vantagens de rápido crescimento e boa taxa de conversão. Isto porque, em cruzamentos terminais, utiliza-se normalmente como touro terminal animais de raça de grande porte.

Formação de populações compostas - este tipo de cruzamento pode envolver duas ou mais raças (Quadro 6 e 7). Após a formação da raça Santa Gertrudis,

Quadro 6 Esquema de cruzamento para formação de população composta envolvendo três raças, composição genética dos pais e progênie, e percentagem esperada de heterozigose

COMPOSIÇÃO GENÉTICA									HETEROZIGOSE (%)
PAI			MÃE			PROGÊNIE			
A	B	C	A	B	C	A	B	C	
100	-	-	100	50	50	50	50	-	100
100	-	-	100	50	50	50	50	-	100
50	50	-	50	50	50	50	25	25	75
50	25	25	50	25	25	50	25	25	62

este tipo de cruzamento se expande seguindo sempre a mesma ordem desta primeira, iniciando-se com um cruzamento rotacional, e em seguida de determinado grau de sangue normalmente 5/8 europeu e 3/8 zebu, estabelecia-se o cruzamento *inter se* ou *inter raças*, que consiste no cruzamento de machos e fêmeas do mesmo grau de sangue. Várias populações foram formadas dentro desta categoria, como, Ibagé, Canchim, Figueiras, Brangus, Belmonte e outras.

A discussão destes esquemas de cruzamento não precisa ser exaustiva nem apresentar todos os tipos possíveis, uma vez que as combinações podem ser muitas para atender a situações particulares. O que se pretende é mostrar alguns esquemas que vem sendo utilizados, em uma forma ou de outra.

Como mencionado anteriormente, não existe nenhum sistema ou tipo de cruzamento que seja adequado a qualquer situação. Vários são os fatores que devem ser considerados quando da decisão

Quadro 7 Esquema de cruzamento para formação de uma população composta envolvendo quatro raças, composição genética dos pais e progênie, e percentagem esperada de heterozigose.

COMPOSIÇÃO GENÉTICA												HETEROZIGOSE (%)
PAI				MÃE				PROGÊNIE				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
100	-	-	-	100	50	50	50	50	50	50	50	100
	100	-	-	100	50	50	50	50	50	50	50	100
50	50	-	-	50	50	50	50	25	25	25	25	100
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	75

zarr. Cada tipo de cruzamento rotacionado apresenta suas vantagens e desvantagens, que, associadas a outros fatores de decisão, deverão nortear o produtor.

6 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS DIFERENTES TIPOS DE CRUZAMENTOS

Cruzamento rotacionado - este sistema de cruzamento atende às condições necessárias ao bom funcionamento de cruzamentos, no entanto, aplica-se em nosso meio, evidências de sucesso limitado com este sistema, o que possivelmente leva a variação entre gerações em termos de requerimentos nutricionais e de manejo. Isto, principalmente pelo fato de que, mais recentemente, a maioria dos cruzamentos no Brasil envolve uma raça, predominante o zebu, e uma raça européia de porte e/ou maior produção de leite. O resultado deste procedimento é que gerações subsequentes, com maior ou menor grau de sangue europeu apresentam maior ou menor requerimento nutricional que a geração anterior. Gerações semelhantes podem ocorrer em termos de manejo de diferentes gerações. Isto, além de causar transtornos de manejo, causa variações na produtividade, ou seja, promove variação nos níveis de desempenho de vacas e bezerros.

Uso de touros F1 - a utilização deste esquema de cruzamento, quer seja em sistema de cruzamento simples, quer seja em sistema rotacionado, resultará em nível de heterozigose inferior aos obtidos com reprodutores puros. No entanto, para condições de uso de inseminação não é aconselhável ou desejável, e a utilização de monta natural com touros europeus puros é inviável, pois a utilização é apropriada. Além disso, possibilita uso máximo de touros para fertilidade de machos, o que contornaria problemas de baixa libido e avançada idade a reprodução, comuns em raças puras. É de fácil manejo, flexível

quanto à troca de raça européia para eventuais ajustes para adaptação às condições de mercado ou de produção.

Formação de populações compostas - o desenvolvimento de programas de cruzamento com este objetivo teve grande impulso há 4-6 décadas, e hoje tem sido retomado dentro de uma nova visão, e com novas bases, em função de evidências experimentais obtidas, principalmente pelo MARC em Nebraska, USA. Tais resultados confirmam que, em gado de corte, retenção de heterose esta associada a retenção de heterozigose. Assim, raças constituídas pela combinação de outras, também poderiam reter altos níveis de heterose tanto materna quanto individual. Possivelmente haverá ainda, como benefício adicional, heterose para fertilidade de machos.

Esta opção é uma alternativa à complexidade apresentada pelos cruzamentos rotacionados. Após a formação da população composta desejada, o manejo é idêntico aquele para rebanho puro e, como tal, pode ser também utilizado em pequenos rebanhos.

É importante salientar, no entanto, que para se evitar consanguinidade na população formada, e manter altos níveis de heterozigose, faz-se necessário ampla base genética para cada uma das raças envolvidas, ou seja os representantes de todas as raças envolvidas na formação da composta devem ser animais de um grande número de touros geneticamente diferentes.

Cruzamento terminal - também chamado cruzamento industrial, possibilita uso máximo da heterose e da complementariedade. Além disto, viabiliza grande flexibilidade na escolha da raça terminal, o que garante rápidos ajustes a demandas de mercado ou a imposições do sistema de produção. É um esquema vantajoso para produção de animais a serem terminados em condições favoráveis, principalmente no que se refere a alimentação, como pastagens de boa qualidade ou

confinamento, uma vez que este cruzamento resulta em animais que apresentam altas taxas de ganho e altos pesos à terminação. No entanto, pelo fato de se abater fêmeas, é de aplicação limitada na pecuária como um todo. No entanto, é importante, neste caso, ressaltar que apesar de o uso de fêmeas F1 possibilitar usufruir dos benefícios da heterose materna, ao se utilizar estas fêmeas para acasalamento com touros terminais, faz-se necessário manter parte do rebanho total de fêmeas como rebanho puro. Isto tem a finalidade de produzir fêmeas de reposição, tanto para produção das F1s quanto para a substituição das puras.

Rotacionado terminal - neste caso, 45-50% das fêmeas são acasaladas em um sistema rotacionado com a finalidade de se produzir fêmeas de reposição. As fêmeas restantes, as mais velhas, são acasaladas com touro terminal. Este esquema combina as vantagens de altos níveis de heterose do sistema rotacionado com as vantagens da complementariedade advindas do touro terminal. É, no entanto, um esquema complexo, exigindo grande capacidade gerencial e boa mão-de-obra.

7 - CRUZAMENTO VS SELEÇÃO

O fato de o cruzamento se constituir em uma forma rápida, e muitas vezes econômica, de produzir carne bovina não elimina a necessidade, nem diminui a importância da seleção como método de melhoramento genético a ser realizado concomitantemente. Raças puras melhoradas são, na verdade, elementos fundamentais ao sucesso do cruzamento.

A seleção, além de fundamental na melhoria das raças puras, tem de ser componente essencial em um programa de cruzamentos. Cruzamento sem seleção resultará em vantagens facilmente superáveis pela seleção em raça pura (Figura 1)

8 - O AMBIENTE E SUA IMPORTÂNCIA NO MELHORAMENTO GENÉTICOS DE BOVINOS DE CORTE

A característica, qualquer que seja ela, peso, volume, medidas corporais, taxa de fertilidade, cor de pelagem; e qualquer que seja a forma de mensura-la é chamada de fenótipo. O fenótipo, como o medimos, é uma expressão do genótipo (constituição genética) do indivíduo para aquela característica mais o componente de ambiente (clima, alimentação, manejo, saúde, etc.). Assim, representando-se fenótipo, genótipo e ambiente por P, G e E, respectivamente, tem-se que:

$$P = G + E \quad (1)$$

No entanto, determinados genótipos resultam em fenótipos distintos em diferentes ambientes. A isto, chama-se interação genótipo-ambiente que pode ser representado por GE. Desta forma, a equação 1 transforma-se em:

$$P = G + E + GE \quad (2)$$

Ao se medir os componentes de variância, que são importantes do ponto de vista genético, o componente de interação cria uma fonte de variação adicional e a equação 2 torna-se:

$$VP = VG + VE + VGE \quad (3)$$

Quanto mais distantes forem os genótipos e/ou ambientes, mais

marcante e fácil de identificar será o efeito desta interação. Esta interação pode se expressar de diferentes formas e intensidades, sendo que a mais extrema pode ser representada pela seguinte condição.

Comparando-se duas raças, A e B, em dois ambientes X e Y, observa-se que enquanto a raça A foi superior a B no ambiente X, a raça B

foi no ambiente Y (Figura 2).

Outra relação importante envolvendo genótipo e ambiente surge pelo tratamento diferenciado

dado a determinados indivíduos, ou genótipos, como é o caso, por exemplo, de vacas leiteiras de alta produção que recebem suplementação concentrada em altos níveis. Outro exemplo comum, em gado de corte, é o tratamento diferenciado concedido a filhos de determinados touros que recebem leite de ama-seca e suplementação concentrada no cocho. Esta condição também altera a fórmula 2, pois ela cria uma correlação entre genótipo e ambiente. Neste caso, a variância fenotípica seria acrescida de duas vezes a covariância entre genótipo e ambiente, e a fórmula 3 seria:

$$VP = VG + VE + 2 COVGE \quad (4)$$

onde, COVGE representa a covariância entre genótipo e ambiente e é originada da maior semelhança entre estes indivíduos do que seria sob tratamentos aleatórios.

A existência destas relações,

principalmente da interação compreensão, é importante tomada de decisão de qual animal (raça ou cruzamento) pois como já foi mostrado, a escolha não pode estar dissociada do ambiente.

No Brasil, o ambiente de criação caracteriza-se por pastagens com predominância de gramíneas tropicais que são de baixa qualidade quando comparadas as gramíneas temperadas. As condições ambientais são: I) altas temperaturas; II) alta radiação; III) solos pobres; IV) solas pobres; V) flutuação sazonal da produção forragem, tanto em quantidade quanto em qualidade; VI) presença de parasitos intestinais externos.

Assim, ao se iniciar um programa de cruzamentos é impossível verificar, além dos itens mencionados em 2, a combinação de raça que é adequada, e o que se modificar no ambiente. Em outras palavras, há necessidade de buscar um biótipo adequado à condição de criação e ao meio.

Em um sistema cuja finalidade é produzir carne, nem sempre os animais pesados serão a solução. A função objetiva deve ser produzir carne de boa qualidade, e não o que nem sempre é conseguido com animais grandes, principalmente se a meta deve ser alta produção considerando-se produção sustentável em sistemas de produção sustentados.

9 - DEMANDA/AMBIENTE VS ESCOLHA DO SISTEMA DE CRUZAMENTO

Serão considerados dois exemplos enfocando demanda de mercado e ambiente.

SITUAÇÃO I:

Mercado exige carne de gado desmamado, que será terminado em confinamento, para ser abatido com, aproximadamente, 18 meses de idade. O sistema de produção tem, nos componentes alimentação solo e clima.

...ntes informações: região de ... do Brasil Central, solos ... precipitação de aproxima- ... 1300-1500 mm distri- ... dos de setembro a março, ... de *Brachylaria decum-* ... e como suplementação ... , somente a mineral.

A análise desta condição ... identificar que a exigência ... mercado é por um animal que ... alta taxa de ganho em ... boa conversão alimentar e alto ... à desmama. Prosseguindo a ... é possível identificar as ... continentais como sendo ... Assim, cruzamentos ... tais raças seria a ... opção a ser estudada.

Analisemos um sistema de ... zamento alternado contínuo de ... raça zebuína com uma Neste caso, as fêmeas ... produzidas seriam, a semelhança ... machos, de grande porte, ... tardias, e apresen- ... grande exigência de Estas fêmeas, nas ... do exemplo, podem ... baixa taxa de fertilidade, ... pesos dos bezerras desma- ... produzidos podem não ser ... economicamente interessantes. ... mais maiores e de maior ... de manutenção terão de ser ... dados numa taxa de lotação ... baixa, caso contrário, pode ... superpastejo e degradação das Lotação baixa pode ... em menor produção/ha/ano. ... situação é representada na ... Figura 3.

Analisemos agora uma outra ... para a situação 1. Cruza- ... de raças britânicas para ... de fêmeas F1 que serão

de menor porte, apresentam boa fertilidade e menor exigência de manutenção. No entanto, o cruzamento alternado entre raças zebu e britânica não atenderia a demanda do mercado; poder-se-ia, sobre estas fêmeas F1, usar touros de raça continental num cruzamento terminal. Estes produtos atenderiam ao mercado (Figura 4). Neste caso, as fêmeas F1 poderiam ser

adquiridas no mercado ou produzidas no próprio sistema, neste caso, os machos F1 teriam de ser destinados a outro mercado pois não atenderiam a demanda.

SITUAÇÃO 2:

Mercado exige animais de carcaça média, bom desenvolvimento muscular, carne com marmoreio e boa cobertura de gordura. O sistema de produção apresenta, além dos componentes descritos para a situação 1, dificuldade no uso de inseminação artificial e o fato de as propriedades possuírem rebanhos pequenos. Frente a esta situação podemos analisar duas opções: uso de touro F1 (zebu-britânica) ou uso de uma raça composta. No primeiro caso, é muito importante salientar que os touros tem de ser adquiridos com "certificado de garantia", ou seja, faz-se necessário que eles sejam provenientes de um produtor que proceda a seleção com critérios eficientes, metodologia adequada e que considere, na seleção, precocidade sexual e produtiva, bom desenvolvimento e conformação. Quanto a segunda opção, uso de raça composta, pode-se sugerir uma combinação que envolva raças

zebuínas, britânicas e uma européia adaptada. Desta forma, poder-se-ia manter uma população com 75% de sangue europeu, no entanto, adaptada, que pode apresentar como vantagem adicional, a produção de carne macia; e 25% de sangue zebu para que, além da resistência, conferisse boa habilidade materna (Figura 5).

10- ALGUNS RESULTADOS DE PESQUISA EM CRUZAMENTO DE *Bos taurus* COM *Bos indicus* NO BRASIL.

A busca por animais de grande porte, com alta taxa de ganho em peso, e consequentemente almejando-se carcaças mais pesadas, talvez seja uma das principais razões que induziram ao uso preferencial de animais de raças européias continentais em cruzamentos no Brasil. Esta tendência tem se modificado ultimamente, e deve alcançar um equilíbrio a medida que os resultados e preferências vão se consolidando e se ajustando e, principalmente, a medida que se compreenda melhor a adequação do binômio genótipo-ambiente.

Para que se possa apresentar uma idéia geral dos resultados procurou-se apresentá-los sob três grandes tópicos: I) eficiência reprodutiva; II) desempenho até o abate e, III) características de carcaça.

I) Eficiência reprodutiva - um dos aspectos mais importantes da produtividade e competitividade da pecuária bovina de corte é, sem dúvida, a eficiência reprodutiva

envolvendo desde precocidade reprodutiva até número de bezerros desmamados passando por intervalo entre partos e sobrevivência dos bezerros até a desmama.

NORTE et al. (1993), em um estudo conduzido para avaliação de animais meios-sangues zebu-Red Angus, observaram uma idade média a primeira concepção de 354 dias. O índice de fertilidade destas novilhas, média de três anos, foi de 94%.

Uma avaliação de idade a primeira concepção, conduzida por JOSÉ et al. (1991) em novilhas Nelore e meios-sangues Guzerá-Nelore, Red Angus-Nelore e Marchigiana-Nelore, indicou que a menor idade foi alcançada pelas novilhas Red Angus-Nelore (26,4 meses). Não houve diferença entre os meios-sangue Guzerá-Nelore e Marchigiana-Nelore (33,8 e 30,5 meses, respectivamente), enquanto que para a Nelore à idade a primeira concepção foi de 38 meses. Maior precocidade de mestiços foi também evidenciada pelos resultados de SILVA & PEREIRA (1986). Estes autores estudaram zebu e mestiços Chianina-zebu (1/2 e 3/4 zebu), e concluíram que as fêmeas meios-sangues foram mais precoces. O maior período de serviço foi observado para o grupo de fêmeas zebu. Os índices de não retorno ao cio foram 73,60 e 63% para as fêmeas 1/2 Chianina-zebu e 3/4 zebu-Chianina e zebu, respectivamente. Superioridade reprodutiva de mestiços esta de

acordo com os resultados de PEROTTO et al. (1994). Estes autores estudaram idade ao primeiro parto e intervalo entre partos de fêmeas Nelore, Guzerá-Nelore, Red Angus-Nelore e Marchigiana-Nelore e observaram para a idade ao primeiro parto, os seguintes valores: 529, 536, 372 e 445 dias, respectivamente; enquanto que para o intervalo entre partos os valores, na mesma ordem, foram: 1360, 1248, 995 e 1096 dias.

Em uma avaliação da eficiência de diferentes grupos genéticos, conduzida por RIBEIRO & LOBATO (1988), utilizando animais 3/4 Red Angus-Devon, 3/4 Charolês-Devon e 1/2 Tabapuã-Devon observou-se que a produtividade, medida por quilograma de bezerros desmamados/número de vacas expostas, favoreceu as vacas 3/4 Red Angus-Devon. Os outros dois grupos não diferiram entre si. Os índices obtidos foram 57, 38, 1 e 40,6, respectivamente, para 3/4 Red Angus-Devon, 3/4 Charolês-Devon e 1/2 Tabapuã-Devon. Diferenças na eficiência também foram observadas por EUCLIDES FILHO et al. (1994). Neste caso, a eficiência foi medida pela relação entre quilogramas de bezerro desmamado e quilogramas de vaca à desmama do bezerro. Os grupos avaliados foram vacas F1 Fleckvieh-Nelore, Charolês-Nelore e Chianina-Nelore e a maior eficiência foi alcançada pelas meios-sangue Fleckvieh-Nelore, 0,41. Os outros dois grupos não diferiram

quanto a eficiência que foi a média, 0,38. ALENCAR et al. (1988), no entanto, estudando a eficiência de fêmeas Canchim-Nelore, não observaram diferenças (0,375 vs 0,378, respectivamente) quando esta eficiência foi medida como Kg de bezerros/Kg de vaca. Entretanto, quando se avaliou a relação Kg bezerros/idade da vaca ao parto, houve superioridade do Canchim.

Objetivando avaliar a produtividade de novilhas, ROSADO et al. (1991a) estudaram três grupos genéticos, Nelore, Chianina-Nelore e Fleckvieh-Nelore (55,8; 57,8 e 83,8%, respectivamente). Resultados concordantes foram observados por ROSADO et al. (1991b) em uma avaliação de vacas de três grupos genéticos, Nelore, Chianina-Nelore, Limousin-Nelore e Fleckvieh-Nelore. Neste caso, os valores observados para taxa de produção foram: 66,7; 78,9; 93,7 e 93,7%, respectivamente.

II) Desempenho do abate - como o objetivo final da bovinocultura é produzir carne, o desempenho dos animais é um componente importante a ser avaliado em um sistema de produção.

De modo geral, os resultados de cruzamentos tem evidenciado vantagens para os mestiços quando se refere a pesos e ganhos em peso. FELTEN et al. (1988), estudando o desempenho de Charolês, Nelore, Charolês-Nelore e Nelore-Charolês, em confinamento verifi-

Dectomax®. Ação maaaaaaaaaaaaaaaaaa

Laboratórios Pfizer Ltda. / Divisão Agropecuária

Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.111 - CEP 07190-916 - Cx. P. 143
CEP 07111-970 - Guarulhos - SP - Tel.: (011) 964-7444 - Telex: 11-65131 - Fax: (011) 964-7444

© DECTOMAX é marca registrada da Pfizer Inc. para Doramectin. © Copyright Laboratórios Pfizer Ltda. 1995. Todos os direitos reservados.

mbos de 1211, 1022, 1158 e
5g para os quatro grupos
genéticos, respectivamente.

Quanto a conversão alimen-
te, no entanto, o Nelore foi superior
aos demais grupos, 6,98; 8,06; 8,35
e 12, respectivamente. Superiori-
dade do Nelore quanto a eficiência
de utilização de matéria seca,
matéria seca e energia bruta foi também
observada por MANZANO et al.
(1986), quando a dieta apresentava
teor de volumoso (relação
volumoso-concentrado de 70:30%).
No entanto, esta tendência inverteu-
se quando as dietas apresentavam
maiores porcentagens de
concentrado (50:50 e 40:60).

LEME et al. (1985), avali-
ando o desempenho de animais
Nelore, Nelore-Canchim, Nelore-
Santa Gertrudis, Nelore-Holandês,
Nelore-Suíço e Nelore-Caracú,
verificaram que a pior conversão
alimentar foi observada no grupo
Nelore-Holandês. Os grupos
Nelore, Nelore Canchim e Nelore-
Santa Gertrudis foram iguais,
quanto que os outros dois grupos

não diferiram dos demais.

Diferenças em conversão
alimentar de diferentes grupos
foram também identificadas por
CARDOSO & SILVA (1986). Estes
autores avaliaram meios-sangues
Charolês-Nelore, Chianina-Nelore
e Fleckvieh-Nelore e o Nelore. Os
resultados obtidos para conversão
alimentar foram: 7,10; 6,58; 7,48 e
7,03 para os quatro grupos gené-
ticos, respectivamente.

RIBEIRO & LOBATO
(1988), avaliando os desempenhos
de bezerros filhos de vacas 3/4
Angus-Devon, 3/4 Chianina-Devon
e 1/2 Tabapuã-Devon, concluíram
que os filhos das vacas meios-
sangues foram os mais pesados à
desmama. Isto, como resultado de
sua maior capacidade de ganho e da
maior produção de leite de sua
mães. Resultados concordantes
foram obtidos por SILVA &
PEREIRA (1986) em uma ava-
liação de fêmeas com diferentes
graus de sangue Chianina-Nelore
(1/2, 1/4 e 5/8).

A avaliação de animais
mestiços Limousin-Nelore e
Charolês-Nelore conduzida por
ALENCAR et al. (1994), possi-
bilitou que os autores concluíssem
não haver diferença para pesos ao
nascimento e a desmama entre os
dois grupos. Por outro lado, os
resultados de SOUZA et al. (1994)
para pesos a desmama de produtos
de vacas Nelore acasaladas com
tours Nelore, Brangus, Simental,
Canchim Gelbvieh, Angus, Brangus
Vermelho e Gir evidenciaram
diferenças entre vários grupos
genéticos, destacando-se, no
entanto, os filhos de Gelbvieh,
Angus e Simental.

Superioridade dos mestiços
foi também reportada por
BARCELLOS & LOBATO (1992a)
em um ensaio conduzido com
animais Hereford e mestiços
Hereford-Nelore. Os mestiços
apresentam maior ganho médio
diário até a desmama, o que,
segundo os autores, foi reflexo da
heterose individual exibida pelos 1/
2 Hereford-Nelore e 3/4 Hereford-

Quem conhece as
vantagens de Dectomax®
sabe que tempo é
dinheiro. Sabe que mais
tempo de ação é mais
saúde. Com apenas uma
aplicação de Dectomax®

seu rebanho está protegido
por mais tempo.
Comprove a ação maaaais
prolongada de Dectomax®.

prolongada.

DECTOMAX®

O MAIS, MELHOR.

pfizer

Nelore. Estes mesmos autores (1992) observaram que os mestiços foram superiores nos pesos à desmama, a um ano e meio de idade. No entanto, esta superioridade foi influenciada pelo grau de sangue, decrescendo quando os indivíduos apresentavam mais de 50% de sangue Nelore.

III) Características de carcaça - a medida que a pecuária de corte se evolui e o mercado consumidor se torna mais exigente, maior atenção tem de ser dada ao produto final da atividade que é a carne. Assim, características de carcaça passam a ser parâmetros importantes na avaliação do sistema de produção.

BOÏN et al. (1994), em um trabalho desenvolvido para avaliação de carcaça de Nelore, South Devon-Nelore, Hereford-Nelore, Angus-Nelore e Caracu-Nelore, não verificaram diferenças entre os grupos genéticos, para rendimento de carcaça. Variações neste parâmetro foram, no entanto, verificadas por LUCHIARI FILHO et al (1985a) em um experimento comparando Nelore, Canchim e Santa Gertrudis. Os resultados indicaram que as raças Canchim e Nelore apresentaram rendimento de carcaça fria iguais e superiores àquele da Santa Gertrudis. Canchim e Santa Gertrudis, no entanto, apresentaram maiores proporções de traseiro especial e dianteiro que o Nelore.

FELTEN et al. (1988), em um estudo avaliando carcaça de animais Charolês, Nelore, Charolês-Nelore e Nelore-Charolês, terminados em confinamento, verificaram que a principal diferença observada foi o menor peso de carcaça apresentada pelos novilhos Nelore. Resultados semelhantes foram obtidos por PORTO et al. (1994) em uma avaliação envolvendo 15 grupos genéticos, e MARIANTE et al. (1982) trabalhando com animais Nelore e meios-sangues Fleckvieh-Nelore, Chianina-Nelore e Charolês-Nelore.

EUCLIDES FILHO et al. (1994) também não encontraram

diferenças para características de carcaça estudadas, entre animais Nelore, 3/4 Nelore-Fleckvieh, 3/4 Nelore-Charolês e 3/4 Nelore-Chianina. Neste caso, o ponto de abate foi um peso fixo de 440 Kg. Diferenças em rendimento de carcaça, no entanto, foram observadas por LUCHIARI FILHO et al. (1985) em uma avaliação conduzida com Nelore, Nelore-Canchim, Nelore-Santa Gertrudis, Nelore-Holandês, Nelore-Suíço e Nelore-Caracá. Os animais Nelore-Canchim apresentaram o maior rendimento de carcaça fria. Não houve diferença entre os demais grupos genéticos. Quanto a porcentagem de porção comestível, os grupos Nelore e Nelore-Santa Gertrudis apresentaram os piores valores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, M.M. de. Pesos e relações de pesos de bezerras Canchim e Nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA 25., 1988, Viçosa. Anais... Viçosa: SBZ, 1988. p. 254. *Resumo.*

ALENCAR, M.M. de; BUGNER, M.; TAMBASCO, A.J.; BARBOSA, R.T. Fertilidade de vacas primíparas das raças Canchim e Nelore: influência da produção de leite. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 28., 1991, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 1991. p. 431. *Resumo.*

ALENCAR, M.M. de; LIMA, R. de; OLIVEIRA, J. de A.L. Pesos ao nascimento e a desmama e ao sobreano de animais cruzados Limousin-Nelore e Charolês-Nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31., 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. p.152. *Resumo.*

BARCELLOS, J.A.J.; LOBATO, J.F.P. Efeitos da época de nascimento no desenvolvimento de bezerras Hereford e sua cruz. I. Peso ao nascer e ganho médio diário pré-desmama. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.21, n.1, p.137-140, 1992a.

BARCELLOS, J.O.J.; LOBATO, J.F.P. Efeitos da época de nascimento no desenvolvimento de bezerras Hereford e suas cruzes. II. Pesos ao desmame, ano e sobreano. Revista da Sociedade Brasileira de

Zootecnia, v.21, n.1, p.150-157, 1992b.

BOÏN, C.; MARGARIDO, R.; LEME, HANSKENECHT, J.C.D.V.; ALLEONI. Desempenho em confinamento e rendimento de carcaça de bovinos machos de cruzamentos abastidos em 3 faixas de sangue europeu-nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31., 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. p. 188. *Resumo.*

EUCLIDES FILHO, K.; FIGUEREDO, G.R. de; CAMILO, I.B. Eficiência de produção de carne e sangue europeu-nelore. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. *Resumo.*

EUCLIDES FILHO, K.; FIGUEREDO, G.R. de; OLIVEIRA, M. Avaliação de desempenho de animais Nelore Europeu sob três dietas. II. Características de carcaça. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31., 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. p.409. *Resumo.*

FELTEN, G.H.; RESTEL, J.; MÜLLER, L. de J.H.S.d. Nelore, 1/2 Charolês-Nelore e 1/2 Nelore-Charolês. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 25., 1988, Viçosa. Anais... Viçosa: SBZ, 1988. p.255. *Resumo.*

JOSE, WPK.; CUBAS, A.C.; MELLA, S.C.; FIGUEREDO, C.V.; PEREIRA, J. Idade à primeira concepção em quatro grupos genéticos de novilhas de corte no noroeste do Paraná. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 1991, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 1991. p.433. *Resumo.*

LEME, PR.; NARDON, R.F.; CAPELOEDA, R.; RAZOOK, A.G.; LUCHIARI FILHO, A.; OLIVEIRA, W.J.; TROVO, J.B.F.; PIRES, F.L. Avaliação de acasalamentos de matrizes Nelore com touros das raças Nelore, Canchim, Santa Gertrudis, Holanda-Parda-Suíço e Caracu. II. Desempenho de animais terminados em confinamento. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 1985, Balmário Camboriú. Anais... Balmário Camboriú: SBZ, 1985. p.226. *Resumo.*

LUCHIARI FILHO, A.; LEME, PR.; RAZOOK, A.G.; RODRIGUES, J.; COUTINHO FILHO, W.J. Avaliação de acasalamentos de matrizes Nelore com touros das raças Nelore, Canchim, Santa Gertrudis, Holandesa-Parda e Caracá. III. Estudo das características de rendimento dos produtos terminados em confinamento.

REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 12, 1985, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú: SBZ, 1985. p. 221.

WAZAN, A.; NOVAES, N.J.; ESTEVES, S.N. Efeito de utilização de nutrientes pelas raças Zebu e Cachibá e mestiças Holandes-Zebu. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA 23, 1986, Campo Grande. Anais... Campo Grande: SBZ, 1986. p.117 Resumo.

WAZAN, A.; FIGUEIRO, L.E.C.; KURABARA, M.Y.; FIGUEIRO, L.A.S. Eficiência reprodutiva em vacas Zebu. Revista Brasileira de Reprodução Animal, 17, 4, p.32-37, 1993.

WAZAN, A.; JOSÉ, W.P.K.; ABRAHÃO, J.J. dos S. Efeito da duração parto e intervalo entre partos de vacas holandesas Nelore e mestiças Guzerá x Nelore, Friesas x Nelore e Marchigiana x Nelore. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31., 1994 Maringá Anais... Maringá: SBZ, 1994. p. 176. Resumo.

WAZAN, A.; EUCLIDES FILHO, K.; SILVA, A.M.; SILVEIRA, A.C.L. DA; ARRUDA, E.F. de O efeito do desempenho de diferentes grupos genéticos em confinamento. In: REUNIAO ANUAL

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31., 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. p.610. Resumo.

RIBEIRO, A.M.L.; LOBATO, J.F.F. Produtividade e eficiência reprodutiva de três grupos raciais de novilhas de corte. II. Desenvolvimento da progênie até o desmame. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.17, n.6, p.508-515, 1988.

RIBEIRO, A.M.L.; LOBATO, J.F.F. Produtividade e eficiência reprodutiva de três grupos raciais de novilhas de corte III. Produtividade, eficiência reprodutiva e reação ao calor. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.17 n.6, p.516-524, 1988.

ROSADO, M.L.; FONTES, C.A.A.; PAULINO, M.P.; SOARES, J.E.; RUAS, J.R. Estudo de fertilidade em vacas de corte de quatro grupos genéticos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 27, 1991, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 1991 p. 430. Resumo.

ROSADO, M.L.; FONTES, C.A.A.; PAULINO, M.P.; SOARES, J.E.; RUAS, J.R. Eficiência reprodutiva de novilhas de corte 3 grupos genéticos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE

ZOOTECNIA, 26., 1991, João Pessoa. Anais... João Pessoa: SBZ, 1991. p. 428 Resumo.

SILVA, M.D.E.A.; PEREIRA, E.A. Crescimento e desempenho reprodutivo de animais zebu e mestiços Chianina-Zebu. Revista da Sociedade Brasileira de Zootecnia, v.15, n.2, p.116-123, 1986.

SOUZA, J.C. de; FERRAZ FILHO, P.B.; VALENCIA, E.T.; RAMOS, A.de A.; MUNZ, C.A. de et. Estudo comparativo de peso ao desmame de bezerras filhas de touros zebu e europeus. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 21., Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. P. 181. Resumo.

VELOSO, L.; LOBO, R.B.; DUARTE, F.A.M.; COURIER, C.C.; BARROS, P.L. Esgorda em Confinamento de bovinos integrantes de nove diferentes grupos genéticos. In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 31, 1994, Maringá. Anais... Maringá: SBZ, 1994. p. 125 Resumo.

WARWICK, E.J.; LEGATES, J.E. Breeding and improvement of farm animals. 7 ed. New York: McGraw-Hill, 1979. 624p.

SOMOS INCOMPETENTES

*Sigeyuki Ishii

Estamos nos referindo aos produtores rurais. Falamos de gente, sem preocupação de tamanho, credo ou raça. Estamos tratando de um assunto muito muito sério: COMIDA?

E por que estamos cuidando de comida e de comida?

Por causa dos juros absurdos, dos preços irrisórios, baixíssimos. E vetado, em razão da ausência de uma política governamental em todos os âmbitos. Em síntese, fomos abandonados na vala comum dos incompetentes.

Citamos os pequenos agricultores, desassistidos, que morrem nas grandes plantações das fazendas agrícolas, igualmente negligenciados pela mesma crise, criada e resolvida pelo Governo de H.C. Curioso assinalar que nunca se produziu tanto neste País, numa demonstração cabal do quanto

somos capazes. Entretanto, a nossa produção valeu tão pouco, quase nada. Que não se diga que há excesso de produtos, pois que, cada grão será consumido ou então exportado nos próximos meses. No ano vindouro, o Brasil vai novamente precisar de seus produtores, de seus incompetentes.

Desejamos trabalhar a terra e, o mais importante, trabalhar na terra, porque só se trabalha na agricultura por gosto. Desejamos enfrentar chuvas que vem e que vão, geadas, pragas, inundações, estiagens. Até aí trabalhamos com otimismo, as vezes exagerado. Mas os problemas não se alteram para pequenos, médios ou grandes produtores. São os mesmíssimos. Juros elevados, desgoverno. Mas mesmo assim seguimos em frente. Há de aparecer soluções. Ou não?

Temos muito orgulho de nossa profissão, de nossa

atividade.

Mas como superar os tecnocratas? Como trabalhar no escoamento com rodovias totalmente esburacadas? Como fazer com os portos mais caros do mundo e a inexistência de silos e armazenagem? Como encarar impostos e mais impostos, importações reconhecidamente desleais, e a mais flagrante falta de seriedade dos governos, que não cumprem compromissos públicos e até mesmos as leis, as quais juram defender?

Queremos plantar. Esta no sangue do agricultor. Mas honestamente, não podemos. É ridícula a afirmação.

Então, só nos resta uma alternativa. Explodir num grito solitário, em nome de cada agricultor brasileiro:

NÃO POSSO PLANTAR!

“CARA INCHADA” DOS BOVINOS, SUA CAUSA E CONTROLE

Ivan Valadão Rosa¹

A “cara inchada” dos bovinos (CI) é uma periodontite que afeta principalmente animais jovens quando mantidos em determinadas áreas de pastagens nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país. A doença caracteriza-se clinicamente por processo inflamatório peridontário comprometendo as estruturas de sustentação dos dentes (gingiva e osso alveolar). As lesões ativas da “cara inchada” provocam nos animais um hálito fétido característico e, muitas vezes, abaulamento ósseo correspondente aos locais atingidos. As alterações são mais frequentes no maxilar superior, iniciando-se sob

a forma de pequena depressão na papila interdentária, normalmente entre o segundo e o terceiro pré-molares, uni ou bilateralmente. À medida que a lesão progredir há uma recessão da gengiva marginal, com formação de uma “bolsa” gengival, que se aprofunda em direção as raízes dos dentes e onde se acumulam resíduos alimentares. Com o aprofundamento das lesões ocorre também reabsorção do osso alveolar, com exposição das raízes dos dentes, que se tornam frouxos e caem espontaneamente ou podem ser facilmente extraídos com a mão. As lesões orais da CI provocam dor à preensão e mastigação dos alimentos, reduzindo o consumo, o que, associado muitas vezes a uma intensa diarreia, produz emagrecimento progressivo e caquexia, podendo levar o animal à morte. Quando ocorre queda dos dentes, as lesões tendem a cicatrizar, mas o desenvolvimento dos animais fica permanentemente comprometido em consequência da mastigação deficiente.

Nas áreas de ocorrência da CI sua incidência pode ultrapassar 70% nos animais com até um ano de idade. Desde os primórdios de seu estudo a doença foi associada a um ou mais fatores de origem alimentar. As investigações iniciais no sentido de esclarecer a etiologia da CI mostraram: 1. que animais com a doença recuperam-se sem tratamento, quando transferidos de áreas de ocorrência de CI para regiões indenes; 2. que animais com CI recuperam-se rapidamente quando confinados e tratados com ração balanceada; 3. que a doença

não esta associada a parasitas invasoras das pastagens; 4. que o leite materno, aparentemente incapaz de veicular o fator ou fatores responsáveis pela doença; 5. que a incidência da CI nada tem a ver com o manejo de formação dos pastos. Embora os primeiros resultados experimentais oferecessem poucas evidências de associação da CI com deficiência

“Cara inchada”. retração gengival acentuada, com exposição das raízes dentárias.

Animal com “cara inchada” abaulamento da região maxilar esquerda.

(1) Med. Vet. PHD, CRMV-MS, nº 0487, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) - Caixa Postal 154, CEP 79002-970 - Campo Grande, MS

ou desequilíbrios de nutrientes minerais na dieta de pasto bovinos, verificou-se desde o início uma concentração exagerada em pesquisas nessa área específica de detrimento das demais. Um cuidadoso dos trabalhos realizados nesse período deixa entrever alguns deles, falhas no planejamento experimental, e, em alguns casos, uma mal disfarçada teimosia, tendo como motivação básica, possivelmente, interesses comerciais ou necessidade de afirmação. Praticamente todos os minerais essenciais foram investigados, isoladamente e em conjunto, chegando-se a alguns resultados negativos, outros inconclusivos e também alguns “positivos”, porém mal interpretados, deliberadamente distor-

“cara inchada”. retração cicatricial da boca após a queda do pré-molar.

em flagrante conflito com outros obtidos nas mesmas condições por investigadores diferentes.

Não obstante a fragilidade dos argumentos e evidências em favor de uma etiologia mineral para a “cara inchada”, esta teoria ganhou força em decorrência, principalmente, do declínio e eventual desaparecimento da doença em áreas onde sua incidência era elevada, como consequência, supostamente, de uma correta suplementação mineral dos rebanhos. Hoje sabemos com certeza que a CI está de modo relacionada a pastos de formação recente, tendendo a uma redução espontânea a níveis insignificantes ou mesmo desaparecimento em períodos variáveis, de acordo com o tipo de solo: em solos argilosos e pastos de alto valor nutritivo o declínio da doença é lento; nas áreas de pastagens de solos de cerrado ela pode desaparecer em poucos anos. A reforma de pastos antigos degradados pode trazer de volta a doença com alta incidência.

O frágil argumento de uma etiologia mineral para a “cara inchada” recebe seu golpe de misericórdia ao considerar-se um outro mal, ainda mais grave, que vem afetando principalmente os rebanhos de cria em pastos de cerrado nas duas últimas décadas e que está relacionado a um empobrecimento progressivo dos pastos, principalmente no que tange ao fósforo. Este mal é o botulismo, uma intoxicação alimentar ou

envenenamento pela toxina de um germe (**Clostridium botulinum**), que se desenvolve em matéria orgânica em decomposição. Embora a causa primária do botulismo seja a toxina botulínica, sua causa secundária é a deficiência severa de fósforo no rebanho, que produz nos animais uma perversão do apetite e os leva a ingerir restos de cadáveres, e lambe, chupar ou roer ossos, que podem estar contaminados com a toxina botulínica. Conciliar o desaparecimento da “cara inchada” como consequência de uma correta e generalizada suplementação mineral dos bovinos, com o aparecimento, quase simultâneo e nas mesmas áreas, do botulismo, uma doença relacionada à falta de uma adequada suplementação mineral, é a árdua tarefa dos teóricos da causa mineral para a “cara inchada” dos bovinos.

Underwood, talvez o maior estudioso da nutrição mineral que já existiu, sugeriu dois postulados básicos para que se estabeleça com segurança o envolvimento de um nutriente mineral na etiologia de algum mal do rebanho: 1. devem ocorrer repetidas e significantes respostas à suplementação do nutriente, e só dele, à dieta dos animais; 2. deve ocorrer o desencadeamento do quadro clínico da deficiência com o uso de uma dieta pobre no nutriente. No caso da CI nenhum dos postulados de Underwood foi atendido: não se conseguiu recuperar animais doentes com o uso de minerais, nem se conseguiu reproduzir a CI com dietas deficientes em minerais.

Com base em todos os resultados obtidos na investigação da possível causa mineral para a “cara inchada”, tudo o que se pode dizer é que, em áreas de notória defici-

ência mineral nos pastos, o uso correto de misturas minerais de boa qualidade pode produzir nos animais portadores da doença uma considerável melhora de seu estado nutricional e, possivelmente, em alguns animais, uma redução da severidade das lesões orais. Todavia, com base nesses mesmos resultados, não se pode afirmar que a suplementação mineral apenas seja capaz de promover, direta ou indiretamente, a cura das lesões em animais doentes ou prevenir o aparecimento da doença em animais sadios.

Após a evidente ineficácia da suplementação mineral em prevenir a doença ou recuperar animais doentes, um grupo de pesquisadores decidiu investir com mais ímpeto na investigação do possível envolvimento de agentes infecciosos como causa primária da “cara inchada”. Material colhido das lesões periodontais de animais com CI foi comparado, do ponto de vista bacteriológico, com material obtido da gengiva maxilar de animais

“Cara inchada” bolsa gengival com resíduos alimentares tirados do seu interior.

sadios, oriundos de região indene. Determinados germes anaeróbicos foram isolados em grande quantidade da maioria das lesões periodontais. Estes microorganismos mostraram-se capazes de produzir determinadas enzimas, toxinas e produtos metabólicos identificados como lesivos as estruturas de sustentação dos dentes, chegando-se a conclusão de que as lesões primárias da CI não ocorreriam sem

"Cara inchada" aumento de volume do osso maxilar e perda óssea ao nível dos alvéolos dentários.

a presença desses germes e seu material patogênico. As principais conclusões a que os primeiros estudos da doença do ponto de vista bacteriológico conduziram foram:

a) existe um grupo específico de bactérias que pode ser isolado das lesões ativas da CI;

b) há uma predominância das bactérias do gênero **Bacteróides**, que pode constituir até 80% do total da flora bacteriana isolada das lesões de CI;

c) há uma modificação quantitativa da população bacteriana das lesões quando os animais são transferidos para área indene;

d) existe uma correlação estreita entre a cura clínica e a cura bacteriológica da doença;

e) os microorganismos isolados de lesões de CI produzem enzimas e toxinas com potencial de destruição direta e indireta dos tecidos de sustentação dos dentes; e

f) as bactérias isoladas das lesões de CI fazem parte da flora bacteriana normal da boca de bovinos, mas estão grandemente aumentadas em número nos animais portadores de CI.

Os achados bacteriológicos, bem como a evidênciação do potencial patogênico dos germes isolados das lesões de CI, sugerem a participação primária dos mesmos na etiologia da doença. A mesma flora bacteriana isolada das lesões de CI tem sido incriminada como principal responsável pelas periodontoses humanas. Entretanto, ainda restam por serem elucidados

o fator ou fatores, do animal ou do meio ambiente, que desencadeariam ou exacerbariam a virulência dos germes bucais, levando-os a produzir as lesões iniciais da doença e o seu agravamento. Há fortes indícios de que este fator ou fatores estariam relacionados principalmente a alterações ocorridas ao nível do solo, tendo em conta a conhecida relação da doença com pastagens novas, o seu desaparecimento em pastos

antigos e ressurgimento em áreas de pastagens reformadas.

Estabelecida a provável causa bacteriana como fator primário no desenvolvimento das lesões de CI foram realizados alguns trabalhos no sentido de testar métodos de controle da doença. Experimentos iniciais com a aplicação parenteral de antibióticos revelaram reduzida e transitória ação desses agentes terapêuticos sobre a recuperação das lesões. Numa fase subsequente aos isolamentos bacterianos foram ensaiados alguns antibióticos adicionados ao suplemento mineral como meio de controle da CI. No primeiro desses trabalhos foram conduzidos dois experimentos em duas fazendas, que haviam registrado alta incidência de CI em anos anteriores. Na primeira propriedade, 130 vacas com bezerros recém-nascido foram divididas em dois grupos iguais, submetidos a dois tratamentos:

1. mistura mineral contendo 50g de Espiramicina por 50Kg de mistura (1:1000); 2. a mesma mistura mineral sem o antibiótico. Os animais e respectivos tratamentos foram rotacionados nos pastos experimentais a cada 28 dias. Na segunda fazenda, 168 vacas e seus bezerros receberam mistura mineral adicionada de Espiramicina a base de 25g para cada 50Kg de

mistura (1:2000), enquanto em 278 vacas e seus bezerros permaneceram como testemunhas recebendo a mistura antibiótica. A avaliação da ciência profilática dos tratamentos foi feita mediante exames periódicos da gengiva maxilar de bezerros de cada tratamento. No último exame foi realizado aos meses, quando os bezerros foram desmamados. No exame final foram observadas lesões periodontais de CI em nenhum bezerro recebendo mistura mineral com antibiótico. Entretanto, no grupo controle, recebendo a mistura mineral, ocorreu uma incidência de lesões periodontais de 10,1 e 5,1%, respectivamente, a primeira e segunda propriedade.

Um segundo trabalho, desta vez visando a cura das lesões de CI, foi conduzido em uma propriedade com uma incidência de 61,5% da doença nos bezerros. Setenta e sete bezerros com lesões progressivas de CI receberam via oral, durante oito semanas consecutivas, a dose de 0,032g de Virgíamicina por animal, duas vezes por semana. Como testemunhas foram utilizados dois grupos de bezerros com lesões de CI: o primeiro grupo era constituído por dez bezerros, que foram mantidos juntos com o grupo de animais tratados; o segundo grupo era formado por 95 bezerros, que foram mantidos separados do grupo anterior. O comportamento das lesões periodontais foi acompanhado, como nos experimentos

"Cara inchada" corte transversal do maxilar mostrando aumento de volume ósseo e resorção óssea alveolar.

eriores, através de exames
típicos periódicos da cavidade oral.
ós a segunda semana, os bezerros
lote tratado não apresentaram
is a diarreia característica do
adro clínico da doença. Após seis
manas havia desaparecido o odor
do característico da boca e as
ões pareciam estacionárias. Ao
al da oitava semana os animais
tidos com Virginiamicina
iam pronunciada melhora de
as condições gerais, inclusive
a renovação da pelagem. Dos
grupos que não receberam o
ntibiótico, alguns animais
rriaram, a maioria permaneceu
m diarreia e hálito fétido, houve
a piora geral do estado corporal
os animais, agravamento das
ões orais e aumento do abau-
mento facial, tudo evidenciando
a evolução do quadro clínico da
doença.

Em um experimento subse-
quente em propriedade com elevada
incidência de CI, a Virginiamicina
foi testada novamente, desta vez
para verificar a eficácia do anti-
biótico em prevenir a doença. Neste
experimento, a medida que os
bezerros iam nascendo eram iden-
tificados e agrupados em dois lotes,
todos partilhando com suas mães o
mesmo pasto e tendo a sua dis-
posição mistura mineral de boa
qualidade. Duas vezes por semana
todos os bezerros eram recolhidos
ao curral e metade deles era
dosificada com Virginimicina. A
cada duas semanas todos eram
examinados quanto ao estado geral
e presença de lesões de CI. Ao cabo
de cinco meses, 9 dos 30 bezerros
não tratados com antibióticos apre-
sentaram lesões na gengiva margi-
nal (30% de incidência), enquanto

os 30 bezerros do lote tratado apre-
sentavam perfeitas condições de
saúde. Os animais do grupo não
tratado que exibiram lesões peri-
odontais passaram a receber a mis-
tura mineral com antibiótico (50g
de Virginiamicina/50Kg de mistura)
e foram recuperados. Um novo lote
de bezerros nascidos mais tarde
recebeu apenas a mistura mineral
(sem antibiótico) e, após dois
meses, 20% deles já apresentavam
lesões orais de "cara inchada".

Embora ainda permaneçam
por ser esclarecidos alguns aspectos
obscuros relacionados ao fator ou
fatores que atuam no desencan-
deamento do quadro clínico da
"cara inchada", os resultados dos es-
tudos microbiológicos e as excelen-
tes respostas ao tratamento com an-
tibióticos indicam claramente uma
etiologia infecciosa para a doença.

CRESCIMENTO E REPRODUÇÃO EM GADO NELORE

CRESCIMENTO E
REPRODUÇÃO EM
GADO NELORE
VISÃO DO CRIADOR E DO PESQUISADOR

ARTHUR DA SILVA MARIANTE
ARNALDO ZANCANER

VISÃO DO CRIADOR E DO PESQUISADOR

ARTHUR DA SILVA MARIANTE

ARNALDO ZANCANER

Esta publicação deverá ser de grande valia para os criadores interessados em melhorar a composição genética e o manejo de seus rebanhos; para os pesquisadores interessados na análise e interpretação de dados de gado de corte, bem como para os extensionistas interessados em aprender de que forma os dados de pesquisa podem ser usados para melhorar o manejo do rebanho.

Pedidos à:

EDITORA DOS CRIADORES LTDA.

São Paulo - SP

A IMPORTAÇÃO DE SEMEN CONTINUA EM ALTA

ASBIA - RELATÓRIO DE 1994

Temos em mãos um exemplar do relatório anual de inseminação artificial da ASBIA - Associação Brasileira de Inseminação Artificial, referente ao ano de 1994, e pela leitura do mesmo ficamos sabendo que em nosso país, a I.A. cresceu 9,41% em relação ao ano anterior - 1993

Informa o relatório da ASBIA que o sêmen importado apresentou maior crescimento, tendo em vista a falta do TESTE DE PROGÊNIE em nosso país

e a oferta abundante de material genético, principalmente dos Estados Unidos.

Sobre esta questão do TESTE DE PROGÊNIE fazemos um comentário mais adiante, em seu relatório a ASBIA acredita que o parque industrial brasileiro de I.A. e hoje comparável aos melhores dos países desenvolvidos e está trabalhando muito abaixo da sua capacidade de produção. A seguir publicamos vários gráficos e tabelas que fazem parte do relatório da

ASBIA e que dispensa comentários.

A ASBIA tem como presidente o Sr. Marco Antonio Carvalho Volta; vice-presidente Sr. Hélio Dias Santos Duarte; diretor-secretário, Sr. Dorival Cruz e diretor-tesoureiro, Sr. José de Castro Rodrigues Neto. Seu endereço: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2893 - CEP: 05083-010 - S. Paulo - SP - Tel: (011) 261.5013 - Fax: (011) 260.9423.

ASBIA

Evolução da Inseminação Artificial no Brasil

Ano	Semen Nacional			
	Produção	Vendas	Partic.	Evol.
1977	1.737.909	1.030.228	62,82%	
1978	1.323.218	1.128.068	81,54%	8,50%
1979	1.550.792	1.207.141	78,57%	7,01%
1980	1.956.995	1.372.001	69,00%	13,68%
1981	1.627.873	1.340.051	83,12%	-2,33%
1982	1.666.193	1.132.967	68,77%	-18,45%
1983	1.415.400	1.024.025	67,18%	-8,62%
1984	1.785.594	1.377.449	80,44%	34,51%
1985	1.810.032	1.359.504	80,82%	-1,30%
1986	1.907.828	1.515.177	80,30%	11,48%
1987	2.374.011	1.731.883	80,09%	14,29%
1988	2.558.066	1.467.825	69,03%	-16,24%
1989	2.769.801	2.260.054	80,33%	56,34%
1990	2.071.091	1.808.231	81,15%	-18,40%
1991	2.086.418	2.040.088	80,08%	9,12%
1992	2.206.314	2.108.248	80,56%	1,35%
1993	2.439.225	2.697.833	78,21%	23,23%
1994	2.354.248	2.968.457	70,43%	-1,21%

Ano	Semen Importado			
	Importação	Vendas	Partic.	Evol.
1977	287.513	216.860	17,38%	
1978	190.504	265.484	18,46%	17,81%
1979	347.720	329.215	21,43%	28,67%
1980	394.340	280.920	17,00%	-14,67%
1981	170.364	180.888	11,08%	-35,69%
1982	182.443	143.267	11,23%	-20,70%
1983	155.447	150.858	12,64%	5,26%
1984	99.420	155.742	10,18%	3,24%
1985	148.042	157.479	10,38%	1,11%
1986	218.887	281.149	14,70%	65,83%
1987	382.014	212.032	10,91%	-18,81%
1988	188.478	180.929	10,97%	-14,67%
1989	340.625	361.019	13,67%	99,54%
1990	415.315	442.600	18,05%	22,55%
1991	803.282	517.582	19,82%	16,89%
1992	852.888	508.036	19,45%	-1,65%
1993	718.898	723.597	21,79%	42,15%
1994	1.179.712	1.077.431	29,57%	48,30%

Ano	Total Geral em Dólares			
	Mac + Imp	Vend.	Partic.	Evol.
1977	2.025.512	1.246.888	62,82%	
1978	1.513.720	1.393.552	81,54%	8,50%
1979	1.898.512	1.536.256	78,57%	7,01%
1980	2.351.335	1.652.921	69,00%	13,68%
1981	1.798.237	1.520.138	83,12%	-2,33%
1982	1.718.636	1.276.234	68,77%	-18,45%
1983	1.570.847	1.174.883	67,18%	-8,62%
1984	1.885.014	1.533.191	80,44%	34,51%
1985	1.958.074	1.516.983	80,82%	-1,30%
1986	2.126.815	1.796.326	80,30%	11,48%
1987	2.756.025	1.943.915	80,09%	14,29%
1988	2.746.542	1.648.754	69,03%	-16,24%
1989	2.509.426	2.621.073	80,33%	56,34%
1990	2.486.406	2.248.081	81,15%	-18,40%
1991	2.889.699	2.557.670	80,08%	9,12%
1992	2.659.202	2.616.284	80,56%	1,35%
1993	3.158.123	3.420.430	78,21%	23,23%
1994	3.533.960	3.845.888	70,43%	-1,21%

Foto: DAEMPRESAS/ASBIA

Ord.	Raças	Semen Nacional						Semen Importado						Total do Semen Comercializado					
		1.992		1.993		1.994		1.992		1.993		1.994		1.992		1.993		1.994	
		Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %	Doses	Part %
1	Holandes	453.173	21,50	506.850	19,47	483.419	15,72	314.486	81,78	452.403	82,52	613.702	58,09	707.659	29,33	654.253	28,6	1.687.021	81
2	Melano	375.869	17,82	553.253	21,30	613.317	23,90	-	0,00	-	0,00	290	0,02	375.869	14,38	533.253	18,88	813.747	40
3	Simental	245.070	11,67	294.856	10,19	298.301	11,62	50.635	9,95	70.351	9,72	129.096	11,08	296.005	11,33	335.217	10,08	427.201	21
4	Melano Mocho	125.138	5,94	188.892	6,96	228.979	8,61	-	0,00	-	0,00	-	0,00	125.138	4,78	188.892	5,41	228.979	11
5	Lilimovine	115.413	5,47	130.472	5,02	144.038	5,61	20.884	4,10	33.949	4,69	49.728	4,62	136.297	5,21	154.421	4,58	185.796	9
6	Gr Luthin	87.141	4,12	118.145	4,55	162.242	6,22	-	0,00	-	0,00	-	0,00	87.141	3,33	118.145	3,38	162.242	8
7	Jersey	85.721	4,07	102.432	3,94	95.215	3,71	20.945	4,08	37.754	5,22	65.037	6,04	116.890	4,49	143.188	4,23	188.258	10
8	Red Angus	80.640	3,82	57.975	2,23	54.184	2,11	22.727	4,46	43.048	5,95	78.473	7,28	103.367	3,96	101.023	3,04	122.687	6
9	Aberdeen Angus	59.701	2,83	83.795	3,11	79.340	3,00	17.655	3,47	24.822	3,43	34.079	3,16	77.356	2,96	118.817	3,57	113.619	5
10	Polled Hereford	44.448	2,11	55.114	2,12	65.954	2,57	13.689	2,89	21.596	2,98	11.991	1,09	58.137	2,22	76.683	2,31	77.955	4
11	Pardo-Sulco	66.222	3,14	60.748	2,24	98.878	3,72	12.704	2,50	11.284	1,56	17.697	1,64	78.928	3,02	72.032	2,17	76.575	4
12	Tapapu	42.426	2,01	51.114	1,97	71.986	2,86	-	0,00	-	0,00	-	0,00	42.426	1,62	51.114	1,54	71.986	3
13	Chianina	33.738	1,60	32.495	1,25	45.170	1,76	6.892	1,31	9.977	1,38	16.100	1,49	40.420	1,54	42.472	1,28	61.279	3
14	Melano Mocho	58.834	2,79	58.954	2,25	32.516	1,27	-	0,00	-	0,00	2.096	0,19	58.834	2,17	58.504	1,78	34.812	1
15	Marcopiana	29.520	1,40	25.377	1,26	25.916	1,01	1.588	0,31	2.253	0,31	3.945	0,37	31.108	1,19	37.820	1,13	25.916	1
16	Gr	48.691	2,21	64.317	2,48	29.484	0,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	48.691	1,78	64.317	1,94	29.484	1
17	Hereford	9.604	0,46	4.175	0,16	8.490	0,25	837	0,16	381	0,05	17.704	1,64	16.441	0,40	4.358	0,14	24.194	1
18	Guzers	18.987	0,90	23.890	0,91	22.606	0,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	18.987	0,73	23.890	0,71	22.606	1
19	Guzers Leitos	11.440	0,54	10.992	0,42	10.913	0,78	-	0,00	-	0,00	-	0,00	11.440	0,44	10.992	0,33	10.913	0
20	Introlud	19.860	0,93	25.149	0,97	16.884	0,65	-	0,00	-	0,00	-	0,00	19.860	0,75	25.149	0,76	16.884	0
21	Piemontesa	3.374	0,16	1.965	0,08	3.042	0,12	5.703	1,12	4.423	0,61	12.087	1,12	9.077	0,35	6.288	0,19	15.128	0
22	Bleudo d'Aquitaine	1.970	0,09	4.232	0,16	6.546	0,26	820	0,12	1.210	0,17	5.920	0,55	2.696	0,10	5.442	0,16	12.689	0
23	Santa Gertrudes	16.144	0,77	9.977	0,35	11.052	0,43	435	0,09	100	0,01	325	0,03	16.579	0,63	9.177	0,29	11.277	0
24	Carolina	3.869	0,18	9.396	0,21	10.897	0,42	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.869	0,15	5.356	0,16	11.897	0
25	Stranex	1.705	0,08	-	0,00	6.830	0,27	1.170	0,23	2.546	0,28	3.089	0,29	2.875	0,11	2.048	0,06	5.919	0
26	Brilman	-	0,00	-	0,00	2.818	0,11	-	0,00	-	0,00	6.584	0,61	-	0,00	-	0,00	5.493	0
27	Delvew	1.631	0,08	9.297	0,36	4.587	0,18	259	0,05	72	0,01	4.811	0,45	1.890	0,07	9.359	0,29	5.708	0
28	Ilmoleudo	12.810	0,66	11.724	0,45	8.282	0,32	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12.810	0,53	11.724	0,35	8.282	0
29	Pampasno	3.050	0,14	2.335	0,09	7.869	0,31	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.050	0,11	2.335	0,07	7.869	0
30	Caracu	3.278	0,16	4.413	0,17	6.379	0,25	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3.278	0,13	4.413	0,13	6.379	0
31	Chianina	12.546	0,60	12.292	0,47	5.932	0,23	5.037	0,99	1.164	0,16	194	0,02	17.583	0,67	13.495	0,41	6.128	0
32	Gr Mocho	2.572	0,12	11.221	0,43	5.059	0,20	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2.572	0,10	11.221	0,34	5.059	0
33	Devon	6.798	0,32	6.249	0,26	4.373	0,17	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.798	0,26	6.249	0,20	4.373	0
	Datas 20 raças	29.224	1,39	87.337	3,26	22.574	0,86	2.980	0,60	6.794	0,94	4.013	0,46	32.204	1,23	64.131	2,83	25.587	1
	Total Geral de Doses	2.103.243	100	2.597.933	100	2.566.457	100	509.636	100	723.987	100	1.077.431	100	2.617.281	100	3.321.536	100	3.686.068	100

Fonte: MAEMPRESAS/ASBIA

Evolução da Inseminação Artificial no Brasil - 1994

Comercialização de Semen Nacional e Importado

Comercialização Nacional de Semen - 1994

Participação das Principais Raças - 1994

TOUROS -VENDEM-SE-

Vendem-se touros mestiços prontos para cobertura, com 2 a 3 anos de idade, produtos da inseminação de vacas Nelore com sêmen importado da Itália, de touros Piemonteses provados.

São animais submetidos a exame andrológico (exame clínico dos touros e análise do sêmen) selecionados das fazendas participantes do Programa de Vitrines da Superga, relacionadas nesta página.

Temos também à disposição sêmen e embriões importados da Itália.

TRATAR NA:

SUPERGA COMERCIO E AGROPECUARIA S.A.
Av. Paulista, 453 - Conj. 132 - São Paulo - SP
01311-000 - Tel. (011) 283-3100 - Fax. (011) 288-9166

CRIAÇÃO

que só a racionalização trará respostas seguras às indagações atuais. Este é o trabalho de Koldino Alves Ferreira, que há mais de...

FAZENDA VEREDÃO
Fátima - TO
Proprietário:
Condomínio Veredão

FAZENDA SARANDI
Juscimeira - MT
Proprietário: Diogo de Toledo Lara Neto

FAZENDA OS BOIS
Vitória da Conquista - BA
Proprietário: Palheta Bahia Agrícola e Pecuária Ltda.

FAZENDA DA MATA
Araguacema - TO
Proprietário: Agropecuária Corrego Azul Ltda.

FAZENDA SÃO VICENTE AGROPASTORIL
Brejinho de Nazaré - TO
Proprietário: Vicente Di Bella e Filhos

FAZENDA SÃO LUIZ
Ribeirão Cascalheira - MT
Proprietário: Agropecuária Bombig Ltda.

ENGENHO SÃO FRANCISCO
Quirinópolis - GO
Proprietário: Oswaldo Mesa Campos

FAZENDA RANCHO VERDE
Novo São Joaquim - MT
Proprietário: Domingos Teixeira Rodrigues

RANCHO SS
Alta Floresta - MT
Proprietário: Pedro Silvestre da Silva

FAZENDA RANCHO AMARUZA
Barra do Garças - MT
Proprietário: José Francisco Galindo

FAZENDA UNIÃO
Barra do Garças - MT
Proprietário: Valdecir L. Ferrari

FAZENDA SÃO CAETANO
Morrinhos - GO
Proprietário: Condomínio Antonio Laefort Filho

FAZENDA SANTO ANTONIO DE PADUA
São Carlos - SP
Proprietário: Mario Milani

FAZENDA RANCHO ALVORADA
Barra do Garças - MT
Proprietário: Nilson Ferreira

FAZENDA PAULISTINHA
Barra do Garças - MT
Proprietário: Superga Comércio e Agropecuária SA

A MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO DOS SUÍNOS

Aloizio Soares
e Juarez Lopes

A mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, é um tubérculo que possui alto teor de água (cerca de 66% de umidade). No Brasil, se produz cerca de 12 milhões de toneladas de mandioca (tubérculos e subprodutos) por ano e essa quantidade representa cerca de 30% da quantidade produzida no mundo. Assim, esse tubérculo e seus subprodutos podem ser alimentos com grande potencial de uso nas rações e em dietas para os suínos, substituindo parcialmente ou totalmente o milho.

Vale destacar que a mandioca pode produzir muito mais energia digestível (ED) e proteína digestível (PD) para suínos, por ha, por ano, que o milho. Por exemplo, numa área de um hectare, usando-se as mesmas condições de plantio (correção de PH do solo, adubação, capinas, etc.), pode-se colher 30.000Kg de mandioca ou 3.000Kg de milho e isso representa 10.200Kg de mandioca seca ou 2.700Kg de milho seco, 38.400.000 Kcal de ED de milho/ha e 360Kg de PD de mandioca/ha ou 225Kg de PD de milho/ha. Convém lembrar, também que a cultura de milho em condições excepcionais pode produzir até 12.000kg/ha enquanto que uma cultura de mandioca em iguais condições pode produzir até 90.000Kg/ha.

A mandioca pode ser usada na alimentação dos suínos, como ingrediente de ração na forma de raspa de mandioca integral (RMI) ou como ingrediente da dieta, em sistema de livre escolha ou de

(*) Professor adjunto - DZO, Universidade Federal de Viçosa - MG

alimentação controlada, na forma de mandioca integral triturada (MIT) ou na forma de mandioca integral triturada e armazenada em silos (MIS). Outros subprodutos, tais como o feno de folhas de mandioca e a raspa residual de mandioca (resíduo da extração do amido ou polvilho), obtidos a partir da cultura e da raiz de mandioca podem ser também usados na alimentação dos suínos.

Nessa publicação serão abordados, exclusivamente, alternativas de uso da mandioca (RMI, MIT e MIS) na alimentação de suínos, como ingredientes de dietas para as fases de crescimento, de terminação e de gestação, dando-se ênfase para as relações de preços com milho e farelo de soja.

A mandioca quando usada imediatamente após a colheita pode intoxicar e até matar os suínos, se as variedades usadas forem as conhecidas como "bravas ou amargas", que possuem consideráveis teores de glicosídeos (substâncias cianogênicas que liberam ácido cianídrico). Por isso, para se usar a raiz (tubérculos) de mandioca integral, recomenda-se três alternativas de tratamentos:

ALTERNATIVA 1

Os tubérculos devem ser triturados logo após a colheita e expostos ao ar e ao sol por um tempo mínimo de 12 horas. Assim se produz a mandioca integral triturada (MIT), que não deixa de ser um produto com alta umidade, sendo, portanto, para consumo imediato.

ALTERNATIVA 2

Os tubérculos devem ser triturados logo após a colheita, expostos ao ar e ao sol por um tempo mínimo de 12 horas (isso pode ser dispensável) e depois armazenados em silos. No processo de armazenagem no silo, para cada tonelada de tubérculo compactado se coloca 30kg de sal. Assim se produz a mandioca integral triturada e armazenada em silos (MIS), a qual é liberada para o plantio de mandioca e a mandioca pode ser usada por um tempo maior.

ALTERNATIVA 3

Os tubérculos devem ser triturados logo após a colheita, expostos ao sol por um período suficiente para deixá-los bem secos (com menos de 88% de umidade). Esse período de exposição varia de 24 a 72 horas dependendo da região. O material deve ser coberto com um plástico a noite sempre que chover. Assim se produz a raspa de mandioca (RM) que é um produto seco, próprio para ser usado dentro da ração e que pode ser armazenado por um longo tempo.

O processo de secagem pode ser feito artificialmente através de secadores em um tempo menor do que o sol e pode ser feito até a noite.

A composição em matéria seca (MS), energia digestível (ED), proteína bruta (PB), proteína digestível (PD), lisina (LIS) e metionina + cistina (MET+CIS) da mandioca obtida através dessas três alternativas

Tabela I
Composição RMI, MIT e MIS

Ingredientes	MS	ED	PB	PD	LIS	MET+CIS
	%	(Kcal/kg)	(%)	(%)	(%)	(%)
RMI	92,3	3280	3,10	2,40	0,09	0,07
MIT	34,0	1280	1,80	1,20	0,06	0,06
MIS	40,3	1500	1,20	0,90	0,06	0,05

esta apresentada na tabela 1.

MIT OU MIS PARA SUÍNOS
EM CRESCIMENTO E EM
TERMINAÇÃO.

Para uso de mandioca com alta umidade (MIT ou MIS) na dieta dos suínos em crescimento e em terminação (desde os 20 até 100Kg de peso), recomenda-se o sistema de alimentação controlada com o fornecimento de MIT ou MIS e concentrado proteico de acordo com a idade em semanas e as quantidades apresentadas na Tabela II da seguinte maneira: a metade de MIT ou MIS deve ser fornecida de manhã entre 7:00 e 9:00, o concentrado deve ser fornecido de uma só

vez entre 12:00 e 14:00h (mais ou menos na metade do dia) e a outra metade da MIT ou MIS deve ser fornecida no final da tarde entre 17:00 e 19:00h.

O concentrado proteico próprio para essas fases pode ser encontrado no comércio especializado e deve ter no mínimo 38% PB, ou ele pode ser produzido na própria granja valendo-se de 92,4% de farelo de soja com 7,6% de núcleo completo.

O núcleo completo deve conter todos os minerais (inclusive cálcio e fósforo) e todas as vitaminas em

quantidades suficientes para atender as necessidades dos suínos em cada fase, ou pode ser preparado a partir de fosfato bicálcico, calcário, sal iodado, premix de minerais e premix de vitaminas.

Pode-se avaliar economicamente o uso do MIS ou MIT nessas fases através das seguintes relações de preços:

Se o preço do Kg de MIT for menor do que 0,42 vezes o preço do Kg do milho menos 0,05 vezes o preço do Kg do farelo de soja, ele permitirá a produção de 1Kg de suíno a um custo menor do que com ração à base de milho.

Se o preço do Kg de MIS for menor do que 0,49 vezes o preço do Kg do milho menos 0,06 vezes o preço do kg do farelo de soja, ele permitirá a produção de 1Kg de suíno a um custo menor do que com ração à base de milho.

MIT OU MIS PARA SUÍNOS
EM GESTAÇÃO

Para uso de mandioca com alta umidade (MIT ou MIS) nas dietas de fêmeas gestantes (desde a cobertura até uma semana antes do parto recomenda-se o sistema de alimentação controlada com o fornecimento diário de 3120g de MIT ou 3790g de MIS mais 430g de concentrado proteico, conforme o caso. A mandioca deve ser fornecida em duas refeições diárias (metade de manhã e metade no final da tarde) e o concentrado proteico em uma única refeição por volta do meio dia (esquema normal).

O concentrado proteico para essa fase pode ser encontrado no comércio especializado e deve ter no mínimo 38% de PB, ou ele pode ser produzido na própria granja valendo-se de uma mistura de 83,2% farelo de soja com 16,8% de núcleo completo.

É possível, também usar outro sistema de alimentação para as fêmeas gestantes, fornecendo-se desde a cobertura até aproximadamente 80 a 85 dias de gestação, no mesmo esquema de refeições diárias anterior, 2730g de MIT ou

Tabela II
Fornecimento semanal de concentrado
proteico e MIT ou MIS para suínos em
crecimento

	Idade (dias)	MIT (g/dia)	Concentrado Proteico (g/dia)	MIS (g/dia)
CRESCIMENTO	64 a 70	2.250	400	1.910
	71 a 77	2.650	470	2.400
	78 a 84	3.160	560	2.690
	85 a 91	3.770	670	3.200
	92 a 98	4.420	780	3.760
	99 a 105	5.100	800	4.330
TERMINAÇÃO	106 a 112	5.100	690	4.270
	113 a 119	5.500	740	4.670
	120 a 126	5.800	780	4.970
	127 a 133	6.280	840	5.270
	134 a 140	6.280	840	5.270
	141 a 147	6.760	910	5.570

2330g de MIS mais 350g de concentrado proteico e nos últimos 30 dias de gestação (antes da transferência para as celas parideiras aos 105 dias de gestação) fornecendo-se, ainda no mesmo esquema de refeições diárias, 6610g de MIT ou 5640g de MIS mais 500g de concentrado proteico (esquema alternativo).

As fêmeas secas em pré-gestação, do desmame até a cobrição (mais ou menos 7 dias) poderão ser alimentadas com MIT ou MIS no mesmo esquema das gestantes nos últimos 30 dias de gestação e os cachaaos (reprodutores) poderão ser alimentados com MIT ou MIS no mesmo esquema das gestantes normais, ou seja, com 3120g de MIT ou 3790g de MIS mais 430g de concentrado proteico.

Pode-se avaliar economicamente o uso de MIT ou MIS para fêmeas gestantes através das mesmas relações de preços usadas para as fases de crescimento e de terminação.

RMI PARA SUÍNOS NAS FASES DE CRESCIMENTO, DE TERMINAÇÃO E DE GESTAÇÃO.

Para uso de mandioca seca (naturalmente ao sol ou artifi-

Tabela III
Rações para suínos em crescimento, em terminação e em gestação contendo RMI, farelo de soja e núcleo

	Crescimento	Terminação	Gestação
RMI	66,7	71,0	73,7
Farelo de soja	30,3	26,5	22,3
Núcleo completo	3,0	2,5	4,0
Total	100,0	100,0	100,0

cialmente em secadores) nas dietas dos suínos, recomenda-se o sistema de alimentação a vontade em comedouros semi-automáticos para as fases de crescimento e de terminação e o sistema de alimentação controlada em duas refeições diárias de 1Kg por refeição na fase de gestação (esquema normal). Pode-se, também, fornecer 1500g de ração nos 80 a 85 primeiros dias de gestação e 2500g de ração nos últimos 30 dias de gestação, antes do transporte para a maternidade (esquema alternativo).

As fêmeas em pré-gestação poderão ser alimentadas de acordo com o esquema normal.

Na tabela 3 estão apresentadas rações à base de RMI e farelo de soja mais núcleo completo que podem ser elaboradas na própria granja para uso nas dietas dos

suínos.

Pode-se avaliar economicamente o uso do RMI nessas dietas através da seguinte relação de preços.

Se o preço do Kg de RMI for menor do que 1.10 vezes o preço do Kg de milho menos 0,17, o preço do Kg de farelo de soja menos 0,004 vezes o preço do núcleo completo, ele será a produção de 1Kg de suíno a custo menor do que com base de milho.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRÍCOLA - EMBRAPA - VINCULADA ao Ministério da Agricultura - Reforma Agrária - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA SUÍNOS E AVES - CNPSA - 153, Km 110 CEP 89700-000 - Concórdia - SC.

COINCIDÊNCIA?

Dos 5 primeiros touros classificados no anuário 90/91 do Serviço de Controle Leiteiro, 3 são FB

2º - FB TERROR DPL + 214,0 / REP 42,2% / 26 FILHAS AVALIADAS

3º - FB DEGAS DPL +176,3 / REP 56,8% / 40 FILHAS AVALIADAS

5º - FB LEGÍTIMO DPL + 139,6 / REP 50,5% / 26 FILHAS AVALIADAS

KÊNIA AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA - FAZENDA SANTANA DA SERRA

Rodovia SP 338 (Mococa/Cajuru) km 295 - Fones (0196) 55-0801 ou 101 (telefonista) pedir Canoas - SP - 0811

Filiado à ABCGIL

**REVISTA
DOS
CRIADORES**

ANEXO A REVISTA DA PECUÁRIA
ANOS 1950-1970 - R\$ 10,00
ANOS 1971-1980 - R\$ 15,00

**O longo
circuito da carne**

**VOCÊ
ENCONTRA
TUDO**

**sobre a
criação de
BOVINOS
EQUINOS
SUÍNOS**
(E OUTROS ANIMAIS)

REVISTA DOS CRIADORES

**A publicação
mais completa
em pecuária**

**66 ANOS DE EXPERIÊNCIA
SEMPRE ATUALIZADA
EDITORA DOS CRIADORES LTDA.**

INDICADOR AGROPECUÁRIO COOXUPÉ

PRODUTO	ANÁLISE
CAFÉ	Os fundamentos do mercado indicaram um mês com mercado firme e recuperação de preços, mas a realidade foi muito diferente. O mês começou com o RA1 a R\$ 150,00, chegando a R\$ 136,00, baixando para R\$ 142,00 e no início de junho atingindo R\$ 136,00. Com a liberação de recursos para a colheita, recuperação de lavouras e constatação da baixa safra deste ano, o mercado não se recuperou.
ARROZ	O preço do arroz piorou 8% em relação ao último mês e o poder de troca é um dos piores registrados neste indicador. O mercado continua abastecido com o produto e não há sinais do aumento da procura. Há registro de entrada do produto importado da Argentina e a morosidade do governo na liberação de recursos para a comercialização forçam produtor a vender a produção o que provocou esta queda nos preços. Até que se dê a liberação dos recursos para comercialização, não há tendência de melhora do mercado.
LEITE	A novidade do mercado ficou por conta das embalagens. De acordo com o tipo de leite (A, B e C) as cores diferenciadas, sendo azul (A), verde (B) e cinza (C). Estas cores virão em forma de latas, que terão 1 litro de altura, dispostas na parte inferior das embalagens. Quanto aos preços, sem novidades para o produtor. O preço do leite tipo B está cotado a R\$ 0,28.
MILHO	Como era previsto o mercado caiu um pouco, pois a oferta é muito grande. A falta de empréstimos para estocagem e as indefinições dos indexadores dos juros para agropecuária pressionam mais a oferta, com consequente desinteresse do comprador e a consequente queda de preços. Os problemas climáticos em várias zonas produtoras no mundo, tem deixado o mercado internacional mais aquecido e, a médio prazo, isto pode se refletir no mercado interno, pois a importação fica proibitiva, com consequente recuperação dos preços.
FEIJÃO	O preço do feijão é praticamente o mesmo do mês passado. Normalmente, no mês de junho o preço começa a melhorar, mas isto não aconteceu na primeira semana do mês. Existe muita oferta no mercado e as indústrias empacadoras estão com baixa liquidez, com pouca participação nas compras. Estes fatores mantêm o mercado calmo, sem alterações nos preços.
SOJA	O preço da soja piorou 8% em relação ao último mês. O mercado sofreu oscilações nas bolsas de Chicago devido às condições climáticas adversas para o plantio americano. O plantio está atrasado e este ano a colheita no meio oeste americano deverá ser menor. Enquanto isso, nos países do Cone Sul, a colheita se desenvolve normalmente, com boa produtividade.
HORTALIÇAS	No mês de maio, os preços estiveram em baixa em função das grandes ofertas de mercadorias e procura nos Estados. Os preços foram: beterraba, ex 25KG, R\$ 6,00 a R\$ 8,00, a cenoura, ex 25kg R\$ 3,00 a R\$ 5,00; tomate, ex 23kg, R\$ 12,00 a R\$ 15,00; pimentão, ex 12 kg R\$ 8,00 a R\$ 10,00. A cebola está sendo comercializada pela Argentina. Preço varia entre R\$ 0,90 a R\$ 1,00 o quilo, pagando à vista. A safra de cebola bulbinho na região do Vale do Rio Pardo está começando. Preço: R\$ 0,88 a R\$ 0,95 o quilo. Pagamento: 23 dias.
CANA	O governo ainda não definiu o futuro do Pró-álcool. A indústria automobilística reduziu a produção de veículos à álcool dos 20% normais para 3,7 em fevereiro. Este é um sinal de que as indústrias não estão apostando na volta dos incentivos. Enquanto isso, os produtores estão começando a sair 95/96 sem perspectiva de aumento da produção de álcool, apenas na produção de açúcar.
CARNES	O preço da arroba do boi gordo baixou um pouco e está cotada a R\$ 22,00 para pagamento em 12 dias. Mercado calmo, com poucos negócios, apesar da liberação de exportação da carne bovina para o Estado de São Paulo. O preço da arroba do suíno baixou 16% e atingiu R\$ 15,50 para pagamento em 12 dias. O preço do frango vivo subiu 25% e o poder de troca melhorou 30%.

1 - DATA DE REFERÊNCIA: 31/05/95 2 - Café preço médio RA 1 COOXUPÉ 3 - Os volumes são líquidos recebidos pelo produtor
 - Dólar Câmbio - Flutuante preço de compra R\$ 0,970 5- No caso do leite, descontar frete e Futuro
 6- Analista: Alexandre Vieira Costa Monteiro - engenheiro agrônomo COOXUPÉ

PREÇO	PODER DE TROCA
Saca de 60 kg	Sacas necessárias para adquirir 1 t. de 20-05-20
R\$ 142,00	
R\$ 146,39	1,67
Saca em casa de 60 kg	Sacas necessárias para adquirir 1 t. de 04-14-08 + zinco
R\$ 9,00	
R\$ 9,30	18,60
litro de Leite C	Litros necessários para adquirir 1 t. de ração 22% AE
R\$ 0,24	
R\$ 0,30	618,30
Saca de 60 kg	Sacas necessárias para adquirir 1 t. de 04-14-08 + zinco
R\$ 5,80	
R\$ 5,97	28,86
Saca de 60 kg	Sacas necessárias para adquirir 1 t. de 04-14-08
R\$ 30,00	
R\$ 31,00	5,60
Saca de 60 Kg	Sacas necessárias para adquirir 1 t. de 00-20-10
R\$ 8,00	
R\$ 8,30	23,70
Saca de Cenoura 25 Kg	Caixas necessárias para adquirir 1 t. de 04-14-08
R\$ 3,00	
R\$ 3,10	55,80
Tonelada	Ton. necessárias para adquirir 1 t. de 18-00-27
R\$ 11,974	
R\$ 12,100	20,90
kg frango vivo	Quilos necessários para adquirir 1 t. de ração final
R\$ 1,50	
R\$ 1,51	420,40

INDICADORES GERAIS	MAIO/95	No ano	Últimos 62 dias	Jun/95
UFIR	0,00	4,34	ND	ND
Dólar oficial	-1,09	7,47	27,19	ND
Ouro(BM&F)	-2,40	4,90	51,31	ND
TR	3,24	13,62	99,02	2,88
IGP - M	0,58	6,25	79,77	2,00
RENDA DO DINHEIRO				
Poupança	3,76	16,48	111,72	3,39
CDB Pré (Taxa Bruta)	3,91	20,29	124,37	3,78
CDB Pós (Taxa Bruta)	3,78	20,45	126,08	3,80
Fundos de Curto Prazo				
(Taxa Bruta)	3,03	15,41	98,67	3,00
CUSTO DO EMPRÉSTIMO				
Crédito Rural	4,27	19,99	127,53	3,91
Desconto de NP	10,56	51,84	234,63	10,00
Cheque especial	15,00	94,90	538,82	15,00

(1) Dados disponíveis até 2.6.95 ND - Não disponível

TRATORES NOVOS E USADOS R\$

MARCA MODELO	ZERO	1994	1993	1992	1991	1990	1989
MASSEY 250X-Estrela	18.700	15.090	13.627	12.174	10.950	9.800	8.674
MASSEY 250X	15.800	14.220	12.789	11.518	10.306	9.329	8.300
VALMET 585-Frutelro	20.200	18.180	16.362	14.725	13.252	11.920	10.793
MASSEY 266	19.900	17.910	16.119	14.507	13.056	11.750	10.575
MASSEY 275	25.300	21.510	19.959	17.423	15.580	14.112	12.700
VALMET 885	31.700	28.530	25.677	23.108	20.700	18.718	16.826
MASSEY 292	31.400	28.260	25.434	22.850	20.601	18.540	16.686

Preços médios calculados pelas agências, referentes ao dia 07/06/95 - ND - Não disponível.

cooxupê

COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES DE GUAXUPÉ LTDA

Rua Manoel Joaquim Magalhães Gomes, 400
 Tel: (038) 551.5000 - Ramal 258 - telefax: 35.7250/05.7285-
 Fax: (038) 551.5200 - Guaxupé - MG - Caixa postal 104 -
 CEP 37400 - 000

Conselho de Administração:

Isaac Ribeiro Ferreira Leite

Presidente

Carlos Alberto P. da Costa

Vice-Presidente

Antonio Carlos de Oliveira Martins

Renato Ribeiro

Getúlio José dos Reis

Carlos Augusto Rodrigues de Melo

Gabriel Francisco Junqueira de Andrade

Jedo Paulo Muniz

Superintendentes

Orlando Carlos Edtore

Arthur Octávio Varella Caldeira

José Geraldo Rodrigues de Oliveira

Otto Vilas Boas

Joaquim Lúcio Ferreira Leite

Joaquim Luiz de Castro Filho

Conselho Fiscal

Efetivos

Eduardo Engel

José João Salgado dos Reis

Romeu Bachiolo

Suplentes

Ademir Vedovato

Márcio Cardoso Monteiro

Elcio Pedro de Sousa

NOTÍCIAS

EXPOCORTE, 95: EVENTO REÚNE 1.800 BOVINOS E ENTRA PARA O CALENDÁRIO DAS MAIORES EXPOSIÇÕES DO PAÍS

Realizada entre os dias 26 de Junho e 02 de Julho, no Agrocentro/Parque da Água Funda, em São Paulo, a Expocorte'95 contou com a participação de 1.800 animais de 14 raças de bovinos de corte - Blond D'Aquitaine, Canchim, Chianina, Marchigiana, Limousin, Nelore Padrão, Nelore Mocho, Pardo Suíço, Piemontês, Simental, Simbrasil, Tabapuã, Santa Gertrudis e a raça belga Belgian Blue, pouco conhecida no País e com uma curiosidade: as fêmeas não realizam parto "normal", há necessidade de uma intervenção cirúrgica para que as vacas possam parir. Criadores e associações de outros países como Argentina, Uruguai, Paraguai, EUA e França compareceram ao evento para ver de perto a maior mostra da pecuária de corte da América Latina.

Na abertura oficial do evento, o governador de São Paulo, Mario Covas e o secretário da Agricultura, Antonio Cabrera, anunciaram o lançamento do Programa Estadual Incentivo à Produção do Novilho Precoce, que prevê a redução de até 50% do ICMS na comercialização desse tipo de gado.

Cerca de 50 expositores apresentaram produtos e serviços ligados à agropecuária - máquinas agrícolas, ração, genética, sanidade, equipamentos entre outros, além de artigos derivados do couro e selarias.

Os 10 leilões ofertaram nada menos que 300 animais. Entre eles, os das raças Nelore e Limousin obtiveram as melhores médias do evento. O leilão de Nelore mocho "Ver - O - Peso na Garoa" obteve média de R\$ 5.500,00, Magia das Netas, uma fêmea de 20 meses, e Filtro ESL, macho de 32 meses,

vendidos por R\$ 30 mil, não só foram os animais mais caros deste leilão, como também os recordes de preço da Expocorte'95. Outro grande destaque foi o remate de Limousin realizado na sexta-feira, 30 de Junho. Contando com a participação de 27 animais de excelente qualidade, este leilão obteve a maior média da Expocorte: R\$ 6.270,00. O lote mais caro foi Erode, fêmea de 77 meses, eleita Grande Campeã na Exposição Nacional da Raça Limousin, comprada por R\$ 28.800,00. Segundo o presidente da Expocorte, Antônio Carlos Pinheiro Machado, foram colocados à venda animais dos melhores plantéis do país. "Os criadores encararam com seriedade a proposta da Expocorte'95 e trouxeram à pista animais de excelente qualidade", diz. O faturamento dos leilões foi de quase US\$ 1 milhão, marca que os organizadores esperam dobrar no próximo ano.

Além dos leilões, a excelente qualidade dos animais que participaram dos julgamentos, também marcou a Expocorte. A Associação Brasileira dos Criadores de Limousin, por exemplo, realizou a Exposição Nacional da Raça, fazendo dos julgamentos uma mostra da evolução da pecuária de corte nacional. A presença de animais como o Grande Campeão de Paris da Raça Limousin em 1993, Ecu, de propriedade de Amílcar Yamin, demonstrou a força da exposição. "A Expocorte está definitivamente incluída no calendário das maiores exposições do País. Além da presença de grandes campeões internacionais, realização de exposições nacionais e do IV Encontro das Américas da Raça Santa Gertrudis, outras associações, antes mesmo do término do evento, manifestaram interesse em participar da Expocorte'96", afirma Pinheiro Machado.

Maiores Informações: (011) 872-0420. Atendimento à Imprensa: Texto Assessoria de Comunicação - Tel. (011) 816-0963

EMPRESAS PARTICIPAM 32a. EXPO

A 32ª Exposição de Agricultura de Presidente Prudente, que este ano acontece de 04 a 17 de setembro próximo, contará com a participação de empresas de vários estados, como Paraná e Rio de Janeiro. A mostra prudentense contará com a presença já conhecida do Banco Bradesco, Presidente Prudente, Brasimex, também de Prudente, e Rio Refrigerantes S/A, de Regener (SP), representante da Coca-Cola região.

As empresas Herbico, Paulista Ltda, Selaria Mar Prudense Comércio e Representação Ltda. e Tairaus Central de Congelamento Sêmen, de Presidente Prudente, estarão com stands, ao lado das empresas Sementes Cobec, Indústria Comércio, Importação e Exportação Ltda., de Pirapózinho (Lagoa da Serra Insemita Artificial Ltda., de Sertãozinho (SP); Tortuga Companhia Técnica Agrária; Merck Saúde Dohme Farmacêutica e Veterinária Ltda.; Walbor Comércio e Indústria de Tintas Ltda.; e Laboratório Pfizer Ltda, de São Paulo) e Comércio e Indústria Mar Importação e Exportação Ltda. Alvarés Machado (SP); In Beckheuser Companhia Ltda. Paranaíba (PR); Santa El Comercio de Importação e Exportação Ltda., de Pinassungua. Ainda estarão participando a Universidade do Oeste, Novo Unoeste, de Presidente Prudente, Pink Panther Diversões Ltda. Niterói (RJ); e Buffet Mar Glace, de Maringá (PR).

ALTA QUALIDADE NO DE NELORE MOCHO

Eles são os principais selecionadores de Nelore Mocho. Dia 21 de agosto próximo, em Viacava, Bordon, Ovidio Machado Brito Agrop., e Varela Agrop., promovem no Palácio

culo, a décima-segunda versão do 3-B de Nelore Mocho, na companhia de outros três criadores, Dionísia Conceição de Souza, Djalma Bezerra e Tarso Flecha de Lima.

40 animais puros compõem a lota. Segundo um dos criadores, Carlos Viacava, o ponto de escolha dos lotes pauta-se na qualidade. "A proposta é dar continuidade a tradição do 3-B e oferecer somente gado de alto nível", afirma ele.

A expectativa dos criadores é de repetir os resultados da venda 94 do 3-B, quando 45 animais foram negociados pela soma de US\$ 13,5 mil, a melhor média ano para o Nelore-Mocho.

Destaque na oferta são os animais premiados nas mais importantes mostras agropecuárias do país, como a expo-zebu de Jaboa-MG.

A Remate é a empresa leiloeira organizadora. Tel.: (011) 872 1722

LEILÃO NELORE LEMGRUBER RENDE US\$ 185,1 MIL

O Leilão Elite de Pasto, realizado no último dia 27 de maio na Fazenda Mundo Novo (Grupo Lemgruber) em Brotas-SP, vendeu todos os touros de 18 meses contratos e 50 novilhas de 30 meses contratadas, para 15 compradores oriundos de SP,MS,MG e GO.

O valor total apurado foi de R\$ 185.090, com médias de US\$ 3.700 para os machos e US\$ 1.600 para as fêmeas. O pecuarista Sérgio Carlos Pereira de Mello, de São Sebastião da Gramma (SP), foi o maior comprador do leilão, tendo contratado o touro mais caro (R\$ 6.480) e o lote de novilhas mais valorizado (US\$ 2.945/cabeça).

Trata-se de resultado bastante interessante para animais que foram criados a campo, com a mãe, até a idade adulta. Nessa idade, os machos apresentam melhor desempenho participando de PGP/ABCZ até 1 ano, sendo novamente para o pasto, sendo foram escolhidos para o

leilão. As fêmeas permaneceram o campo até a realização do remate. Os interessados receberam 10 dias antes do leilão o catálogo de todos os lotes a venda com os dados de performance individual de cada um, bem como das progênes observadas tanto do pai, quanto da mãe. "É uma oportunidade dada aos clientes para que tenham tempo suficiente para analisar e fazer uma escolha judiciosa dos animais que lhes interessam" diz Eduardo Cardoso, da Fazenda Mundo Novo.

Segundo a gerência da Fazenda, é importante que 15 criadores diferentes tenham adquirido o Nelore Lemgruber neste leilão, pois mostra um amplo interesse no trabalho de melhoramento da raça, além de ajudar na sua disseminação nas mais variadas regiões do país.

A venda foi feita em 10 parcelas mensais, fixas.

EMBRAPA PROMOVE SEU LEILÃO ANUAL DE CANCHIM

O XXIX Leilão de Animais Canchim da EMBRAPA aconteceu no dia 22 de junho passado, na Fazenda Canchim, em São Carlos, SP, e comercializou 83 animais, obtendo liquidez total na venda.

O lote mais caro do dia foi o touro 204306, que saiu por R\$ 3.420,00 para José Vagner Vieira de Souza, criador de Cassilândia, MT. Os 36 touros apresentados foram vendidos por uma média de R\$ 1.469,00. Os touros MA alcançaram o valor médio de R\$ 1.1182,00. Na categoria de fêmeas Canchim foram apresentadas 27 novilhas da EMBRAPA, comercializadas por uma média de R\$ 740,00 além das 10 fêmeas doadas por criadores para a Associação Brasileira de Criadores de Canchim e vendidas pela média de R\$ 690,00.

O maior comprador do evento, Augusto N. Tulia, veio de Santos, SP e desembolsou R\$ 19.200,00 pelos exemplares da raça Canchim que adquiriu.

A EMBRAPA promove este leilão anualmente, dentro de sua unidade em São Carlos, SP, a fim

de colocar a disposição dos criadores, o que há de melhor de sua linhagem de Canchim. São animais criadores a campo, que possuem a rusticidade e precocidade tão desejadas na moderna pecuária de corte e ideais para a produção do novilho precoce a campo.

LEILÃO PENSAMENTO FAZ MÉDIA DE R\$ 9,772 MIL

Reunindo animais descendentes do reprodutor Pensamento FM, um dos precursores da raça Mangalarga, o IX Leilão Pensamento aconteceu nesta segunda-feira, 5 de junho, no Palace, na capital paulista. O pregão vendeu 34 lotes com faturamento total de R\$ 332,280 mil, o que dá uma média de R\$9,772 mil.

O lote 5, Frenezia Três Rios, uma alazã nascida em setembro de 91, filha de Hermos OJC em Delta GPI, coberta pelo Campeão nacional Premiado DL, foi o produto mais valorizado. Na batida do martelo do leiloeiro João Gabriel, a fêmea saiu por R\$ 36,400, numa venda de Armando Raucci, da Fazenda Jaguaruna, para Marcio de Paula Mitsuishi.

O veterano criador José Oswaldo Junqueira, responsável pela seleção do garanhão Pensamento e pela marca JO, colocou em pista Cartilha JO, uma alazã filha de Turbante JO, líder do ranking Mangalarga, de quem Cartilha JO está com prenhez confirmada. Cartilha JO, que traz Anistia JO na linha materna, foi apresentada pela bicampeã brasileira de enduro, Isabel Fleury, bisneta do "mestre" José Oswaldo, alcançando o preço final de R\$ 34,450 mil segundo maior lance do leilão, numa compra de Antônio Perez Júnior.

Turbante JO, garanhão-chefe da Fazenda Santa Amélia (São José do Rio Pardo, SP), detém o título de "Garanhão do Ano" desde 1982. Os dez melhores reprodutores Mangalarga do mercado tem o sangue de Turbante no seu pedigree. Mais informações pelos telefones: 831-7944 ou 563-9580.

EMBRAPA VAI SEDIAR O II ENCONTRO ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO AGROPECUÁRIA

Os preparativos do II ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO AGROPECUÁRIA a ser realizado de 28 a 30 de setembro/95, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte (CNPGC) da EMBRAPA, sediado em Campo Grande-MS, estão em ritmo acelerado.

Muitas empresas de máquinas agrícolas já confirmaram sua participação no evento que está sendo coordenado estão incluídas palestras técnicas, demonstrações a campo de plantas forrageiras, fertilidade de solo e de máquinas agrícolas como colhedoras, plantadoras, grades niveladoras, pulverizadores e demais equipamentos.

A AGRODINÂMICA, como também está sendo chamado o II ENCONTRO, certamente será uma grande oportunidade para agricultores e pecuaristas debaterem temas como o de recuperação de pastagem via agricultura, manejo de solo e de pasto, entre outros assuntos.

Os organizadores deste II ENCONTRO acreditam que o sucesso se repetirá, a exemplo do primeiro realizado em setembro de 1994, no município de Maracaju, e contam com o apoio de várias entidades do estado: CPAQ/EMBRAPA, SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE BANCO DO BRASIL e outras.

Informações adicionais poderão ser obtidas nos seguintes locais: CNPGC/EMBRAPA, fone 763-1030 ramal 264 com José Antônio Schenk; * FUNDAÇÃO MS, fone 454-2631 com Edson ou Paulo; * COOAGRI, fone 726-2244 ramal 23 com Marcia.

EMBRAPA: BR 262, KM 4 CAIXA POSTAL 154 CEP 79002970 CAMPO GRANDE-MS TELEFONE: 763-2245 E 763-2700.

CIBA SEMENTES COMPLETA LINHA DE PRODUTOS COM CINCO NOVOS HÍBRIDOS DE ALTA TECNOLOGIA

A Ciba Sementes está completando sua linha de milho híbrido no mercado brasileiro com o lançamento de cinco novos produtos: Tecnus, Avant, Star, Veloz, e Exceler. Destinados a atender as diferentes necessidades dentro de uma propriedade agrícola, os novos híbridos são recomendados para o plantio na área mais fértil e corrigida da fazenda. A partir desta safra, eles estarão disponíveis para a escolha da melhor semente para o tipo de agricultura desejada.

Grãos duros, pesados e de coloração alaranjada, caracterizam os lançamentos. Foram necessários oito anos de trabalho nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e produção para se chegar aos novos híbridos nos parâmetros exigidos pela agricultura brasileira.

O Tecnus, como o próprio nome já sugere, é um milho híbrido simples de altíssima tecnologia, superprecoce, para ser plantado na primeira época do plantio nas regiões Sul e Centro. Já o Avant é um milho híbrido simples, precoce, recomendado para o plantio na primeira época em áreas de sequeiro e irrigada, especialmente nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e para culturas irrigadas na região Centro do país com altitudes acima de 700 metros. O Star, por ser um milho híbrido simples semi-precoce, rende o máximo em produtividade. Possui alta qualidade de grão e é adequado as regiões Sul e Centro.

Recomendado para acelerar a produtividade, o Veloz é um híbrido triplo, superprecoce, indicado também para a primeira época em áreas abaixo de 650 metros de altitude nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Exceler, quinto milho lançado pela Ciba, apresenta alta tolerância a doenças foliares e de colmo. Híbrido triplo e precoce, ele completa a lista dos milhos de tecnologia da

ponta. É recomendado para o plantio no cedo e no tarde no Centro do país.

Além dos híbridos, a Ciba Sementes traz outra novidade: reduzir o tempo gasto na abertura do saco de semente de milho. A empresa desenvolveu um sistema simples, que consiste na costura de um fio a extremidade da abertura, permitindo a abertura do saco mais rapidamente.

Segundo Eduardo Basso, Gerente de Negócios da Ciba Sementes, com o lançamento dos novos híbridos, "a linha está segmentada e pronta a atender diversas necessidades do produtor".

Para responder as dúvidas de todos os seus produtores e sua oficina a Ciba Sementes mantém um serviço Hot Line 24 horas por dia, pelo telefone (011) 542-6967.

TRANSPORTADORA BRASIL AGRÍCOLA LTDA

Transportadora Brasil Agrícola é uma sociedade de incentivo à agricultura com larga experiência no transporte agrícola e de transportes no Brasil. Esta fusão de conhecimentos e recursos base de uma empresa ao nível nacional dedicada a transportes e logística de produção agrícola e insumos agrícolas.

A empresa é responsável por ser bem organizada, para assim garantir prazos de entrega e o zelo das mercadorias transportadas. Executa serviços ao nível nacional para evitar os fluxos de mercadorias e a disponibilidade de caminhões e motoristas autônomos e frota. Atualmente são cadastrados 3.000 trucks e carretas, disponíveis para transitar em qualquer região do Brasil.

A empresa tem estrutura para atender as necessidades específicas de cada cliente, mantendo o cliente bem informado sobre o movimento das suas mercadorias. O nível de atendimento da Transportadora Brasil Agrícola economizará para o cliente o tempo e esforço pessoal no planejamento e apoio a produção.

CURSOS DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para iniciar o trabalho com o cliente, é preciso uma definição das necessidades, a frequência das visitas e o tipo de mercadoria a ser comercializada. Em seguida seria feita uma reunião sobre estes percursos. A intenção da empresa obter um grande volume de vendas sem assumir uma modesta margem do movimento dos produtos que pode ser sempre compensada com eficácia e rapidez. A meta da Transportadora Agrícola é o compromisso de desempenho que contribuirá para o sucesso dos negócios da sua empresa.

OPORTUNIDADE PARA EMBRAPA

Estão abertas as inscrições, até o dia 18 de agosto, para candidatos ao cargo de chefe geral do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, localizado em Cordeiro do Pacheco (MG). A Embrapa Brasileira de Pesquisa em Gado de Leite (CNPGL) está implementando uma nova política de sucessão gerencial, visando democratizar o processo de escolha de gerentes das unidades descentralizadas.

No novo modelo, procede-se a um curso público aberto, no qual os candidatos são submetidos a uma série de títulos, apresentação de currículo de trabalho por escrito e entrevista com um Comitê de Seleção da unidade a qual está se candidatando. O Comitê de Seleção é composto por membros da Embrapa e de instituições parceiras.

O novo sistema de sucessão é baseado no modelo de escolha de gerentes praticado pelo CNPGL desde 1990, quando o então coordenador do Setor de Difusão de Tecnologia, Alberto Duque Portugal foi substituído pelos próprios responsáveis do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite.

O novo sistema de sucessão está sendo implementado para os profissionais de outras

AGOSTO		
P 11	Paisagismo interior	das 09h00 às 17h00;
12	Criação de codornas	das 09h00 às 13h00;
P 14	Ferti-irrigação	das 09h00 às 17h00;
P 17	Controle de cupins em áreas urbanas e rurais	das 09h00 às 17h00;
15 e 16	Criação de escargots	Helicicultura das 19h00 às 22h00;
18	Cultivo de cogumelos	Fungicultura das 09h00 às 14h00;
19	Criação de escargots	Helicicultura das 08h00 às 13h00;
25 e 26	Criação de minhoca	Minhocultura no dia 25 das 19h00 às 22h00 e no dia 26 das 09h00 às 12h00;
30 e 31	Cultivo de orquídeas	Orquidocultura das 19h00 às 22h00;
SETEMBRO		
02	Criação de escargots	Helicicultura das 08h00 às 13h00;
09	Criação de escargots	Helicicultura das 08h00 às 13h00;
P 12 e 13	Planejamento, gerenciamento e uso de máquina e implemento em uma propriedade agrícola	das 09h00 às 17h00;
P 14	Princípios e aplicações de gerenciamento da qualidade total na agropecuária;	
15 e 16	Criação de Minhoca	Minhocultura dia 15 das 19h00 às 22h00 e no dia 16 das 09h00 às 12h00.
30	Criação de escargots	Helicicultura das 08h00 às 13h00.

Todos os cursos são ministrados na sede da AEASP, na rua 24 de maio, 104 14, andar São Paulo. Inscrições antecipadas e maiores informações pelos telefones (011) 223-9483 ou 221-6322.

instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, de ciência e tecnologia e do setor agrícola possam concorrer ao cargo de chefe de qualquer unidade da Embrapa.

Para ser candidato ao cargo de chefe geral do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite, o candidato deve: a) ser brasileiro nato ou de outra nacionalidade, desde que, nesta última hipótese, tenha domínio da Língua Portuguesa; b) possuir, pelo menos, o curso de mestrado concluído; c) possuir mais de dez anos de experiência em atividades de ciência e tecnologia ou relacionados ao negócio agrícola, excluído o período de pós-graduação; e d) possuir, no mínimo, três anos de experiência em coordenação e/ou gerência em instituições de pesquisa ou ensino, públicas ou privadas.

Na opinião do presidente do Comitê Técnico Interno do CNPGL, o chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento, Duarte Vilela, a nova política de sucessão gerencial que está sendo implementada privilegia a competência do candidato e confere a Embrapa maior eficiência, transparência e interação com a sociedade.

Calendário da Seleção Inscrições: Até o dia 18.08.95, direto no CNPGL, a Rodovia MG 133, Km 42, Coronel Pacheco (MG) 36155-000, ou via postal;

Apresentação da Proposta de Trabalho: Até o dia 01.09.95 ao presidente do CIT/CNPGL, Dr. Duarte Vilela;

Apresentação Oral da Proposta de Trabalho: Prevista para os dias 11 e 12/09/95.

LIVRO PARA CONTABILIDADE

Preparado de acordo com as atuais exigências para se fazer a contabilidade da parte agrícola e pecuária da fazenda. A seguir um resumo das partes de que compõem o livro para Contabilidade.

CAPÍTULO I DESPESAS DO ANO CIVIL

Parte I

Construções e Instalações.
Melhoramentos. Formação de culturas permanentes, essenciais florestais e pastoris.

RESUMO DAS DESPESAS EM FORMAÇÃO

Parte II

Despesas com aquisições.
Equipamentos motorizados.
Equipamentos a tração animal.

Parte III

Despesas com aquisição de animais para: formação e/ou melhoria do plantel, reprodutores, etc.

Parte IV

Despesas com: Insumos de alta produtividade para todas as explorações do imóvel; sementes e mudas; fertilizantes e corretivos, etc.

Parte V

Despesas: Diversas sem coeficiente ou de custeio; sementes e saís; combustível e lubrificantes, etc.

CAPÍTULO II RECEITAS DO ANO CIVIL

Venda de milho, de leite, de vários, etc.

CAPÍTULO III INVENTÁRIO

Controle sobre o desenvolvimento do rebanho durante o ano civil.
A - Terra. Início do ano. Área em hectares, valor unitário, valor total, fim de ano, etc.
B - Culturas permanentes.
C - Benfeitorias: Construções, instalações e melhoramentos.
D - Máquinas, veículos e equipamentos.
E - Animais de produção ou criação.

Reprodutores e de trabalho.
De criação ou produção: terras, vacas, novilhos, bezerras ou bezerras, etc.
Áreas agrícolas ou agriculturável.
Culturas hortícolas ou flores. Culturas temporárias e permanentes, pastarias.
II - Área florestal.
III - Área edificada.
IV - Área improdutiva.
V - Quantidade, preço médio, unitário e valor total; animais de produção: bovinos, bubalinos, suínos, animais para recria e engorda, etc.
VI - Animais de trabalho.
F - Produtos e materiais.
Investimentos.

CAPÍTULO IV RESULTADOS FINANCEIROS E IMPOSTO DE RENDA

Parte VI

Resultados financeiros apurados na empresa. Despesa e receita.

Parte VII

Imposto de renda.
No livro de CONTABILIDADE

AGROPECUÁRIA há ainda um anexo para **REGISTRO AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO** para anotações sobre:

Cultura do café, registros diversos por lote ou talhão.
Pastaria, registros diversos por piquetes ou posto.
Controle da movimentação do gado; controle de cobertura, partições; controle de produção e alimentação das vacas em lactação. Registro diário de venda do leite. Datas de vacinações. Eis aí um resumo do Plano que compõe o LIVRO PARA CONTABILIDADE AGROPECUÁRIA.

Pedidos à
EDITORA DOS CRIADORES
AV. JOSÉ CESAR DE OLIVEIRA
JAGUARÉ - CEP 05317 - SÃO PAULO
Tel.: (011) 831.77.12 - 831.79.99

LUCRE PESADO

BALANÇA ELETRÔNICA PARA PESAR GADO

PESAGEM FÁCIL E RÁPIDA. CONTROLE TOTAL DO REBANHO.

Aplicações: pesagem para abate, apartação de manada, programa de engorda, seleção de matrizes. Pode pesar também sacarias, sementes, rações, etc.

- Sem gradil. Você instala a balança em bretes existentes em sua fazenda.
- Memória para 4.600 pesagens.
- Registra pesagem e quatro tipos de relatórios em tickets.
- Funciona com bateria própria (recarregável) ou de veículos, ou a energia elétrica.
- Rede de Assistência Técnica Toledo.
- Comunica com PC através do software GLINK.

TOLEDO

ALTA TECNOLOGIA EM PESAGEM

LIGUE JÁ. PEÇA FOLHETO OU MAIORES INFORMAÇÕES:

TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA.

BELÉM, PA	TEL. (091) 233-4891	FORTALEZA, CE	TEL. (085) 231-8728	RIB. PRETO, SP	TEL. (016) 626-4252
B. HORIZONTE, MG	TEL. (031) 462-4888	GOIÂNIA, GO	TEL. (062) 261-5791	R. DE JANEIRO, RJ	TEL. (021) 532-5021
CAMPINAS, SP	TEL. (019) 38-2133	MANAUS, AM	TEL. (092) 234-6241	SALVADOR, BA	TEL. (071) 384-6618
C. GRANDE, MS	TEL. (067) 741-1300	P. ALEGRE, RS	TEL. (051) 337-2968	S. J. CAMPOS, SP	TEL. (0123) 21-8157
CURITIBA, PR	TEL. (041) 222-7422	RECIFE, PE	TEL. (081) 339-4774	SÃO PAULO, SP	TEL. (011) 274-2011

MATRIZ: RUA DO MANIFESTO, 1183 - CEP 04209-901 - SÃO PAULO - SP - BRASIL

Portátil

capacidade até 2.000 kg.
pesa até 300 animais/hora.

EXPLORAÇÃO LEITEIRA

A MELHOR E MAIS ÚTIL PUBLICAÇÃO QUE OS NOSSOS ESPECIALISTAS PRODUZIRAM PARA O PRODUTOR DE LEITE

PUBLICAÇÃO PATROCINADA PELA ANPES
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROGRAMAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL

3.ª EDIÇÃO REVISTA

- CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO
- CAPÍTULO 2 — MELHORES PASTOS, CHAVE PARA A PRODUÇÃO MAIS ECONÔMICA DE CARNE E LEITE
- CAPÍTULO 3 — ALGUNS FATORES QUE AFETAM A PRODUÇÃO DE CULTURAS FORRAGEIRAS
- CAPÍTULO 4 — AS FORRAGEIRAS: GRAMINEAS E LEGUMINOSAS
- CAPÍTULO 5 — ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PASTAGENS
- CAPÍTULO 6 — A MÁQUINA ANIMAL
- CAPÍTULO 7 — SUPLEMENTAÇÃO DAS PASTAGENS
- CAPÍTULO 8 — A ROTAÇÃO PASTAGEM-CULTURA
- CAPÍTULO 9 — CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pedidos à EDITORA DOS CRIADORES LTDA.

Neguvon®

Líder em todos os campos

Eficiente:

Neguvon é o melhor no tratamento contra bernes, vermes, habronemose, sarnas, gasterofiloze, oestrose e no combate à piolhos e moscas.

Versátil:

Neguvon pode ser utilizado através da pulverização, por via oral, pincelamento, método pour-on ou ainda através de iscas.

Neguvon®

Bernicida, Oestricida, Inseticida

Peso líquido: 150 g
Uso Veterinário

para bovinos, eqüinos, ovinos, suínos e aves

Prático:

Com Neguvon você trata bovinos, eqüinos, caprinos e aves.

Econômico:

Neguvon tem o menor custo por multiplicidade de uso.

Apresentação:

150 e 500 g

Bayer

Se é Bayer, é bom.